


数学基础知识必备手册

第一章 实数及其运算

一、实数及其运算

1. 实数的分类



2. 实数相关概念

(1) 自然数: 我们把 0、1、2、3、4……等, 非负整数叫做自然数.

(2) 奇数与偶数

①能被 2 整除的整数叫做偶数，常表示成 $2k$ (k 为整数)；
不能被 2 整除的整数叫做奇数，常表示成 $2k+1$ 或者 $2k-1$ (k 为整数)。

②奇数与偶数的运算性质：

偶数 \pm 偶数 = 偶数；

偶数 \times 偶数 = 偶数。

奇数 \pm 奇数 = 偶数；

奇数 \times 奇数 = 奇数；

奇数 \pm 偶数 = 奇数；

奇数 \times 偶数 = 偶数；

(3) 质数与合数

①质数:如果一个大于 1 的整数，只能被 1 和它本身整除，
那么这个数叫做质数（或素数）。例如：2、3、5、7.....

②合数:一个大于 1 的整数，除了能被 1 和本身整除外，还能被其他正整数整除，这样的数叫做合数。例如：4、6、9.....

【注意】1 既不是质数也不是合数，2 是最小的、唯一的偶质数。

(4) 数的整除：设 $\forall a, b \in Z$ 且 $b \neq 0$ ，若 $\exists p \in Z$ 使得 $a = pb$ 成立，则 b 称能整除 a ，或 a 能被 b 整除，此时我们把 b 叫做 a 的因数，把 a 叫做 b 的倍数。

【注意】关于整除，掌握以下几个规律：

- ①被 2 整除的数，个位数是偶数；
- ②被 3 整除的数，各位数之和为 3 的倍数；
- ③被 4 整除的数，末两位数是 4 的倍数；
- ④被 5 整除的数，个位数是 0 或 5；
- ⑤被 6 整除的数，既能被 2 整除又能被 3 整除；
- ⑥被 8 整除的数，末三位数之和是 8 的倍数；
- ⑦被 9 整除的数，各位数之和为 9 的倍数；
- ⑧被 10 整除的数，个位数为 0。

(5) 公约数与公倍数

①公约数：如果一个整数同时是几个整数的约数，则称这个整数为它们的公约数；所有公约数中最大的，称为这些整数的最大公约数，比如 20 和 50 的公约数有 1、2、5、10，但是 10 是它们的最大公约数.

②公倍数：如果几个整数有相同的倍数，则称这个倍数是它们的公倍数；所有公倍数中最小的，称为这些整数的最小公倍数，如 25 和 5 的公倍数有 25、50 等，但是 25 是它们的最小公倍数.

(6) 有理数与无理数

①有理数：我们把整数、分数、有限小数和无限循环小数，统称为有理数.

②无理数；无限不循环小数叫做无理数.

(7) 实数:有理数和无理数统称为实数，实数集用 R 表示.

3.实数的运算

(1) 实数的加、减、乘、除四则运算符合加法和乘法运算的交换律，结合律和分配律.

(2) 乘方运算：

当 $a \in R, a \neq 0$ 时, $a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

负实数的奇数次幂为负数；负实数的偶数次幂为正数.


(3) 开方运算：在实数范围内，负实数无偶次方根；0 的偶次方根是 0；正实数的偶次方根有两个，它们互为相反数；正实数的平方根有两个，它们互为相反数；其中正的平方根称为算术平方根.

在运算有意义时, $a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$

二、绝对值

1. 实数 a 的绝对值定义为： $|a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$

2. 绝对值的几何意义：实数 a 在数轴上对应一点，这个点到原点的距离就是 a 的绝对值（如下图）。



3. 绝对值性质

(1) 对称性：互为相反的两个数的绝对值相等，即 $|-a| = |a|$ ；

(2) 自反性： $\frac{|x|}{x} = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ ；

(3) 等价性：① $|a| = \sqrt{a^2}$, ② $|a|^2 = a^2$;

(4) 非负性：任何实数 a 的绝对值非负，即 $|a| \geq 0$.

【归纳】其他非负性的变量：

① 正的偶数次方（根式）： $a^2, a^4, \dots, a^{\frac{1}{2}}, a^{\frac{1}{4}} \geq 0$;

② 负的偶数次方（根式）： $a^{-2}, a^{-4}, \dots, a^{-\frac{1}{2}}, a^{-\frac{1}{4}} > 0$

重要规则：若干个具有非负性质的数之和等于零时，则每个非负数必然为零.

4. 绝对值运算法则和三角不等式

(1) $|a| \leq b \ (b > 0) \Leftrightarrow -b \leq a \leq b$;

(2) $|a| \geq b \ (b > 0) \Leftrightarrow a \leq -b \text{ 或 } a \geq b$;

(3) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|, \left| \frac{b}{a} \right| = \frac{|b|}{|a|} \ (a \neq 0)$;

(4) 三角不等式

$$\textcircled{1} |a+b| \leq |a|+|b| \quad (ab \geq 0 \text{ 时等号成立}) ;$$

$$\textcircled{2} |a+b| \geq |a|-|b| \quad (ab \leq 0 \text{ 且 } |a| \geq |b| \text{ 时等号成$$

立) ;

$$\textcircled{3} |a-b| \leq |a|+|b| \quad (ab \leq 0 \text{ 时等号成立}) ;$$

$$\textcircled{4} |a-b| \geq |a|-|b| \quad (ab \geq 0 \text{ 且 } |a| \geq |b| \text{ 时等号成立}) .$$

三、平均数

1. (算术) 平均数. 定义: 设 x_1, x_2, \dots, x_n 为 n 个实数, 称

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ 为这 } n \text{ 个数的 (算术) 平均数.}$$

(2) 算术平均值常用下面方法计算:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} ;$$

2.几何平均数：设 x_1, x_2, \dots, x_n 为 n 个正实数，称

$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$ 为这 n 个数的几何平均数.

四、比和比例

1.比和比例的定义

(1) 比： a 除以 b 的商，叫做 a, b 这两个数的比，记做

$a:b$ 、即 $a:b = \frac{a}{b}$ ，其中 a 叫做比的前项， b 叫做比的后

项，若 $\frac{a}{b}$ 的商为 k ，则称 k 为 $a:b$ 的值.

(2) 比例：如果 $a:b$ 和 $c:d$ 的比值相等，就称 a, b, c, d

成比例，记作 $a:b = c:d$ 或 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ， a 和 d 叫做比例的

外项， b 和 c 叫做比例的內项；当 $a:b = b:d$ 时，称 b 为

a 和 d 的比例中项，即 $b^2 = ad$ 。

2.比和比例的性质

(1) 比的基本性质

$$\textcircled{1} a:b=k \Leftrightarrow a=kb ;$$

$$\textcircled{2} a:b=ma:mb(m \neq 0) .$$

(2) 比例的基本性质

$$\textcircled{1} \text{更比定理: } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d} ;$$

$$\textcircled{2} \text{反比定理: } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

$$\textcircled{3} \text{合比定理: } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a \pm mc}{b \pm md} = \frac{a \pm c}{b \pm d} ;$$

$$\textcircled{4} \text{等比定理: } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{a+c+e}{b+d+f} . \text{ (注意! 等}$$

比定理的使用条件: $b+d+f \neq 0$)

第二章 整式与分式

一、整式及其运算

1.常用乘法公式（逆运算就是因式分解）

$$(1) (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 ;$$

$$(2) (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc ;$$

$$(3) (a - b)(a + b) = a^2 - b^2 ;$$

$$(4) (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 ;$$

$$(5) (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3 ;$$

技巧提示：公式扩展①

$$\frac{1}{\sqrt{n+1} \pm \sqrt{n}} = \frac{(\sqrt{n+1} \mp \sqrt{n})}{(\sqrt{n+1} \pm \sqrt{n})(\sqrt{n+1} \mp \sqrt{n})} = \sqrt{n+1} \mp \sqrt{n}$$

公式扩展②

$$(a \pm \frac{1}{a})^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} \pm 2 \Leftrightarrow a^2 + \frac{1}{a^2} = (a \pm \frac{1}{a})^2 \mp 2$$

公式扩展③

$$a^2 + b^2 + c^2 \pm ab \pm ac \pm bc = \frac{1}{2}(a \pm b)^2 + \frac{1}{2}(b \pm c)^2 + \frac{1}{2}(a \pm c)^2$$

2. 整式除法定理：若整式 $F(x)$ 除以 $x - a$ 的余式为 $r(x)$ ，

则 $F(x) = (x - a) \cdot g(x) + r(x)$ ，故 $r(a) = F(a)$ 成立。

二、指数和对数的运算性质

1. 指数运算性质：

$$(1) a^0 = 1 (a \neq 0) ; \quad (2) a^m \cdot a^n = a^{m+n} ;$$

$$(3) a^m \div a^n = a^{m-n} ; \quad (4) (a^m)^n = a^{mn} ;$$

$$(5) (ab)^m = a^m b^m ; \quad (6) a^{-m} = \frac{1}{a^m} (a \neq 0) .$$

2.对数运算性质：

$$(1) \log_a (MN) = \log_a M + \log_a N ;$$

$$(2) \log_a \left(\frac{M}{N} \right) = \log_a M - \log_a N ;$$

$$(3) \log_a (M^n) = n \log_a M ;$$

$$(4) \log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a} ;$$

$$(5) \log_a 1 = 0, \log_a a = 1 .$$







三、分式运算性质：

$$\frac{A}{B} = \frac{A \times M}{B \times M} ; \frac{A}{B} = \frac{A \div M}{B \div M} (M \neq 0)$$

第三章 函数、方程、不等式

一、函数



1. 一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 的图象及性质：

一次函	$y = kx + b (k \neq 0)$			性质
$k > 0$	$b > 0$	$b < 0$	$b = 0$	y 随 x 的增大 而增大
图象				
$k < 0$	$b > 0$	$b < 0$	$b = 0$	y 随 x 的增大 而减小
图象				



2.二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象和性质

抛物线	$y = ax^2 + bx + c \ (a > 0)$
顶点坐标	$(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$
对称轴	直线 $x = -\frac{b}{2a}$
位置	由 a,b 和 c 的符号确定
开口方向	上
增减性	在对称轴的左侧,y 随 x 的增大而减小. 在对称轴的右侧, y 随 x 的增大而增大.
抛物线	$y = ax^2 + bx + c \ (a < 0)$
顶点坐标	$(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$
对称轴	直线 $x = -\frac{b}{2a}$
位置	由 a,b 和 c 的符号确定
开口方向	下
增减性	在对称轴的左侧,y 随 x 的增大而增大. 在对称轴的右侧, y 随 x 的增大而减小.

3. 指数函数 $y = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象和性质:

	$a > 1$	$0 < a < 1$
图 象		
性 质	(1) 定义域: R	
	(2) 值域: $(0, +\infty)$	
	(3) 过点 $(0, 1)$, 即当 $x = 0$ 时, $y = 1$	
	(4) 在定义域内是增函数	(4) 在定义域内是减函数

4. 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象与性质 :

	$a > 1$	$0 < a < 1$
图 象		
性 质	(1) 定义域 : $(0, +\infty)$	
	(2) 值域 : R	
	(3) 过点 $(1, 0)$, 即当 $x = 1$ 时 , $y = 0$	
	(4) 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数	(4) 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

二、方程

1.一元一次方程 $ax + b = 0 (a \neq 0)$, 解法: $x = -\frac{b}{a}$.

2.二元一次方程 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} (a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0)$ 解

法: 加减消元法, 代入消元法等.

3.一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$

(1) 解法:

①分解因式:

若 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) = 0 (a \neq 0)$, 则

$x = x_1$ 或 $x = x_2$.

②公式法: 方程两根为 $x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

(2) 根的判别式 ($\Delta = b^2 - 4ac$)

①当 $\Delta > 0$ 时, 方程有两相异的实数根;

②当 $\Delta = 0$, 方程有两相等的实数根;

③当 $\Delta < 0$ 时, 方程没有实数根.

(3) 根与系数的关系 (韦达定理)

①设方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根为 x_1 和 x_2 ,

则有如下结论:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}.$$

②韦达定理的应用: 利用韦达定理求关于两个根的代数式的数值:

$$a. x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2;$$

$$\begin{aligned} b. x_1^3 + x_2^3 &= (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) \\ &= (x_1 + x_2)[(x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2] ; \end{aligned}$$

$$c. \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} ;$$

$$d. \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2}{(x_1x_2)^2} ;$$

$$e. |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} .$$

4.一元 n 次方程

形如 $a(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) = 0$ 的方程称为

一元 n 次方程, x_1, x_2, \cdots, x_n 是它的 n 个根.

三、不等式

1.不等式的基本性质

(1) 如果 $a > b$, 那么 $b < a$;

如果 $b < a$, 那么 $a > b$; 即 $a > b \Leftrightarrow b < a$;

(2) 如果 $a > b, b > c$, 那么 $a > c$, 即

$$a > b, b > c \Leftrightarrow a > c ;$$

(3) 如果 $a > b$, 那么 $a + c > b + c$;

(4) 如果 $a > b, c > 0$, 那么 $ac > bc$;

如果 $a > b, c < 0$, 那么 $ac < bc$;

(5) 如果 $a > b, c > d$, 那么 $a + c > b + d$;

(6) 如果 $a > b > 0, c > d > 0$, 那么 $ac > bd$;

(7) 如果 $a > b > 0$, 那么 $a^n > b^n, (n \in N, n \geq 2)$;

(8) 如果 $a > b > 0$, 那么

$$\sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}, (n \in N, n \geq 2) ;$$

2.不等式的求解

(1) 一元一次不等式 $ax > b$ (或 $ax < b$) ;

解不等式时, 运用不等式的性质, 去分母, 去括号, 移项, 合并同类项, 最后变为 $x > c$ 或 $x < c$.

(2) 一元一次不等式组 ;

每个一元一次不等式的解集的公共部分 (交集) 叫做一元一次不等式组的解集.

(3) 绝对值不等式的解法

$$\textcircled{1} |f(x)| < a \Leftrightarrow -a < f(x) < a ;$$

$$|f(x)| > a \Leftrightarrow f(x) < -a \text{ 或 } f(x) > a ;$$

$$\textcircled{2} |f(x)|^2 > a \Leftrightarrow [f(x)]^2 > a ;$$

$$\textcircled{3} |f(x)| = \begin{cases} f(x) & f(x) \geq 0, \\ -f(x) & f(x) < 0 \end{cases} ;$$

④设 $f(x) = |x-a| + |x-b|$, 函数的特点为 :

x 在区间 $[a, b]$ 上取得最小值. $f(x)$ 有最小值 $|a-b|$,

无最大值. ;

⑤设 $f(x) = |x-a| - |x-b|$, 函数的特点为 :

$f(x)$ 有最大值 $|a-b|$, 最小值 $-|a-b|$, 且最大值与

最小值互为相反数.

(4) 一元二次不等式 $ax^2 + bx + c > (<) 0 (a > 0)$, 一元二次不等式的解法如下表 ,

设 $f(x) = ax^2 + bx + c (a > 0)$:

$\Delta = b^2 - 4ac$	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
方程 $f(x) = 0$	有两相异实根 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$	有两相等实根 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$	无实根
$f(x) > 0$ 的 解集	$\{x x < x_1 \text{ 或 } x > x_2\}$	$\left\{x x \neq -\frac{b}{2a}\right\}$	R
$f(x) < 0$ 的 解集	$\{x x_1 < x < x_2\}$	ϕ	ϕ

(5) 指数、对数不等式：不等号两边同时取指数或同时取对

数，变成相同的形式后，再换元成有理不等式求解：

	指数不等式	对数不等式
$a > 1$	$a^{f(x)} > a^{g(x)}$ $\Leftrightarrow f(x) > g(x)$	$\log_a f(x) > \log_a g(x)$ $\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases}$
$0 < a < 1$	$a^{f(x)} > a^{g(x)}$ $\Leftrightarrow f(x) < g(x)$	$\log_a f(x) > \log_a g(x)$ $\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) < g(x) \end{cases}$

3.常用的基本不等式

$$(1) a^2 + b^2 \geq 2ab (a, b \in R) ,$$

$$(2) \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} (a, b \in R^+) ,$$

$$(3) \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2 (ab > 0) ,$$

$$(4) \frac{1}{a} + a \geq 2 (a \in R^+) , \frac{1}{a} + a \leq -2 (a \in R^-)$$

第四章 应用题

一、增长率问题

1. 设原值为 a , 变化率为 $p\%$, 若上升 $p\% \Rightarrow$ 现值
 $= a(1 + p\%)$, 若下降 $p\% \Rightarrow$ 现值 $= a(1 - p\%)$.

2. 利润问题

利润 = 售价 - 进价, 利润率 $= \frac{\text{利润}}{\text{成本(进价)}} \times 100\%$

$$= \frac{\text{售价} - \text{成本}}{\text{成本}} \times 100\% = \left(\frac{\text{售价}}{\text{成本}} - 1 \right) \times 100\% ;$$

售价 = 成本 + 利润 = 成本 \times (1 + 利润率).

二、行程问题

1. 基本公式 : 路程 = 速度 \times 时间.

2.相遇及追击问题

(1) 直线运动：

①两人相向而行，在中途相遇，则 $t = \frac{S_1 + S_2}{v_1 + v_2}$ ：

②甲乙两人从同一起点行走，甲先走了一段路程 S 后，乙沿同样的路程去追甲，乙追上甲所用时间 $t = \frac{S}{v_{\text{乙}} - v_{\text{甲}}}$ 。

(2) 圆周运动（设圆周长为 S ）

①同向运动：相遇一次： $S_{\text{甲}} - S_{\text{乙}} = S$ 。若相遇 n 次，则

$$S_{\text{甲}} - S_{\text{乙}} = n \cdot S ;$$

②相背运动：相遇一次： $S_{\text{甲}} + S_{\text{乙}} = S$ 。若相遇 n 次，则

$$S_{\text{甲}} + S_{\text{乙}} = n \cdot S .$$

3.流水问题：.

$$V_{\text{顺}} = V_{\text{船}} + V_{\text{水}}, \quad V_{\text{逆}} = V_{\text{船}} - V_{\text{水}};$$

$$V_{\text{顺}} + V_{\text{逆}} = 2V_{\text{船}}, \quad V_{\text{顺}} - V_{\text{逆}} = 2V_{\text{水}};$$

三、溶液浓度问题

1.常用公式：浓度 = $\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}} \times 100\%$ ，溶液 = 溶剂 + 溶质；

2.设 x 克浓度为 $a\%$ 的 A 溶液与 y 克浓度为 $b\%$ 的 B 溶液

混合，混合后的 C 溶液浓度为 $c\%$ ，则 $\frac{x}{y} = \frac{|c\% - b\%|}{|a\% - c\%|}$ ，

可用下面十字交叉法求 A 和 B 溶液的质量：

$$\begin{array}{ccc}
 A \text{ 溶液: } a\% & & |c\% - b\%| \\
 & \searrow \quad \nearrow & \\
 & c\% & \\
 & \nearrow \quad \searrow & \\
 B \text{ 溶液: } b\% & & |a\% - c\%|
 \end{array}$$

四、工程问题




计算公式：

工作效率=完成的工作量÷工作时间，总量=部分量÷部分量所占的比例。

五、集合问题

$$m(A \cup B) = m(A) + m(B) - m(AB);$$

$$m(A \cup B \cup C) = m(A) + m(B) + m(C) - m(AB) - m(AC) - m(BC) + m(ABC)$$



第五章 数列

一、基本概念

a_n 与 S_n 有如下关系：

$$a_n = \begin{cases} S_1 & (n=1) \\ S_n - S_{n-1} & (n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*) \end{cases}$$

二、等差数列

1. 通项公式： $a_n = a_1 + (n-1)d$.

2. 前 n 项和公式： $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$.

$= \frac{d}{2} \cdot n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$ ，它可以抽象成关于 n 的二次函数

$$f(x) = \frac{d}{2}x^2 + (a_1 - \frac{d}{2})x, S_n = f(n)$$

3.等差中项：若 a, A, b 成等差数列，则 A 叫做 a 与 b 的等差

中项，且 $A = \frac{a+b}{2}$ 。

三、等比数列

1.通项公式： $a_n = a_1 q^{n-1} (n \in N)$ 。

$$2. \text{前 } n \text{ 项和公式：} S_n = \begin{cases} na_1 & (q=1) \\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1 - a_n q}{1-q} & (q \neq 1) \end{cases}$$

3.等比中项：若 a, A, b 成等比数列，那么 A 叫做 a 与 b 的等

比中项，且 $A = \sqrt{ab}$ 。

四、等差、等比数列性质总结

等差数列	等比数列
若 $m+n=p+q$, 则 $a_m+a_n=a_p+a_q$	若 $m+n=p+q$, 则 $a_m a_n = a_p a_q$.
若 $\{k_n\}$ 成等差数列 (其中 $k_n \in N$) , 则 $\{a_{k_n}\}$ 成等差数列.	若 $\{k_n\}$ 成等差数列 (其中 $k_n \in N$) , 则 $\{a_{k_n}\}$ 成等比数列.
$S_n, S_{2n}-S_n, S_{3n}-S_{2n} \dots$ 成等差数列.	$S_n, S_{2n}-S_n, S_{3n}-S_{2n} \dots$ 成等比数列.
$a_k, a_{k+m}, a_{k+2m}, \dots$ 也成等差数列, 其公差 $d' = md$.	$a_k, a_{k+m}, a_{k+2m}, \dots$ 也成等比数列, 其公比 $q' = q^m$.

第六章 初等几何



平面/立体几何部分

一、平行直线

1. 两直线平行，内错角相等，同位角相等，同旁内角互补.

2. 两条直线被一组平行线截得的线段成比例，如下图，

$$a : b = c : d .$$



二、三角形的性质

1. 三角形的基本性质：

①三角形内角和定理： $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

②三角形三边关系：三角形任意两边之和大于第三边，任意两边之差小于第三边.

③三角形的任意一个外角等于与它不相邻的两个内角的和.

④三角形的面积：

$$S = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ab \sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad (\text{海伦}$$

公式)，其中 P 为周长的一半。

2.三角形的四心

(1) 重心：三条中线的交点，将中线分成1:2两段；

(2) 垂心：三条高的交点；

(3) 内心：内切圆圆心，三条角平分线交点，角平分线上的点到角两边的距离相等；

(4) 外心：外接圆圆心，三条边的中垂线交点.

3. 三角形的全等与相似

(1) 两个几何图形全等, 全等的图形对应角相等, 对应的线段长度也相等.

(2) 两个几何图形相似, 似的图形对应角相等, 对应的线段长度成比例, 比值称为相似比. 如果两个相似图形的相似比为 k , 则面积比为 k^2

4. 特殊三角形

(1) 等腰三角形的性质: 两底角相等, 底边上的中线, 底边上的高及顶角的角平分线重合, 两腰上的中线相等, 两腰上的高相等, 两底角的角平分线相等.

(2) 等边三角形的性质: 三个角都为 60° , 等边三角形的重心, 垂心, 内心, 外心重合, 称此点为它的中心. 边长和高的比为

$$2:\sqrt{3}, \text{ 边长等于 } a \text{ 的等边三角形的面积为 } \frac{\sqrt{3}}{4}a^2.$$

(3) 直角三角形的性质：直角边的平方和等于斜边的平方(充分必要条件).斜边上的中线长度等于斜边的一半(充分必要条件).

①记住几组常用的勾股数：

3, 4, 5; 6, 8, 10; 7, 24, 25; 8, 15, 17; 9, 12, 15; 9, 40, 41.

②两类特殊的直角三角形(两块三角尺)：

a. 等腰直角三角形：两底角都为 45° . 直角边和斜边的长度比为 $1:\sqrt{2}$.

b. $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 直角三角形：斜边的长度是短直角边的 2 倍，长直角边长度是短直角边的 $\sqrt{3}$ 倍.

三、四边形的性质

1. 平行四边形：两对边都相等(充分必要条件)；两对角都相等；
两条对角线互相平分.

2. 矩形：四个角都是直角的四边形.

3.菱形：各边相等的四边形.其中两条对角线互相垂直平分，两条对角线都平分所在角.

4.正方形：四个角都是直角,并且各边相等的四边形.

四、圆的性质

1.关于圆周角

(1) 命题：一条弧所对应的圆心角等于这段弧所对应的圆周角的2倍.

(2) 推论1：圆的内接四边形对角和等于 180° .

(3) 推论2：半圆所对应的的圆周角是直角.

2.关于弦和切线：

(1) 垂直于弦的直径平分此弦.

(2) 如果直线和圆相切，则经过切点的半径和切线垂直.

(3) 经过圆外一点的圆的切线有两条，两个切点到此点的距离

相等.

(4) 推论：圆的外切四边形两双对边长度之和相等.

3. 直线与圆的位置关系：设圆半径为 r , 圆心到直线距离为 d ,

直线与圆的位置关系分为有三种：

① 直线与圆相离 ($d > r$) ;

② 直线与圆相切 ($d = r$) ;

③ 直线与圆相割 ($d < r$) .

4. 两个圆的位置关系：设两个圆半径分别为 r_1, r_2 , 两个圆心的距

离为 d , 两个圆的位置关系有五种：

① 两圆外离 ($d > r_1 + r_2$) ;

② 两圆外切 ($d = r_1 + r_2$) ;

③ 两圆相割 ($|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$) ;

④两圆内切 ($d = |r_1 - r_2|$) ;

⑤两圆内含 ($d < |r_1 - r_2|$) .

五、特殊的三角函数值

几个常用的角：

$$360^\circ = 2\pi, 180^\circ = \pi, 90^\circ = \frac{\pi}{2}, 60^\circ = \frac{\pi}{3}, 30^\circ = \frac{\pi}{6}, 45^\circ = \frac{\pi}{4}.$$

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

六、常用几何体的周长、面积与体积

1. 三角形

三角形的面积

$$S = \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}ab \sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

(其中 $p = \frac{a+b+c}{2}$, 为三角形的半周长) ;

直角三角形两直角边为 a, b , 则 $S = \frac{1}{2}ab$; 等边三角形面积

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 ; \text{高 } h = \frac{\sqrt{3}}{2}a ;$$

外接圆半径 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$; 内切圆半径 $r = \frac{\sqrt{3}}{6}a$.

2. 四边形

平行四边形的面积 $S = ah$;

长方形的周长 $L = 2(a + b)$;

长方形的面积 $S = ab$;

正方形的周长 $L = 4a$;

正方形的面积 $S = a^2$;

梯形的面积 $S = \frac{1}{2}(a + b)h$.

3. 圆

圆的周长 $l = 2\pi r = \pi d$;

圆的面积 $S = \pi r^2 = \frac{\pi}{4}d^2$;

设扇形的圆心角为 α , 半径为 r , 则它的弧长 $l = r\theta$, 面积

$$S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}\alpha r^2 .$$



4.空间几何体

(1) 长方体的表面积 $S = 2(ab + bc + ac)$; 长方体的

$V = abc$; 正方体的表面积 $S = 6a^2$; 正方体的体 $V = a^3$.

(2) 圆柱的侧面积 $S = 2\pi rh$;

圆柱的表面积 $S = 2\pi rh + 2\pi r^2$;

圆柱的体积 $V = \pi r^2 h$.

(3) 球的表面积 $S = 4\pi r^2$; 球的体积 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

解析几何部分

一、直线

1.直线的方程

(1) 点斜式： $y - y_0 = k(x - x_0)$ ；

(2) 斜截式： $y = kx + b$ ；

(3) 截距式： $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ；

(4) 一般式： $Ax + By + C = 0$ 。

2. 两条直线的位置关系

直线方程	平行的充要条件	垂直的充要条件
$l_1: y = k_1x + b_1$ $l_2: y = k_2x + b_2$	$k_1 = k_2, b_1 \neq b_2$	$k_1 \cdot k_2 = -1$
$l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$	$A_1B_2 = A_2B_1$, 且 $B_1C_2 \neq B_2C_1$	$A_1A_2 + B_1B_2 = 0$

3.距离公式

(1) 两点间的距离公式：设两点的坐标为

$P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ ，则这两点间的距离

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} ;$$

(2) 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离：

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} ;$$

(3) 两条平行线 $Ax + By + C_1 = 0$ 与 $Ax + By + C_2 = 0$

的距离是 $d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

二、圆

圆的方程

(1) 标准方程： $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$. (a, b) 圆心，
 r 为半径.

特别地：当圆心为 $(0, 0)$ 时，方程为 $x^2 + y^2 = r^2$ ；

第七章 数据分析

一、计数原理

1.加法(分类)原理： $N = m_1 + m_2 + \cdots + m_n$.

2.乘法(分步)原理： $N = m_1 \cdot m_2 \cdots m_n$.

3.排列： $P_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)$;

当 $m = n$ 时, $P_n^m = n!$.

4.组合： $C_n^m = \frac{P_n^m}{P_m^m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$.

组合数的几个公式：

$$\textcircled{1} C_n^m = C_n^{n-m} ;$$


$$\textcircled{2} C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1} .$$

二、概率基本概念

1.事件间的关系与运算


(1) A, B 的和: $A \cup B$ 或 $A + B$, 如图 (1);

(2) A, B 的积: $A \cap B$ 或 AB , 如右图 (2);



(3) A, B 互不相容: $AB = \phi$, 如右图 (3);

(4) 对立事件: $\bar{A} \cup A = \Omega, \bar{A} \cap A = \phi$, 如右图 (4).



2.事件的概率及其性质

(1) 概率的性质： $0 \leq P(A) \leq 1, P(\Omega) = 1, P(\phi) = 0..$

(2) 加法公式： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$

推广公式：

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - \\ [P(AB) + P(BC) + P(AC)] + P(ABC).$$

(3) 对立事件公式：对任意事件 $A, P(\bar{A}) = 1 - P(A).$

3.古典概型的概率计算公式 $P(A) = \frac{A \text{ 包含的基本事件个数}}{\text{总的基本事件个数}}.$

4.事件的独立性： $P(AB) = P(A)P(B)$.如果事件

A_1, \dots, A_n 相互独立，则

$$P(A_1 + \dots + A_n) = 1 - P(\bar{A}_1) \cdots P(\bar{A}_n).$$

5. 在 n 次试验中事件 A 恰好发生 k ($0 \leq k \leq n$) 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k P^k (1-p)^{n-k}.$$

6. 独立地做一系列的贝努利试验, 直到第 k ($k=1, 2, \dots, n$) 次

试验时事件 A 才首次发生的概率 $P_k = (1-p)^{k-1} p$.

三、统计中常用的特征数

1. 平均数 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ ($i=1, 2, \dots, n$)

2. 众数: 在 n 个数 x_1, x_2, \dots, x_n 中, 出现次数最多的数.

3. 中位数: 将 n 个数 x_1, x_2, \dots, x_n , 按从小到大的顺序依次

排列, 处在最中间的那个数是这 n 个数的中位数;

4. 方差: $S^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$.

5. 标准差: $s = \sqrt{\frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]}$.