

# 第十五周作业

洪艺中\*

2025 年 1 月 6 日

## 1 第一部分

### 习题 10.1 题目 1

解答.

(1)

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 2x_3)^2 - 3x_3^2,$$

做线性替换

$$\begin{cases} z_1 = x_1 + x_2, \\ z_2 = x_2 + 2x_3, \\ z_3 = x_3, \end{cases}$$

得到

$$f(z_1, z_2, z_3) = z_1^2 + z_2^2 - 3z_3^2.$$

(3)

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2(x_1 - x_2)^2 - (x_2 + 2x_3)^2 + 4x_3^2,$$

做线性替换

$$\begin{cases} z_1 = x_1 - x_2, \\ z_2 = x_2 + 2x_3, \\ z_3 = x_3, \end{cases}$$

得到

$$f(z_1, z_2, z_3) = 2z_1^2 - z_2^2 + 4z_3^2.$$

---

\*本学期的作业及源文件已经上传到 github: <https://github.com/Eclipse-desu/2024linear-algebra>

## 习题 10.2 题目 1

解答. 记  $M$  为第  $k$  列只有第  $i_k$  行的元素是 1, 其他元素皆 0 的矩阵. 则  $M$  每行每列都只有一个元素是 1, 并且当这个矩阵与单位向量  $e_s$  相乘时, 只有第  $s$  列为 1 的那一行乘出来才不是 0. 根据  $M$  的定义, 只有第  $i_s$  行的第  $s$  列元素是 1, 因此

$$Me_s = e_{i_s},$$

那么可以写出对一般的  $x = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^\top$ ,

$$Mx = \begin{pmatrix} x_{i_1} \\ x_{i_2} \\ \vdots \\ x_{i_n} \end{pmatrix},$$

考虑用  $M$  做合同变换. 我们记题目中的第一个对角阵为  $A$ , 第二个为  $B$ , 那么

$$x^\top M^\top B M x = \begin{pmatrix} x_{i_1} & x_{i_2} & \cdots & x_{i_n} \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} x_{i_1} \\ x_{i_2} \\ \vdots \\ x_{i_n} \end{pmatrix} = \sum_{t=1}^n \lambda_{i_t} x_{i_t}^2 = x^\top A x,$$

因为两个矩阵都是对称的, 因此  $A$  和  $B$  合同,  $A = M^\top B M$ .

## 题目 2

解答. 二次型对应的矩阵是对称的, 所以只需要把  $A$  『变成』对称矩阵. 即

$$\frac{1}{2}(A + A^\top).$$

## 2 第二部分

## 习题 10.3 题目 2

解答. 在实数域上, 合同变换不改变惯性指数, 所以二者不合同. 在复数域上, 可以取  $\mathbf{M} = \mathbf{iE}$ ,  $\mathbf{M}^\top \mathbf{E} \mathbf{M} = -\mathbf{E}$ .

## 题目 3

解答. 根据惯性定理, 正惯性指数  $p$  和矩阵的秩  $r$  相同的矩阵在同一个合同类里. 所以一共有  $(n+2)(n+1)/2$  种.

## 题目 5

解答. 这个二次型对应的矩阵是

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \cdots & \frac{1}{2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

为了计算其规范形, 我们只需要了解其惯性指数. 为此, 计算其特征多项式, 为方便计算, 设  $u = \lambda + \frac{1}{2}$ , 记所有位置都是 1 的向量为  $\mathbf{a} = (1, 1, \cdots, 1)^\top$ , 利用秩一校正公式,

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = |u \mathbf{E} - \frac{1}{2} \mathbf{a} \mathbf{a}^\top| = |u \mathbf{E}| |1 - \frac{1}{2} \mathbf{a}^\top \frac{1}{u} \mathbf{E} \mathbf{a}| = u^{n-1} (u - \frac{n}{2}),$$

所以  $u = \frac{n}{2}$  或  $u = 0$  ( $n-1$  重). 所以特征值  $\lambda = \frac{n-1}{2}$  和  $\lambda = -\frac{1}{2}$  ( $n-1$  重). 故规范形是

$$f = z_1^2 - z_2^2 - \cdots - z_n^2.$$

## 习题 10.4 题目 2

解答. 记二次型对应的矩阵是

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

根据条件, 其合同于对角阵

$$\mathbf{P}^\top \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(0, 1, 4),$$

因为  $\mathbf{P}$  是正交替换对应的矩阵, 所以是正交矩阵, 因此上式同时也是相似变换. 故因为迹是相似变换的不变量,  $1 + a + 1 = 5$ ,  $a = 3$ . 同时,  $\mathbf{A}$  的行列式为 0 可以解出  $b = 1$ .  $\mathbf{P}$  可以取

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{-\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & \frac{-\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}$$

## 习题 10.5 题目 1(2)

解答. 利用正交替换同时也是相似对角化,

$$\mathbf{P}^{\top} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix},$$

解特征方程得到  $a = 2$ ,

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

## 题目 2

解答. 取  $\mathbf{e}_i$ ,  $a_{ii} = \mathbf{e}_i^{\top} \mathbf{A} \mathbf{e}_i \geq 0$ .

## 题目 4(2)

解答. 写成矩阵

$$\begin{pmatrix} t & 1 & 1 & 0 \\ 1 & t & -1 & 0 \\ 1 & -1 & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

若要正定, 其顺序主子式皆正. 计算顺序主子式为  $t, t^2 - 1, t^3 - 3t - 2, t^3 - 3t - 2$ . 四者都正, 得到  $t > 2$ .

## 题目 6

解答. 取  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^{\top} \neq \mathbf{0}$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{x} &= \sum_{i=1}^n x_i \left( \left(1 - \frac{1}{n}\right) x_i + \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} x_j \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} x_i x_j \\ &= \left(1 - \frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 > 0, \end{aligned}$$

因此正定.

## 题目 7

解答.

1. 我们首先假设『任何绝对对角占优矩阵可逆』. 有此假设, 将矩阵  $\mathbf{A}$  分解为其对角部分  $\mathbf{B} = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$  和非对角部分  $\mathbf{C} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$ . 考虑矩阵函数  $\mathbf{A}(t) = \mathbf{B} + t\mathbf{C}$ . 在  $t \in [-1, 1]$  时,  $\mathbf{A}(t)$  都是绝对对角占优的. 所以  $f(t) := \det \mathbf{A}(t)$  在  $[-1, 1]$  上非零. 由于  $f(t)$  是关于  $t$  的多项式, 所以其连续.  $f(0) = \det \mathbf{B} > 0$ , 则由介值定理知  $\det \mathbf{A} = f(1) > 0$ .

下面证明这一假设. 为了证明可逆, 我们只需要证明  $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$  这个齐次方程组没有非零解. 不妨反设其有非零解  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top$ , 且  $x_k$  是其中绝对值最大的下标, 即任取  $i$  都有  $|x_k| \geq |x_i|$ . 那么考虑  $\mathbf{A}\mathbf{x}$  的第  $k$  行

$$a_{k1}x_1 + \dots + a_{kk}x_k + \dots + a_{kn}x_n = 0,$$

把  $a_{kk}x_k$  移动到右边, 取绝对值得到

$$a_{kk}|x_k| = |a_{k1}x_1 + \dots + a_{k,k-1}x_{k-1} + a_{k,k+1}x_{k+1} + \dots + a_{kn}x_n| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}| |x_j| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}| |x_k|,$$

所以得到

$$a_{kk} \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}|,$$

但这与绝对对角占优的条件矛盾. 故反设不成立, 原假设成立.

2. 注意到绝对对角占优矩阵的顺序主子阵也是绝对对角占优的. 所以如果  $\mathbf{A}$  对称, 其顺序主子式也都正 (由 (1)), 那么其正定.

## 题目 8

解答.

$\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^\top$  正定

$$\Leftrightarrow \text{任取 } \mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \mathbf{x}^\top \mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^\top \mathbf{x} > 0$$

$$\Leftrightarrow (\text{由 } \mathbf{A} \text{ 的正定性}) \text{ 任取 } \mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \mathbf{B}^\top \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{B}^\top \text{ 列满秩, 即 } \mathbf{B} \text{ 行满秩.}$$

## 题目 9

解答. 因为实对称矩阵可对角化, 所以如果其行列式是负的, 那么一定有一个负特征值  $\lambda < 0$  和对应的特征向量  $\alpha$  满足  $\mathbf{A}\alpha = \lambda\alpha$ . 那么  $\alpha^\top \mathbf{A}\alpha = \lambda\alpha^\top \alpha < 0$ .