

第三次作业

洪艺中 12335025

2024 年 3 月 23 日

0.1 132 页习题 4

题目 1. 设 M 为光滑流形, ∇ 为对称仿射联络. 设 $\{e_i\}$ 是局部基向量场, $\{\omega^i\}$ 和 $\{\omega_j^i\}$ 分别是对偶基和联络 1-形式, 证明:

$$\nabla_X \omega^i = -\omega_j^i(X) \omega^j, \quad \forall X \in \mathcal{X}(M).$$

解答. 取向量场 $Y \in \mathcal{X}(M)$, 设 $Y = Y^i e_i$.

$$\begin{aligned} (\nabla_X \omega^i)(Y) &= X(\omega^i(Y)) - \omega^i(\nabla_X Y) \\ &= X(Y^i) - \omega^i(X(Y^j) e_j + Y^j \omega_j^k(X) e_k) \\ &= X(Y^i) - X(Y^i) - Y^j \omega_j^i(X) \\ &= -\omega_j^i(X) \omega^j(Y). \end{aligned}$$

因此 $\nabla_X \omega^i = -\omega_j^i(X) \omega^j$.

0.2 132 页习题 5

题目 2. 设 (M^n, g) 为 Riemann 流形, $\omega = \omega_{i_1 \dots i_m} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_m}$ 为 m -形式, 其中

$$\begin{aligned} \omega_{i_1 \dots i_m} &= \sqrt{G} \varepsilon_{i_1 \dots i_m}, \\ \varepsilon_{i_1 \dots i_m} &= \begin{cases} 0 & (i_1, \dots, i_m) \text{ 中有相同时,} \\ 1 & (i_1, \dots, i_m) \text{ 为偶置换,} \\ -1 & (i_1, \dots, i_m) \text{ 为奇置换.} \end{cases} \end{aligned}$$

证明: $\omega_{i_1 \dots i_m, k} = 0$, 即 ω 是平行的.

解答. 如果按照题目, $\omega \equiv 0$, 所以此题应该是说明体积元关于 Riemann 联络是平行的.

由于体积 $\text{vol} = \sqrt{G} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^m$ 是张量, 其协变导数也是张量. 任取 $\{v_1, \dots, v_n\} \subset \mathcal{X}(M)$, $v_i = \alpha_i^j e_j$, 则

此时

$$\begin{aligned}\nabla_{e_k} \text{vol}(v_1, \dots, v_m) &= e_k(\text{vol}(v_1, \dots, v_m)) - \sum_{i=1}^m \text{vol}(v_1, \dots, \nabla_{e_k} v_i, \dots, v_m) \\ &= e_k(\text{vol}(v_1, \dots, v_m)) - \sum_{i=1}^m \text{vol}(v_1, \dots, e_k(\alpha_i^l) e_l + \alpha_i^j \omega_j^l(e_k) e_l, \dots, v_m).\end{aligned}$$

记矩阵 $A = (\alpha_i^j)$, 以及记其伴随阵为 $A^* = (A_i^j)$, 满足 $\sum_i \alpha_i^i A_j^i = \delta_{jl} \det A$, $\sum_i \alpha_i^j A_i^l = \delta_{jl} \det A$. 则利用这些记号, 以及

$$e_k(\det A) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m e_k(\alpha_i^j) A_i^j,$$

和

$$e_k(\sqrt{G}) = \frac{e_k(G)}{2\sqrt{G}} = \sqrt{G} \sum_{i,j=1}^m \frac{1}{2} (\langle \nabla_{e_k} e_i, e_j \rangle + \langle e_i, \nabla_{e_k} e_j \rangle) g^{ij},$$

可以得到

$$\begin{aligned}\nabla_{e_k} \text{vol}(v_1, \dots, v_m) &= e_k(\text{vol}(v_1, \dots, v_m)) - \sum_{i=1}^m \text{vol}(v_1, \dots, (e_k(\alpha_i^l) + \alpha_i^j \omega_j^l(e_k)) e_l, \dots, v_m) \\ &= e_k(\sqrt{G} \det A) - \sqrt{G} \sum_{i=1}^m \sum_{l=1}^m (e_k(\alpha_i^l) + \alpha_i^j \omega_j^l(e_k)) \cdot A_i^l \\ &= e_k(\sqrt{G} \det A) - \sqrt{G} \sum_{i=1}^m \sum_{l=1}^m e_k(\alpha_i^l) A_i^l - \sqrt{G} \sum_{l=1}^m \omega_j^l(e_k) \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i^j \cdot A_i^l \right) \\ &= e_k(\sqrt{G} \det A) - \sqrt{G} e_k(\det A) - \sqrt{G} \sum_{j,l=1}^m \omega_j^l(e_k) \delta_{jl} \det A \\ &= e_k(\sqrt{G} \det A) - \sqrt{G} e_k(\det A) - \sqrt{G} \sum_{j=1}^m \omega_j^j(e_k) \det A.\end{aligned}$$