

2014 年全国统一高考地理试卷（新课标II）


一、选择题：共 44 分。在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

珠江三角洲某中心城市周边的农民竞相在自家的宅基地建起了“握手楼”（如图）据此完成 1~2 题。



- 1.（4 分）农民建“握手楼”的直接目的是（ ）
A. 吸引外来人口定居 B. 吸引市民周末度假
C. 增加自住房屋面积 D. 出租房屋增加收入
- 2.（4 分）“握手楼”的修建反映该中心城市（ ）
A. 居住人口减少 B. 城市房价昂贵 C. 人居环境恶化 D. 城区不再扩大

总部位于江苏徐州（约 34°N ， 117°E ）的某企业承接了甲国（如图）价值 7.446 亿美元的工程机械订单。据此完成 3~5 题。



- 3.（4 分）甲国位于（ ）

- A. 欧洲 B. 非洲 C. 北美洲 D. 南美洲

4. (4分) 2011年6月21日, 该定单的首批产品从徐州发货. 这一日, 徐州与甲国首都相比 ()

- A. 徐州的正午太阳高度较高 B. 徐州的白昼较短
C. 两地正午物影方向相同 D. 两地日出方位角相同

5. (4分) 该批产品运往甲国, 最近的海上航线需经 ()

- A. 好望角 B. 苏伊士运河 C. 巴拿马运河 D. 麦哲伦海峡

降水在生态系统中被分为蓝水和绿水. 蓝水是形成径流的部分 (包括地表径流和地下径流); 绿水是被蒸发 (腾) 的部分, 其中被植物蒸腾的部分称为生产性绿水, 被蒸发的部分被称为非生产性绿水. 据此完成 6~7 题.


6. (4分) 下列河流中, 绿水比例最大的是 ()

- A. 塔里木河流域 B. 长江流域
C. 雅鲁藏布江流域 D. 黑龙江流域

7. (4分) 在干旱和半干旱地区, 下列措施中, 使绿水中生产性绿水比重提高最多的是 ()

- A. 水田改旱地 B. 植树造林
C. 覆膜种植农作物 D. 修建梯田

如图示意科隆群岛 (加拉帕戈斯群岛) 的地理位置. 读图, 完成 8~9 题.



8. (4分) 科隆群岛特有动物种属比例较大. 形成这一现象的地理条件是该群岛

()


- A. 地处赤道附近 B. 远离大陆 C. 构造运动强烈 D. 地形复杂

9. (4分) 科隆群岛是耐寒的企鹅和喜暖的鼠蜥的共同家园, 主要因为该群岛

()

- A. 气温日较差大 B. 处在动物迁徙路线上
C. 地处热带但受寒流影响 D. 气候垂直差异明显

如图示意某岛的地理位置, 读图, 完成 10~11 题.



10. (4分) 图示岛屿西南部降水丰沛, 主要是因为 ()

- ①盛行西风 ②地形抬升 ③暖流增湿 ④反气旋控制.

- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④


11. (4分) 下列农业生产类型中, 最适宜在图示岛屿发展的是 ()

- A. 水田农业 B. 迁移农业 C. 种植园农业 D. 畜牧业

三、解答题

12. (22分) 阅读图文资料, 完成下列要求。

河流的侵蚀、沉积及沼泽的吸收(附)影响河流泥沙和营养物质含量, 水体中营养物质含量影响浮游生物量, 与水温共同制约鱼类资源数量。如图所示的西西伯利亚平原地势低平, 冻土发育, 河流众多, 沼泽广布。



(1) 分析西西伯利亚平原沼泽广布的原因。


(2) 分析叶尼塞河泥沙含量较多，而鄂毕河泥沙含量较少的原因。

(3) 通常，大河河口的鱼类资源丰富，但鄂毕河河口鱼类资源相对较少。说明鄂毕河河口鱼类资源较少的原因。

13. (24 分) 阅读图文资料，完成下列要求。

建三江位于三江平原腹地，于 1957 年开始垦荒，目前面积 1.24 万平方千米，人口 20 多万。这里空气清新，水源丰富且水质优良，土壤肥沃。近年来，建三

江重点种植水稻，有“中国绿色米都”之称。建三江采用现代技术科学生产，如定点监测土壤肥力并精准施肥。如图示意建三江的位置和范围。



- (1) 分析三江平原环境质量优良的原因。
- (2) 分析建三江农作物病虫害较少的气候原因。
- (3) 简述建三江水稻种植过程中化肥施用量较少的原因。
- (4) 建三江被称为“中国绿色米都”。请说明建三江获此美誉的理由。

三、旅游地理


14. (10 分) 某学习小组在探讨“老工业区如何转型”的活动中，发现德国鲁尔区在转型过程中，利用原有的生产设备等工业遗产资源，开发了能够吸引人们了解工业文明和工业化历史，具有独特观光、休闲等功能的工业遗产旅游产

品。

提出老工业区的工业遗产资源，并设计老工业区工业遗产旅游项目。

四、自然灾害与防治

15.（10 分）福建低山丘陵区是崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害的多发区，如图示意该区域 1990～2006 年地质灾害各月多年平均发生的次数。



概况该区域地质灾害月际分布特点，说明 6 月、7 月地质灾害发生次数差异的自然原因。

五、环境保护

16.（10 分）中华秋沙鸭为我国一级重点保护鸟类，目前全国只有 1000 只左右。中华秋沙鸭生活在河流与小型湖泊等湿地中，主要以淡水鱼、虾等为食。以长白山某河流作为繁殖地的中华秋沙鸭种群，春季为 50 只左右，秋季迁徙时，数量增至 200 只左右。但只有近百只到达赣东北的越冬地。而第二年春季只有 50 余只返回繁殖地。

分析中华秋沙鸭在迁徙途中不断死亡，导致数量减少的可能原因，并提出保护对策。

