2026年普通高等学校招生全国统一考试（浙江）地理

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

本试卷满分100分，考试用时90分钟。

一、选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

下图为某实验结果模式图，该图示意华北某流域草地转林地后主要水文指标变化（单位：毫米）。蒸散量是指地表和水体的蒸发量以及植物蒸腾量的总和。完成下面小题。

1. 实验中草地转为林地后，流域实际蒸散量增加，主要因为（ ）

A. 区域降水增加B. 植被蒸腾增加C. 地表径流减少D. 土壤水分增加

2. 据图中实验结果，在水资源受到限制地区，实现生态可持续发展的措施应是（ ）

A. 扩大乔木面积B. 提高灌木比例C. 适度恢复草地D. 增加林木密度

科研人员在我国西南喀斯特地区开展石漠化风险调研。图1为利用地理信息技术获取的该区域三个地理要素等级分布图（数值越大表示程度越高）。图2为图1中三个图层叠加分析得到的石漠化风险评估结果。完成下面小题。

3. 图2中石漠化风险最高的是（ ）

A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁

4. 我国西南喀斯特地区不适宜建设大型水库，是因为（ ）

A. 落差小B. 多火山C. 降水量少D. 岩溶渗漏

某中学组织学生对黄土高原南部的洛川塬—沟壑区进行地理考察。该区域多年平均降水量622毫米，降水集中在6~9月。下图为考察区地形图。完成下面小题。

5. 该考察区（ ）

A. 甲河总体自东南向西北流B. 土地沙化严重

C. 地带性植被为落叶阔叶林D. 易受涝灾影响

6. 乙地冬季土壤水分含量总体大于春季，主要是因为冬季（ ）

①气温较低，蒸发弱 ②降水量大，下渗多

③土质疏松，易储水 ④果树休眠，耗水少

A. ①②B. ②③C. ③④D. ①④

7. 该区域坡地上不栽种苹果，主要因（ ）

A. 地形坡度较大B. 日照时间不足C. 灌溉水源缺乏D. 昼夜温差较小

湖南水稻种植历史悠久，是我国水稻主产省。黑龙江面积是湖南的2.2倍，人口是湖南的1/2左右，近年来水稻生产快速发展，也成为我国水稻主产省。下表为2004—2022年湖南和黑龙江粮食生产的相关数据。完成下面小题。

注：粮食调出率=粮食调出量/粮食产量×100%

8. 与湖南相比，2004—2022年黑龙江水稻产量增长更快，主要因黑龙江（ ）

A. 自然条件更适宜水稻生长B. 水稻播种面积大幅增长

C. 交通运输条件大幅度改善D. 逆城市化过程非常显著

9. 黑龙江粮食调出率高于湖南，究其原因在于（ ）

①湖南粮食外运不便利 ②两省的人口数量不同

③黑龙江距消费市场近 ④两省的饮食习惯差异

A. ①②B. ①③C. ②④D. ③④

10. 从粮食安全角度考虑（ ）

①湖南需要重视粮食供给 ②黑龙江可提高耕地复种指数

③黑龙江需重视粮食调运 ④湖南大力开发后备耕地资源

A. ①②B. ①③C. ②④D. ③④

下图为2010—2020年江苏省各地市的县（市、区）常住人口变化幅度分布图。完成下面小题。

11. 2010—2020年江苏省（ ）

A. 人口集聚特征加强B. 沿海人口增长明显

C. 人口分布趋于平衡D. 北部人口减少最多

12. 南京、苏州中心城区存在常住人口减少现象，最可能的原因是当地（ ）

A. 交通通达度低B. 产业结构转型

C. 人口返乡创业多D. 生活配套不完善

下图为马来半岛及周边地区简图，图中航线为唐宋时期我国“ 海上丝绸之路 ”的一部分。目前该半岛热带雨林广布，但在乙地发现大量第四纪热带食草动物化石。完成下面小题。

13. 唐宋时期，我国商船利用季风规律出航西亚，途经甲段航线时的最佳时间为（ ）

A. 春季B. 夏季C. 秋季D. 冬季

14. 影响该半岛东部5月至9月降水量较少的主要大气环流为（ ）

A. 赤道低气压带B. 西南季风C. 副热带高气压带D. 东北信风

15. 乙地附近发现第四纪热带食草动物化石，可推断当时该地最可能的气候特征是（ ）

A. 夏季炎热干燥，冬季温和多雨B. 全年高温，干湿季分明

C. 夏季高温多雨，冬季寒冷干燥D. 终年温和，降水较均匀

20世纪90年代，某城市在建成区边缘建设开发区，发展劳动密集型和资源密集型工业。随着经济发展，城市拓展，将开发区包围。近年来，该开发区开始更新改造，其功能向居住和商业服务业转变。下图为该城市三个阶段发展示意图。完成下面小题。

16. 图中Ⅰ→Ⅱ阶段，该开发区（ ）

A. 污染威胁下降B. 阻碍城市拓展C. 土地价格上升D. 距离乡村更近

17. 图中Ⅱ→Ⅲ阶段，开发区更新改造会带来（ ）

①城市功能区协调性提高 ②开发区土地利用效率提升

③城市的建成区面积扩大 ④开发区工业生产功能增强

A. ①②B. ②③C. ③④D. ①④

一些荒漠区地表由粗砾和中砾组成的粗颗粒层，对维持荒漠区生态结构稳定有重要作用。粗颗粒层的形成方式多样，下图为其中一种形成机制模型：基岩风化形成粗砾、中砾→粗砾、中砾截留大气中的细颗粒→细颗粒发生沉降，向下渗滤并穿过砾石空隙。完成下面小题。

18. 荒漠区粗颗粒层的主要作用是（ ）

A. 减轻下伏物质风蚀B. 增强当地水分蒸发

C. 阻碍生态自然修复D. 增加当地降水频率

19. 除风力外，对图中细颗粒穿过砾石空隙起主要作用的因素是（ ）

A. 生物B. 海拔C. 气温D. 降水

20. 图中粗颗粒层形成模型中（ ）

A. 砾石来源差异明显B. 下伏细颗粒分选差

C. 砾石形成时间相近D. 基岩风化速率不变

北极星周围的天体环绕北极星旋转是地球自转、公转运动的直接反映。我国某中学小丁同学选择了北极星周边P、Q两个明亮天体进行跟踪观测。下图为观测到的这两个天体绕北极星运动轨迹图，图中示意P、Q两天体在K日20时的位置。完成下面小题。

21. 小丁发现K日20时，从北极星到Q天体的连线方向指向地面的（ ）

A. 偏东方B. 偏南方C. 偏西方D. 偏北方

22. K日20时小丁对P天体连续观测了两小时，而对Q天体每天20时观测一次，自K日起连续观测了两个月。正确的观测记录是（ ）

A. ①B. ②C. ③D. ④

下图为我国中亚热带某山地南、北坡年内出现日最低气温≤0°C天数随海拔变化关系图。完成下面小题。

23. 该山地栽种柑橘最佳的坡段是（ ）

A. ①B. ②C. ③D. ④

24. 当山脚日最低气温出现≤0°C的时候，山脚处近地面大气物理状态出现概率最大的是（ ）

A. ①B. ②C. ③D. ④

25. 若山坡P、Q两地气温比山脚低，这种现象在下列四个时间中最有可能发生的是（ ）

A. 盛夏晴朗的中午后B. 山脚有浓雾的夜晚

C. 晴天无风的日出前D. 冷锋过后的日落后

二、非选择题（本大题共3小题，共50分）

26. 阅读材料，完成下列问题。

材料 澳大利亚为经济发达国家，2024年总人口2720万人，新增人口主要来自移民。该国农矿业和服务业发达，制造业占GDP的比重从2000年的11.4%下降到2024年的5.4%。2017年国内汽车整车生产停止，有观点认为该国汽车工业发展受限于国内人口规模，不过有学者认为这种观点是片面的。图1为澳大利亚略图。图2为2000—2024年澳大利亚城镇化水平和农村人口数量统计图。

（1）制约甲地发展钢铁工业的自然资源有_____和_____等。

（2）分析该国城镇化水平上升的原因。

（3）说明“该国汽车工业发展受限于国内人口规模”这一观点的依据，并从市场需求的角度简述这种观点的片面之处。

27. 阅读材料，完成下列问题。

材料一 钱塘江径流丰富，水清沙少，在杭州湾注入东海。杭州湾毗邻长江口，水体含沙量高，涨潮与落潮潮流流速快、潮差大，形成著名的“钱塘潮”。图1为杭州湾区域略图，图中①②之间有沙坎，沙坎表面潮流侵蚀、堆积形成冲刷槽和沙脊，两者相间分布，空间上变化频繁，幅度大。图2为图1中①②间沙坎纵剖面图。

材料二 图1中浙东运河西起钱塘江，东到甬江入海口，横贯萧山—绍兴—宁波平原，贯通钱塘江、甬江等众多河流，由人工运河和天然河道构成。

（1）海塘是抵御海洋危害、开发海洋资源的堤岸工程。图1中甲、乙两地都建设海塘但目的不同，分别指出两地建设海塘的目的，并分析原因。

（2）图1中①②间沙坎的泥沙主要来自_____江。简述①②间沙坎对钱塘江出入东海发展航运的不利条件_____。

（3）从水运的角度，说明历史上浙东运河对杭州的作用。

28. 阅读材料，完成下列问题。

材料 肯尼亚人口超5000万，年轻劳动力比例高，薪资低。该国棉花种植有潜力但不稳定，农民更倾向于种植粮食作物（如玉米、高粱）或其他经济作物（如茶叶、咖啡、花卉）。为了打造纺织服装业全产业链，肯尼亚试图通过“地热+纺织”模式应对纺织业产业链（如纺纱、印染和烘干等）中的高耗能问题。肯尼亚凭借其独特的“政策+能源+市场”组合优势，成为纺织服装企业布局非洲、辐射全球的理想之地。下图为肯尼亚略图。

（1）从气候和土地利用角度，简析肯尼亚棉花种植少的原因。

（2）分析肯尼亚地热资源丰富且易开发的地质条件。

（3）说明肯尼亚依托地热资源，采取“电力+蒸汽”模式为纺织企业提供能源的优点。

（4）从地理位置、交通条件和劳动力三个方面，说明肯尼亚是纺织服装企业布局非洲、辐射全球理想之地的原因。

2026年普通高校招生选考科目考试（浙江6月卷）

地理答案及解析

一、选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. B 2. C

【解析】

【第1题详解】

审视图示数据后不难发现，下垫面从草地转化为林地后，该流域的降水量虽有微弱上浮，但其上升的量级与蒸散量的增幅相差悬殊，降水的小幅增加根本不足以驱动蒸散量发生如此大幅的提升，故A项应被排除出正确选项。

林地的植物群落相较于草地具有两个显著差异：其一，林木的株高远在草本之上；其二，树冠层的叶面积指数远超草被。这两个特征共同决定了森林生态系统的蒸腾通量远大于草地，树木通过根系吸水后经叶面气孔向大气释放的水汽量急剧增大，成为流域实际蒸散发总量上升的直接推手，B项正确。

地表径流的减弱系植被截留增多、水分下渗增强及蒸腾加强共同引发的效应，属于蒸散量增大带来的结果而非成因，C项与题意不符。

将图中转林地前后的土壤含水数据进行对比：林地条件下土壤含水量为24.6，而草地条件下为34.7——数值不升反降，说明林地并未增加土壤蓄水，D项判断不成立。

【第2题详解】

无论是扩大乔木林面积还是增加林木栽植密度，都会大幅推高植被蒸腾耗水，进一步激化区域水资源的供需矛盾，这与水资源紧缺区域的可持续发展理念相冲突，A、D两项均不可取。

题目所提供的资料仅涉及草地和林地两种下垫面的水文对比，并未涵盖灌木的相关水文信息，因而提高灌木比例这一推论缺乏实证依据，B项予以排除。

通过对比图示可发现，草地生态系统的蒸散消耗相对较低，土壤蓄水量却更为可观。适度推进草地恢复有助于削减水资源损耗，在维护生态效益的同时兼顾用水制约，C项正确。

3. C 4. D

【解析】

【第3题详解】

解题的关键在于理解题意中“数值大→驱动程度高”的对应关系。石漠化风险并非由单一因子决定，而是土地利用强度、植被覆盖度和地形坡度三者叠加耦合的结果，需要注意的是植被覆盖度的赋值规则为“覆盖越差、分值越高”，即植被稀缺会推高风险。接下来定位各个点位在三层栅格中的坐标值：丙处于第二行第二列，土地强度为2、植被覆盖为3、坡度为3，将这组数值累加后得分在四个选项中居于首位，故丙所代表的石漠化驱动程度最严重，C项当选。

甲的栅格位置对应第一行第一列，所叠加的三个图层分值依次为：土地强度2分、植被2分、坡度1分，其综合得分显著低于丙的三项总和，据此可判定甲的石漠化驱动程度弱于丙，A项排除。

乙所在的第一行第三列栅格中，三项指标分别赋值为：土地强度1、植被覆盖2、坡度2，累加后的总分仍不及丙的得分，故乙的石漠化驱动程度未达到丙的水平，B项不正确。

丁位于第三行第二列，对应分值为：土地利用1、植被2、坡度1，三项加总低于丙，风险程度不及丙，D项错误。

【第4题详解】

该区域广泛出露的碳酸盐岩（石灰岩）在长期的溶蚀作用下发育了错综复杂的裂隙与溶洞系统，构成密集的地下渗漏网络。水库蓄积的地表水会通过这些岩溶通道迅速漏失，蓄水效率极低，因此不具备建设大型水库的地质条件，D项当选。

题目涉及的喀斯特区域正好坐落在云贵高原之上，高原面被深切的河谷强烈分割，地势高低悬殊，河道的天然落差因此相当可观，A项描述并未切中要害。

考察区（我国西南喀斯特）范围内并无活火山或近代火山活动的记录，故火山作用对水库工程选址不构成实际限制，B项可予以排除。

本区在气候区划上归属亚热带季风类型，年降水量处于较丰沛的水平，因此在评估水库建设制约因素时，水资源供给并非短板，C项不成立。

5. C 6. D 7. A

【解析】

【第5题详解】

依据图上标注的指向标和等高线的空间展布规律——水流方向与等高线凸出方向互为反向——可判定甲河的水流总体走向是自西北方向朝东南方向流动，A项与此判定结果相左。

准确辨识区域生态问题需紧扣黄土高原南部的自然地理特征：深厚的黄土层在流水作用下极易遭受侵蚀，水土流失才是该区域面临的核心生态挑战，将其归为土地沙化是对问题本质的误判，B项排除。

题目所示区域地处温带季风气候的控制范围之内，在此种水热组合条件下发育的地带性植被群落类型应为落叶阔叶林，C项当选。

区域内地势起伏较大，自然排水条件良好，发生涝灾的概率较低，D项与实际情况不符。

【第6题详解】
入冬后气温一路走低，地表和土壤中的液态水向气态转化的速率随之放缓，因蒸发而损失的土壤水分大幅减少，①项分析无误。
本地属温带季风气候区，在冬季风主宰的时段内降水量处于全年低谷水平，故②项不成立。
土壤疏松程度在冬春两季并无显著差异，且该因素并非冬季土壤含水量高于春季的关键原因，③项排除。
冬季果树进入落叶休眠的生理阶段，地上部分的代谢活动和水分消耗均降至全年最低水平，这使得土壤中蓄积的水分得以较多地保留下来，表现为土壤含水率相对偏高，④项判断无误。
【第7题详解】
通过解读等高线的分布密度即可判断地形条件：该区域坡面上的等高线排列相对紧凑，指示地面坡度偏陡，这对于苹果树的栽植和管理均构成明显制约，A项当选。
黄土高原区光照资源充足，坡地日照时长相对较长，B项与实际条件不符。
图中可见河流分布，表明灌溉水源尚可获取，并非核心限制条件，C项排除。
黄土高原区白天与夜晚之间的温差较大这一自然禀赋，恰恰是有利于苹果品质提升的积极因素——较大的日温差能够促进果实内部糖分的有效积累，故D项不属于制约条件。
8. B 9. C 10. B
【解析】
【第8题详解】
与黑龙江相比，湖南纬度偏低，热量和降水条件均更为优越，水热组合利于水稻种植，但这不是两省产量差异的主要原因，A项排除。
表格中所列数据清晰地传递出一个核心信息：黑龙江水稻种植面积的扩展速率和绝对增量均远在湖南之上。播种面积的大幅扩张是产量快速攀升的最直接推手，B项当选。
交通基础设施的改善主要作用于粮食的流通和调运环节，对种植环节的产量并无直接的增产效应，因此C项理由不能成立。
黑龙江省当前的城市发展进程中，并未观察到大规模人口从城市向乡村回流的结构性趋势，D项所描述的逆城市化现象与当地的实际情况并不吻合。
【第9题详解】
湖南省境内水网与陆路相互交织，形成了覆盖面广的运输网络，这为粮食向省外调运提供了便捷的物流通道，故①项的陈述与事实不符。
将两省的人口规模与饮食结构对照分析：黑龙江常住人口体量显著小于湖南，且当地居民日常主食以面制品为主、大米消费占比较低（相比之下湖南的饮食高度依赖稻米），导致黑龙江水稻的本地留存有限、外调比率高企，②④两项正确。
从地理位置来看，黑龙江偏居东北一隅，与长三角、珠三角等国内粮食主要消费区域之间的空间距离较长，运输成本偏高，故③项的判断与客观条件不符。
【第10题详解】
受制于高纬度地区热量资源的先天不足，黑龙江的耕作制度只能维持一年一熟的节奏，无法像南方省份那样通过增加年内的种植茬数（提高复种指数）来实现产量跨越，②项不成立。
湖南的粮食调出率指标已从正值跌落至负值区间，这意味着本省粮食安全正面临供不应求的隐忧，应优

先保障省内供给；而黑龙江调出率维持高位，亟需解决的是外运通道的通畅问题。据此判断，①③两项符合题意。

湖南农业发展历史悠久，可供开垦的后备耕地资源已十分有限，不具备大规模开发的潜力，④项错误。

11. A 12. B

【解析】

【第11题详解】

对图示信息加以解读可以发现，各区域常住人口的变化幅度参差不齐，既有正向增长也有负向萎缩，人口净流入的区域分布集中而流出区人口则持续减少，其中经济发展水平较高的少数区域增幅格外显著。这一空间格局清晰地折射出人口向优势区域集聚的态势正在强化，A项当选。

图中沿海区域的常住人口变动幅度有升有降，并非清一色的增长，B项判断有误。

人口变动幅度悬殊，表明人口空间分布远未达到均衡状态，而是呈现明显的非均衡格局，C项排除。

图中呈现的是变化幅度而非绝对增减值，据此无法直接断定北部人口缩减数量为最多，D项不成立。

【第12题详解】

南京、苏州中心城区交通便捷，生活配套设施完备，A、D两项与人口减少的事实相矛盾。

伴随南京、苏州等城市发展迈入更高阶段，两大城市的中心城区持续推动产业迭代升级，传统劳动密集型制造业逐步向郊区或外围城市迁移，中心城区所容纳的就业机会总量随之收缩，这是常住人口数量走低的关键成因，B项当选。

南京、苏州经济发达，属于典型的人口净流入城市，人口大规模返乡创业的说法与实际情况不符，C项排除。

13. D 14. B 15. B

【解析】

【第13题详解】

古代的远洋商船动力来源完全依赖风帆，顺风航行方能事半功倍。自中国东南沿海启航前往西亚的航线，在南海航段需保持偏南偏西的航向。春季恰好处于冬季风退却、夏季风北推的转换阶段，大气环流尚不稳定，风向摆动频繁且风力起伏大，不具备稳定顺风的条件，A项予以排除。

夏季南海盛行西南季风，而船舶航向为南偏西，西南风对于向南行驶而言属于侧逆风，不利于南下行船，B项错误。

秋季同样处于季风转换时期，气流不稳定，C项排除。

进入冬季后亚洲大陆被强大的冷高压所盘踞，南海海域盛行稳定而强劲的东北季风，这一风场恰好与南下西行的航线方向高度契合（东北风吹送船只向西南方向行进），为古代帆船提供了最为理想的顺风条件，因此冬季是启航的最佳时间窗口，D项当选。

【第14题详解】

从地图上可以辨识，马来半岛中央发育有近南北走向的高大山系。每年5至9月属于北半球的夏半年时段，源自南半球副热带高压的东南信风在跨越赤道之后，因地转偏向力方向由南半球的左偏切换为北半球的右偏，风向演变为西南方向。这支西南气流在印度洋上空吸纳了大量水汽，抵达马来半岛时遇到南北延展的山脉阻挡，被迫沿迎风坡（半岛西侧）爬升，水汽在上升过程中冷却凝结，在西坡形成充沛的降水。气流翻越山脊后，在东侧背风坡做下沉运动，绝热增温使得相对湿度急剧下降，已无足够水汽可供成云致雨，因而马来半岛东侧在5到9月间降水显著偏少，B项正确。

当赤道低压带（ITCZ）盘踞该地上空时，强烈的辐合上升运动促使全区域进入大范围对流性降水模式，东西两侧的降水差异在此种环流背景下无法显现，A项被排除。

该区域位于低纬度赤道附近，副热带高压带的影响范围无法延伸至此，C项有误。

需注意东北信风带在一年中的活跃时段集中在北半球的冬半年（大致10月至次年4月），而题干明确将时间窗口限定在5至9月，两者在季节上并不重叠，D项应予排除。

【第15题详解】

庞大的热带食草动物种群（以象、野牛、羚羊为代表）要以连绵的天然草场作为赖以生存的食物基础，而丛生禾草占优势的稀树草原景观恰好能满足这一生态需求。从气候成因来看，稀树草原由热带草原气候所塑造，其核心标志为终年高温配合干季与湿季的交替轮回，这种水热节律能够维系大面积草本植被的生长与更新，为大型食草动物提供充裕的觅食空间，B项当选。

夏干冬雨的地中海气候模式（夏季受副高控制炎热干燥、冬季受西风影响温和湿润）在全球的分布局限于南北纬30°至40°的大陆西岸。马来半岛的地理纬度远低于此区间，不具备形成该气候类型的基本条件，A项错误。

'夏热冬冷、雨热同期'是对温带季风气候四季分明的精准概括，其冬季低温是标志性特征。然而马来半岛所处的纬度带终年高温，冬季低温在此地完全是天方夜谭，这一气候类型的描述根本无法适用于该区域，C项不成立。

终年温和、降水分配相对均匀是温带海洋性气候的显著特征，其热量积累不足，无法形成可供大型食草动物生存的大片稀树草原，D项错误。

【答案】16. C 17. A

【解析】

【第16题详解】

解读图示信息可知开发区的空间演化路径：第Ⅰ阶段，开发区地处城市建成区外围边缘，扮演着城乡过渡地带的角色。至第Ⅱ阶段，经济扩张驱动城市空间不断向外延伸，新增建成区将原先处于边缘位置的开发区完整地包裹于城市版图之内，促使其完成了从“郊区飞地”向“中心城区腹地”的角色转换。根据背景材料，开发区设立初期主要布局了劳动密集型和资源加工型产业。在Ⅰ→Ⅱ的演进过程中，这些产业类型伴生的工业三废排放强度较高，而城市扩张后又将更多的居住社区和人口纳入开发区周边，工业生产排放的污染物对邻近生活空间的威胁程度由此显著加剧，故A项判断不当。

从图示的空间关系来看，城市建成区的蔓延已经“跨过”了开发区并将其完整吞并，这恰恰证明开发区的存在并未构成城市空间生长的障碍，相反它似乎还为外围区域的后续开发提供了某种“跳板”效应，B项判断失误。

随着开发区被城市建成区完全吸纳，其地理区位发生了本质性的跃升——从交通不便的边缘地带转变为拥有完善路网和市政配套的城市内部区块，伴随而来的是人流、物流和信息流的高度汇聚，区位条件全面优化，用地需求随之激增，土地的市场价格自然会显著走高，C项当选。

城市边界向外推移的结果是，在开发区与外侧乡村之间填充了大片新建城区，开发区与乡村之间的直线距离因此被进一步拉开，D项的结论与这一空间演化趋势不符。

【第17题详解】

对照示意图中Ⅱ阶段到Ⅲ阶段的用地演变，开发区的主导功能发生了根本性跃迁——由原先单一的工业用地转为以居住和商业服务业用地为主体的复合功能区。在此之前，大片工业地块镶嵌于城区内部引发

了工业污染扩散和职住分离通勤矛盾两大问题，经过此次更新改造，新增的居住和商业设施使城区各类用地的空间配比趋于合理，不同功能区之间的协同关系得到实质性增强，故①项表述恰当。

从经济地理的视角审视，工业用地的单位面积产出效益通常远不及商业服务和居住用地。通过此次功能转换，地块的经济密度得到跨越式提升，土地利用的集约化水平显著增强、利用效率迈上新台阶，②项成立。

需厘清本次更新的性质：它是对既有城市建成区内部的用地结构进行调整与重组，属于存量优化而非增量扩张，因此城市建成区的总面积并未发生任何变动，③项不成立。

用地功能的转变意味着开发区工业空间的绝对规模被大幅压缩，取而代之的是居住和服务业态的植入，其原有的工业生产职能明显退化、逐步边缘化，④项不成立。

【答案】18. A 19. D 20. C

【解析】

【第18题详解】

在风力侵蚀盛行的荒漠环境中，地表粗大的岩屑和砾石块体因其自身质量较大、启动风速门槛偏高，不容易被近地面风沙流所挟带运移。这些粗颗粒物质在表层形成一道天然的“装甲层”，有效阻隔了风力对下伏细粒松散物质的直接吹蚀和磨蚀，从而起到保护作用，A项当选。

粗颗粒物质在表层形成的覆盖层犹如一道物理屏障，切断了下方土壤孔隙与大气之间的直接连通，这将抑制土壤水分的蒸发散逸——换言之，蒸发量会因覆盖而减少而非增加，B项判断与物理常识相悖。

题目材料已着重强调了粗颗粒覆盖层在维系荒漠生态系统稳定性方面的正面角色，据此可以推断粗颗粒层的存在并不会成为生态修复的障碍，C项排除。

粗颗粒层仅属于微地貌尺度的地表覆盖结构，其存在与否远不足以对大气环流和区域降水的气候统计特征产生影响，因此D项的推论缺乏科学依据。

【第19题详解】

题干明确提到“细颗粒发生沉降，向下渗滤并穿过砾石空隙”，这实质上描述了降雨期间，水分垂直下渗所产生的拖曳效应——水流裹挟着细粒物质顺着砾石间的孔隙通道向下运移。由此断定，驱动细颗粒下渗并穿越砾石层的主要营力是大气降水，D项当选。

荒漠环境中生物数量稀少，生物活动对细颗粒向下迁移的驱动力十分微弱，A项排除。

海拔高程只反映一个地点的绝对高度或相对高度，属于静态的地形属性，它本身并不具备将固态颗粒物质沿砾石空隙向下搬运的驱动力，B项无法解释题意所述的下渗现象。

气温的升降仅调控水分的相态转化和蒸发速率，其所涉及的能量交换尺度远不足以驱动固态颗粒物质发生空间位移，故气温变化不具备促使细颗粒穿透砾石层向下运移的力学条件，C项被排除。

【第20题详解】

题干模型中的“基岩风化形成粗砾、中砾”这一设定决定了所有砾石的“出生地”均为本地基岩，由于风化过程的区域同步性，这些碎屑物质的形成时代大体相当，C项当选。

根据题意所设定的模型框架，文中涉及的全部砾石均由本地基岩原地风化剥蚀而来，物源区单一、搬运距离近，因此不同砾石的来源背景并不存在显著差别，A项排除。

在这一地质过程中，细粒级的碎屑物质先后经历了风力的选择性搬运和降水渗透的淋滤分异作用，最终堆积形成的沉积层具有较理想的粒径分选特征，故B项判断失误。

决定风化速率的环境变量（温度高低与水分多寡）并非一成不变，在漫长的地质时间尺度上，当气候条

件发生波动时基岩的风化剥蚀速率必然随之调整，故认为风化速率恒定不变的观点站不住脚，D项排除。

【答案】21. A 22. D

【解析】

【第21题详解】

解题需要把握北半球观察北极星时的方位坐标体系：北极星恒位于观测者子午线正北方向的天顶点附近，以观测者面向北极星的方向为正北参照，则身后为正南、左手方向为正西、右手方向为正东。根据题目给出的观测轨迹示意图，Q天体在视场中处于北极星的右侧（即东方位），这意味着从北极星引向Q天体的连线下延至地平面的方向指向偏东侧，其余三个选项均与此结论不符，A项当选。

【第22题详解】

北极星附近的恒星绕转现象，实质上是地球绕地轴自转在天球上的投影效应。当观测者面向北极星方向时，所有天体的周日视运动均沿逆时针方向进行，运动角速率等于地球自转的角速率（约15°每小时）。以下依据这一基本原理对各选项加以甄别：

先看P天体的轨迹变动：经过2小时的连续跟踪，P在逆时针方向上的角位移为2×15°=30°，即新位置落在原位置逆时针偏转30°的方向上。据此可立即筛除图中P沿顺时针方向移动的①和②两种情况，A、B两项不予考虑。

关于Q天体两个月后的位置：需要在理解恒星日与太阳日差异的基础上进行推演。地球自转的真实周期（恒星日）比日常钟表所用的太阳日大约短4分钟，这意味着每隔一个太阳日，同一颗恒星在天球上的位置会比前一日沿逆时针方向多走约1°。连续观测60天，累计偏移量约为60×1°=60°。因此，Q天体两个月后的新位置应在原位置逆时针偏转60°处。选项③中Q的运动方向为顺时针，与理论上的逆时针视运动方向正好相反，不成立；选项④中P移动30°、Q移动60°，与上述计算完全一致，故C项错误，D项正确。

23. B 24. D 25. A

【解析】

【第23题详解】

柑橘对低温较为敏感，宜选取≤0℃低温天数少、冻害影响最轻的坡段。①坡段海拔较高，无论南坡或北坡，年内≤0℃低温日数均随海拔抬升而显著增多，低温日数偏多，冻害程度较重，难以保障柑橘安全越冬，A项排除。

②号坡段所处的海拔区间恰到好处：既避免了更高海拔区域低温日数激增的劣势，又不像低海拔谷地那样容易成为冷空气下沉汇聚的“冷湖”。全年≤0℃的低温累计天数在四个坡段中处于最低梯队，霜冻风险可控，热量资源相对充裕，完全有能力支撑柑橘完成全生育期和越冬期的热量需求，综合条件最优，B项当选。

③坡段所处的海拔区间具有一个不利特征：其≤0℃低温日数超出②坡段，且冬季因冷空气密度较大而容易在相对低洼处产生“冷池”效应，霜冻事件的频率和强度均更高，冻害风险超出柑橘的耐受范围，不适宜作为种植选址，C项不当。

④号坡段地处山麓地带，海拔为全剖面最低，是冷空气夜间沿坡下滑后的最终汇聚区，一年内出现≤0℃低温的天数偏多，冻害程度不容忽视，柑橘植株在此难以安全度过冬季低温期，D项不可取。

【第24题详解】

先厘清山脚气温降至冰点以下时近地气层的物理图像——地面强烈辐射冷却使贴地层成为“冷源”，上

层大气相对偏暖，形成下冷上热的逆温层结；此时等温面在垂直方向上表现为向下凹陷（低值区在低层）；冷重空气的堆积则造成近地面气压偏高，等压面随之向上隆升。

等温面向上凸起与等压面向下凹陷的组合，反映的是近地层大气处于“上冷下暖”的正常递减状态，绝不存在逆温——这与山脚处气温≤0°C所对应的冷空气堆积格局截然相反，A项被筛除。

等温面向上凸起反映的是近地层气温高于上方大气的正常递减格局，此种温度层结与近地面冷空气堆积形成的逆温结构存在本质差异，B项予以排除。

等压面若呈现向下凹陷的形态，则意味着近地面层的气压值偏低——这与近地层有密度较大的冷空气堆积时理应出现的高压特征恰好背道而驰，C项予以排除。

当等温面呈现向下凹陷的形态时，意味着垂直方向上近地层冷、高层暖——这正是逆温层结的典型热力结构；与此同时，等压面向上隆起的形态表征冷重空气在近地层堆积、产生相对较高的地面气压。这两者的配置关系与山脚处气温降至冰点以下时近地气层的物理状态高度吻合，故D项正确。

【第25题详解】

白昼期间山脚上空存在补偿性下沉运动，下降气块在近地面压缩增温，这一绝热过程使得山脚处气温被显著抬高。与之相比，P、Q两处山坡虽因海拔相对较高而接收到更多太阳直接辐射，但山坡开阔地带的气流交换更为活跃、散热速率更快，故可能出现山坡温度反而低于山脚的反常现象，A项成立。

进入夜间后，山坡地表因强烈辐射冷却而迅速失温，冷却后的空气在重力作用下沿坡面缓慢下泄，最终滞留在山谷底部形成“冷湖”，导致山脚气温普遍低于坡面。山脚处出现的浓雾正是强烈逆温存在的直观证据（低层冷湿空气达到饱和），确认了“下冷上热”的层结分布，B项与此分析结果不一致。

在夜间持续辐射降温的背景下，坡面上被冷却的空气密度不断增大，受重力驱动沿坡面缓慢下泄并在山谷底部汇聚堆积，这一过程使山脚气温在整个夜间时段始终低于山坡同高度气温，两者温差于翌日日出前夕达到极大值，此时山谷底部理应为全剖面温度最低处，C项陈述与客观规律不符。

冷锋天气系统过境之后，该区域受单一性质冷气团全面控制，由于较冷空气的密度大于暖空气，冷气团倾向于占据海拔较低的山脚位置。待日落西山、太阳短波辐射补给中断后，山坡坡面通过长波辐射迅速损失热量、温度骤降，贴近坡面的冷空气密度增大，沿坡体向下滑动并在谷底低洼处汇集，最终形成山脚温度反低于山坡的分布格局。D项的判断与上述物理过程不相吻合。

二、非选择题（本大题共3小题，共50分）

26.

（1）①.水资源 ②.煤炭(能源)

（2）城市教育、医疗、交通等公共服务发达，吸引人口向城镇集中；新增人口以移民为主，移民多选择在就业机会多、配套完善的城市定居，推动城镇人口增长；产业结构调整，制造业占比下降，服务业快速发展，且服务业多集中分布在城市，吸引大量劳动力向城镇转移；农矿业机械化水平提升，所需劳动力减少，农村剩余劳动力向城镇迁移。

（3）观点依据：澳大利亚国内人口规模小，汽车消费市场有限，国内汽车需求量小，规模效应不足，生产成本高。

观点的片面之处：澳大利亚可聚焦高附加值的汽车零部件生产，可面向全球市场，并非仅依赖国内市场；除了民用乘用车，澳大利亚的矿业、农业、工程建设等领域对商用车、特种车辆的多元化需求稳定。

【解析】

【第（1）题详解】

首先提取图中的关键信息——矿产资源和降水分布，观察到甲地周边年等降水量线数值偏低，表明降水偏少、水资源紧缺；同时甲地附近河流稀疏，可推断其地表水资源匮乏。此外，澳大利亚的煤炭资源高度集中于东部沿海，甲地邻近区域煤炭赋存亦较贫乏。

【第（2）题详解】

解答本题的思维路径：首先锁定材料中的显性信息——该国经济发达且接纳了较多移民；然后挖掘隐含的驱动机制——工业和服务业部门的持续扩张不断创造新的就业岗位，构成拉动城镇化的人口引力。整条逻辑链可概括为：“ 人口迁入→产业吸纳→城镇化率提升 ”。具体可从以下维度组织答案：城市公共服务资源的虹吸效应、移民群体的定居偏好、第三产业在城市的高度集聚特征，以及农业部门机械化替代劳动力后释放的农村剩余人口向城镇的转移。

【第（3）题详解】

支撑该观点的核心论据：材料已明确交代“ 该国汽车工业发展受限于国内人口规模 ”，换言之，澳大利亚本土消费群体数量有限，乘用车内需市场规模狭小，生产端难以通过大批量制造来摊薄固定成本、实现规模经济效应。

观点的不足之处：从市场需求的角度审视，澳大利亚并非只能依赖本土市场，完全可以瞄准国际市场和特定细分领域。在汽车零部件高附加值制造以及特种车辆、专用车辆的市场需求方面，仍存在可观的发展空间。

27.

（1）目的：甲地，抵御海洋危害(保护海岸)；乙地，开发海洋资源(围滩造地)。

原因：甲地地处海湾凹岸，喇叭口形海湾抬升涌潮，潮水强力掏蚀岸堤，造成岸坡坍塌，淹没村镇农田，冲毁生产生活设施，造成土地盐碱化等，需修建海塘抵御海潮侵袭。乙地泥沙持续淤积形成广阔滩涂，浙江省人多地少，筑塘围滩可拓展耕地和其他产业用地，临东海易受台风，风暴潮侵袭，修筑海塘可阻隔海水，保障滩涂开发与农田安全。

（2）①. 长 ②. 影响航道水深，航运载重量不足；航道稳定性差，船舶易搁浅；通航受潮水涨落影响，通航时间受限，降低通航效率；增加疏浚航道成本；影响通航安全。

（3）连通钱塘江与浙东沿海水系，完善水运网络，奠定杭州南北航运枢纽地位；依托通航能力，输送沿海物产、内地物资，扩大杭州经济腹地；依靠稳定的漕运、商贸航运保障物资流通，持续支撑杭州城市长期经济繁荣：凭借贯通浙东的水运通道，串联沿线城镇的优势，稳固杭州在浙东沿海区域核心城市地位。

【解析】

【第（1）题详解】

破题需要紧扣材料提供的两条关键线索：杭州湾的“ 喇叭口 ”形态决定了潮汐能量在向湾顶传播过程中不断被压缩聚焦，形成破坏力惊人的钱塘涌潮；图中甲恰好位于喇叭口凹岸的顶冲位置。据此逻辑链推导：涌潮以雷霆之势撞击凹岸→剧烈冲刷侵蚀岸线堤防→海水漫溢淹没沿岸农田聚落→海水入侵导致土地盐碱化→甲地海塘的核心功能是“ 防潮护岸、保民生 ”。转向乙地分析：图中标注了大范围的淤泥质潮滩，叠加“ 浙江人多地少 ”这一区域背景，可推导出“ 围垦滩涂、扩充土地 ”的内在需求；再加上海岸带面临台风风暴潮的叠加威胁，海塘在此处的主要使命便明确为“ 阻隔海水、保障围垦开发 ”。

【第（2）题详解】

判断沙坎物质的来源，关键在于对比钱塘江与长江的来沙特征：钱塘江流域来水含沙量极低，而长江则

为世界级的高含沙量河流。在杭州湾的水沙交换格局中，长江输出的巨量泥沙随沿岸流和潮汐往复搬运，成为①②之间沙坎淤积体的主导物质供给方。

沙坎作为水下堆积体给航运带来的连锁负面效应可从四个维度展开：其一，图2显示沙坎顶部水深有限→航道通航水深不足→船舶载重吨位被迫压低；其二，材料交代沙坎处于动态冲淤变化中→河床地形频繁变动→航道走向和尺度极不稳定→船舶易触底搁浅；其三，海湾受潮汐支配→每日水位周期性大幅波动→可利用的通航时间窗口被压缩→运输效率打折扣；其四，为维持航道畅通需反复进行疏浚作业→船舶运营成本被抬高；此外，浅滩的随机变化也直接构成航行安全隐患。

【第（3）题详解】

浙东运河的修建对杭州城市地位的提升可从四个层次进行评价：层次一（网络连通）：运河将原本彼此孤立的水系——钱塘江干流与浙东沿海诸河——串联为一个有机整体，杭州由此升级为南北水运网络中的枢纽节点；层次二（腹地拓展）：依托新开辟的水上运输通道，内陆腹地的物产与沿海地区的海货得以双向高效流通，杭州的商品贸易辐射半径大幅延展；层次三（经济持续）：运河通航不受季节枯洪的极端限制，提供了常年稳定的物流保障，为城市经济的长期繁荣注入了可靠的动力；层次四（区域核心）：运河以杭州为起点向东延伸，串联了沿线一众城镇，从根本上强化了杭州对浙东沿海地带的引领和集聚功能。

28.

（1）气候角度：肯尼亚以热带草原气候为主，降水季节变化大，旱涝灾害频发，水热条件不稳定，影响棉花产量。

土地利用角度：相较于粮食作物(如玉米、高粱)或茶叶、咖啡、花卉等经济作物，棉花种植的经济收益较低，且生产 投入、技术要求相对较高，农民种植意愿低，种植规模受限。

（2）

地处东非大裂谷(板块边界)附近，裂隙发育，地下岩浆活动频繁，地下热能极易沿断裂带上涌，地热资源丰富。断裂带岩石破碎，大气降水和地表水沿裂隙渗入地下，受热形成大量温泉、热蒸汽，地热资源丰富。断裂带岩层断裂，温泉直接出露地表，钻井与抽水工程施工难度低，易开发。

（3）地热发电可为工业生产提供大量廉价的能源，降低综合能耗成本。利用地热蒸汽，可满足烘干、定型等工艺，满足对高温蒸汽的需求，大幅降低高耗能环节的能源成本。地热资源为可再生能源，受季节、天气 影响小，能源供应稳定。地热能属于清洁能源，污染排放少，利于企业实现环保生产，也能提升产品的绿色竞争力。

（4）地理位置：肯尼亚地处非洲东部，西部内陆与多个国家接壤，可依托本土工厂覆盖非洲各国服装消费市场：东南部濒临印度洋，靠近亚洲通往欧美的国际远洋主航道，方便成衣销往全球，区位辐射能力强。

交通条件：蒙巴萨拥有优良海港，海运便利，便于纺织原料进口、成衣出口；国内铁路连通内陆腹地，海陆联运便利，货物集散效率高，便于产业链原料与成品运输。

劳动力：人口基数大，人口结构年轻，适龄劳动力充足；薪资水平低，纺织服装业属于劳动密集型产业，可显著降低企业用工成本，产品国际价格竞争力强。

【解析】

【第（1）题详解】

以“ 气候 ”为切入维度展开分析：材料已指明肯尼亚大部分国土位于热带草原气候区，这一气候类型的

突出短板在于降水的季节分配极不均匀——旱季漫长而干燥、雨季集中且多暴雨，旱涝交替的极端水热组合使得棉花在关键生长期内极易遭遇水分胁迫，实现稳产的难度远高于气候稳定的植棉区。

土地利用维度：依据材料农民倾向于优先种植粮食作物（玉米、高粱等）或其他经济作物（茶叶、咖啡、花卉）的行为信息，将棉花与这些作物进行收益和投入对比后可知，棉花的经济回报相对较低、生产投入和技术门槛却更高，导致农民种植棉花的积极性不足，种植规模受到制约。

【第（2）题详解】

本题需立足于东非大裂谷作为陆内张裂带的构造背景，从热源丰度、储水空间和开采便利性三个层面逐级推演。第一，由图可见该地紧邻裂谷断裂体系和板块分离边界，地壳拉张导致岩层中裂隙网络极其发育、深部岩浆房持续供给热能，意味着地热资源的热源端非常充沛，储量可观。第二，拉张破碎的岩体为大气降水和地表水体向下渗透提供了天然通道，水流在深部被加热后形成高温蒸汽和热泉，说明地热流体资源同样充足。第三，图中若干温泉点直接出露于地表，表明钻探和取水工程无需穿越巨厚盖层，施工难度和开发成本均较低，开采条件十分有利。

【第（3）题详解】

从三个维度论证地热能源对纺织服装全产业链的赋能效应：第一，成本维度。纺纱织造中的高温定型、印染环节的加热与烘干均属高能耗工序，地热电站提供的基础电力及地热蒸汽的直接利用，可将全产业链的能源开支压缩至传统能源方案的数分之一。第二，稳定性维度。相较于风电、光伏等间歇性可再生能源，地热能的突出优势在于不受天候和昼夜的制约，可实现全年8760小时的持续输出，切实保障生产线的不间断运转。第三，绿色竞争力维度。在全球碳关税和绿色供应链认证日益严格的大背景下，地热能的近零碳排放特征可帮助企业降低产品的碳足迹，使肯尼亚制造的纺织成衣在欧美高端市场上获得差异化竞争优势。

【第（4）题详解】

解答本题需综合考量三个维度的区位条件：面向非洲内陆的消费市场、对接全球远洋贸易通道、以及纺织服装业作为劳动密集型产业对生产要素的特殊需求。分析的落脚点是市场覆盖广度、海陆物流衔接度与人工成本竞争力三大核心。

地理位置：分为辐射非洲内陆市场和对接远洋全球市场两个层面。依据图中肯尼亚东临印度洋、西邻多个内陆国家的空间区位信息，可推知其可依托本土工厂向内覆盖非洲各国服装消费市场，向外借助印度洋航线连通全球远洋贸易，区位辐射效应突出；

在交通维度上可从海运和陆运两条线分别论述：看图可知蒙巴萨拥有天然深水良港，为大宗纺织原料（棉花、化纤）的海上进港和成衣的集装箱远洋出口提供了关键门户；与此同时，图中标注的内陆铁路网将港口与腹地工业区紧密衔接，形成了“港口卸货→铁路分拨至工厂→成品经铁路集结至港口”的高效海陆联运闭环，极大提升了整个物流链条的集散效率与响应速度。

劳动力的比较优势应当沿着“供给规模→成本水平→产业适配→国际竞争力”的递进关系展开：第一步，材料给出肯尼亚人口总量突破5000万且人口年龄中位数偏低的关键信息，表明该国的潜在劳动力储备极为庞大且持续增长。第二步，该国的人均国民收入处于较低区间，意味着工资水平具有显著的国际比较优势。第三步，纺织服装业恰为典型的劳动密集型产业，对低技能劳动力的吸纳能力极强，与肯尼亚的要素禀赋高度契合。第四步，极低的用工成本最终传导至终端产品价格——肯尼亚制造的服装在国际市场上拥有难以匹敌的价格竞争力。

年份

水稻播种面积（万公顷）
水稻产量（万吨）
粮食调出率（百分比）
黑龙江
湖南
黑龙江
湖南
黑龙江
湖南
2004
159
372
1130
2286
54
8
2010
277
403
1844
2506
72
6
2016
320
409
2255
2602
75
-7
2022
360
397
2718
2640
79
-7
相关试卷

2026年浙江省地理高考6月卷真题（原卷版＋解析版）：