

2023 福建省普通高中学业水平选择性考试地理试题

一、单项选择题：本大题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

江苏省在改革开放以来在山上废弃矿坑养殖青虾，近年来，通过发展电商扩展销售，2018 年以来陆续关闭一些污染严重的青虾养殖场，并由下游愿意付费的企业买单。根据材料回答 1~3 题。

1. 江苏选择山上矿坑养殖而非平原养殖的目的是（ ）

- A. 降低生产成本
- B. 增加汇水面积
- C. 避免占用耕地
- D. 减少水土流失


2. 分析发展电商销售对于青虾养殖的促进作用（ ）

- A. 扩大养殖规模
- B. 提高产量
- C. 保证产品质量
- D. 扩展销售渠道

3. 关闭污染养虾场后，下游付费意愿最高的企业是（ ）


- A. 高端康养产业
- B. 传统种植业
- C. 仓储运输业
- D. 信息技术

自然资源丰富的国家（或地区）若投入到自然资源开发及贸易的资金和劳动力过多，影响其他行业发展，可能导致经济发展缓慢，引发“资源诅咒”。当前俄罗斯油气技术装备的进口比例偏高。俄罗斯北极地区某自治区近年来大力开发油气资源和发展储运，其第三产业以劳动密集型为主。图 1 示意该区从业人口构成变化。据此完成 4~5 题。



- 4.有人认为该区存在“资源诅咒”风险，若该结论成立，则图中序号代表（ ）
- A.①第一产业，②第三产业 B.①第三产业，②第二产业
- C.①第二产业，③第三产业 D.①第一产业，③第二产业
- 5.中俄已就共建“冰上丝绸之路”达成共识，该区希望通过合作优先解决油气行业（ ）
- A.技术支撑不足 B.环境污染严重
- C.产量趋于下降 D.从业人口短缺

唐朝时期，吴淞江未形成较稳定的河道。北宋时期，吴江长堤建成后，吴淞江河道日趋稳定，成为太湖的主要泄洪通道。近代以来，吴淞江成为上海港体系的一部分。图2示意唐代以来太湖东部水系的演变过程。据此完成6～8题。



- 6.晚唐诗人许浑泛舟吴淞江，留下了“杨柳北归路，兼葭(芦苇)南渡舟”的诗句。诗中所述河段南北两侧植被差异的主要影响因素是（ ）
- A. 坡向 B.热量
- B. C.堆积状况 D.盛行风向
- 7.北宋时期吴江长堤建成导政（ ）
- A.长堤以西河湖淤积加强 B.吴淞江输沙量减少
- C.长堤以东湖水冲刷加强 D.吴淞江径流量减少
- 8.近代以来吴淞江逐渐成为上海的“米粮要道”，主要原因是（ ）
- A.吴淞江航道条件改善 B.上海工商业发展
- C.吴淞江防洪能力提高 D.上海港泊位不足

局部强降雨后，太阳光线以一定的角度投射在雨幕上可能形成彩虹。图3示意彩虹最高视点与太阳高度角(h)的关系。据此完成9～11题。




图 3

9. 华南是我国出现彩虹概率最大的地区之一，主要原因是该地区（ ）

- A. 锋面活动频繁
- B. 强对流天气多
- C. 地形较复杂
- D. 日照时数长

10. 暑假某日，小海同学在武夷山旅游，雨后邂逅一轮美丽的彩虹。此时的时间和他的朝向最可能是（ ）

- A. 07:30-08:30，面向太阳
- B. 10:30-11:30，背向太阳
- C. 14:30-15:30，面向太阳
- D. 16:30-17:30，背向太阳

11. 从冬季到夏季，我国北方的彩虹可见概率的增幅较南方更大，主要是因为夏季北方较南方（ ）

- A. 白昼更长
- B. 降水更多
- C. 大气能见度更高
- D. 太阳高度角更大

一天中，区域的居民活动类型（工作、学习和休闲等）越丰富，活动地点总数越多，区域之间人口流动越频繁，其活力越高。我国 N 市基于大数据测算城市活力，图 4 示意该市工作日两种高活力类型。据此完成 12 ~ 14 题。

活力




图 4

12. 甲型对应区域的功能最有可能是（ ）

- A. 文化创意
- B. 购物娱乐
- C. 办公教育
- D. 高端居住

13.青少年比例高的某区域活力类型是乙型。该区域昼夜活力均较稳定表明青少年（ ）

- A.停留时间较短
- B.参与的活动类型多样
- C.通勤频率较高
- D.出行目的地类型单一

14.地铁通常有助于提升城市活力。N 市新开通了一条途经某高活力区域的地铁。然而，该地铁对此区域的活力影响较小。推测当前该地铁沿途的其他区域人口（ ）

- A.增长缓慢
- B.流动频繁
- C.容量较大
- D.密度较小

泥石流爆发后，部分物质冲出沟口，沟内残留物质会影响下一次泥石流的冲出量。图 5 示意某条沟及沟口景观。该沟于 2013 年、2019 年和 2020 年爆发了泥石流，沟口冲出量分别为 11.50 万 m^3 、11.91 万 m^3 和 11.04 万 m^3 。引发这三次泥石流的降雨量依次下降。图 6 示意泥石流冲出沟口后的堆积体。据此完成 15 ~ 16 题。




图 5

15.2013 年与 2019 年沟内物质量相近，但 2013 年泥石流冲出量较少，主要原因是 2013 年泥石流爆发前（ ）

- A. 沟道弯曲度较小
- B.降雨冲刷较强
- C.沟内的空间较大
- D.土壤水分较少

16. 图 6 中 PQ 线示意的堆积体剖面结构最可能是（ ）




图 6

二、非选择题（52 分）

17. 阅读图文材料，完成下列要求。（10 分）森林枯落物能吸收雨水，涵养水源。通常采用浸泡法和模拟降雨法两种方法测算枯落物吸水量。前者适用于满足枯落物长时间浸泡和含水量饱和的环境；后者模拟当地降雨特点，将水降到枯落物后测算。福建某研学小组在当地考察时发现 B 处枯落物层比 A 处厚（图 7）。为更准确测算冬季 A 处枯落物的实际吸水量，该小组选择模拟

降雨法。




图 7

分析浸泡法不适用于准确测算冬季 A 处枯落物实际吸水量的自然原因。（10 分）

18. 阅读图文材料，完成下列要求。（22 分）新中国成立后，上海开启了郊区城镇化进程（图 8），逐步在郊区规划建设了许多功能区，促进各类要素在此集聚。2001 年后，上海在郊区建设新城，完善基础设施和公共配套，布局大型购物中心，逐步实现产城融合。临港新城（L）是上海产城融合的典范，中国新闻网对此报道：“脚下是陶瓷废料制成的再生地砖，蓝色透水沥青路旁边草木葱茏。海风徐徐，树影婆娑，高达 50% 的森林覆盖率让临港不仅空气清新，而且较别处更多了几分清凉。围绕滴水湖，已经形成了功能各异的城市环带。





图 8

- (1) 归纳阶段 I 到 III 上海郊区功能区演变的特点。(4 分)
- (2) 说明阶段 III 各要素流动对上海人口流向郊区的拉力作用。(6 分)
- (3) 从集聚效应的角度，评价上海郊区大型购物中心对入驻商家的影响。(6 分)
- (4) 说明临港新城是如何实现自然环境调节功能的。(6 分)

19. 阅读图文材料，完成下列要求。(20 分) 古环境演变可从地质构造、沉积特征、化石类型和全球气候变化等方面进行研究。距今约 150 万年，澳大利亚东南部存在古大湖（图 9），墨累河流经此湖并于 P 处溢出入海。此后，气候干湿交替，该湖逐渐变成内陆咸水湖。甲、乙两处水下沉积速率一致且无间断，沉积地层中含有古生物化石。黏土层形成于深淡水湖环境，石灰岩层形成于浅咸水湖环境。石灰岩层顶部海拔指示相应地点当时的湖面高度（图 10）。



- (1) 根据沉积地层特征，分别说明古大湖区域干旱化和甲处先于乙处露出湖面的依据。(8分)
- (2) 墨累河曾因 P 处海拔较高而无法入海，后又经 P 处重新入海。推测使墨累河重新入海的主要内、外力作用。(4分)
- (3) 研究表明，P 处北侧附近未遭受过海水入侵。如果不考虑构造因素，若为科考队员，在野外可以寻找哪些方面的证据并论证该观点 (列举两方面)。(8分)