

绝密★启用前

2025 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试

地理

本试题卷分选择题和非选择题两部分，共 8 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。


考生注意：

- 1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
- 2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。

选择题部分

一、选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

冷湖曾因石油资源枯竭陷入衰落，如今因赛什腾山上世界级天文观测基地（海拔 4200 米）的建设而备受瞩目，主题旅游蓬勃发展。下图为柴达木盆地局部简图。据此完成下面小题。




- 1. 冷湖的重新兴起得益于（ ）
 - A. 盐类资源丰富
 - B. 自然环境独特
 - C. 文化底蕴深厚
 - D. 人口大量集聚
- 2. 在冷湖可能被限制发展的旅游项目是（ ）
 - A. 灯光秀
 - B. 自然风光
 - C. 科普研学
 - D. 天文摄影

随着全球化进程的加快和中国综合国力的不断提升，我国海外高层次人才回流现象日

益显著。完成下面小题。


3. 我国海外高层次人才大多回流至直辖市或省会城市，主要影响因素是（ ）
- A. 事业发展 B. 生活成本 C. 交通设施 D. 环境质量
4. 海外高层次人才回流人才对所在城市产生的主要影响有（ ）
- ①改变人口年龄结构 ②提高政府办事效率
- ③提升城市创新实力 ④优化城市人才结构
- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

榆林市位于鄂尔多斯高原毛乌素沙地南缘。下图为该城市中心城区时空演变图，图中黑色部分为建设用地。完成下面小题。



5. 该城市中心城区扩张的主要制约因素是（ ）
- A. 气候 B. 水资源 C. 矿产资源 D. 交通条件
6. 在水库管理过程中，可运用（ ）
- A. 全球定位系统测量水库蒸发量 B. 遥感分析水库微生物含量
- C. 北斗卫星导航系统获取水库容量 D. 地理信息系统评估水库水质

由于锂等矿产资源紧缺，我国动力电池龙头企业采取与国内外企业合资等方式布局产业链，实现生产自主、可控。下图为动力电池产业链示意图。完成下面小题。




7. 我国动力电池龙头企业产业链布局的主要目的是（ ）

- A. 降低矿产原料运费
- B. 推动产品多样化
- C. 扩大电池生产规模
- D. 保障供应链安全

8. 针对矿产资源供给问题，还可采取的措施有（ ）

- ①加强国内锂矿勘探
 - ②加大关键材料生产
 - ③研发新的替代材料
 - ④鼓励废旧电池进口
- A. ①④ B. ②④ C. ①③ D. ②③

土壤水是土壤的重要组成部分。墒指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度。下图为土壤-植被-大气的水分运移过程模式图。完成下面小题。



9. 与图中排水环节相关度最大的因素为（ ）

- A. 土壤矿物质含量
- B. 土壤质地
- C. 土壤有机质含量
- D. 土壤温度

10. 图中表土蒸发份额为（ ）

- A. 10%-30%
- B. 15%-30%
- C. 15%-40%
- D. 25%-60%

11. 当墒情过低时，可采取的保墒措施是（ ）

- A. 地膜覆盖
- B. 作物密植
- C. 开沟排水
- D. 土地翻耕


12. 其他条件相同情况下，在青藏高原四地观测太阳辐射与海拔高度之间的关系，结果如下表。完成问题。

地点	①	②	③	④
海拔高度（米）	2200	3700	5000	6325
太阳辐射（卡/平方厘米·分）	1.318	1.455	1.632	1.729

导致四地太阳辐射随海拔高度产生差异的主要因素是（ ）

- A. 大气逆辐射
- B. 地面反射与吸收
- C. 地面长波辐射
- D. 大气反射、吸收与散射


坐落于地堑谷地一侧的某山脉是开展地理研学活动的理想场所。某学校组织学生从山脚下的P地（34° 8'20"N，107° 52'53"E）登山开展考察。下图为学生绘制的山地垂直自然带简图。完成下面小题。



13. P地有著名的天然温泉，与其直接相关的是（ ）


- A. 褶皱
- B. 沉积作用
- C. 断层
- D. 火山喷发

14. 学生在考察过程中拍摄的植被景观照片与垂直自然带对应正确的是（ ）



- A. 甲① 乙② 丙③ 丁④
- B. 甲④ 乙① 丙② 丁③
- C. 甲④ 乙③ 丙② 丁①
- D. 甲④ 乙② 丙① 丁③

下图为2021年我国部分省（区、市）不同运输方式货运量及增速状况图（图中水路包括河运和海运）。完成下面小题。




15. 甲、乙、丙、丁对应正确的是 ()

- A. 甲—重庆市 B. 乙—内蒙古 C. 丙—青海省 D. 丁—浙江省

16. 关于省（区、市）货运状况及其主要成因的叙述，正确的是 ()

- A. 广东货运量大，因经济发达 B. 云南货运量小，因地形崎岖
C. 吉林货运量负增长，因产业外迁多 D. 海南货运增量最大，因人口增长快

产城融合是指产业与城市融合发展。下图为某城市新工业园区空间结构规划图，该园区致力于打造创新服务、低碳宜居的产城融合新区。完成下面小题。



17. 宜居生活片区布局的合理性表现在 ()


- ①在园区内位置适宜，通勤便捷 ②位于盛行风下风向，空气清新
③公共绿地面积广阔，环境优美 ④距离商业中心较近，购物便利

- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

18. 先进制造业片区适合发展的产业是（ ）

- A. 纺织服装 B. 有色冶金 C. 生物医药 D. 食品加工


下图为某年10月两日内气旋移动的路径图，图中等压线反映的是某测站附近第一天2时的海平面气压形势。该测站测得第一天7时、15时前后风向发生两次明显变化。完成下面小题。



19. 第一天7时前后，测站的风向由（ ）


- A. 西南变东北 B. 西南变西北
C. 东北变东南 D. 东北变西南

20. 第一天不同时间天气系统依次经过测站次序正确的是（ ）




- A. ① B. ② C. ③ D. ④

下图为长江口简图，图中虚线表示沟槽或隆脊。研究人员测定M、N两点2月和8月的海面水体盐度；在P、Q两地采集海底表层沉积物并测定年代，测得P地距今约1千年，Q地为现代沉积。完成下面小题。



- 试卷第 7 页，共 10 页




- A. ① B. ② C. ③ D. ④

非选择题部分

二、非选择题（本大题共 3 小题，共 50 分）

26. 阅读材料，完成下列问题。

材料一：福建以山地和丘陵为主，平原只占总面积的 10%，主要为河谷平原和河流下游冲积平原，是人口和产业的集中分布区，人地矛盾突出。该省是我国的多雨区，降水集中在春夏两季。该省是海洋大省，其海岸为构造下沉式海岸，岸线曲折，岛屿众多且紧靠大陆分布。福建海域属大陆架浅海，渔场面积广阔。下图为福建省略图。



材料二：福建是我国水果生产大省，主要在山地和丘陵的坡地栽种水果，易引发水土流失，故非常重视水土保持。

- (1) 福建发展风电比水电更具优势。试分析修建水库发展水电的不利条件和发展海上风电的有利条件。
- (2) 甲渔场是福建的重要渔场，分析该渔场的自然优势。
- (3) 说出福建省果树栽种过程中易引发水土流失的原因。

27. 阅读材料，完成下列问题。

材料一：喀麦隆位于非洲中西部，图1为该简图，图中甲、乙两地自然环境迥异。该国金矿主要分布于中部造山带，受断裂带控制。其中丙矿区基岩主要由花岗岩构成，金矿存在于侵入岩脉和接触带中。图2为丙矿区地质剖面示意图。图3为丙矿区金矿形成过程图。




图1




图2



图3

材料二：由我国公司承建的克里比港附近海岸有独特的“瀑布入海”景观，河口水面高于海平面约30米。

(1)图中乙地自然带为_____。从降水特征角度，分析甲地地带性植被的主要特点_____。

(2)写出图3中①、②、③对应的内力作用。

(3)简述克里比特殊的海岸地形对港口建设的有利和不利影响。

28. 阅读材料，完成下列问题。

材料：每年春季，我国大陆仍受逐渐减弱的亚洲高压控制。4—5月，黄海北部海面常出现小型冷气流辐散中心。洞庭湖流域是水稻种植重要地区，有的年份3月就会提前受副高西侧气流影响。早稻田间育秧要求3—5日连续晴朗且气温大于10℃天气，若遇天气不好，会造成烂秧。图1为我国某区域略图。图2为单、双季稻投入产出对比图。图3为单、双季稻生长期差异图。




图 1




图 2




图 3

- (1) 简述造成洞庭湖流域早稻烂秧的天气特征，并指出相应的天气系统。
- (2) 从 1 月到 4 月，图示内陆地区气温升高速度比沿海_____，从海陆位置和天气角度分析两地差异的成因_____。
- (3) 甲地气温年较差较相邻东西两侧大，从地形和季风角度简析其成因。
- (4) 长江中下游地区存在单季稻和双季稻两种种植方式，你认为哪种方式更好？请阐述理由。

1. B 2. A

【解析】1. 冷湖重新兴起后主题是旅游，并不是进行盐类资源的开发，因此不是得益于盐类资源丰富，A 错误；赛什腾山海拔高，大气稀薄，适合天文观测，建立了世界级天文观测基地，自然环境独特，促进了冷湖的重新兴起，B 正确；如今因赛什腾山上世界级天文观测基地的建设而备受瞩目，与文化底蕴无关，C 错误；结合材料信息可知，冷湖曾因石油资源枯竭陷入衰落，重新兴起并不是因为人口大量集聚，D 错误。故选 B。

2. 该地有世界级天文观测基地，天文观测需要暗黑环境，灯光秀亮度较大，不利于天文观测，因此可能被限制发展，A 符合题意；该地有世界级天文观测基地，适合开展自然观光、天文科普研学和天文摄影，BCD 不符题意。故选 A。

【点睛】世界一流的天文观测台址一般要远离灯光，避免电磁干扰、晴夜数量多、视宁度（大气扰动程度）好。青海省北部冷湖镇海拔 4200 多米的赛什腾山区，其天文观测条件可与世界一流天文观测台相媲美。

3. A 4. D

【解析】3. 直辖市或省会城市等级高，拥有更多优质企业、科研机构 and 高校，能为高层次人才提供更好的事业发展平台，A 正确；直辖市或省会城市生活成本通常较高，但人才往往更关注发展机会而非生活成本，B 错误；交通便利是基础条件，但并非吸引高层次人才的核心因素，C 错误；环境质量对人才吸引力有限，且直辖市和省会城市环境未必最优，D 错误。故选 A。

4. 回流人才多为青壮年，但总量有限，对城市整体年龄结构影响较小，难以改变人口年龄结构，①错误；人才回流与政府办事效率无直接关联，②错误；高层次人才可以带来技术、知识等，可以提升城市创新能力，③正确；高层次人才补充了城市高端人才缺口，可以优化了人才结构，④正确。综上所述，D 正确，ABC 错误，故选 D。

【点睛】影响人口迁移的因素：

自然环境因素：气候、水源、土壤、矿产资源、自然灾害等；经济因素（主导）：经济发展水平、交通和通讯的发展等；社会因素：政策、战争、社会变革、宗教信仰、文化教育的发展、家庭和婚姻等。

5. B 6. D

【解析】5. 榆林市位于鄂尔多斯高原毛乌素沙地南缘，水资源并不丰富。读图可知，榆林市的建设用地明显呈现沿榆溪河分布的特征，因此水资源是该城市中心城区扩张的主要制约因素，B 正确；图中信息没有体现气候、矿产资源和交通条件对该城市中心城区扩张的影响，

ACD 错误。故选 B。

6. 全球定位系统和北斗卫星导航系统主要功能是定位、导航，不能用于测量水库蒸发量，也不能用于获取水库容量，AC 错误；遥感主要用于获取地理信息，不能分析水库微生物含量，B 错误；地理信息系统主要用于分析、处理地理信息，可以评估水库水质，D 正确。故选 D。

【点睛】3S 各自功能：

RS：地理信息的获取；GIS：能对地理空间数据进行输入、管理、分析和表达；GNSS：能为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间。

7. D 8. C

【解析】7. 由于锂等矿产资源紧缺，影响锂矿资源的稳定供应，为了保障供应链安全，我国动力电池龙头企业采取与国内外企业合资等方式布局产业链，实现生产自主、可控，D 正确；原料运费主要与运输距离有关，我国动力电池龙头企业产业链布局并不能降低矿产原料运费，A 错误；产品多样化主要与市场需求和生产技术有关，我国动力电池龙头企业产业链布局并不能直接推动产品多样化，B 错误；电池生产规模与市场需求量和下游电池生产制造企业的产能有关，而产业链包含上游、中游、下游的不同环节，我国动力电池龙头企业产业链布局的主要目的不是扩大电池生产规模，C 错误。故选 D。

8. 加强国内锂矿勘探可以增加国内锂矿资源的供应，①正确；加大关键材料生产会加大对锂矿资源的消耗，并不能缓解矿产资源的供给问题，②错误；研发新的替代材料可以减少对矿产资源的消耗，缓解矿产资源供应紧张的局面，③正确；废旧电池回收利用过程中对环境的污染很大，鼓励废旧电池进口会加剧环境污染，④错误。综上所述，C 正确，ABD 错误，故选 C。

【点睛】国家矿产资源保障措施：矿产资源管理法规、矿产勘查开发规划、矿产勘查技术进步、矿产资源节约利用、矿产资源国际合作。

9. B 10. C 11. A

【解析】9. 读图可知，图中排水环节应是下渗后但未被表土蒸发和蒸腾作用消耗的水体，应是通过进一步下渗和地下径流来实现的，而土壤的质地会影响土壤的透水性，进而影响地下水的运动，因此土壤质地是与图中排水环节相关度最大的因素，B 正确；土壤矿物质含量、土壤有机质含量主要影响土壤的肥力，不是与图中排水环节相关度最大的因素，AC 错误；图中水体在地下运移，说明没有冻土分布，因此土壤温度对水体运动的影响较小，D 错误。故选 B。

10. 读图可知, 表土蒸发份额= (30%-65%) + (0%-10%) - (15%-35%) = 15%-40%, C 正确, ABD 错误, 故选 C。

11. 当墒情过低时, 说明种子发芽和作物生长的适度过低, 土壤水分不足。地膜覆盖可以减少土壤水分蒸发, 起到保墒的作用, A 正确; 作物密植会加大土壤水分的需求, 使墒情更低, B 错误; 开沟排水会使土壤水分流失更快, 使墒情更低, C 错误; 土地翻耕并不能增加土壤的水分含量, 反而会使土质更疏松, 土壤水分蒸发更快, 无法起到保墒的作用, D 错误。故选 A。

【点睛】土壤质地是土壤颗粒的组合特征, 按不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例, 一般将土壤分为砂土、壤土和黏土等。

12. D

【详解】大气逆辐射属于长波辐射, 主要影响的是地面保温, 与属于短波辐射的太阳辐射到达地面的强度无直接关系, A 错误; 题目强调“其他条件相同”, 地面反射与吸收差异较小, 且海拔变化主要影响大气而非地面, B 错误; 地面长波辐射是地面向外辐射热量, 与太阳辐射的接收无关, C 错误; 海拔升高会导致大气愈加稀薄, 大气反射、吸收与散射作用减弱, 大气对太阳辐射的削弱作用减弱使更多太阳辐射到达地面, D 正确。故选 D。

13. C 14. D

【解析】13. 该山脉是坐落于地堑谷地, 地堑为两侧岩层相对上升, 中间岩层相对下降的断块构造, 属于断层地貌, 当地下水沿断层或裂隙上升到地表, 进而形成温泉, C 正确; 温泉水来自于地下水, 地下水必须有断层或裂隙成为向上的通道, 而褶皱和沉积作用不会形成断层或岩层裂隙, AB 错误; 当地位于 34°8'20"N, 107°52'53"E, 据所学知识可知该地位于秦岭附近, 秦岭不是火山地貌, 没有火山喷发, D 错误。故选 C。

14. 据上题分析得知该山脉为秦岭山脉, 山脚下的 P 地是在地堑谷地附近, 对应④(谷地)附近, 据图片信息所示②应为落叶阔叶林, ①应为针叶林, ③应为高山灌丛草甸带, 相对而言②落叶阔叶林对应的水热条件优于③针叶林, 而针叶林的水热条件优于高山灌丛草甸, 依据山地垂直地带分异规律, 随海拔高度上升, 水热条件递减, 所以乙对应②, 丙对应①, 丁对应③。综上分析, D 正确, ABC 错误。故选 D。

【点睛】在高山地区, 随着海拔高度的变化, 温度和降水发生变化, 自然带也依次变化。如珠穆朗玛峰南坡从山麓到山顶的自然带变化规律是: 常绿阔叶林带、针阔混交林带、针叶林带、高山草甸草原带、寒荒漠带、积雪冰川带。

15. B 16. A

【解析】15. 重庆市的经济发展水平低于上海市，而上海市是全国交通枢纽，交通比重庆更便利，所以重庆市的货运量不可能比上海高，A 错误；内蒙古矿产资源丰富，有丰富的煤炭和稀土资源，大量供给我国其他地区，其货运量较大。而铁路适宜大宗矿物运输，所以内蒙古铁路货运占比相对其他省份较高，由于内蒙古气候较干旱，河流径流量较小，水路运输不发达，乙省份符合内蒙古，B 正确；青海省经济欠发达，经济发展水平应比新疆低，货运量应小于新疆，另外青海省位于我国大江大河的源头处，水运并不便利，水运占比应很小，C 错误；浙江省经济较发达，且地处沿海地区，货运量应较大，丁地区货运量极小，不符合浙江省经济发展现状，D 错误。故选 B。

16. 广东省经济发达，对外开放程度高，产业活动发达，产品数量和类型都较多，因此货运量大，A 正确；货运量较小的根本原因是因为经济欠发达，若经济发达，即使地形崎岖也会修建现代交通方式以满足交通需求，B 错误；吉林货运量增速在 0.05% 以上，增速为正值，并未负增长，C 错误；我国的人口政策是统一的，在 2021 年全国各地的人口增长速度保持相对稳定，海南省并未出现人口增长快的现象。海南货运增量最大，是因为其货运量基数很低，实际增长量并不大，D 错误。故选 A。

【点睛】一个地区人口数量的变化由人口自然增长和人口迁移共同决定。经济发展水平高的地区往往人口自然增长率低，但就业机会多，吸引大量的青壮年劳动力迁入。

17. D 18. C

【解析】17. 图中宜居生活片区在园区的中心位置附近，相对位置适宜，且宜居生活片区偏南侧有轨道交通线，通勤便捷，①正确；据图中风频玫瑰图可知，当地主要的盛行风为偏东风，而宜居生活片区分布在园区的偏东侧，分布在盛行风的上风向附近，②错误；图中没有公共绿地面积分布地区显示，无法判断公共绿地面积是否广阔，排除③；宜居生活片区靠近商业中心片区，方便购物，人居环境好，④正确。D 正确，ABC 错误。故选 D。

18. 纺织服装和食品加工一般属于传统的劳动密集型产业，有色冶金属于动力指向型工业，而先进制造业一般需要产品科技含量高，产品科研成本投入大，生物医药产品对科技要求极高，研发周期普遍较长，所以先进制造业片区适合发展的产业是生物医药，C 正确，ABD 错误。故选 C。

【点睛】城镇用地包括居住用地、商业用地、工业用地、行政用地、文化用地，交通用地，旅游休闲用地、生态用地等。

19. C 20. C

【解析】19. 第一天 2 时的气压中心 K1 位于测站的西南方向，据图示等压线信息可知 K1

是低压中心，则由测站到 K1 的水平气压梯度力由东北指向西南，结合北半球地转偏向力右偏形成东北风。第一天 7 时的气压中心 K2（低压中心）位于测站的偏西方向，则由测站到 K2 的水平气压梯度力由东指向西，受北半球地转偏向力右偏影响，形成东南风，因此第一天 7 时前后，测站的风向由东北变东南，C 正确，排除 ABD。故选 C。

20. 据所学知识可知，由 K1 的低压中心附近形成的北半球锋面气旋中，偏东侧的锋面应是暖锋，结合北半球气旋的气流方向是逆时针辐合，所以在 K1 时期（第一天 2 时）测站应位于暖锋的锋面之前，受冷气团控制，而②④在 2 时附近受暖气团（位于锋面之上）控制，排除 BD；据图示可知在 K2 时期，测站在暖锋锋面之后的暖气团控制，一直到锋面气旋偏西侧的冷锋过境前一直是受暖气团控制，当此冷锋过境之后，测站将会受冷气团（位于锋面之下）控制，C 正确，A 错误。故选 C。

【点睛】气旋为低气压中心，周围的空气向气旋中心涌入。①天气：在垂直方向上，盛行上升气流，气流上升的过程中，冷凝形成降水；②风向：在水平方向上，气流涌向气旋中心，并发生偏转（北右南左），因此表现出的旋转方向为北逆南顺。

21. C 22. A 23. A

【解析】21. 根据图示信息可知，M 距离长江入海口更近，受径流补给影响更大，对海水盐度的稀释作用更强，海水盐度更低，N 距离入海口较远受陆地径流影响较小，海水盐度较高，同季节 M 海水盐度低于 N，AD 错误；长江夏季径流量大于冬季，夏季对入海口处海水盐度的稀释作用更强，海水盐度更低，B 错误；N 海域距离入海口更远，受陆地径流影响更小，冬夏季盐度差更小，C 正确。故选 C。

22. 根据材料信息可知，P 地沉积物距今约 1 千年，说明该地以侵蚀作用为主，A 正确；Q 地沉积物为现代沉积物，说明以沉积作用为主，B 错误；P 等深线由低值凸向高值，说明为沟槽，C 错误；Q 地等深线由高值凸向低值，说明为隆脊，D 错误。故选 A。

23. 潮流会侵蚀沿岸地区的海底，促进水下沟槽的发育，A 正确；风浪主要在海洋表层，不是海底沟槽形成的主要动力，B 错误；上升流主要在垂直方向上，不是海底沟槽形成的主要动力，C 错误；温度差不是海水运动的主要原因，D 错误。故选 A。

【点睛】影响海水盐度的核心因素主要包括气候因素（降水量与蒸发量的对比关系）、洋流性质、入海径流输入、海域封闭程度以及结冰与融冰作用。其中气候因素通过降水量与蒸发量的动态平衡主导大洋表层盐度分布格局，而近岸海域则更多受入海径流影响。

24. B 25. B

【解析】24. 根据所学知识可知，某地一年中最早日出地方时和最晚日出地方时应该关于地

方时 6 时对称，且 $b=2a$ ，则 $(6-b)=a$ ，可以求出来 a 为 2， b 为 4，即日出地方时最早为 4 时，最晚为 8 时，年内日出地方时差值最大值为 4，B 正确，ACD 错误。故选 B。

25. 过该地的晨线作顺时针方向转动，说明应为北半球夏至日到北半球冬至日之间，K 为北半球夏至日，Q 为北半球冬至日。根据“此时该地日出地方时逐渐提前”，说明该地应该位于南半球。根据上题分析可知，该地年内日出地方时差值最大值为 4，应位于中纬度，正午太阳方位位于正北，日影应朝向正南，A 错误；Q 日太阳直射点位于南半球，全球有日落的点位，日落方位偏南，该地应西南日落，B 符合；Q 日太阳直射点位于南半球，当地日出东南，日出时日影应朝向西北，C 错误；该地位于南半球，观测不到北极星，D 错误。故选 B。

【点睛】日出日落的太阳方位主要由太阳直射点的位置决定，具体表现为：太阳直射北半球时（北半球夏半年），日出东北、日落西北；直射南半球时（北半球冬半年），日出东南、日落西南；直射赤道时（春秋分日），日出正东、日落正西。

26. (1)修建水库发展水电的不利条件：人口和产业分布较多，修建水库淹没耕地和聚落多，移民搬迁成本高；降水集中在春夏两季，降水季节变化大，导致水库发电量不稳定；多山地丘陵，地质条件复杂，修建水库大坝难度大、成本高且存在安全隐患。

发展海上风电的有利条件：福建海岸线长且曲折，海域面积广，为海上风电建设提供充足空间；地处沿海，风力资源丰富；靠近东部经济发达地区，电力消费市场广阔；政府重视能源发展，政策支持海上风电建设。

(2)甲渔场位于大陆架浅海区域，光照充足，利于浮游生物生长，为鱼类提供丰富饵料；地处寒暖流交汇，海水搅动，将海底营养物质带到表层，促进浮游生物繁殖；入海河流带来陆地上丰富的营养盐类，进一步增加了海域的饵料；海岸线曲折，岛屿众多，为鱼类提供栖息、产卵和躲避场所。

(3)福建省多山地丘陵，果树栽种在坡地，地形坡度大，水流速度快，侵蚀能力强；降水集中在春夏两季，且多暴雨，雨水对坡面冲刷力大；栽种果树过程中，破坏了原有植被，植被保持水土能力下降；单一作物种植破坏土壤结构，降低土壤抗侵蚀能力等。

【分析】本大题以福建省为材料设置试题，涉及能源开发条件、渔场的成因、农业发展对区域影响等相关知识点，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐述地理事物的能力，体现综合思维、区域认知学科素养。

【详解】(1) 修建水库发展水电的不利条件从淹没问题、发电稳定性、建设难度等方面分析。淹没问题：材料一表明福建平原少且河谷平原是人口产业集中区，修建水库必然淹没大量耕地和聚落，移民搬迁成本较高。发电稳定性：福建降水季节集中，水库蓄水受降水影响

大，导致发电不稳定，难以持续稳定供电。建设难度：山地丘陵地形使地质条件复杂，建设水库大坝需要处理复杂地质问题，增加建设成本和施工难度，还存在滑坡、泥石流等威胁大坝安全的隐患。

发展海上风电的有利条件从空间条件、风力资源、市场需求、政策等方面分析。空间条件：福建漫长曲折的海岸线和广阔海域，提供了充足的海上风电建设空间，可大规模安装风力发电机组。风力资源：地处沿海，风力强劲，风能资源丰富，能为风电提供稳定动力来源。市场需求：东部经济发达地区对电力需求大，福建靠近这些地区，海上风电电力输送距离近，市场广阔。政策支持：在国家大力发展清洁能源的背景下，福建政府积极推动海上风电发展，在规划、审批等方面给予政策支持。

（2）甲渔场的自然优势从饵料、洋流、栖息环境等方面分析。饵料充足：位于大陆架浅海光照能到达海底，利于浮游植物光合作用，大量浮游生物生长为鱼类提供基础饵料；入海河流携带陆地上土壤中的营养盐类，增加海域营养成分，为鱼类提供丰富食物。洋流作用：寒暖流交汇（日本暖流和沿岸寒流）使海水扰动明显，将海底营养盐类带到表层，促进浮游生物繁殖，吸引鱼类聚集。栖息环境：曲折海岸线和众多岛屿形成多样海域环境，为鱼类提供栖息、产卵和躲避敌害的场所，利于鱼类生存繁衍。

（3）福建果树种植区的水土流失是自然与人为因素共同作用的结果。自然条件（如陡坡、暴雨）为水土流失提供了潜在动力，而人类活动（如毁林开垦、管理粗放）则直接触发并加剧了这一过程。自然条件：山地丘陵地形坡度大，水流速度快，对坡面土壤冲刷力强，容易带走表层土壤；集中的暴雨，短时间内大量雨水冲击坡面，加剧土壤侵蚀。人为因素：栽种果树过程中，原有植被被破坏，植被根系对土壤的固着作用减弱，地表失去植被保护，水土保持能力下降，土壤易被侵蚀；过度翻耕、单一作物种植导致土壤结构破坏，抗侵蚀能力降低；过量施肥或不当灌溉可能加速土壤酸化或板结，进一步削弱土壤稳定性。

27. (1) 热带雨林带 甲地年降水量较少，降水季节分配不均，湿季多雨，干季少雨，故植被乙草类为主，湿季草类茂盛；干季草类枯黄。

(2)①地壳运动、②岩浆活动、③变质作用。

(3)有利影响：瀑布入海水流较急，不利于泥沙堆积，水深，利于大型船舶靠岸；海岸线曲折，避风条件好，利于船舶安全停泊。

不利影响：“瀑布入海”形成较大落差，船舶进出港口时，需要克服水流的冲击力，增加航行难度和风险；河口与海洋之间存在水位差，建设连接河口与海洋的航道成本高，且维护难度大。

【分析】本大题以喀麦隆为材料设置试题，涉及陆地自然带、植被特征、内力作用表现、港口的区位因素等相关知识点，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐述地理事物的能力，体现综合思维、区域认知学科素养。

【详解】（1）乙地自然带判断：喀麦隆地处非洲中西部，乙地位于几内亚湾沿岸的热带地区纬度低且降水丰富，图中显示年降水量 4000mm 左右，为热带雨林气候分布区，对应自然带为热带雨林带。

读图可知，甲地位于 8°N-12°N 之间，图中显示年降水量在 500-1000mm 之间，属于热带草原气候，总降水量难以满足森林的生长，植被以草类为主。由于降水季节分配不均，湿季多雨，水分条件较好，草类茂盛。干季少雨，水分条件较差，草木枯黄。

（2）内力作用是由地球内部能量（如放射性元素衰变）引发的地质作用。读图可知，①是构造运动形成山地，对应地壳运动；②形成了花岗岩，为岩浆侵入冷凝形成，对应岩浆活动；③热液侵入形成石英岩脉、金矿，对应变质作用。

（3）有利影响：河口水面高于海平面，形成天然落差，入海口水流较急，不利于泥沙堆积，水较深，利于大型船舶停靠；读图可知，该地海岸线较为曲折，形成天然的港湾，受海风和海浪影响小，避风条件好，利于船舶安全停泊。

不利影响：“瀑布入海”形成较大落差，水流湍急、冲击力强，船舶进出港口需克服水流阻力，可能导致航线偏离或动力损耗，增加航行难度；河口与海洋之间的水位差需通过人工疏浚或修建船闸等设施平衡，建设成本高昂；且水流携带泥沙易淤积航道，需定期维护，增加运营负担。

28. (1)阴雨天气，气温较低（低于 10℃）；冷锋

(2) 快 内陆地区距海较远、升温快，沿海地区升温慢；内陆地区降水较少、晴天多，沿海地区多阴雨、云雾天气。

(3)甲地地处山谷中，地势低洼、地形封闭；夏季风（东南风）下沉进入谷地，增温明显；冬季风深入谷地，且不易扩散，降温明显。

(4)观点一：种植双季稻。理由：年产量更高；充分利用光热、水、土地等自然资源；经济效益显著。

观点二：种植单季稻。理由：生长周期较长，水稻品质较高；避免自然灾害带来的早春烂秧等影响；一年中部分时间休耕，保持土地生产力；减少化肥等投入，降低生产成本。

【分析】本题以洞庭湖流域水稻种植为材料展开设问，设置 3 个小问，涉及天气系统、海陆热力性质差异、农业区位分析、影响气温年较差的因素等地理原理，考查学生获取和解读地

理信息、描述和阐释地理事物的能力和综合思维、区域认知等地理学科核心素养，体现基础性、综合性与应用性考查。

【详解】（1）结合材料可知，早稻田间育秧要求 3-5 日连续晴朗且气温大于 10℃天气，如果出现烂秧现象，意味着当地可能出现阴雨天气或气温小于 10℃的天气。黄海北部海面常出现小型冷气流辐散中心，辐散气流向西南方向运动至鄱阳湖地区，形成冷气团；3 月提前受副高西侧气流影响，为洞庭湖流域带来从南向北的辐散气流，形成暖气团。冷暖气团在洞庭湖流域相遇，形成冷锋，带来降温、阴雨天气，导致早稻出现烂秧现象。

（2）结合材料及所学知识，1 月到 4 月，太阳直射点向北移动，图示区域气温回升。受海陆热力性质差异和天气的影响，内陆地区距离海洋较远、水汽较少，多晴朗天气，气温升高速度较快；沿海地区受海洋调节作用更加显著，水汽充足、多阴雨天气，气温升高速度较慢。

（3）甲地气温年较差较相邻东西两侧大，意味着甲地夏季气温更高、冬季气温更低。结合材料及所学知识，甲地位于洞庭湖南侧河谷中，地势较低且地形封闭，气流一旦进入甲地便不易扩散。夏季，洞庭湖流域受东南季风的影响，甲地河谷大致呈南北走向、与季风走向垂直，季风沿着谷地东侧山坡下沉进入山谷，增温效果明显；受封闭地形影响，加剧增温幅度。冬季，洞庭湖流域受偏北的冬季风影响，冬季风沿着河谷深入甲地，带来降温作用；受封闭地形影响，冷气流不易扩散，导致温度更低。在地形和季风的共同作用下，甲地气温年较差更大。

（4）本题属于开放性试题，任选观点，言之有理即可。

观点一：种植双季稻。结合图示信息可知，若种植双季稻，生产周期从 3 月持续至 10 月，可以更加充分利用当地的光热、水土等自然资源，提高资源的利用率。双季稻一年可以收获两次，可以获得更高的水稻产量，保证粮食供应。根据图 2 可知，种植双季稻尽管投入增加，但净收益更高（投入产出比更高）。

观点二：种植单季稻。与双季稻相比，种植单季稻生产周期明显缩短，土地休养生息的时间更长，可以更好的维持土地生产力，提升生态效益。单季稻的生产周期长于双季稻中每一茬水稻的生长周期，有机质积累的时间更长，水稻的品质更高。与双季稻相比，种植单季稻需要投入的农药、化肥等更少，节约生产成本。另外，单季稻的生产从 4-5 月持续到 9-10 月，有效避免早春寒冷天气带来的早稻烂秧等不利影响，生产风险更小。