

2013 年普通高等学校招生全国统一考试地理（海南卷）

第 I 卷（选择题）

本卷共 20 小题，每小题 3 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

图 1 为某半岛地形图。读图 1，完成 1-3 题。




图1

1. 该半岛火山活动频繁，是因为受到（ ）
 - A. 太平洋板块张裂的影响
 - B. 印度洋板块张裂的影响
 - C. 印度洋板块挤压的影响
 - D. 太平洋板块挤压的影响
2. 当地居民稳定的用电来源于（ ）
 - A. 地热能
 - B. 风能
 - C. 水能
 - D. 太阳能
3. 7 月份该半岛可能出现（ ）
 - A. 冰川与岩浆相映
 - B. 极昼
 - C. 成群的企鹅
 - D. 台风

花椒，落叶灌木或小乔木，多刺，喜光，耐寒，耐旱，果实需人工采摘，可用作调料、药材。武都（位置见图

- 2）素有“千年椒乡”之称，古书有“蜀椒出武都”的记载。据此完成 4-5 题。




图2

4. 与四川盆地相比，武都生产花椒的气候条件优越的主要原因有（ ）

- ①纬度较高 ②海拔较高 ③位于夏季风迎风坡 ④年温差较小

- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

5. 目前，武都花椒生产成本不断攀升的主要原因是（ ）

- A. 交通不便 B. 人力成本上升 C. 土质退化 D. 种植面积扩大

巴西东南部 S 州甘蔗种植面积居全国第一，其甘蔗主要用来生产燃料乙醇。该州集中了全国一半以上的燃料乙醇厂。随着国内外对燃料乙醇需求的增加，该州和巴西中南部地区更多的土地被开发为甘蔗田。据此完成 6-7 题。

6. 燃料乙醇厂相对集中在 S 州的主要原因是（ ）

- A. 接近原料地 B. 接近消费市场 C. 利用廉价劳动力 D. 方便产品运输

7. 燃料乙醇的大量使用会导致巴西（ ）

- ①碳排放量增加 ②能源消费结构改变 ③热带草原面积减少 ④蔗糖消费量下降

- A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ③④

我国天然白桦林主要分布在东北地区。北京喇叭沟门口有一片天然白桦林。图 3 示意喇叭沟门在北京的位置。据此完成 8-10 题。



图 3

8. 北京的地带性植被属于 ()
- A. 常绿阔叶林 B. 针阔叶混交林 C. 落叶阔叶林 D. 针叶林
9. 喇叭沟门有天然白桦林分布的主导因素是 ()
- A. 纬度位置 B. 海陆位置 C. 大气环流 D. 地形
10. 北京香山红叶最佳观赏期一般在 10 月下旬至 11 月初, 那么, 赴喇叭沟门观赏白桦林金黄色树叶美景宜选在 ()
- A. 9 月中旬 B. 10 月上旬 C. 10 月下旬 D. 11 月中旬

我国许多聚落名称体现了所处自然环境的特点。黄土高原地区有些聚落名为“XX 川”。《现代汉语词典》解释：川地是山间或河流两边的平坦低洼的土地。据此完成 11-12 题。

11. 为趋利辟害, 这些以“川”为名的聚落选址宜 ()
- A. 紧邻河岸以方便取水 B. 接近坡地中部以方便耕作
- C. 靠近坡地上部以防洪水 D. 远离陡坡以避崩塌、滑坡
12. 在农业社会, 决定这些聚落发展规模的主导条件是 ()
- A. 河流水量 B. 土壤肥力 C. 川地面积 D. 林木蓄积量

地处于干旱区的宁夏银川市, 其周边地区曾广布湖泊, 明清时有“七十二连湖”的说法。20 世纪 80 年代银川周边湖泊所剩无几。1999 年开始, 银川实施恢复湿地的计划。图 4 示意银川周围目前的湖泊分布。据此完成 13-14 题。




图 4

13. 20 世纪 80 年代银川周边湖泊所剩无几的主要原因是 ()
- A. 泥沙淤积 B. 气候变暖 C. 排水造田 D. 黄河来水量减少
14. 疏浚、恢复湖泊湿地, 对银川环境的直接影响是 ()
- ①增强城市排污能力 ②增加城市空气湿度 ③美化城市环境 ④增大城市气温年较差
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

某海洋考察船的航行日志记录: 北京时间 8 时太阳从正东方海面升起; 桅杆的影子在正南方时, 太阳高度为 60° ; 日落时北京时间为 19 时 45 分。据此完成 15-17 题。

15. 日志记录当天, 该船航行在 ()
- A. 北太平洋 B. 南太平洋 C. 北印度洋 D. 南印度洋
16. 日志记录当天, 该船的航向可能是 ()
- A. 正北 B. 东北 C. 正南 D. 西南
17. 日志记录当天考察船经过的海域, 当月的天气状况多为 ()
- A. 阴雨绵绵、风微浪缓 B. 晴朗少云、风急浪高
- C. 晴朗少云、风微浪缓 D. 雷雨频发、风急浪高

图 5 示意我国 39°N 附近某区域。读图 5, 完成 18-20 题。




图5

18. 图示区域土壤盐渍化最严重的地区是 ()
- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
19. 限制丙地区农业生产的主要因素是 ()
- A. 光照 B. 水分 C. 坡度 D. 温度
20. 如果乙地区大规模引水灌溉进行农业开发, 将会导致 ()
- A. 甲地区植被退化 B. 乙地区沙化
- C. 丙地区荒漠化 D. 丁地区植被改善

第II卷

本卷包括必考题和选考题两部分。第21题-第23题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第24题-第26题为选考题, 考生根据要求作答。

21. 阅读图文资料, 完成下列要求。(10分)

西藏年楚河河谷(图6)所产油菜籽粒大、品质优, 单位面积产量比我国东部平原高一倍。





图6

分析年楚河河谷油菜籽单产高、品质优的自然条件。

22. 阅读图文材料, 完成下列要求。(10分)

河流在弯曲段存在“凹岸侵蚀，凸岸堆积”的现象。


法国罗纳河上的圣贝内泽桥始建于 1177 年，13 世纪和 15 世纪曾大修和重建，1668 年被废弃。1669 年的大洪水冲毁了河流右岸的桥墩，后来左岸的残桥（图 7 左侧图中粗实线）成为旅游景点——圣贝内泽断桥（图 7 右照片）。



通过比较断桥处河流左右岸附近河水的深浅及流速差异，说明该断桥能保存至今的原因。

23. 阅读图文材料，完成下列要求。（10 分）

甲地某传统美食历史悠久，闻名遐迩。自从沿线高速公路建成后，以经营该传统美食为主的餐饮业在甲地逐渐衰落，而在乙地日趋兴盛。图 8 示意区域中心城市 M 至甲地的交通线。



分析高速公路建成后，经营该传统美食的餐饮业在甲地和乙地此衰彼盛的原因。

24. (10 分) 【旅游地理】图 9 示意著名旅游目的地。




图 9

分析该地游客数量最多，季节构成较均衡的原因。

25. (10 分) 【自然灾害与防治】洪泽湖是我国五大淡水湖之一，其湖底比东侧大堤外的平原高出数米，被称为“悬湖”。历史上，洪泽湖上游的淮河流域多次发生严重的洪涝灾害。图 10 示意洪泽湖及其相关水系的分布。





图 10

分析洪泽湖成为“悬湖”的原因及其与上游流域洪涝灾害的关系。

26. (10 分) 【环境保护】我国干旱区某区域近 30 多年胡杨大量死亡，沙化面积扩大，生态环境恶化的趋势有所加强。图 11 显示该区域地区生产总值及地下水埋深的变化。



分析该区域生态环境恶化的原因，并提出此类地区遏制生态环境恶化的主要措施。