

# Отчёт по протоколу

Набор данных: Первичка для анализа работа.xlsx

Протокол: Первичка — полный отчёт по всем показателям (comparisons vs arm)

ID набора: 606be8ec-47ef-4828-9151-d78c45eef41b

## Шаг: cmp\_\_age

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.7595


Статистика: 228.500

Эффект: rbc -0.06

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in age between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups (p = 0.760, r = -0.06 indicates a trivial effect).

Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_sex

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Тип:


Метод: Chi-Square Test of Independence

p-value: 0.7540

Статистика: 0.098

График: на следующей странице

Вывод: A Chi-Square test of independence was performed to examine the relation between sex and arm. The relation between these variables was not significant ( $p = 0.754$ ). sex appears to be independent of arm.



## Шаг: cmp\_\_сад\_v1

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V1

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.4010

Статистика: 0.848

Эффект: cohen-d 0.26

ДИ эффекта: [-6.02, 14.74]


Мощность: 0.13

BF10: 0.398

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in САД V1 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.401$ , Cohen's  $d = 0.26$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_дад\_v1

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V1

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.3440

Статистика: 0.957

Эффект: cohen-d 0.29

ДИ эффекта: [-3.18, 8.90]


Мощность: 0.15

BF10: 0.43

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in ДАД V1 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.344$ , Cohen's  $d = 0.29$  indicates a small effect).

# Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_сад\_v2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.9531


Статистика: 245.000

Эффект: rbc 0.01

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in САД V2 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.953$ ,  $r = 0.01$  indicates a trivial effect).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_дад\_v2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.1694


Статистика: 300.500

Эффект: rbc 0.24

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in ДАД V2 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.169$ ,  $r = 0.24$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_2\_повседневная\_активность\_баллы\_v2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.1539

Статистика: 1.452

Эффект: cohen-d 0.44

ДИ эффекта: [-0.55, 3.37]


Мощность: 0.29

BF10: 0.69

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in УШОБП часть 2 «Повседневная активность» баллы V2 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.154$ , Cohen's  $d = 0.44$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_3\_двигательные\_функции\_баллы\_v2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.9532

Статистика: -0.059

Эффект: cohen-d 0.02

ДИ эффекта: [-3.22, 3.04]


Мощность: 0.05

BF10: 0.298

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in УШОБП часть 3 «Двигательные функции» баллы V2 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.953$ , Cohen's  $d = 0.02$  indicates a trivial effect).

Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_шкала\_депрессии\_тревоги\_и\_стресса\_dass\_21\_баллы\_v2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.0074

Статистика: -2.814

Эффект: cohen-d 0.85

ДИ эффекта: [-8.59, -1.41]


Мощность: 0.78

BF10: 6.2

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Шкала депрессии тревоги и стресса DASS-21 баллы V2 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.007$ , Cohen's  $d = 0.85$  indicates a large effect). Specifically, the Шкала депрессии тревоги и стресса DASS-21 баллы V2 in the active group ( $M = 30.73$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 35.73$ ).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_устомяемости\_при\_бп\_баллы\_v2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.2187

Статистика: -1.249

Эффект: cohen-d 0.38

ДИ эффекта: [-13.44, 3.16]


Мощность: 0.23

BF10: 0.555

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки устомяемости при БП баллы V2 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.219$ , Cohen's  $d = 0.38$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_сонливости\_эпуорта\_баллы\_v2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.8316


Статистика: 232.500

Эффект: rbc -0.04

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки сонливости Эпуорта баллы V2 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.832$ ,  $r = -0.04$  indicates a trivial effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_апатии\_старкстейна\_баллы\_v2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.1226

Статистика: 1.576

Эффект: cohen-d 0.48

ДИ эффекта: [-0.59, 4.77]


Мощность: 0.34

BF10: 0.799

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Шкала апатии Старкстейна баллы V2 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.123$ , Cohen's  $d = 0.48$  indicates a small effect).

Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_тест\_струпа\_v2\_1

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.4626


Статистика: 237.500

Эффект: rbc 0.14

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Тест Струпа V2 1 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.463$ ,  $r = 0.14$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_тест\_струпа\_v2\_2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0512


Статистика: 284.000

Эффект: rbc 0.36

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Тест Струпа V2 2 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.051$ ,  $r = 0.36$  indicates a medium effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_тест\_струпа\_v2\_3

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.2702

Статистика: 1.118

Эффект: cohen-d 0.35

ДИ эффекта: [-1.73, 5.99]


Мощность: 0.19

BF10: 0.503

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Тест Струпа V2 3 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.270$ , Cohen's  $d = 0.35$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_индекс\_интерференции\_v2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0330


Статистика: 127.000

Эффект: rbc -0.39

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Индекс интерференции V2 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.033$ ,  $r = -0.39$  indicates a medium effect). Specifically, the Индекс интерференции V2 in the active group ( $M = 0.65$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 0.79$ ).

# Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_тест\_прокладывания\_пути\_trail\_making\_test\_мин\_v2\_a

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.7871


Статистика: 254.000

Эффект: rbc 0.05

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V2 A between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.787$ ,  $r = 0.05$  indicates a trivial effect).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_тест\_прокладывания\_пути\_trail\_making\_test\_мин\_v2\_б

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.5416


Статистика: 268.500

Эффект: rbc 0.11

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V2 Б between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.542$ ,  $r = 0.11$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: `str__шкала_оценки_качества_жизни_при_бп_баллы_v2`

Задача: Сравнение групп (`compare_groups`)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.8776

Статистика: -0.155

Эффект: cohen-d 0.05

ДИ эффекта: [-9.61, 8.24]


Мощность: 0.05

BF10: 0.3

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки качества жизни при БП баллы V2 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.878$ , Cohen's  $d = 0.05$  indicates a trivial effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_2\_повседневная\_активность\_баллы\_v3

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.5366

Статистика: 0.624

Эффект: cohen-d 0.19

ДИ эффекта: [-1.33, 2.51]


Мощность: 0.09

BF10: 0.348

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in УШОБП часть 2 «Повседневная активность» баллы V3 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.537$ , Cohen's  $d = 0.19$  indicates a trivial effect).

Сравнение групп





## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_3\_двигательные\_функции\_баллы\_v3

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.4230

Статистика: -0.813

Эффект: cohen-d 0.25

ДИ эффекта: [-4.31, 1.86]


Мощность: 0.12

BF10: 0.388

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in УШОБП часть 3 «Двигательные функции» баллы V3 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.423$ , Cohen's  $d = 0.25$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: `cmp__шкала_депрессии_тревоги_и_стресса_dass_21_баллы_v3`

Задача: Сравнение групп (`compare_groups`)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.0025

Статистика: -3.221

Эффект: cohen-d 0.97

ДИ эффекта: [-10.72, -2.46]


Мощность: 0.88

BF10: 14.892

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Шкала депрессии тревоги и стресса DASS-21 баллы V3 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.002$ , Cohen's  $d = 0.97$  indicates a large effect). Specifically, the Шкала депрессии тревоги и стресса DASS-21 баллы V3 in the active group ( $M = 27.95$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 34.55$ ).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_утомляемости\_при\_бп\_баллы\_v3

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.3067


Статистика: 198.000

Эффект: rbc -0.18

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки утомляемости при БП баллы V3 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.307$ ,  $r = -0.18$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_сонливости\_эпуорта\_баллы\_v3

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.9246


Статистика: 246.500

Эффект: rbc 0.02

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки сонливости Эпуорта баллы V3 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.925$ ,  $r = 0.02$  indicates a trivial effect).

# Сравнение групп





## Шаг: стр\_\_шкала\_апатии\_старкстейна\_баллы\_v3

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.3294

Статистика: -0.987

Эффект: cohen-d 0.30

ДИ эффекта: [-3.32, 1.14]


Мощность: 0.16

BF10: 0.44

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Шкала апатии Старкстейна баллы V3 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.329$ , Cohen's  $d = 0.30$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_струп\_v3\_1

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.9964

Статистика: -0.005

Эффект: cohen-d 0.00

ДИ эффекта: [-1.91, 1.90]


Мощность: 0.05

BF10: 0.3

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Струп V3 1 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.996$ , Cohen's  $d = 0.00$  indicates a trivial effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_струп\_v3\_2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0068


Статистика: 342.500

Эффект: rbc 0.48

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Струп V3 2 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.007$ ,  $r = 0.48$  indicates a medium effect). Specifically, the Струп V3 2 in the active group ( $M = 30.45$ ) was significantly higher than in the placebo group ( $M = 24.38$ ).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_струп\_v3\_3

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0116


Статистика: 349.500

Эффект: rbc 0.44

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Струп V3 3 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.012$ ,  $r = 0.44$  indicates a medium effect). Specifically, the Струп V3 3 in the active group ( $M = 20.32$ ) was significantly higher than in the placebo group ( $M = 18.05$ ).

## Сравнение групп





## Шаг: стр\_индекс\_интерференции\_v4

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V4

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.2096

Статистика: -1.275

Эффект: cohen-d 0.39

ДИ эффекта: [-0.14, 0.03]


Мощность: 0.24

BF10: 0.574

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Индекс интерференции V4 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.210$ , Cohen's  $d = 0.39$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_тест\_прокладывания\_пути\_trail\_making\_test\_мин\_v3\_a

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.2901


Статистика: 196.500

Эффект: rbc -0.19

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V3 A between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.290$ ,  $r = -0.19$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_тест\_прокладывания\_пути\_trail\_making\_test\_мин\_v3\_б

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.1624


Статистика: 302.000

Эффект: rbc 0.25

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V3 Б between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.162$ ,  $r = 0.25$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_качества\_жизни\_при\_бп\_баллы\_v3

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.1144

Статистика: -1.621

Эффект: cohen-d 0.49

ДИ эффекта: [-14.24, 1.61]


Мощность: 0.35

BF10: 0.845

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки качества жизни при БП баллы V3 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.114$ , Cohen's  $d = 0.49$  indicates a small effect).

# Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_сад\_v4

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V4

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.8353

Статистика: -0.209

Эффект: cohen-d 0.06

ДИ эффекта: [-7.26, 5.89]


Мощность: 0.05

BF10: 0.303

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in САД V4 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.835$ , Cohen's  $d = 0.06$  indicates a trivial effect).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_дад\_v4

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V4

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.1909


Статистика: 298.000

Эффект: rbc 0.23

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in ДАД V4 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.191$ ,  $r = 0.23$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_2\_повседневная\_активность\_баллы\_v4

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V4

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.7560

Статистика: 0.313

Эффект: cohen-d 0.09

ДИ эффекта: [-1.50, 2.04]


Мощность: 0.06

BF10: 0.31

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in УШОБП часть 2 «Повседневная активность» баллы V4 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.756$ , Cohen's  $d = 0.09$  indicates a trivial effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_3\_двигательные\_функции\_баллы\_v4

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V4

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.1690

Статистика: -1.414

Эффект: cohen-d 0.43

ДИ эффекта: [-4.90, 0.90]


Мощность: 0.28

BF10: 0.661

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in УШОБП часть 3 «Двигательные функции» баллы V4 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.169$ , Cohen's  $d = 0.43$  indicates a small effect).

Сравнение групп





## Шаг: `cmp__шкала_депрессии_тревоги_и_стресса_dass_21_баллы_v4`

Задача: Сравнение групп (`compare_groups`)

Точка: V4

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: < 0.001

Статистика: -3.876

Эффект: cohen-d 1.17

ДИ эффекта: [-12.05, -3.76]


Мощность: 0.97

BF10: 72.108

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in Шкала депрессии тревоги и стресса DASS-21 баллы V4 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p < 0.001$ , Cohen's  $d = 1.17$  indicates a large effect). Specifically, the Шкала депрессии тревоги и стресса DASS-21 баллы V4 in the active group ( $M = 25.95$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 33.86$ ).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_утомляемости\_при\_бп\_баллы\_v4

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V4

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.2386

Статистика: -1.199

Эффект: cohen-d 0.36

ДИ эффекта: [-11.51, 2.96]


Мощность: 0.22

BF10: 0.53

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки утомляемости при БП баллы V4 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.239$ , Cohen's  $d = 0.36$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_сонливости\_эпуорта\_баллы\_v4

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V4

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.5223


Статистика: 214.500

Эффект: rbc -0.11

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки сонливости Эпуорта баллы V4 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.522$ ,  $r = -0.11$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: `ср_шкала_апатии_старкстейна_баллы_v4`

Задача: Сравнение групп (`compare_groups`)

Точка: V4

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.2322


Статистика: 191.000

Эффект: rbc -0.21

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала апатии Старкстейна баллы V4 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.232$ ,  $r = -0.21$  indicates a small effect).

# Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_тест\_прокладывания\_пути\_trail\_making\_test\_мин\_v4\_a

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V4

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0325


Статистика: 150.500

Эффект: rbc -0.38

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V4 A between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.032$ ,  $r = -0.38$  indicates a medium effect). Specifically, the «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V4 A in the active group ( $M = 37.91$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 49.45$ ).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_тест\_прокладывания\_пути\_trail\_making\_test\_мин\_v4\_б

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V4

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.8880


Статистика: 235.500

Эффект: rbc -0.03

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V4 Б between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.888$ ,  $r = -0.03$  indicates a trivial effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_качества\_жизни\_при\_бп\_баллы

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.1395

Статистика: -1.516

Эффект: cohen-d 0.46

ДИ эффекта: [-13.00, 1.91]


Мощность: 0.32

BF10: 0.744

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки качества жизни при БП баллы between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.140$ , Cohen's  $d = 0.46$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_2\_повседневная\_активность\_баллы\_v5

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.7882

Статистика: -0.271

Эффект: cohen-d 0.08

ДИ эффекта: [-1.94, 1.49]


Мощность: 0.06

BF10: 0.306

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in УШОБП часть 2 «Повседневная активность» баллы V5 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.788$ , Cohen's  $d = 0.08$  indicates a trivial effect).

Сравнение групп





## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_3\_двигательные\_функции\_баллы\_v5

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.0296

Статистика: -2.309

Эффект: cohen-d 0.70

ДИ эффекта: [-6.11, -0.35]


Мощность: 0.62

BF10: 2.386

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in УШОБП часть 3 «Двигательные функции» баллы V5 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.030$ , Cohen's  $d = 0.70$  indicates a medium effect). Specifically, the УШОБП часть 3 «Двигательные функции» баллы V5 in the active group ( $M = 8.45$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 11.68$ ).

Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_шкала\_депрессии\_тревоги\_и\_стресса\_dass\_21\_баллы\_v5

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: < 0.001


Статистика: 81.500

Эффект: rbc -0.66

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала депрессии тревоги и стресса DASS-21 баллы V5 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p < 0.001$ ,  $r = -0.66$  indicates a large effect). Specifically, the Шкала депрессии тревоги и стресса DASS-21 баллы V5 in the active group ( $M = 24.50$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 33.32$ ).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_утомляемости\_при\_бп\_баллы\_v5

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.2002


Статистика: 187.000

Эффект: rbc -0.23

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки утомляемости при БП баллы V5 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.200$ ,  $r = -0.23$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_сонливости\_эпуорта\_баллы\_v5

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.4322


Статистика: 208.500

Эффект: rbc -0.14

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки сонливости Эпуорта баллы V5 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.432$ ,  $r = -0.14$  indicates a small effect).

Сравнение групп





## Шаг: стр\_\_шкала\_апатии\_старкстейна\_баллы\_v5

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0949


Статистика: 171.000

Эффект: rbc -0.29

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала апатии Старкстейна баллы V5 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.095$ ,  $r = -0.29$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_струп\_v5\_1

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.0044

Статистика: -3.008

Эффект: cohen-d 0.91

ДИ эффекта: [-2.96, -0.58]


Мощность: 0.84

BF10: 9.322

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Струп V5 1 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.004$ , Cohen's  $d = 0.91$  indicates a large effect). Specifically, the Струп V5 1 in the active group ( $M = 14.14$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 15.91$ ).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_струп\_v5\_2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.0205

Статистика: 2.408

Эффект: cohen-d 0.73

ДИ эффекта: [0.38, 4.26]


Мощность: 0.65

BF10: 2.842

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Струп V5 2 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.020$ , Cohen's  $d = 0.73$  indicates a medium effect). Specifically, the Струп V5 2 in the active group ( $M = 23.95$ ) was significantly higher than in the placebo group ( $M = 21.64$ ).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_струп\_v5\_3

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.2717

Статистика: 1.114

Эффект: cohen-d 0.34

ДИ эффекта: [-0.63, 2.17]


Мощность: 0.19

BF10: 0.489

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Струп V5 3 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.272$ , Cohen's  $d = 0.34$  indicates a small effect).

Сравнение групп





## Шаг: стр\_\_индекс\_интерференции\_v5

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.1934

Статистика: -1.322

Эффект: cohen-d 0.40

ДИ эффекта: [-0.14, 0.03]


Мощность: 0.25

BF10: 0.598

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Индекс интерференции V5 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.193$ , Cohen's  $d = 0.40$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_тест\_прокладывания\_пути\_trail\_making\_test\_мин\_v5\_a

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0021


Статистика: 110.500

Эффект: rbc -0.54

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V5 A between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.002$ ,  $r = -0.54$  indicates a large effect). Specifically, the «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V5 A in the active group ( $M = 36.18$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 49.50$ ).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_тест\_прокладывания\_пути\_trail\_making\_test\_мин\_v5\_б

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.7512


Статистика: 228.000

Эффект: rbc -0.06

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V5 Б between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.751$ ,  $r = -0.06$  indicates a trivial effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_качества\_жизни\_при\_бп\_баллы\_v5

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.0300

Статистика: -2.277

Эффект: cohen-d 0.69

ДИ эффекта: [-14.66, -0.80]


Мощность: 0.60

BF10: 2.256

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки качества жизни при БП баллы V5 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.030$ , Cohen's  $d = 0.69$  indicates a medium effect). Specifically, the Шкала оценки качества жизни при БП баллы V5 in the active group ( $M = 52.64$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 60.36$ ).

Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_сад\_v6

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.6646

Статистика: -0.437

Эффект: cohen-d 0.13

ДИ эффекта: [-7.41, 4.77]


Мощность: 0.07

BF10: 0.321

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in САД V6 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.665$ , Cohen's  $d = 0.13$  indicates a trivial effect).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_дад\_v6

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.0065

Статистика: 2.862

Эффект: cohen-d 0.86

ДИ эффекта: [1.93, 11.16]


Мощность: 0.80

BF10: 6.843

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in ДАД V6 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.007$ , Cohen's  $d = 0.86$  indicates a large effect). Specifically, the ДАД V6 in the active group ( $M = 84.27$ ) was significantly higher than in the placebo group ( $M = 77.73$ ).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_2\_повседневная\_активность\_баллы\_v6

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.7010

Статистика: -0.388

Эффект: cohen-d 0.12

ДИ эффекта: [-2.00, 1.36]


Мощность: 0.07

BF10: 0.316

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in УШОБП часть 2 «Повседневная активность» баллы V6 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.701$ , Cohen's  $d = 0.12$  indicates a trivial effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_3\_двигательные\_функции\_баллы\_v6

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0605


Статистика: 162.000

Эффект: rbc -0.33

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in УШОБП часть 3 «Двигательные функции» баллы V6 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.061$ ,  $r = -0.33$  indicates a medium effect).

Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_шкала\_депрессии\_тревоги\_и\_стресса\_dass\_21баллы\_v6

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: < 0.001


Статистика: 66.500

Эффект: rbc -0.73

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала депрессии, тревоги и стресса DASS-21баллы V6 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p < 0.001$ ,  $r = -0.73$  indicates a large effect). Specifically, the Шкала депрессии, тревоги и стресса DASS-21баллы V6 in the active group ( $M = 24.00$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 32.73$ ).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_утомляемости\_при\_бп\_баллы\_v6

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.1922


Статистика: 186.000

Эффект: rbc -0.23

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки утомляемости при БП баллы V6 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.192$ ,  $r = -0.23$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_сонливости\_эпуорта\_баллы\_v6

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.4983


Статистика: 213.000

Эффект: rbc -0.12

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки сонливости Эпуорта баллы V6 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.498$ ,  $r = -0.12$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_апатии\_старкстейна\_баллы\_v6

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0298


Статистика: 150.000

Эффект: rbc -0.38

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Шкала апатии Старкстейна баллы V6 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.030$ ,  $r = -0.38$  indicates a medium effect). Specifically, the Шкала апатии Старкстейна баллы V6 in the active group ( $M = 4.82$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 7.64$ ).

# Сравнение групп





## Шаг: стр\_\_струп\_v6\_1

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: < 0.001


Статистика: 98.500

Эффект: rbc -0.59

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Струн V6 1 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p < 0.001$ ,  $r = -0.59$  indicates a large effect). Specifically, the Струн V6 1 in the active group ( $M = 13.91$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 16.14$ ).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_струп\_v6\_2

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0299


Статистика: 334.500

Эффект: rbc 0.38

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Струп V6 2 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.030$ ,  $r = 0.38$  indicates a medium effect). Specifically, the Струп V6 2 in the active group ( $M = 22.77$ ) was significantly higher than in the placebo group ( $M = 21.27$ ).

# Сравнение групп



### Шаг: стр\_\_струп\_v6\_3

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.4882


Статистика: 271.500

Эффект: rbc 0.12

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Струн V6 3 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.488$ ,  $r = 0.12$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_индекс\_интерференции\_v6

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.1819

Статистика: -1.357

Эффект: cohen-d 0.41

ДИ эффекта: [-0.13, 0.02]


Мощность: 0.26

BF10: 0.621

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Индекс интерференции V6 between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.182$ , Cohen's  $d = 0.41$  indicates a small effect).

# Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_тест\_прокладывания\_пути\_trail\_making\_test\_мин\_v6\_a

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: < 0.001


Статистика: 92.000

Эффект: rbc -0.62

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V6 A between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p < 0.001$ ,  $r = -0.62$  indicates a large effect). Specifically, the «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V6 A in the active group ( $M = 35.64$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 49.64$ ).

Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_тест\_прокладывания\_пути\_trail\_making\_test\_мин\_v6\_б

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.2311


Статистика: 190.500

Эффект: rbc -0.21

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in «Тест прокладывания пути» Trail Making Test мин V6 Б between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.231$ ,  $r = -0.21$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: `стр__шкала_оценки_качества_жизни_при_бп_баллы_v6`

Задача: Сравнение групп (`compare_groups`)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Welch's T-Test

p-value: 0.0038

Статистика: -3.146

Эффект: cohen-d 0.95

ДИ эффекта: [-16.28, -3.45]


Мощность: 0.87

BF10: 12.582

График: на следующей странице

Вывод: An independent Welch's T-Test was conducted to determine if there were differences in Шкала оценки качества жизни при БП баллы V6 between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.004$ , Cohen's  $d = 0.95$  indicates a large effect). Specifically, the Шкала оценки качества жизни при БП баллы V6 in the active group ( $M = 50.95$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 60.82$ ).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_stroop\_sum\_v2\_sec

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.0522

Статистика: 2.003

Эффект: cohen-d 0.63

ДИ эффекта: [-0.14, 28.12]


Мощность: 0.50

BF10: 1.458

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Stroop sum V2 (sec) between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.052$ , Cohen's  $d = 0.63$  indicates a medium effect).

# Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_stroop\_sum\_v3\_sec

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V3

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0076


Статистика: 356.000

Эффект: rbc 0.47

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Stroop sum V3 (sec) between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.008$ ,  $r = 0.47$  indicates a medium effect). Specifically, the Stroop sum V3 (sec) in the active group ( $M = 66.86$ ) was significantly higher than in the placebo group ( $M = 56.68$ ).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_stroop\_sum\_v5\_sec

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V5

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.4061

Статистика: 0.839

Эффект: cohen-d 0.25

ДИ эффекта: [-1.85, 4.49]


Мощность: 0.13

BF10: 0.395

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Stroop sum V5 (sec) between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.406$ , Cohen's  $d = 0.25$  indicates a small effect).

Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_stroop\_sum\_v6\_sec

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.8709

Статистика: -0.163

Эффект: cohen-d 0.05

ДИ эффекта: [-3.64, 3.09]


Мощность: 0.05

BF10: 0.301

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Stroop sum V6 (sec) between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.871$ , Cohen's  $d = 0.05$  indicates a trivial effect).

Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_trail\_a\_b\_v2\_sec

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.5186


Статистика: 270.000

Эффект: rbc 0.12

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in Trail A+B V2 (sec) between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.519$ ,  $r = 0.12$  indicates a small effect).

# Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_trail\_a\_b\_v6\_sec

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.0317

Статистика: -2.222

Эффект: cohen-d 0.67

ДИ эффекта: [-40.68, -1.96]


Мощность: 0.58

BF10: 2.056

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in Trail A+B V6 (sec) between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.032$ , Cohen's  $d = 0.67$  indicates a medium effect). Specifically, the Trail A+B V6 (sec) in the active group ( $M = 125.86$ ) was significantly lower than in the placebo group ( $M = 147.18$ ).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_3\_двигательные\_функции\_баллы\_v2\_v6\_улучшение

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: < 0.001


Статистика: 433.000

Эффект: rbc 0.79

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in  $\Delta$  УШОБП часть 3 «Двигательные функции» баллы (V2→V6, улучшение) between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p < 0.001$ ,  $r = 0.79$  indicates a large effect). Specifically, the  $\Delta$  УШОБП часть 3 «Двигательные функции» баллы (V2→V6, улучшение) in the active group ( $M = 3.77$ ) was significantly higher than in the placebo group ( $M = 0.32$ ).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_ушобп\_часть\_2\_повседневная\_активность\_баллы\_v2\_v6\_улучшение

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: < 0.001


Статистика: 389.500

Эффект: rbc 0.61

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in  $\Delta$  УШОБП часть 2 «Повседневная активность» баллы (V2→V6, улучшение) between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p < 0.001$ ,  $r = 0.61$  indicates a large effect). Specifically, the  $\Delta$  УШОБП часть 2 «Повседневная активность» баллы (V2→V6, улучшение) in the active group ( $M = 2.14$ ) was significantly higher than in the placebo group ( $M = 0.41$ ).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_сонливости\_эпуорта\_баллы\_v2\_v6\_улучшение

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.3013


Статистика: 286.000

Эффект: rbc 0.18

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in  $\Delta$  Шкала оценки сонливости Эпуорта баллы (V2→V6, улучшение) between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.301$ ,  $r = 0.18$  indicates a small effect).

Сравнение групп





## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_утомляемости\_при\_бп\_баллы\_v2\_v6\_улучшение

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.1953


Статистика: 297.500

Эффект: rbc 0.23

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in  $\Delta$  Шкала оценки утомляемости при БП баллы (V2→V6, улучшение) between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.195$ ,  $r = 0.23$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_апатии\_старкстейна\_баллы\_v2\_v6\_улучшение

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: < 0.001


Статистика: 446.000

Эффект: rbc 0.84

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in  $\Delta$  Шкала апатии Старкстейна баллы (V2→V6, улучшение) between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p < 0.001$ ,  $r = 0.84$  indicates a large effect). Specifically, the  $\Delta$  Шкала апатии Старкстейна баллы (V2→V6, улучшение) in the active group ( $M = 5.00$ ) was significantly higher than in the placebo group ( $M = 0.09$ ).

Сравнение групп



## Шаг: стр\_\_шкала\_оценки\_качества\_жизни\_при\_бп\_баллы\_v2\_v6\_улучшение

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: < 0.001


Статистика: 416.500

Эффект: rbc 0.72

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in  $\Delta$  Шкала оценки качества жизни при БП баллы (V2→V6, улучшение) between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p < 0.001$ ,  $r = 0.72$  indicates a large effect). Specifically, the  $\Delta$  Шкала оценки качества жизни при БП баллы (V2→V6, улучшение) in the active group ( $M = 11.27$ ) was significantly higher than in the placebo group ( $M = 2.09$ ).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_stroop\_sum\_v2\_v6\_улучшение

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.0374

Статистика: 2.155

Эффект: cohen-d 0.67

ДИ эффекта: [0.85, 26.82]


Мощность: 0.56

BF10: 1.849

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in  $\Delta$  Stroop sum (V2→V6, улучшение) between groups defined by arm. There was a statistically significant difference between the groups ( $p = 0.037$ , Cohen's  $d = 0.67$  indicates a medium effect). Specifically, the  $\Delta$  Stroop sum (V2→V6, улучшение) in the active group ( $M = 25.79$ ) was significantly higher than in the placebo group ( $M = 11.95$ ).

# Сравнение групп





## Шаг: cmp\_\_trail\_a\_b\_v2\_v6\_улучшение

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V2

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Mann-Whitney U Test

p-value: 0.0542


Статистика: 324.500

Эффект: rbc 0.34

График: на следующей странице

Вывод: An independent Mann-Whitney U Test was conducted to determine if there were differences in  $\Delta$  Trail A+B (V2→V6, улучшение) between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.054$ ,  $r = 0.34$  indicates a medium effect).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_сад\_v6\_v1

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.2159

Статистика: -1.256

Эффект: cohen-d 0.38

ДИ эффекта: [-14.81, 3.44]


Мощность: 0.23

BF10: 0.56

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in  $\Delta$  САД (V6–V1) between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.216$ , Cohen's  $d = 0.38$  indicates a small effect).

# Сравнение групп



## Шаг: cmp\_\_дад\_v6\_v1

Задача: Сравнение групп (compare\_groups)

Точка: V6

Сравниваемые группы: active vs placebo

Тип:

Метод: Student's t-test (Independent)

p-value: 0.1685

Статистика: 1.401

Эффект: cohen-d 0.42

ДИ эффекта: [-1.62, 8.98]

Мощность: 0.28

BF10: 0.652

График: на следующей странице

Вывод: An independent Student's t-test (Independent) was conducted to determine if there were differences in  $\Delta$  ДАД (V6–V1) between groups defined by arm. The analysis revealed no statistically significant difference between the groups ( $p = 0.169$ , Cohen's  $d = 0.42$  indicates a small effect).

# Сравнение групп

