

Exercice 1 : Étude d'une fonction de deux variables

On considère la fonction de deux variables $F : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$F(1, 1) = 0 \quad \text{et} \quad F(x, y) = \frac{xy(1-x)(1-y)}{(1-xy)} \quad \text{si } (x, y) \neq (1, 1).$$

1. Montrer que, pour tout $(x, y) \in [0, 1]^2$,

$$(1-x)(1-y) \leq (1-\sqrt{xy})^2.$$

2. Montrer que F est continue sur $[0, 1]^2$.
3. En déduire que F est bornée sur $[0, 1]^2$ et atteint ses bornes.
4. Déterminer la borne inférieure de F sur $[0, 1]^2$; en quels points de $[0, 1]^2$ cette borne est-elle atteinte?
5. Justifier que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $]0, 1[^2$ et calculer ses dérivées partielles premières.
6. Montrer que F admet un unique point critique (x_0, y_0) dans l'ouvert $]0, 1[^2$ et le préciser.
7. Calculer $F(x_0, y_0)$ et justifier que

$$F(x_0, y_0) = \sup_{(x, y) \in [0, 1]^2} F(x, y).$$

Problème 1 : Matrices de Toeplitz, circulantes et cycliques : réduction et propriétés spectrales

Dans tout le problème, $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, n un entier naturel supérieur ou égal à 2, $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité. Si a et b sont deux entiers relatifs tels que $a \leq b$, $[a, b]$ désigne l'ensemble $\{a, a+1, \dots, b-1, b\}$. $\mathbb{K}[X]$ désigne l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$. L'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si $(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1}) \in \mathbb{K}^{2n-1}$, on note $T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1})$ la matrice

$$T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1}) = \begin{pmatrix} t_0 & t_1 & t_2 & \dots & t_{n-1} \\ t_{-1} & t_0 & t_1 & \dots & \vdots \\ t_{-2} & t_{-1} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & t_1 & t_2 \\ \vdots & \ddots & t_{-1} & t_0 & t_1 \\ t_{-n+1} & \dots & t_{-2} & t_{-1} & t_0 \end{pmatrix}.$$

Une telle matrice est appelée *matrice de Toeplitz* d'ordre n . On nomme $\text{Toep}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de Toeplitz d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$:

$$\text{Toep}_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \exists (t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1}) \in \mathbb{K}^{2n-1}, M = T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1})\}.$$

Une matrice N de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite *nilpotente* s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$. On admettra qu'une telle matrice vérifie $N^n = 0$. Pour toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note χ_M son polynôme caractéristique défini par $\chi_M(X) = \det(XI_n - M)$.

Si $P = a_0 + a_1X + \dots + a_pX^p$ ($p \in \mathbb{N}$) est un polynôme de $\mathbb{K}[X]$, $P(M)$ désigne la matrice $P(M) = a_0I_n + a_1M + \dots + a_pM^p$. Le but de ce problème est l'étude de certaines propriétés des matrices de Toeplitz. La partie I traite de généralités sur les matrices de Toeplitz et de quelques exemples. La partie II, indépendante de la partie I, étudie un type particulier de matrices de Toeplitz — les matrices circulantes — en s'intéressant à leur structure et à leur diagonalisabilité. Enfin, la partie III, indépendante des précédentes, aborde l'étude des matrices cycliques et les relie aux matrices de Toeplitz.

I Généralités et quelques exemples**I.A – Généralités**

- Q 1. Montrer que $\text{Toep}_n(\mathbb{C})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. En donner une base et en préciser la dimension.
Q 2. Montrer que si $AB = BA$ et si P et Q sont deux polynômes de $\mathbb{C}[X]$, alors $P(A)$ et $Q(B)$ commutent.

I.B – Cas de la dimension 2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix}$ une matrice de Toeplitz de taille 2×2 , où (a, b, c) sont des complexes.

- Q 3. Donner le polynôme caractéristique de A .
Q 4. Discuter, en fonction des valeurs de (a, b, c) , de la diagonalisabilité de A .

Réduction d'une matrice sous forme de Toeplitz

Q 5. Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Montrer que M est semblable à une matrice de type $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ ou de type $\begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$, où α, β, γ sont des complexes avec $\alpha \neq \beta$.

Q 6. En déduire que toute matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ est semblable à une matrice de Toeplitz.

I.C – Matrices tridiagonales

Une matrice tridiagonale est une matrice de Toeplitz de la forme $T(0, \dots, 0, t_{-1}, t_0, t_1, 0, \dots, 0)$, i.e. une matrice de la forme

$$A_n(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & (0) \\ c & a & \ddots \\ & \ddots & \ddots & b \\ (0) & & c & a \end{pmatrix} \text{ où } (a, b, c) \text{ sont des complexes.}$$

On fixe (a, b, c) trois nombres complexes tels que $bc \neq 0$. On se propose de chercher les éléments propres de $A_n(a, b, c)$.

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de $A_n(a, b, c)$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$ un vecteur propre associé.

Q 7. Montrer que si l'on pose $x_0 = 0$ et $x_{n+1} = 0$, alors $(x_1, \dots, x_n)$ sont les termes de rang variant de 1 à n d'une suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ vérifiant $x_0 = 0$, $x_{n+1} = 0$ et

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad bx_{k+2} + (a - \lambda)x_{k+1} + cx_k = 0.$$

Q 8. Rappeler l'expression du terme général de la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en fonction des solutions de l'équation

$$bx^2 + (a - \lambda)x + c = 0 \quad (1.1)$$

Q 9. À l'aide des conditions imposées à x_0 et x_{n+1} , montrer que (1.1) admet deux solutions distinctes r_1 et r_2 .

Q 10. Montrer que r_1 et r_2 sont non nuls et que r_1/r_2 appartient à $\mathbb{U}_{n+1}$.

Q 11. En utilisant l'équation (1.1) satisfaite par r_1 et r_2 , déterminer $r_1 r_2$ et $r_1 + r_2$. En déduire qu'il existe un entier $\ell \in [1, n]$ et un nombre complexe ρ vérifiant $\rho^2 = bc$ tels que $\lambda = a + 2\rho \cos\left(\frac{\ell\pi}{n+1}\right)$.

Q 12. En déduire qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que, pour tout k dans $[0, n+1]$, $x_k = 2i\alpha \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^{k/2} \sin\left(\frac{k\ell\pi}{n+1}\right)$.

Q 13. Conclure que $A_n(a, b, c)$ est diagonalisable et donner ses valeurs propres.

II Matrices circulantes

Une matrice circulante est une matrice de Toeplitz $T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1})$, pour laquelle $\forall k \in [1, n-1], \quad t_k = t_{-n+k}$. Elle est

donc de la forme $T(t_0, t_1, \dots, t_{n-1}) = \begin{pmatrix} t_0 & t_1 & \cdots & t_{n-2} & t_{n-1} \\ t_{n-1} & t_0 & \cdots & t_{n-3} & t_{n-2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ t_2 & \cdots & t_{n-1} & t_0 & t_1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_{n-1} & t_0 \end{pmatrix}$. On pose $M_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\omega_n = e^{2i\pi/n}$.

Q 14. Calculer $M_n^2, \dots, M_n^n$. Montrer que M_n est inversible et donner un polynôme annulateur de M_n .

Q 15. Justifier que M_n est diagonalisable. Préciser ses valeurs propres (exprimées à l'aide de ω_n) et donner une base de vecteurs propres de M_n .

Q 16. On pose $\Phi_n = (\omega_n^{(p-1)(q-1)})_{1 \leq p, q \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Justifier que Φ_n est inversible et donner sans calcul la valeur de la matrice $\Phi_n^{-1} M_n \Phi_n$.

Q 17. Soit A une matrice circulante. Donner un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $A = P(M_n)$.

Q 18. Réciproquement, si $P \in \mathbb{C}[X]$, montrer, à l'aide d'une division euclidienne de P par un polynôme bien choisi, que $P(M_n)$ est une matrice circulante.

Q 19. Montrer que toute matrice circulante est diagonalisable. Préciser ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

III Étude des matrices cycliques

III.A – Endomorphismes et matrices cycliques

Pour toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note f_M l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ canoniquement associé à M .

Q 20. Montrer que si M est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, alors les propositions suivantes sont équivalentes :

- il existe x_0 dans $\mathbb{C}^n$ tel que $(x_0, f_M(x_0), \dots, f_M^{n-1}(x_0))$ est une base de $\mathbb{C}^n$;
- M est semblable à la matrice $C(a_0, \dots, a_{n-1})$ définie par

$$C(a_0, \dots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{où } (a_0, \dots, a_{n-1}) \text{ sont des nombres complexes.}$$

On dit que f_M est un *endomorphisme cyclique*, que M est une *matrice cyclique* et que x_0 est un *vecteur cyclique* de f_M .

III.A.1 – Diagonalisabilité et cyclicité

Soit M dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que f_M est diagonalisable. On note $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ses valeurs propres (non nécessairement distinctes) et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de vecteurs associée à ces valeurs propres. Soit $u = \sum_{i=1}^n u_i e_i$ un vecteur de $\mathbb{C}^n$ où $(u_1, \dots, u_n)$ sont n nombres complexes.

- Q 21. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur $(u_1, \dots, u_n, \lambda_1, \dots, \lambda_n)$ pour que $(u, f_M(u), \dots, f_M^{n-1}(u))$ soit une base de $\mathbb{C}^n$.
- Q 22. En déduire une condition nécessaire et suffisante pour qu'un endomorphisme diagonalisable soit cyclique. Caractériser alors ses vecteurs cycliques.

III.A.2 – Valeurs propres d'une matrice cyclique

Soit $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$. On s'intéresse aux éléments propres de la matrice $C(a_0, \dots, a_{n-1})$.

- Q 23. Soit λ un nombre complexe. En discutant dans $\mathbb{C}^n$ du système $C(a_0, \dots, a_{n-1})X = \lambda X$, montrer que λ est une valeur propre de $C(a_0, \dots, a_{n-1})$ si et seulement si λ est racine d'un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ à préciser.
- Q 24. Si λ est racine de ce polynôme, déterminer le sous-espace propre de $C(a_0, \dots, a_{n-1})$ associé à la valeur propre λ et préciser sa dimension.
- Q 25. En déduire une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice cyclique soit diagonalisable.

III.A.3 – Commutant d'un endomorphisme cyclique

Soient M une matrice cyclique et x_0 un vecteur cyclique de f_M . On cherche à montrer que l'ensemble

$$\mathcal{C}(f_M) = \{g \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n) \mid f_M \circ g = g \circ f_M\} \text{ est l'ensemble des polynômes en } f_M.$$

- Q 26. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que $P(f_M) \in \mathcal{C}(f_M)$.
- Q 27. Soit $g \in \mathcal{C}(f_M)$. Montrer qu'il existe $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ tels que $g = \alpha_0 \text{Id}_{\mathbb{C}^n} + \alpha_1 f_M + \dots + \alpha_{n-1} f_M^{n-1}$. On pourra utiliser la base $(x_0, f_M(x_0), \dots, f_M^{n-1}(x_0))$ et exprimer $g(x_0)$ dans cette base.
- Q 28. Conclure.

III.A.4 – Exemple : matrice N

Soit

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Q 29. Donner les valeurs propres de N et les sous-espaces propres associés. Est-elle diagonalisable ?

Q 30. La matrice N est-elle cyclique ?

Q 31. Montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec N est l'ensemble des matrices de Toeplitz triangulaires inférieures.

III.B – Décomposition par diagonales

Dans toute la suite du problème, les matrices considérées sont à coefficients réels.

Si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est une matrice d'ordre n et k est un entier dans $[-n+1, n-1]$, on dit que le coefficient $a_{i,j}$ de A est un *coefficient diagonal d'ordre k* si $j - i = k$.

On note $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice définie par $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $a_{ij}^{(k)} = \begin{cases} a_{ij} & \text{si } j - i = k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. Tous les coefficients de cette matrice sont nuls sauf ses coefficients diagonaux d'ordre k qui sont égaux aux coefficients diagonaux d'ordre k de A .

Ainsi, si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, $A^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$, $A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^{(-1)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \end{pmatrix}$.

On note D_k la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf les coefficients diagonaux d'ordre k qui valent 1. Pour tout entier relatif k , on définit l'espace vectoriel Δ_k par

$$\Delta_k = \{M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \forall (i, j), m_{ij} = 0 \text{ si } j - i \neq k\} \quad \text{si } k \in [-n+1, n-1],$$

et $\Delta_k = \{0\}$ sinon. Ainsi, Δ_0 est l'ensemble des matrices diagonales, Δ_1 l'ensemble des matrices dont tous les coefficients sont nuls sauf éventuellement les coefficients diagonaux d'ordre 1, Δ_{-1} l'ensemble des matrices dont tous les coefficients sont nuls sauf éventuellement les coefficients diagonaux d'ordre -1 .

Pour tout k dans $\mathbb{Z}$, on note $H_k = \bigoplus_{i=0}^k \Delta_i$.

Q 32. Montrer que si i et j sont dans $[-n+1, n-1]$, si $A \in \Delta_i$ et $B \in \Delta_j$, alors $AB \in \Delta_{i+j}$.

Q 33. En déduire que si $A \in H_i$ et $B \in H_j$, alors $AB \in H_{i+j}$.

III.B.1 – Inversion de $I_n + C$

Q 34. Soit C une matrice nilpotente. Montrer que $I_n + C$ est inversible et que

$$(I_n + C)^{-1} = I_n - C + C^2 - \dots + (-1)^{n-1} C^{n-1}.$$

Q 35. On suppose que $k \geq 0$ et que C est une matrice de Δ_{k+1} . On pose $P = I_n + C$. Montrer que P est inversible et que

$$P^{-1} \in \bigoplus_{p=0}^{n-1} \Delta_{p(k+1)}.$$

On considère l'endomorphisme ϕ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\phi(M) = P^{-1}MP$.

Q 36. Soient $i \in \llbracket 0, k \rrbracket$ et $M \in \Delta_i$. Montrer qu'il existe $M' \in H_{k+1}$ tel que $\phi(M) = M + M'$.

Q 37. La matrice N étant définie en III.A.4, montrer qu'il existe $N' \in H_{k+1}$ tel que

$$\phi(N) = N + NC - CN + N'.$$

Q 38. Soit T une matrice triangulaire supérieure. On pose $A = N + T$, $B = \phi(A)$. Montrer que $B \in H_{-1}$ et que

$$\begin{cases} \forall i \in [-1, k-1], & B^{(i)} = A^{(i)} \\ B^{(k)} = A^{(k)} + NC - CN. \end{cases}$$

