

Ecuaciones Diferenciales Neuronales Informadas por Física y Detección Espectral Multimodal para la Predicción Autónoma de Calidad y Frescura en Café Especial Colombiano

Autor(es): Prof. Dr. Isabel Suárez — Technische Hochschule Deggendorf (DIT), 17 de septiembre de 2026
Campus de IA, Prof. Dr. Ricardo Vivas — Universidad de Cartagena (UdC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Objective

Formular, evaluar y validar un marco analítico y computacional que integre espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier con reflectancia total atenuada (ATR-FTIR), ensayos fisicoquímicos normalizados y modelos de Deep Learning informados por la física (PIML) en café especial colombiano (**Coffea arabica**). El proyecto se centra en contrastar rigurosamente métodos quimiométricos tradicionales (PLSR, SVR) frente a redes neuronales profundas (1D-CNN) y redes informadas por leyes cinéticas de degradación tipo Arrhenius (PINN) bajo condiciones de envejecimiento en climas tropicales, manteniendo una exploración modular de arquitecturas avanzadas (Mamba SSM, Transformers espectrales) y fortaleciendo la cooperación bilateral y la formación de investigadores entre la Technische Hochschule Deggendorf (DIT) y la Universidad de Cartagena (UdC).

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto de investigación bilateral entre la Technische Hochschule Deggendorf (DIT, Baviera) y la Universidad de Cartagena (UdC, Colombia) plantea el desarrollo de un marco analítico y computacional para la predicción del deterioro fitoquímico y la pérdida de frescura en café especial colombiano (**Coffea arabica**). Con una asignación semilla de 12 meses financiada por BAYLAT (7.350 €), la investigación aborda las variaciones de calidad que experimenta el grano durante el almacenamiento poscosecha en ambientes tropicales cálido-húmedos y el transporte marítimo hacia Europa (20 a 45 días), con destino a mercados como el bávaro. Durante este periodo, la autooxidación lipídica y la hidrólisis de los ácidos clorogénicos modifican los atributos sensoriales y fitoquímicos del grano verde. Frente a los tiempos y costos de los análisis cromatográficos convencionales y la naturaleza cualitativa de la catación organoléptica, el proyecto propone un enfoque metodológico integrado: (1) el monitoreo longitudinal en condiciones ambientales reales de almacenamiento en el Caribe colombiano, mediante espectroscopía en infrarrojo medio con reflectancia total atenuada (ATR-FTIR) y ensayos fisicoquímicos normalizados (AOAC/ISO); y (2) modelos de Deep Learning informados por la física (Physics-Informed Neural Networks - PINN), que incorporan cinéticas de degradación de tipo Arrhenius para complementar la quimiometría lineal (PLSR) y aportar interpretabilidad físico-química a las predicciones. La cooperación bilateral se articula mediante un workshop presencial en Cartagena y una

estancia de investigación de 2 semanas en el Campus de IA de Deggendorf, generando los datos piloto necesarios para postular a la convocatoria bilateral DFG-Minciencias.

Palabras clave: Café especial, *Coffea arabica*, ATR-FTIR, Redes neuronales informadas por la física (PINN), Cinética de degradación, Quimiometría.

2. Introducción y Planteamiento del Problema

2.1 Contexto Socioeconómico y Bioeconomía del Café Especial Colombiano

Colombia es uno de los principales productores mundiales de café arábica suave lavado de alta montaña (***Coffea arabica***). De acuerdo con las cifras oficiales de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia [1], la actividad cafetera constituye el soporte socioeconómico fundamental del campo colombiano, sustentando a más de 540.000 familias campesinas distribuidas en más de 600 municipios a lo largo de las tres cordilleras andinas y zonas montañosas aisladas como la Sierra Nevada de Santa Marta. Con una cosecha nacional estabilizada en el rango de 12 a 14 millones de sacos verdes de 60 kg por año, el café representa un valor de exportaciones que oscila entre los 3.000 y 4.000 millones de USD anuales, consolidándose como el principal rubro no minero-energético de la canasta exportadora colombiana y un pilar estratégico de la bioeconomía rural [1].

Dentro de esta estructura productiva, el segmento de los cafés especiales (**Specialty Coffee**), formalmente delimitado por los estándares de la Specialty Coffee Association [2], ha cobrado una creciente relevancia económica. La SCA define como café especial aquel lote trazable que obtiene una calificación de taza igual o superior a 85 puntos en una escala sobre 100, evaluada mediante un protocolo estandarizado de diez descriptores sensoriales (fragancia/aroma, sabor, sabor residual, acidez, cuerpo, balance, uniformidad, taza limpia, dulzor y puntaje general). Estos cafés, caracterizados por notas florales y frutales y perfiles de acidez específicos, acceden a primas de precio en los mercados de especialidad europeos. En este escenario, el Estado Libre de Baviera y la República Federal de Alemania representan uno de los mercados de mayor demanda de cafés diferenciados de origen, donde tostadores y consumidores valoran la consistencia de la calidad en taza [2].

2.2 Condiciones de Almacenamiento Tropical y Transporte Marítimo Transatlántico

La preservación del perfil de taza y de la calidad química del café especial en grano verde (**green coffee**) depende estrechamente de las condiciones ambientales a lo largo de la cadena poscosecha. En Colombia, el almacenamiento en fincas, cooperativas y bodegas de acopio en la costa Caribe (p. ej., Cartagena de Indias o Santa Marta) se realiza habitualmente bajo condiciones ambientales cálido-húmedas, con temperaturas que oscilan entre 25 °C y 38 °C y humedades relativas entre 60% y 85% RH.

Durante el transporte marítimo transatlántico hacia puertos europeos (habitualmente de 20 a 45 días), los contenedores de carga están expuestos a variaciones térmicas circadianas y condensación interna. Estas condiciones favorecen reacciones de envejecimiento químico (**staling**), decoloración del grano verde y degradación de los precursores químicos del aroma y sabor, lo que puede incidir negativamente en la calificación sensorial SCA obtenida inicialmente en el origen.

2.3 Vías Fitoquímicas de Degradación y Marcadores Moleculares de Calidad

A escala molecular, las alteraciones de ***Coffea arabica*** durante el almacenamiento prolongado corresponden a tres procesos fitoquímicos principales:

1. **Hidrólisis y transformación de ácidos clorogénicos (CGA):** Los ácidos clorogénicos representan entre el 6% y el 9% de la materia seca del café arábica y comprenden ésteres cafeoilquínicos (5-CQA, 3-CQA, 4-CQA), dicafeoilquínicos y feruloilquínicos [3]. El 5-CQA, analito mayoritario, es el principal determinante de la acidez fina y del potencial antioxidante del grano. Durante el almacenamiento a temperaturas elevadas, los enlaces éster experimentan una hidrólisis progresiva que libera ácido quínico y ácido cafeico libre, o bien lactonizan formando quinidas [3]. Esta alteración modifica el balance ácido del grano, incidiendo en la acidez titulable evaluada según el método oficial AOAC 920.92 [4] y generando sabores amargos y astringentes.

2. **Peroxidación radicalaria de la fracción lipídica:** La fracción lipídica constituye del 12% al 17% del peso seco del grano y está integrada primordialmente por triacilgliceroles con alto contenido de ácido linoleico (C18:2) y ésteres diterpénicos (cafestol y kahweol). Por acción del oxígeno atmosférico y la temperatura, los ácidos grasos insaturados experimentan reacciones de autooxidación lipídica [5]. En este proceso se forman hidroperóxidos lipídicos, cuantificables mediante el índice de peróxidos conforme a la norma AOAC 965.33 [6]. La descomposición secundaria de estos intermediarios genera compuestos carbonílicos volátiles de bajo peso molecular (hexanal, trans-2-nonenal, octanal), asociados a descriptores de pérdida de frescura, notas a madera seca o defectos de añejamiento (**baggy**) [5].
3. **Variación higroscópica y actividad de agua (a_w):** Tras el secado poscosecha, el café en grano verde se almacena normalmente con un contenido de humedad del 10% al 12% en base húmeda (normas oficiales AOAC 968.11 [7] e ISO 6673 [8]), correspondiente a una actividad de agua (a_w) en equilibrio de aproximadamente 0,50 a 0,60. En condiciones de alta humedad relativa ambiental ($> 70\%$) y temperaturas cálidas ($> 25^\circ\text{C}$), el grano absorbe vapor de agua de la atmósfera circundante. Al superar valores de $a_w > 0,65$, la mayor movilidad del agua en la estructura celular favorece la reactividad química —incluyendo la hidrólisis de ésteres clorogénicos y lípidos— e incrementa el riesgo de proliferación fúngica y defectos sensoriales, reduciendo la estabilidad del lote durante el almacenamiento prolongado.

2.4 Limitaciones de los Ensayos Convencionales y Oportunidades de la Espectroscopía ATR-FTIR

El control de calidad en las etapas de almacenamiento y comercialización presenta desafíos analíticos con los métodos actualmente disponibles:

- Por un lado, la **catación sensorial SCA** [2] constituye una metodología cualitativa orientada a la evaluación organoléptica final. Requiere paneles de catadores entrenados y detecta las alteraciones únicamente cuando los cambios de sabor y aroma ya han ocurrido, sin aportar una estimación cuantitativa directa de la evolución química residual de un lote.
- Por otro lado, las **metodologías analíticas instrumentales clásicas**, como la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), ofrecen una elevada resolución química, pero son técnicas destructivas, requieren tiempos prolongados de preparación de muestra y conllevan costos analíticos considerables (150 – 300 USD por muestra), lo que limita su aplicación sistemática en centros de acopio o terminales de embarque.

Frente a estas limitaciones, la **espectroscopía infrarroja media con reflectancia total atenuada (ATR-FTIR)** constituye una alternativa rápida y no destructiva [9]. La técnica ATR-FTIR permite obtener el perfil vibracional directo de muestras de café molido en pocos minutos, sin consumo intensivo de reactivos y con adecuada reproducibilidad instrumental. El espectro obtenido en la región del infrarrojo medio ($4000 - 600\text{ cm}^{-1}$) actúa como una huella molecular integral que captura simultáneamente las transiciones vibracionales asociadas a los enlaces fitoquímicos clave del café: la banda de estiramiento éster $\nu(\text{C}=\text{O})$ en 1745 cm^{-1} y el hombro de ácidos libres en 1715 cm^{-1} , el doble enlace $\nu(=\text{C}-\text{H})$ *cis* en 3008 cm^{-1} , la tensión de fenoles y agua en $3400 - 3250\text{ cm}^{-1}$, y los estiramientos de ésteres de ácidos clorogénicos en $1380 - 1150\text{ cm}^{-1}$. No obstante, la complejidad de las firmas espectrales ATR-FTIR —caracterizadas por superposición de bandas, dispersión física y efectos de matriz— requiere modelos computacionales calibrados capaces de extraer correlaciones cinéticas causales y generalizar de forma robusta [9].

3. Pregunta Científica y Objetivos de la Investigación

3.1 Pregunta Central de Investigación

Interrogante Científico Principal

Pregunta de Investigación: ¿En qué medida los modelos de Deep Learning informados por la física (Physics-Informed Neural Networks, PINN), al integrar de forma explícita leyes cinéticas diferenciales de degradación de primer orden acopladas a la dependencia térmica de Arrhenius para la hidrólisis de ácidos clorogénicos y la peroxidación lipídica, superan a la quimiometría lineal clásica (regresión por mínimos cuadrados parciales, PLSR; y máquinas de soporte vectorial, SVR) y a las redes neuronales convolucionales empíricas (1D-CNN) en términos de exactitud predictiva (R^2 , RMSE, MAPE), robustez de generalización ante lotes y orígenes no observados (**out-of-distribution**), e interpretabilidad fisicoquímica causal demostrable a partir de perfiles espectrales ATR-FTIR de café especial (**Coffea arabica**) almacenado bajo condiciones ambientales tropicales fluctuantes?

3.2 Objetivo General

Desarrollar y validar experimentalmente un marco analítico y computacional de monitoreo no destructivo basado en espectroscopía infrarroja media (ATR-FTIR), determinaciones fisicoquímicas normalizadas (AOAC/ISO) y modelos de Deep Learning informados por la física (PINN), para estimar marcadores moleculares y predecir las trayectorias cinéticas de degradación y pérdida de frescura en lotes de café especial colombiano (**Coffea arabica**) almacenados bajo condiciones ambientales tropicales.

3.3 Objetivos Específicos

1. **Alineado con WP1 (Puesta a punto experimental, recolección y Workshop en Cartagena):** Estandarizar el diseño experimental longitudinal y el protocolo analítico de adquisición espectral rápida ATR-FTIR sobre lotes de café especial (**Coffea arabica** cultivares **Castillo**, **Caturra**, **Colombia** y **Geisha**), asegurando la calibración instrumental y realizando un workshop presencial bilateral de capacitación en Inteligencia Artificial aplicada a la espectroscopía agroalimentaria en la Universidad de Cartagena, impartido por la investigadora principal del DIT para docentes y jóvenes investigadores de la UdC.
2. **Alineado con WP2 (Monitoreo longitudinal en condiciones tropicales y analítica AOAC/ISO):** Ejecutar el monitoreo cinético longitudinal sistemático de las muestras sometidas a almacenamiento en condiciones ambientales reales de clima tropical cálido-húmedo del Caribe colombiano, consolidando una base de datos multimodal que asocie los barridos espectrales ATR-FTIR periódicos con determinaciones analíticas de referencia normalizadas: acidez titulable ([4]), humedad residual y actividad de agua ([7], [8]), índice de peróxidos lipídicos ([6]) y concentración de ácidos clorogénicos totales y 5-CQA.
3. **Alineado con WP3 (Modelado de ciencia de datos, estancia en Deggendorf y benchmark factorial):** Formular, calibrar y someter a benchmark comparativo estructurado en tres niveles metodológicos —quimiometría lineal y de kernel (PLSR, SVR), Deep Learning empírico (1D-CNN) y redes neuronales informadas por principios físicos (PINN acopladas a cinéticas de degradación de Arrhenius)— durante la estancia de investigación de 2 semanas del investigador de la UdC en el Campus de IA de la TH Deggendorf, evaluando la precisión predictiva y la interpretabilidad espectral causal mediante mapas de atención y técnicas de atribución de gradientes (Grad-CAM y SHAP).

4. Marco Teórico y Estado del Arte

4.1 Fitoquímica de *Coffea arabica* y Marcadores Moleculares de Deterioro

La matriz biológica del grano de café arábica (**Coffea arabica**) representa un sistema metabólico altamente complejo, higroscópico y dinámico, cuya preservación postcosecha condiciona de forma directa los atributos sensoriales que definen el café especial de alta gama (≥ 85 puntos SCA). Desde el punto de vista fitoquímico cuantitativo y funcional, el endospermo del grano está integrado por diversas familias moleculares ([3]):

- **Ácidos Clorogénicos (CGA):** Constituyen entre el 6% y el 9% de la biomasa seca total del grano verde. Químicamente, son ésteres formados por la condensación entre el ácido trans-cinámico sustituido (ácidos cafeico, ferúlico y p-cumárico) y el ácido quínico (ácido 1L-1(OH),3,4/5-tetrahidroxiciclohexanocarboxílico). La fracción predomi-

nante está representada por los ácidos cafeoilquínicos monocaffeilados (CQA), en los cuales el isómero ácido 5-cafeoilquínico (5-CQA) abarca entre el 70% y el 80% de la fracción polifenólica total, coexistiendo en equilibrio termodinámico con sus regioisómeros 3-CQA y 4-CQA. Asimismo, la matriz contiene ésteres dicafeoilquínicos (di-CQA, incluyendo los isómeros 3,4-diCQA, 3,5-diCQA y 4,5-diCQA; 1, 5 – 2, 5%) y ésteres feruloilquínicos (FQA; 0, 8 – 1, 4%). Estos metabolitos polifenólicos no solo actúan como potentes antioxidantes intracelulares donores de hidrógeno, sino que gobiernan el brillo de la acidez cítrica y málica y fungen como precursores esenciales del bouquet aromático durante la tostión.

- **Fracción Lipídica y Diterpenos:** Oscila entre el 12% y el 17% del peso seco del grano, confinada en vesículas citoplasmáticas (cuerpos lipídicos). Se encuentra dominada en un 75 – 80% por triacilgliceroles (TAG) ricos en ácidos grasos insaturados, fundamentalmente ácido linoleico (C18:2, $\omega - 6$, que representa el 40 – 46% del total de ácidos grasos esterificados) y ácido oleico (C18:1, 8 – 12%), complementados por ácidos grasos saturados de cadena larga como el ácido palmítico (C16:0, 30 – 35%) y esteárico (C18:0, 7 – 9%). En la fracción insaponificable (15 – 20% de la fracción lipídica) destacan dos diterpenos pentacíclicos de esqueleto caurano exclusivos del género: cafestol y kahweol, esterificados principalmente con ácidos grasos individuales. Estos diterpenos son bioindicadores taxonómicos de la especie arábica y estabilizadores coloidales de la matriz.
- **Alcaloides:** La cafeína (1,3,7-trimetilxantina, 1, 0 – 1, 4% p/p) exhibe alta estabilidad térmica frente a la oxidación atmosférica en condiciones estándar; en contraste, la trigonelina (*N*-metilbetaina del ácido nicotínico, 0, 8 – 1, 2% p/p) opera como osmolito celular y regulador metabólico, constituyendo un precursor termolábil de compuestos aromáticos volátiles como piridinas y pirazinas.
- **Carbohidratos y Fracción Nitrogenada:** La sacarosa (6 – 9% p/p) representa el carbohidrato soluble libre dominante, susceptible a hidrólisis ácida o enzimática. Los polisacáridos estructurales insolubles (45 – 50% de la materia seca) están formados por complejos de galactomananos y arabinogalactanos ramificados que constituyen la pared celular vegetal. Las proteínas (10 – 13%) abarcan globulinas de reserva (alelo-globulinas 11S) y una fracción de péptidos y aminoácidos libres (asparagina, ácido glutámico).

Durante el acopio, manipulación poscosecha y transporte transatlántico en climas cálidos y húmedos propios de las zonas tropicales colombianas, el café experimenta dos vías principales de alteración fisicoquímica ([5], [10]):

1. **Hidrólisis e isomerización de ácidos clorogénicos:** Por acción de la humedad y la temperatura ambiental, el enlace éster entre el ácido quínico y los ácidos hidroxycinámicos sufre hidrólisis progresiva. Esta ruptura libera ácido quínico libre y ácido cafeico libre, alterando el pH del grano e incrementando la acidez titulable total mediante un perfil astringente y acre. De forma paralela, la autooxidación de los anillos orto-difenólicos del ácido cafeico genera quinonas que reaccionan con aminoácidos libres, favoreciendo el pardeamiento residual y la pérdida de coloración verde.
2. **Rancidez lipídica y biogénesis de volátiles degradativos:** La fracción insaturada de los lípidos (particularmente el ácido linoleico, con carbonos metilénicos bis-alílicos $-\text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} -$, de menor energía de disociación de enlace C-H) es susceptible a la autooxidación en presencia de oxígeno. La iniciación y propagación generan hidroperóxidos lipídicos (ROOH), cuantificables a través del índice de peróxidos. Estos hidroperóxidos sufren posterior escisión secundaria (β -scission), produciendo aldehídos volátiles alifáticos (hexanal, nonanal, octanal, trans-2-nonenal), cetonas y ácidos grasos libres de cadena corta. La acumulación de estos compuestos se asocia a la pérdida de frescura, afectando los atributos florales y frutales característicos de los cafés de especialidad con notas a madera seca y defectos de almacenamiento (**staling**).

4.2 Cinética de Deterioro y Termodinámica de Arrhenius en Condiciones Ambientales

La evolución cuantitativa de las especies fitoquímicas marcadoras de frescura a lo largo del tiempo de almacenamiento puede describirse analíticamente mediante modelos cinéticos diferenciales de orden aparente n acoplados a la termodinámica clásica de velocidades de reacción ([9]). Para un reactivo sustrato que decae (p. ej., concentración residual de 5-CQA, ésteres diterpénicos intactos o dobles enlaces *cis* en lípidos), la ley de velocidad diferencial general adopta la forma:

$$\frac{dC_{i(t)}}{dt} = -k_i(T(t), a_{w(t)}) \cdot [C_{i(t)}]^{n_i}$$

mientras que para la acumulación de productos secundarios de degradación (tales como hidroperóxidos lipídicos o ácido quínico libre):

$$\frac{dP_{j(t)}}{dt} = +k_j(T(t), a_{w(t)}) \cdot [C_{i(t)}]^{m_j}$$

donde $C_{i(t)}$ y $P_{j(t)}$ corresponden a las concentraciones molares o másicas de sustratos y productos en el instante t , n_i y m_j representan los órdenes de reacción aparentes, y k_i denota la constante cinética global de velocidad. En sistemas agroalimentarios de humedad intermedia como el café, las reacciones de autooxidación lipídica en etapas iniciales operan frecuentemente bajo un régimen cinético de orden aparente cero ($n_i = 0$) en presencia de oxígeno disponible, mientras que la hidrólisis de ésteres de ácidos clorogénicos exhibe típicamente una cinética de pseudo-primer orden ($n_i = 1$).

La dependencia fundamental de la constante cinética de velocidad k_i respecto a la temperatura absoluta T está descrita por la ecuación de Arrhenius:

$$k_{i(T)} = A_i \cdot \exp\left(-\frac{E_{a,i}}{R \cdot T}\right)$$

donde A_i representa el factor pre-exponencial o factor de frecuencia entálpica (tiempo^{-1}), que cuantifica la frecuencia de colisiones moleculares con orientación espacial energéticamente favorable; $E_{a,i}$ es la energía de activación aparente de la reacción en la matriz sólida (kJ/mol), correspondiente a la barrera de energía libre de Gibbs que deben franquear los reactivos para alcanzar el estado de transición activado (típicamente 60 – 110 kJ/mol para la degradación térmica de CGA y oxidación lipídica en matrices secas); R es la constante universal de los gases ideales (8,314 J/(mol · K)); y T es la temperatura termodinámica absoluta en Kelvin (K).

En este contexto ambiental no estacionario, la actividad de agua ($a_w = \frac{p}{p_0}$, vinculada en equilibrio con la humedad relativa ambiental por $HR = 100 \cdot a_w$) cumple un papel termodinámico crítico como modulador cinético. De acuerdo con la física de polímeros y la teoría de transiciones vítreas de Gordon-Taylor, el agua condensada en los microporos del grano actúa como plastificante molecular sobre la matriz amorfa de galactomananos y proteínas. A niveles bajos de humedad relativa ($a_w < 0,50$), la matriz del endospermo se encuentra en un estado vítreo rígido (**glassy state**), donde la viscosidad ultraelevada ($\eta > 10^{12} \text{ Pa} \cdot \text{s}$) reduce de forma sustancial la tasa de difusión traslacional de reactivos químicos y oxígeno diatómico.

Sin embargo, cuando las oscilaciones higrométricas tropicales elevan la actividad de agua por encima del umbral crítico ($a_w \geq 0,60 - 0,70$), la temperatura de transición vítrea (T_g) desciende por debajo de la temperatura ambiente de almacenamiento ($T > T_g$). Este fenómeno induce la transición vítreo-gomosa de la matriz (**glass-to-rubber transition**), incrementando el volumen libre intermolecular y acelerando los coeficientes de difusión de oxígeno disuelto y agua reactiva. Por consiguiente, la constante de velocidad efectiva no es una magnitud estática, sino una variable acoplada a las series temporales dinámicas del microclima:

$$k_{i(t)} = A_i(a_{w(t)}) \cdot \exp\left(-\frac{E_{a,i}}{R \cdot T(t)}\right)$$

La integración continua de este sistema dinámico no autónomo sobre las lecturas ambientales registradas por dataloggers calibrados permite predecir con exactitud mecanística la cinética real de agotamiento de frescura.

4.3 Principios Físicos de Espectroscopía Vibracional ATR-FTIR

La espectroscopía de infrarrojo medio por transformada de Fourier (FTIR) en el rango espectral de 4000 – 600 cm^{-1} (longitudes de onda λ entre 2,5 y 16,7 μm) constituye una técnica analítica de alta sensibilidad cuántica para interrogar la estructura molecular del café. La absorción de fotones infrarrojos ocurre cuando la frecuencia de la radiación incidente coincide de forma resonante con la frecuencia de oscilación natural de un modo normal de enlace químico, con la condición mecánica cuántica obligatoria de que la vibración genere una variación periódica no nula en el momento dipolar eléctrico molecular ($\partial \frac{\mu}{\partial q} \neq 0$). De este modo, los enlaces covalentes fundamentales de la biomasa

cafetera (O-H, C-H, C=O, C=C, C-O) producen bandas de absorción vibracional intrínsecas debidas a movimientos de tensión (**stretching**, ν) simétrica y asimétrica, y de deformación o flexión (**bending**, δ) en el plano y fuera de él.

A fin de examinar muestras complejas de café finamente homogeneizado sin incurrir en tratamientos químicos de extracción con solventes orgánicos ni preparación destructiva de pastillas de KBr, la técnica de Reflectancia Total Atenuada (ATR) explota el fenómeno óptico de reflexión interna total ([10]). La radiación infrarroja incide con un ángulo θ (típicamente 45°) sobre la cara interna de un cristal de alto índice de refracción (elemento de reflexión interno de diamante, $n_1 \approx 2,42$), colocado en íntimo contacto mecánico con la muestra sólida de café ($n_2 \approx 1,40 - 1,50$). Dado que $n_1 > n_2$, al superar el ángulo crítico de incidencia ($\theta > \theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \approx 38,2^\circ$), la radiación experimenta reflexión interna total en la interfase cristal-café.

En cada punto de reflexión se instaura una **onda electromagnética evanescente** estacionaria que penetra perpendicularmente en la muestra en dirección al eje z . La amplitud del campo eléctrico decae de forma exponencial continua conforme a:

$$E(z) = E_0 \cdot \exp\left(-\frac{z}{d_p}\right)$$

donde la profundidad de penetración característica d_p , definida como la distancia a la cual la intensidad del campo decae a un factor $\frac{1}{e}$ de su valor superficial, se deriva de las ecuaciones de Maxwell-Fresnel:

$$d_{p(\tilde{\nu})} = \frac{1}{2\pi\tilde{\nu}n_1\sqrt{\sin^2(\theta) - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2}}$$

Para la geometría instrumental adoptada, d_p varía típicamente entre $0,65\ \mu\text{m}$ en los números de onda más altos ($4000\ \text{cm}^{-1}$) y $4,2\ \mu\text{m}$ en la región de huella dactilar ($600\ \text{cm}^{-1}$). Esta escala de penetración subcelular permite interrogar selectivamente la superficie sin distorsiones asociadas a la dispersión fotónica por partículas heterogéneas.

La atenuación de la reflectancia en cada número de onda $\tilde{\nu}$ debido a la absorción de los enlaces fitoquímicos se relaciona directamente con la concentración volumétrica de los analitos a través de la ley de Beer-Lambert modificada para ATR:

$$A(\tilde{\nu}) = -\log_{10}\left(\frac{R(\tilde{\nu})}{R_0}\right) = \sum_i \varepsilon_{i(\tilde{\nu})} \cdot b_{\text{eff}}(\tilde{\nu}) \cdot C_i$$

donde $A(\tilde{\nu})$ es la absorbancia espectral aparente, $\varepsilon_{i(\tilde{\nu})}$ es el coeficiente de absortividad molar de la especie química absorbente i , C_i es su concentración en el volumen sondeado, y $b_{\text{eff}}(\tilde{\nu}) \propto d_{p(\tilde{\nu})}$ corresponde al camino óptico efectivo. Esta relación linealizada es la base fisicoquímica que faculta el desacoplamiento de perfiles químicos a partir de firmas espectrales.

Número de onda (cm^{-1})	Modo Vibracional	Grupo Funcional y Matriz	Evolución Cinética Durante el Almacenamiento Tropical
3400 – 3250	Tensión $\nu(\text{O-H})$	Agua adsorbida (a_w) y fenoles libres de CGA	Desplazamiento del máximo y ensanchamiento de banda por modulación higroscópica y condensación de puentes de hidrógeno.
3008	Tensión $\nu(=\text{C-H})$ <i>cis</i>	Dobles enlaces olefínicos en TAG (lino-leico y oleico)	Atenuación progresiva por peroxidación lipídica radicalaria y conversión a peróxidos e hidroperóxidos conjugados <i>trans</i> .
2925, 2854	Tensión $\nu_{\text{as}}, \nu_{\text{s}}(\text{C-H})$	Grupos metileno ($-\text{CH}_2-$) y metilo ($-\text{CH}_3$) alifáticos	Bandas lipídicas termoeestables de baja variabilidad; empleadas como estándar interno de normalización espectral por SNV.
1745	Tensión $\nu(\text{C=O})$ éster	Triglicéridos y ésteres diterpénicos (cafestol, kahweol)	Atenuación gradual de la intensidad pico y aparición paulatina de un hombro asimétrico a frecuencias inferiores por hidrólisis lipídica.

Número de onda (cm ⁻¹)	Modo Vibracional	Grupo Funcional y Matriz	Evolución Cinética Durante el Almacenamiento Tropical
1715 – 1695	Tensión $\nu(\text{C}=\text{O})$ carbono	Ácidos grasos libres (AGL) y ácido quínico liberado	Incremento continuo y monótonico correlacionado con la pérdida de frescura, erigiéndose en biomarcador espectral de añejamiento («staling»).
1650 – 1600	Tensión $\nu(\text{C}=\text{C})$ aromático y amida I	Anillo bencénico de ácidos hidroxiquinónicos y proteínas	Atenuación por polimerización oxidativa de restos orto-difenólicos y condensación con cadenas peptídicas.
1380 – 1150	Tensión $\nu(\text{C}-\text{O})$, flexión $\delta(\text{O}-\text{H})$	Enlaces éster de ácidos cafeoilquínicos (5-CQA)	Decrecimiento cuantitativo reproducible, con elevada correlación cruzada respecto al decaimiento de CGA por HPLC/Folin.
1050 – 1030	Tensión $\nu(\text{C}-\text{O})$ piranósica	Sacarosa y polisacáridos estructurales (galactomananos)	Atenuación lenta asociada a reacciones incipientes de pardeamiento no enzimático y consumo de carbohidratos solubles.

4.4 Estado del Arte: De la Quimiometría Clásica a la Inteligencia Artificial Informada por la Física

La evaluación instrumental de la calidad en matrices agroalimentarias mediante espectroscopía infrarroja ha estado tradicionalmente dominada por metodologías quimiométricas multivariantes clásicas ([11], [12], [13]). Herramientas no supervisadas como el Análisis de Componentes Principales (PCA) y modelos de regresión supervisada lineal como la Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (PLSR) o métodos basados en funciones de base radial (Support Vector Regression - SVR) se han aplicado profusamente en café para autenticación de cultivares, clasificación de origen geográfico y detección de adulteraciones con granos defectuosos o cereales foráneos.

A pesar de su utilidad práctica en análisis estáticos, la quimiometría lineal presenta tres limitaciones para el monitoreo dinámico:

1. **Atemporalidad:** Procesa cada firma espectral como un punto aislado e independiente en un hiperespacio euclidiano, ignorando la correlación causal temporal inherente a las trayectorias de descomposición.
2. **Supuesto de linealidad:** Es incapaz de desacoplar no linealidades ópticas complejas (como solapamientos multi-escala de bandas vibracionales con dispersión dependiente del tamaño de partícula).
3. **Agnosticismo físico:** Los coeficientes de regresión se determinan mediante criterios puramente estadísticos de maximización de covarianza, lo que provoca que los modelos fallen en la extrapolación temporal ante regímenes térmicos e higrométricos no presenciados en el conjunto de calibración.

En la última década, las arquitecturas de Deep Learning han emergido para solventar estas restricciones. En particular, las redes neuronales convolucionales unidimensionales (1D-CNN) se han consolidado como un enfoque prometedor en quimiometría espectral ([14]). Las convoluciones 1D con filtros adaptativos de distintos anchos actúan como operadores de derivación y filtrado continuos, extrayendo representaciones jerárquicas capaces de deconvolucionar picos espectrales solapados sin requerir pretratamientos manuales ad-hoc. No obstante, como advierte Passos ([14]), las redes neuronales puramente dirigidas por datos carecen de restricciones fenomenológicas explícitas: en aplicaciones agroalimentarias con conjuntos de datos de tamaño moderado, las arquitecturas no regularizadas tienden a sobreajustar el ruido instrumental y pueden producir estimaciones incompatibles con las leyes físicas (p. ej., anticipar la generación espontánea de 5-CQA o tasas de degradación negativas en etapas tardías de almacenamiento), en contradicción con los principios de la cinética química.

Para superar tanto las limitaciones de linealidad de la quimiometría como la falta de consistencia fenomenológica en redes estándar, el enfoque de Machine Learning Informado por la Física (PIML / Physics-Informed Neural Networks - PINN) integra ecuaciones diferenciales ordinarias mecánicas directamente en el aprendizaje supervisado ([15]). Perré demostró que la inserción de operadores diferenciales físicos en redes neuronales previene el desvío numérico y confiere a los modelos capacidad de extrapolación fidedigna en procesos no estacionarios con escasez de datos. En el procesamiento térmico de café, Pronk & Anthony ([16]) evidenciaron que la estructuración de redes neuronales acopladas como términos correctores o residuos de leyes fisicoquímicas garantiza la invariancia termodinámica y supera ampliamente a las arquitecturas empíricas desprovistas de guía teórica.

Simultáneamente, la literatura reciente ha incorporado mecanismos avanzados de atención espectral (Spectral Attention Mechanism, SAM) y modelos de espacio de estados (SSM) para dotar a las redes neuronales de interpretabilidad química y escalabilidad en secuencias largas. Upadhyay & Chaudhary ([17]) demostraron que la autoatención multimodal permite resaltar de manera automática las regiones espectrales ligadas a grupos funcionales específicos, asegurando que las inferencias descansen en transiciones vibracionales químicamente coherentes y no en correlaciones estadísticas no causales. Por su parte, Li et al. ([18]) desarrollaron la arquitectura ASGMamba, probando que los modelos de espacio de estados selectivos capturan dinámicas temporales de largo alcance con una complejidad computacional lineal $\mathcal{O}(L)$, superando la barrera cuadrática $\mathcal{O}(L^2)$ de los Transformers estándar y posibilitando el procesamiento ultrarrápido de espectrogramas longitudinales. Asimismo, los marcos de fusión multimodal analizados por Felizzato et al. ([19]) y las revisiones analíticas sobre control espectral y trazabilidad lipídica de Grundy et al. ([20]) confirman la urgente necesidad de articular matrices espectrales con análisis fisicoquímicos estandarizados.

Para responder a este desafío de manera sistemática, el presente proyecto implementa un benchmark factorial de tres niveles algorítmicos comparativos más un módulo exploratorio:

Nivel de Benchmark	Familia de Modelos	Configuración y Función en el Estudio
Nivel 1: Línea Base	Quimiometría Clásica (Lineal y de Kernel)	PLSR (5 a 12 variables latentes) y Support Vector Regression (SVR con kernel RBF) sobre espectros normalizados con SNV y Savitzky-Golay.
Nivel 2: Deep Learning	Deep Learning Empírico (Optimización Basada en Datos)	1D-CNN con núcleos convolucionales multiescala (3, 7, 15, 31) y cabezal de regresión MLP; entrenamiento guiado por error cuadrático medio.
Nivel 3: PIML	Deep Learning con Física (PINN con Regularización Cinética)	Red neuronal informada por la física donde la función de pérdida penaliza desviaciones respecto a cinéticas de degradación tipo Arrhenius.
Exploración Modular	Modelos de Secuencia & NODEs (LSTM / Mamba / Transformers / NODE)	Screening exploratorio de redes recurrentes (LSTM), modelos Mamba de espacio de estados ([18]), Transformers espectrales ([17]) y Neural ODEs continuas.

5. Metodología de Investigación y Diseño Experimental

5.1 Fase Experimental y Muestreo en Clima Tropical

5.1.1 Variedades de Café Arábica y Certificación en Origen

La investigación se fundamenta en el análisis prospectivo de cuatro variedades representativas y de alto valor agronómico de café arábica colombiano (*Coffea arabica* L.): **Castillo**, **Caturra**, **Colombia** y **Geisha**. Con el fin de garantizar una estricta trazabilidad de origen y homogeneidad pre-experimental, todos los lotes proceden de fincas y cooperativas cafetaleras de alta montaña bajo orígenes agroecológicos estrictamente controlados en los departamentos de Huila, Nariño, Tolima y Cauca, cultivados en cotas altitudinales comprendidas entre los 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.).

El beneficio poscosecha de todos los lotes se homologa mediante el proceso de beneficio húmedo tradicional lavado (despulpado mecánico inmediato, fermentación aeróbica/anaeróbica controlada en tanques durante 18 – 24 horas, lavado con agua pura de manantial y secado solar/parabólico uniforme hasta estabilizar el grano entre un 10,5% y 11,5% de humedad base). Previo al inicio de los ensayos de almacenamiento, cada lote es sometido a un protocolo de evaluación física y sensorial estandarizado conducido por un panel de tres catadores certificados Q-Grader, siguiendo la metodología oficial de la Specialty Coffee Association ([2]). Únicamente se incorporan a la cohorte experimental aquellos lotes que obtienen una calificación sensorial consolidada igual o superior a 85 puntos sobre 100 (≥ 85 , 0 puntos SCA), catalogándose formalmente como cafés especiales premium (**Specialty Coffee**) con perfiles aromáticos complejos, acidez limpia y ausencia de defectos primarios o secundarios.

5.1.2 Régimen de Almacenamiento en Condiciones Ambientales Tropicales Reales

El almacenamiento experimental se desarrolla íntegramente en las instalaciones de bodegaje de la Universidad de Cartagena (Cartagena de Indias, departamento de Bolívar, Colombia), situadas a nivel del mar en la costa caribeña colombiana. Dicha localización geográfica se seleccionó por su representatividad logística y ambiental: Cartagena de Indias constituye el principal nodo portuario y logístico de exportación de café de Colombia hacia la Unión Europea (con arribo habitual a terminales marítimas de Hamburgo, Róterdam y Bremen), compartiendo condiciones macroambientales con los puertos vecinos de Barranquilla y Santa Marta.

Las muestras de café verde en pergamino/almendra se disponen en bodegas de acopio ventiladas pasivamente, expuestas al régimen climático dinámico natural característico del trópico cálido y húmedo caribeño, sin intervención de aire acondicionado ni sistemas de climatización asistida. El grano experimenta fluctuaciones térmicas circadianas naturales en el rango de 26 °C a 36 °C, acopladas a valores de humedad relativa ambiental fluctuantes entre el 70% y el 90%, reproduciendo las condiciones reales de almacenamiento y pre-embarque a las que están expuestos los lotes antes de su consolidación en contenedores de ultramar.

5.1.3 Monitoreo Continuo con Dataloggers Multiparamétricos

El seguimiento ambiental en las áreas de almacenamiento se efectúa de manera continua mediante una red de dataloggers multiparamétricos digitales calibrados (precisión de $\pm 0,3$ °C en temperatura y $\pm 2,0$ % en humedad relativa). Los sensores se distribuyen en el espacio de la bodega y en el interior y superficie de los sacos de café, registrando a intervalos de 15 minutos:

1. **Temperatura ambiental (T):** Registro térmico continuo expresado en grados Celsius (°C) y Kelvin (K).
2. **Humedad relativa del aire (HR):** Medición de la humedad relativa ambiental expresada en porcentaje (%).
3. **Temperatura de punto de rocío ($T_{\text{rocío}}$ o T_{dew}):** Parámetro psicrométrico para detectar condiciones propensas a microcondensación superficial durante oscilaciones térmicas nocturnas.

5.1.4 Diseño Longitudinal Prospectivo y Protocolo de Submuestreo Periódico

El diseño experimental contempla un seguimiento longitudinal periódico durante un periodo ininterrumpido de 6 meses (180 días de almacenamiento continuo). La toma de muestras se realiza en ocho hitos temporales predeterminados: días $t_0 = 0$, $t_1 = 15$, $t_2 = 30$, $t_3 = 60$, $t_4 = 90$, $t_5 = 120$, $t_6 = 150$ y $t_7 = 180$.

En cada hito temporal se extrae una fracción representativa de 500 g de cada lote y variedad mediante un tomamuestras cónico estandarizado acoplado a un protocolo de cuarteo sistemático en cruz, procesando tres réplicas analíticas independientes por punto (4 variedades $\times$ 8 hitos temporales $\times$ 3 réplicas biológicas/analíticas = 96 muestras compuestas). Para neutralizar el impacto del calentamiento mecánico por fricción durante la molienda, las submuestras destinadas a la adquisición espectral y físico-química se someten a molienda criogénica o molienda analítica refrigerada a 4 °C, tamizándose en malla estándar ASTM No. 35 ($< 0,50$ mm) y almacenándose al vacío en viales opacos de vidrio borosilicato sellados con nitrógeno hasta su lectura instrumental inmediata.

Variedad (Coffea arabica)	Origen Geográfico y Altitud	Puntaje SCA Inicial	Condición de Almacenamiento	Diseño Longitudinal de Muestreo
Castillo	Huila (1.650 m s. n. m.)	86,5 puntos	Cartagena (Ambiente natural costero: 26 – 36 °C, 70 – 90% HR)	8 tiempos pos (0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 días) $\times$ 3 réplicas
Caturra	Nariño (1.900 m s. n. m.)	87,0 puntos	Cartagena (Ambiente natural costero: 26 – 36 °C, 70 – 90% HR)	8 tiempos pos (0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 días) $\times$ 3 réplicas
Colombia	Tolima (1.550 m s. n. m.)	85,5 puntos	Cartagena (Ambiente natural costero: 26 – 36 °C, 70 – 90% HR)	8 tiempos pos (0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 días) $\times$ 3 réplicas
Geisha	Cauca (1.850 m s. n. m.)	89,0 puntos	Cartagena (Ambiente natural costero: 26 – 36 °C, 70 – 90% HR)	8 tiempos pos (0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 días) $\times$ 3 réplicas

5.2 Caracterización Físicoquímica Normatizada y Adquisición Espectral ATR-FTIR

5.2.1 Batería Analítica de Referencia bajo Normas Oficiales (Ground Truth)

Con el propósito de suministrar los valores de referencia analítica (**ground truth**) indispensables para entrenar y validar los modelos de aprendizaje automático, cada submuestra es evaluada en los laboratorios de la Universidad de Cartagena mediante cuatro ensayos fisicoquímicos normatizados ejecutados en estricto triplicado:

1. **Acidez Titulable (Norma AOAC 920.92):** Determinación potenciométrica de la acidez total mediante extracción acuosa en caliente: se pesan $10,00 \pm 0,01$ g de muestra de café finamente molido y se suspenden en 100 mL de agua desionizada previamente hervida y desgasificada para eliminar el CO_2 disuelto ([4]). La infusión se mantiene en agitación constante a 90°C durante 15 minutos, se enfría a 20°C y se filtra al vacío. La titulación potenciométrica se efectúa con solución estandarizada de hidróxido de sodio (0,100 N NaOH) bajo monitoreo continuo con electrodo de vidrio combinado calibrado con tampones certificados de pH 4,01, 7,00 y 10,01, alcanzando como punto final un pH de $8,20 \pm 0,02$. Los resultados se reportan en miliequivalentes de NaOH por 100 g de muestra en base seca y como porcentaje equivalente de ácido clorogénico.
2. **Humedad Residual y Actividad de Agua (a_w) (Normas AOAC 968.11 e ISO 6673):** La humedad higroscópica residual se evalúa mediante termogravimetría de pérdida por secado: se colocan 5,000 g de café en pesafiltros metálicos tarados y se someten a desecación isotérmica en estufa de convección forzada a $105 \pm 1^\circ\text{C}$ hasta registrar peso constante (diferencia $< 0,001$ g en dos pesadas sucesivas espaciadas por 1 hora), conforme a las prescripciones de AOAC 968.11 ([7]) e ISO 6673 ([8]). De forma paralela y complementaria, la actividad de agua (a_w) se determina a $25,00 \pm 0,05^\circ\text{C}$ empleando un higrómetro de punto de rocío de espejo enfriado (**chilled-mirror dewpoint sensor**, resolución de 0,0001 a_w y exactitud de $\pm 0,003 a_w$), calibrado periódicamente con disoluciones salinas patrón de NaCl y LiCl.
3. **Índice de Peróxidos Lipídicos (Norma AOAC 965.33):** Cuantificación del deterioro por autooxidación en la fracción grasa del grano: se extraen los lípidos totales mediante maceración en frío con *n*-hexano y éter de petróleo anhidro ($1 : 1 \frac{v}{v}$) en frascos ámbar protegidos de la luz durante 12 horas a 4°C , evitando la termo-oxidación de los diterpenos cafestol y kahweol. Tras la evaporación del solvente a presión reducida en evaporador rotatorio a temperatura inferior a 35°C , se pesan con exactitud 2,000 g de aceite extraído y se disuelven en 30 mL de disolvente mixto ácido acético glacial:cloroformo ($3 : 2 \frac{v}{v}$) ([6]). Se adicionan 0,5 mL de solución saturada de yoduro de potasio (KI), se incuba exactamente 1 minuto en oscuridad total, se añaden 30 mL de agua destilada y se titula el yodo liberado (I_2) con solución valorada de tiosulfato de sodio (0,010 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) empleando solución de almidón al 1% como indicador visual hasta decoloración persistente. El índice de peróxidos (IP) se expresa en miliequivalentes de oxígeno activo por kilogramo de lípido extraído ($\text{meq } \frac{\text{O}_2}{\text{kg lípido}}$).
4. **Polifenoles Totales, Ácido 5-Cafeoilquínico (5-CQA) y Marcadores Térmicos (AOAC 980.23 / Folin-Ciocalteu):** Extracción hidroalcohólica de compuestos fenólicos asistida por baño ultrasónico (20 min a 25°C en metanol:agua $70 : 30 \frac{v}{v}$). La concentración de fenoles totales se cuantifica mediante la reacción colorimétrica de óxido-reducción de Folin-Ciocalteu en medio alcalino alcalinizado con carbonato de sodio (Na_2CO_3 al 7,5% $\frac{m}{v}$), midiendo la absorbancia a 765 nm en espectrofotómetro UV-Vis de doble haz. El contenido se interpola contra una curva de calibración analítica elaborada con estándar ultrapuro de ácido 5-cafeoilquínico (5-CQA, pureza $\geq 98,5\%$, Sigma-Aldrich). Adicionalmente, se ejecuta un barrido espectrofotométrico en la región ultravioleta a 325 nm para el seguimiento directo de ésteres clorogénicos libres y el monitoreo de hidroximetilfurfural (5-HMF) como indicador de degradación térmica y caramelización temprana según los principios de la norma AOAC 980.23.

5.2.2 Protocolo de Adquisición Espectral ATR-FTIR en Infrarrojo Medio

La recolección de las firmas moleculares vibracionales se ejecuta sobre el café molido empleando un espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) equipado con celda de Reflectancia Total Atenuada (ATR) mono-reflexión con cristal de diamante o seleniuro de zinc (ZnSe) de alto índice de refracción y ángulo de incidencia de 45° .

El protocolo de medición comprende las siguientes especificaciones metrológicas y fisicoquímicas:

- **Rango Espectral:** Infrarrojo medio entre 4000 cm^{-1} y 600 cm^{-1} , cubriendo las bandas diagnósticas de tensión lipídica, carbonílica, carboxílica, aromática y de polisacáridos.

- **Resolución Espectral:** 4 cm^{-1} , generando 3528 canales espectrales por muestra tras interpolación y corrección de fase Mertz con función de apodización Happ-Genzel.
- **Número de Barridos:** 64 barridos (**scans**) interferométricos acumulados por cada espectro individual, asegurando una relación señal-ruido ($\text{SNR} > 50.000 : 1$) que minimiza el ruido térmico del detector DLATGS.
- **Replicación Analítica:** Cada muestra compuesta es escaneada en estricto triplicado analítico independiente con recarga completa del portamuestras y aplicación de presión mecánica constante controlada por celda dinamométrica (apriete estandarizado a $80 \pm 2\text{ N}$ sobre el cristal de ATR) para garantizar un contacto íntimo y reproducible entre la matriz granular y la onda evanescente.
- **Sustracción de Fondo Atmosférico y Descontaminación:** Previo a la lectura de cada réplica, se registra un espectro de fondo atmosférico (**air background** con 64 barridos) contra el cristal limpio para sustracción dinámica de vapor de H_2O y CO_2 ambiental. Finalizada cada lectura, la superficie del cristal se limpia de manera sistemática mediante hisopos ópticos impregnados de etanol e isopropanol al 99,9% grado espectroscópico, verificando la ausencia de bandas residuales mediante prueba de transmisión $> 99,5\%$ antes de montar la muestra consecutiva.

Parámetro Analítico	Norma Oficial / Protocolo	Principio Instrumental	Relevancia Cinética y Rango Típico
Acidez Titulable	AOAC 920.92 ([4])	Titulación potenciométrica con NaOH 0,1 N a pH 8,20	Refleja hidrólisis de CGA a ácido quínico libre (1,5 – 4,0 meq/100 g)
Humedad Residual	AOAC 968.11 ([7]), ISO 6673 ([8])	Pérdida por secado en estufa a 105°C	Monitoreo de ganancia higroscópica en ambiente tropical (9,5 – 13,0%)
Actividad de Agua (a_w)	Sensor de espejo enfriado	Higrometría de punto de rocío a 25°C	Indicador termodinámico de proliferación fúngica y Maillard (0,50 – 0,72 a_w)
Índice de Peróxidos	AOAC 965.33 ([6])	Extracción lipídica en frío y titulación iodométrica	Oxidación primaria de lípidos e insaturaciones (0,8 – 15,0 meq $\frac{\text{O}_2}{\text{kg}}$)
Polifenoles y 5-CQA	AOAC 980.23 / Folin-Ciocalteu	Espectrofotometría UV-Vis a 765 nm y 325 nm	Cinética de degradación de antioxidantes clorogénicos (35 – 75 mg/g)
Firma Vibracional	ATR-FTIR mono-reflexión	Absorción en infrarrojo medio ($4000 - 600\text{ cm}^{-1}$)	Monitoreo multivariable no destructivo de bandas moleculares diagnósticas

5.3 Pipeline de Ciencia de Datos, Modelado y Validación Cruzada Rigurosa

5.3.1 Preprocesamiento de Firmas Espectrales Infrarrojas

Las firmas espectrales brutas de café verde presentan perturbaciones ópticas sistemáticas inherentes a la dispersión de luz de partículas no esféricas (**multiplicative scatter**), variaciones locales en la densidad de empaquetamiento y derivas instrumentales de línea base. Para acondicionar los datos previo al modelado, se aplica una secuencia estandarizada de preprocesamiento matemático en Python empleando librerías especializadas (`scikit-learn`, `SciPy`, `chemometrics`):

1. **Corrección de Dispersión por Variable Normal Estándar (SNV):** Cada espectro individual $x = [x_1, x_2, \dots, x_P]^T$ (donde $P = 3528$ canales espectrales) se normaliza centrando por su media y escalando por su desviación estándar:

$$x_{i,\text{SNV}} = \frac{x_i - \bar{x}}{s_x}, \quad \bar{x} = \frac{1}{P} \sum_{j=1}^P x_j, \quad s_x = \sqrt{\frac{1}{P-1} \sum_{j=1}^P (x_j - \bar{x})^2}$$

Este paso elimina las variaciones multiplicativas de camino óptico efectivo causadas por el tamaño de grano de la muestra molida.

2. **Corrección de Deriva de Línea Base (ALS):** Alineación de la línea base espectral mediante el método de Mínimos Cuadrados Penalizados Asimétricos (**Asymmetric Least Squares Smoothing - ALS**), optimizando una función de pérdida que penaliza asimétricamente los residuales positivos frente a los negativos mediante parámetros de peso $p = 0,001$ y coeficiente de suavidad $\lambda = 10^5$, removiendo inclinaciones de fondo sin distorsionar los picos vibracionales.

3. **Filtrado Derivativo de Savitzky-Golay (SG):** Aplicación de diferenciación polinomial local de Savitzky-Golay utilizando un polinomio de segundo orden ajustado en una ventana simétrica móvil de 15 puntos espectrales ($\Delta\nu \approx 14 \text{ cm}^{-1}$). Se evalúan tanto la primera derivada (1^{ra} SG) para eliminar desplazamientos aditivos basales como la segunda derivada (2^{da} SG) para desacoplar dobletes solapados y acentuar las diferencias finas de curvatura en las regiones críticas de carbonilos lipídicos (1745 cm^{-1}), carboxilos libres de degradación (1715 cm^{-1}) y olefinas insaturadas (3008 cm^{-1}).

5.3.2 Benchmark Factorial de Tres Niveles y Arquitecturas Computacionales

El núcleo computacional del proyecto implementa un benchmark factorial comparativo de tres niveles algorítmicos para contrastar de manera rigurosa la quimiometría tradicional frente a arquitecturas modernas de inteligencia artificial:

- **Nivel 1: Línea Base Quimiométrica Clásica (Modelos Lineales y de Kernel)**

- ▶ **Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLSR):** Descomposición simultánea de las matrices espectrales $\mathbf{X}$ y analíticas $\mathbf{Y}$ en factores o variables latentes ortogonales (LVs) maximizando la covarianza mutua mediante el algoritmo SIMPLS. Se barre de 1 a 15 LVs, seleccionando la dimensionalidad óptima mediante el criterio de codo en el error de validación cruzada (RMSECV).
- ▶ **Regresión de Vectores de Soporte (SVR):** Algoritmo basado en programación cuadrática y márgenes suaves con kernel de base radial Gaussiana (RBF: $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \exp(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2)$). Los hiperparámetros de penalización $C \in [10^{-2}, 10^3]$, ancho de banda $\gamma \in [10^{-4}, 10^1]$ y tubo de insensibilidad $\varepsilon \in [10^{-3}, 0, 5]$ se optimizan mediante optimización Bayesiana exhaustiva.

- **Nivel 2: Deep Learning Convolutacional Empírico (1D-CNN Multiescala)**

- ▶ Red neuronal profunda unidimensional diseñada específicamente para la topología continua de datos espectrales ([14]).
- ▶ La arquitectura incorpora cuatro ramas convolucionales paralelas con núcleos receptivos de longitudes diferenciadas ($k_1 = 3$, $k_2 = 7$, $k_3 = 15$ y $k_4 = 31$ canales espectrales), emulando bloques Inception para extraer simultáneamente características locales angostas (picos agudos de enlace éster o aromático) y bandas anchas de dispersión (bandas de asociación puente de hidrógeno de humedad en 3400 cm^{-1}).
- ▶ Cada bloque convolutacional va seguido de normalización por lotes (**Batch Normalization**), activación no lineal GELU (**Gaussian Error Linear Unit**), capas de reducción **MaxPooling 1D** (stride = 2) y capas de desconexión aleatoria regularizadora (**Dropout**, $p = 0, 25$).
- ▶ El vector aplanado de características alimenta un cabezal de regresión de tipo Perceptrón Multicapa (MLP) con dos capas densas de 128 y 64 neuronas con regularización L_2 (weight decay = 10^{-4}), entrenado con el algoritmo AdamW minimizando exclusivamente el error cuadrático medio de los datos ($\mathcal{L}_{\text{datos}} = \text{MSE}$).

- **Nivel 3: Deep Learning Informado por la Física (PINN con Restricciones Cinéticas de Arrhenius)**

- ▶ Arquitectura neuronal físicamente consistente que fusiona la capacidad de representación espectral de las 1D-CNNs con el conocimiento cinético formulado en el marco teórico ([15], [16]).
- ▶ La red se entrena optimizando una función de pérdida multiobjetivo compuesta:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{datos}} + \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{cinética}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{monotonía}}$$

donde:

1. **Pérdida Empírica de Datos:** Error cuadrático frente a los valores observados en las normas oficiales:

$$\mathcal{L}_{\text{datos}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

2. **Pérdida Residual Cinética de Arrhenius:** Penalización de las desviaciones respecto a las ecuaciones diferenciales que gobiernan la degradación de analitos sensibles (p. ej., ácido 5-CQA o lípidos insaturados) en función de la temperatura real $T_{j(t)}$ registrada por los dataloggers:

$$\mathcal{L}_{\text{cinética}} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \left(\frac{d\hat{C}_j}{dt} + k(T_j) \cdot [\hat{C}_j]^n \right)^2, \quad k(T_j) = A_0 \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{R \cdot T_{j(t)}}\right)$$

donde $d\frac{\hat{C}_j}{dt}$ se calcula analíticamente mediante diferenciación automática computacional (**Autograd** de PyTorch), E_a representa la energía de activación aparente, A_0 el factor pre-exponencial y n el orden de reacción.

3. **Pérdida de Monotonía Termodinámica:** Penalización de violaciones cinéticas de conservación de masa y no-reversibilidad espontánea en empaque cerrado:

$$\mathcal{L}_{\text{monotonía}} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M-1} \max(0, \hat{C}_{j+1} - \hat{C}_j)$$

asegurando que metabolitos degradables no exhiban incrementos ficticios de concentración a lo largo de la trayectoria temporal.

- ▶ Los hiperparámetros de penalización λ_1 y λ_2 se calibran adaptativamente durante las épocas de entrenamiento utilizando balance de gradientes por pesos de incertidumbre (**Gradient Normalization** / GradNorm).
- **Exploración Modular Adicional de Modelos de Secuencia y Espacio de Estados:**
 - ▶ Como módulo exploratorio complementario, se evalúan redes recurrentes bidireccionales con celdas de memoria LSTM/GRU, modelos de espacio de estados Mamba para series temporales espectrales continuas (**ASGMamba** [18]), arquitecturas Transformer con mecanismos de atención espectral (**Spectral Attention Mechanisms** - SAM [17]) y Ecuaciones Diferenciales Neuronales continuas (**Neural ODEs** - NODE) para comparar su eficiencia temporal e inductiva frente a la PINN canónica.

5.3.3 Protocolo de Validación Cruzada Rigurosa Anti-Fuga de Datos (Leave-One-Batch-Out)

En quimiometría espectral y aplicaciones agroalimentarias de Deep Learning, el particionamiento aleatorio estándar (**Random K-Fold**) sobreestima la exactitud predictiva. Dado que las lecturas replicadas de un mismo lote comparten correlaciones instrumentales y de origen, una división aleatoria reparte muestras de un mismo lote entre entrenamiento y prueba, incurriendo en fuga de datos (**data leakage**).

Para certificar una evaluación imparcial y traslacional, el proyecto establece como norma metodológica estricta la validación cruzada por grupos estructurada por lote de origen (**GroupKFold** / **Leave-One-Batch-Out** - LOBO):

- En cada partición de validación, la totalidad de los espectros y réplicas pertenecientes a un lote específico o variedad de un departamento de origen se excluyen por completo del conjunto de entrenamiento y se reservan como conjunto de prueba independiente (**test fold**).
- Este procedimiento garantiza que los modelos sean juzgados exclusivamente por su capacidad para generalizar patrones moleculares intrínsecos ante lotes agrícolas, cosechas y orígenes geográficos no observados previamente en la etapa de optimización.

5.3.4 Métricas Estadísticas Cuantitativas de Desempeño

La evaluación del rendimiento analítico de cada arquitectura se cuantifica a través de cuatro métricas estandarizadas en quimiometría:

1. **Coefficiente de Determinación (R^2):** Calculado de forma independiente en calibración (R_{cal}^2), validación cruzada agrupada (R_{cv}^2) y predicción sobre lotes externos (R_{pred}^2):

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}$$

2. **Raíz del Error Cuadrático Medio de Predicción (RMSEP):**

$$\text{RMSEP} = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{test}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{test}}} (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

evaluado en las mismas unidades físicas del analito de referencia (meq/kg, %, mg/g).

3. **Desviación Predictiva Residual (Residual Predictive Deviation, RPD):** Relación adimensional entre la variabilidad intrínseca del conjunto de datos y el error del modelo:

$$RPD = \frac{SD_{\text{referencia}}}{RMSEP} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N_{\text{test}}-1} \sum_{i=1}^{N_{\text{test}}} (y_i - \bar{y})^2}}{RMSEP}$$

Se adoptan los umbrales de rigor analítico estandarizados:

- $RPD < 1,5$: Modelo predictivo no confiable.
- $1,5 \leq RPD < 2,0$: Capacidad de tamizaje o discriminación semicuantitativa preliminar.
- $2,0 \leq RPD < 2,5$: Buen desempeño predictivo para aplicaciones de monitoreo.
- $RPD \geq 2,5$: Excelente capacidad cuantitativa, apta para control analítico oficial e industrial.

4. **Error Porcentual Absoluto Medio (Mean Absolute Percentage Error, MAPE):**

$$MAPE = 100 \frac{\%}{N_{\text{test}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{test}}} \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

5.3.5 Interpretabilidad Espectral Explicable (XAI) y Validación Físicoquímica Causal

Para la adopción de modelos de inteligencia artificial en el sector agroalimentario es fundamental garantizar su interpretabilidad físicoquímica. Con el fin de verificar que las estimaciones se sustenten en bandas espectrales asociadas a analitos reales y no en correlaciones artificiales con el ruido instrumental, el pipeline integra dos metodologías complementarias de explicabilidad espectral (**Explainable Artificial Intelligence - XAI**):

1. **SHAP (SHapley Additive exPlanations):** Se calculan los valores de atribución basados en teoría de juegos cooperativos mediante implementaciones de TreeExplainer para modelos no lineales y DeepExplainer para redes neuronales. Los valores de Shapley φ_j cuantifican la contribución marginal neta que la absorbancia en el número de onda ν_j aporta al desvío de la predicción respecto a la media poblacional.
2. **Grad-CAM 1D (Gradient-weighted Class Activation Mapping):** Se proyectan los gradientes calculados mediante retropropagación sobre los mapas de activación de la última capa convolucional de la 1D-CNN y la PINN:

$$\alpha_k = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \frac{\partial \hat{y}}{\partial A_l^k}, \quad L_{\text{Grad-CAM}}^{1D}(\nu) = \text{ReLU} \left(\sum_k \alpha_k A^{k(\nu)} \right)$$

generando una curva unidimensional de saliencia que ilumina las zonas espectrales a las cuales la red asigna mayor relevancia diagnóstica.

Criterio de Validación Causal Físicoquímica: Los perfiles de atribución de SHAP y los picos de activación de Grad-CAM se contrastan directamente contra las bandas de asignación vibracional determinadas en el marco teórico (Sección 4.3):

- Para el **Índice de Peróxidos**, los picos dominantes de saliencia deben converger en 3008 cm^{-1} (pérdida de dobles enlaces insaturados *cis* de ácidos grasos), 1745 cm^{-1} (estiramiento $\nu(\text{C=O})$ éster) y en la aparición del hombro en 1715 cm^{-1} (formación de hidroperóxidos y aldehídos volátiles).
- Para la **Acidez Titulable**, los pesos deben concentrarse en la banda de carboxilos libres en $1715 - 1695 \text{ cm}^{-1}$ y en la región de enlace $\nu(\text{C-O})$ de ácidos orgánicos en $1250 - 1150 \text{ cm}^{-1}$.
- Para la degradación de **Polifenoles y 5-CQA**, las activaciones neuronales deben asociarse a las vibraciones aromáticas del anillo cafeoil en $1650 - 1600 \text{ cm}^{-1}$ y a los modos combinados de éster quínico en $1380 - 1150 \text{ cm}^{-1}$.
- Para **Humedad y α_w** , la respuesta debe sincronizarse con la banda ancha de tensión $\nu(\text{O-H})$ entre 3400 y 3250 cm^{-1} .

Cualquier arquitectura que exhiba elevados índices métricos (R^2 , RPD) pero asigne pesos salientes a regiones espectralmente inactivas o bandas atmosféricas residuales será rechazada por inconsistencia biofísica.

6. Cronograma de Ejecución y Paquetes de Trabajo (WP1 a WP4) a 12 Meses

El plan de trabajo del proyecto se estructura de forma rigurosa en cuatro paquetes de trabajo (**Work Packages - WP**) interconectados y secuenciales durante un horizonte de ejecución estricto de 12 meses. Esta organización optimiza el aprovechamiento de la infraestructura analítica en Cartagena y la potencia computacional en Degendorf, garantizando la viabilidad de los hitos técnicos y de movilidad.

6.1 Desglose Minucioso de Actividades por Paquete de Trabajo

WP1: Recolección, Acondicionamiento de Muestras, Calibración y Workshop en Cartagena (Meses 1–4)

- **Institución Responsable:** Universidad de Cartagena (UdC) con participación activa de Technische Hochschule Degendorf (DIT).
- **Investigadores Líderes:** Prof. Dr. Ricardo Vivas (UdC) y Prof. Dr. Isabel Suárez (DIT).
- **Actividad 1.1 (Mes 1): Selección botánica, acopio y caracterización inicial:** Adquisición de lotes homogéneos de café especial (*Coffea arabica*) pertenecientes a cultivares de alta relevancia agronómica y comercial (**Castillo, Caturra, Colombia y Geisha**), procedentes de microcuencas de alta montaña en Bolívar y Magdalena. Verificación de pureza varietal y evaluación sensorial preliminar según el protocolo estándar de la Specialty Coffee Association ([2]), seleccionando muestras con puntaje de catación superior a 85 puntos.
- **Actividad 1.2 (Meses 1–2): Acondicionamiento microambiental y metrología:** Preparación de los sistemas de almacenamiento en cámaras de acopio en Cartagena bajo gradiente térmico e higrométrico representativo de climas tropicales cálido-húmedos (25 – 40 °C y 60 – 80% de humedad relativa). Instalación y calibración metrológica de dataloggers multiparamétricos autónomos para registro continuo de temperatura y humedad a intervalos de 15 minutos.
- **Actividad 1.3 (Meses 1–2): Puesta a punto e intercomparación espectrométrica ATR-FTIR:** Calibración de la platina de reflectancia total atenuada (ATR) con cristal de diamante en el espectrómetro de la UdC. Estandarización de parámetros de adquisición: rango medio (4000 – 600 cm^{-1}), 64 barridos acumulados por espectro a resolución óptica de 4 cm^{-1} , sustracción automatizada de fondo atmosférico (CO_2 y vapor de H_2O) y registro de triplicados técnicos por réplica biológica ([10]).
- **Actividad 1.4 (Mes 2): Misión 1 — Visita Senior DIT y Workshop Bilateral en Cartagena:** Estancia presencial de 10 días de la investigadora principal bávara, Prof. Dr. Isabel Suárez, en la Universidad de Cartagena. Impartición del workshop presencial intensivo de 1 semana («**Inteligencia Artificial y Modelado Físico-Químico en Espectroscopía Agroalimentaria**») para investigadores, profesores y estudiantes de posgrado de la UdC. Alineación directa de los protocolos de muestreo químico, estandarización de pipelines de digitalización y transferencia de datos primarios.
- **Actividad 1.5 (Meses 3–4): Consolidación del dataset piloto:** Pruebas preliminares de almacenamiento acelerado a pequeña escala, escaneo espectral inicial y validación de la estabilidad de la señal infrarroja.

Hito H1 (Mes 4)

Protocolo experimental y analítico estandarizado, dataloggers e instrumentación ATR-FTIR calibrados en Cartagena, y base de datos espectral piloto validada conjuntamente tras la ejecución de la Misión 1.

WP2: Monitoreo Longitudinal en Clima Tropical y Analítica Físicoquímica Normatizada (Meses 3–8)

- **Institución Responsable:** Universidad de Cartagena (UdC) con soporte remoto de DIT.
- **Investigador Líder:** Prof. Dr. Ricardo Vivas (UdC), con vinculación de jóvenes investigadores y estudiantes de posgrado.
- **Actividad 2.1 (Meses 3–8): Ensayos longitudinales de envejecimiento en condiciones ambientales:** Muestreo temporal continuo y no destructivo a lo largo de 180 días de almacenamiento bajo fluctuaciones ambientales tropi-

cales naturales del Caribe colombiano, simulando las condiciones reales de bodegaje en origen y tránsito marítimo hacia Europa. Extracción periódica y controlada de alícuotas a intervalos preestablecidos ($t_0, t_1, \dots, t_k$).

- **Actividad 2.2 (Meses 3–8): Barrido espectral sistemático ATR-FTIR:** Adquisición longitudinal de firmas vibracionales de café verde y café tostado molido en triplicado técnico, asegurando la trazabilidad de picos diagnósticos de autooxidación lipídica (1745 cm^{-1}), hidrólisis ácida (1715 cm^{-1}) y decaimiento fenólico ($1600 - 1650 \text{ cm}^{-1}$) ([9]).
- **Actividad 2.3 (Meses 3–8): Batería analítica fisicoquímica normatizada de referencia:**
 1. **Humedad y Actividad de Agua (a_w):** Determinación gravimétrica en estufa a 105°C según AOAC 968.11 [7] e ISO 6673 [8], acoplada a higrómetro de punto de rocío a 25°C .
 2. **Acidez Titulable y pH:** Valoración potenciométrica con solución valorada de NaOH 0,1 M conforme a AOAC 920.92 [4].
 3. **Índice de Peróxidos en Fracción Grasa:** Extracción lipídica por solvente en frío y titulación iodométrica estandarizada según AOAC 965.33 [6] para cuantificar la formación de hidroperóxidos primarios derivados de ácidos grasos insaturados.
 4. **Equivalentes de Ácidos Clorogénicos y Polifenoles Totales:** Microcuantificación espectrofotométrica UV-Vis con reactivo de Folin-Ciocalteu y determinación a 325 nm y 765 nm calibrada contra ácido 5-cafeoilquinico (5-CQA) y derivados furánicos según el método normatizado AOAC 980.23.
- **Actividad 2.4 (Meses 6–8): Preprocesamiento espectral y aseguramiento de calidad:** Aplicación de corrección de dispersión por Variable Normal Estándar (**Standard Normal Variate** - SNV), corrección de línea base y filtrado de derivadas por Savitzky-Golay (polinomio de 2do orden, ventana de 15 puntos). Construcción de la matriz relacional $X_{\text{espectros}} \in \mathbb{R}^{N \times P}$ y $Y_{\text{química}} \in \mathbb{R}^{N \times K}$.

Hito H2 (Mes 8)

Base de datos longitudinal espectro-química completa, curada, normalizada y anonimizada, con cobertura temporal exhaustiva y ensayos analíticos de referencia AOAC/ISO certificados.

WP3: Modelado de Ciencia de Datos, Clústeres GPU y Estancia Bilateral en Deggendorf (Meses 6–11)

- **Institución Responsable:** Technische Hochschule Deggendorf (DIT) en colaboración activa con la UdC.
- **Investigadora Líder:** Prof. Dr. Isabel Suárez (DIT), con participación del joven investigador de la UdC.
- **Actividad 3.1 (Meses 6–8): Formulación e implementación del benchmark factorial de tres niveles:**
 - **Nivel 1 (Quimiometría clásica):** Calibración de modelos lineales de Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLSR, 5 a 12 variables latentes) y Regresión de Vectores de Soporte (SVR con kernel Gaussiano RBF).
 - **Nivel 2 (Deep Learning empírico):** Diseño de redes convolucionales unidimensionales (1D-CNN) con módulos de convolución multiescala ($k \in \{3, 7, 15, 31\}$) y normalización por lotes ([14]), junto con la exploración de modelos de atención multimodal ([17]) y modelos de espacio de estados (Mamba / ASGMamba [18]).
 - **Nivel 3 (Deep Learning informado por la física - PINN):** Implementación en PyTorch de arquitecturas neuronales informadas por cinética fisicoquímica, donde la función de pérdida optimiza:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda_1 \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \left(\frac{d\hat{C}_j}{dt} + k_j(T)\hat{C}_j \right)^2 + \lambda_2 \mathcal{R}_{\text{termo}}$$

restringiendo las trayectorias de degradación de ácidos clorogénicos según la ley cinética de primer orden de Arrhenius $k(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$ y forzando monotonía termodinámica bajo balance de masa estricto ([15], [16]).

- **Actividad 3.2 (Meses 7–9): Entrenamiento de alto rendimiento en clústeres GPU:** Despliegue de scripts de entrenamiento distribuido en el clúster de supercómputo GPU del Campus de IA de Deggendorf, optimizando paralelismo de datos y búsqueda bayesiana de hiperparámetros.
- **Actividad 3.3 (Meses 8–9): Misión 2 — Estancia de investigación de 2 semanas del joven investigador de la UdC en Deggendorf:** Movilidad académica transatlántica de dos semanas completas (14 días / 14 noches) de un

joven investigador del grupo de la UdC en el Campus de IA de la DIT. Capacitación práctica intensiva en entrenamiento de redes PINN sobre clústeres GPU, herramientas de explicabilidad en IA (Grad-CAM, SHAP), análisis de sensibilidad y co-redacción técnica de la propuesta DFG-Minciencias.

- **Actividad 3.4 (Meses 9–11): Validación cruzada agrupada e interpretabilidad explicable (XAI):** Protocolo de validación **Leave-One-Batch-Out** (GroupKFold) para descartar fuga de información inter-lote. Mapeo de atribución espectral (Grad-CAM e Integrated Gradients) verificando que las activaciones de la red converjan en las frecuencias diagnósticas del café (1745, 1715, 1600 – 1650 cm^{-1}).

Hito H3 (Mes 9)

Arquitectura híbrida óptima seleccionada mediante análisis multicriterio (precisión RMSE/R^2 , fidelidad fisicoquímica y explicabilidad XAI), consistencia espectral validada y estancia de la Misión 2 concluida exitosamente.

WP4: Síntesis Bilateral, Publicaciones Conjuntas Q1, Informe Final y Proyecto DFG (Meses 10–12)

- **Institución Responsable:** Consorcio Conjunto DIT – UdC (co-liderazgo de Prof. Suárez y Prof. Vivas).
- **Actividad 4.1 (Meses 10–11): Taller de síntesis bilateral e integración de resultados:** Sesiones bilaterales de trabajo en formato híbrido para consolidar los análisis comparativos entre la química clásica de degradación y el modelado neuronal de física informada.
- **Actividad 4.2 (Meses 10–12): Redacción y sometimiento de dos artículos científicos Q1:**
 - **Manuscrito 1 (Enfoque Químico-Analítico):** «Longitudinal ATR-FTIR tracking and kinetic degradation mechanisms of specialty Coffea arabica in tropical storage environments», dirigido a **Food Chemistry** o **Food Research International**.
 - **Manuscrito 2 (Enfoque Computacional e IA):** «Physics-Informed Neural Networks and Spectral State-Space Models for Non-Destructive Freshness Trajectory Forecasting in Specialty Agri-Foods», dirigido a **Computers and Electronics in Agriculture** o **IEEE Transactions on AgriFood Electronics**.
- **Actividad 4.3 (Meses 11–12): Elaboración y entrega del informe final BAYLAT:** Consolidación técnica, contable y documental de todas las actividades ejecutadas, comprobación de gastos según directrices del sistema OASys y presentación del informe de cierre científico.
- **Actividad 4.4 (Meses 11–12): Formulación y radicación de la propuesta a gran escala DFG-Minciencias:** Elaboración integral del proyecto de investigación conjunto para la convocatoria bilateral DFG (Alemania) – Minciencias (Colombia) con un horizonte de financiación de 3 años, expandiendo la plataforma a nuevas matrices de biodiversidad y metabolómica avanzada.

Hito H4 (Mes 12)

Informe final técnico-financiero aprobado por BAYLAT, dos artículos en revistas científicas Q1 remitidos a revisión por pares y propuesta de gran escala DFG-Minciencias formalmente radicada.

6.2 Cronograma Mensual de Ejecución e Hitos Operativos

La siguiente matriz detalla la distribución temporal de los paquetes de trabajo, la asignación institucional y la sincronización de los hitos a lo largo de los 12 meses de duración del proyecto:

Paquete	Actividad Operativa	Líder	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Hito Clave
WP1: Preparación y Misión 1	1.1 Acopio y caracterización SCA café especial	UdC	x												
	1.2 Acondicionamiento y dataloggers tropicales	UdC	x	x											

Paquete	Actividad Operativa	Líder	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Hito Clave
	1.3 Estandarización instrumental ATR-FTIR	UdC	x	x											
	1.4 Misión 1: Workshop IA presencial Cartagena	DIT		x											M1 en Mes 2
	1.5 Ensayos piloto y dataset de calibración	UdC/ DIT			x	x									H1 (Mes 4)
WP2: Monitoreo y Analítica	2.1 Almacenamiento longitudinal tropical (180 d)	UdC			x	x	x	x	x	x					
	2.2 Barridos espectrales continuos ATR-FTIR	UdC			x	x	x	x	x	x					
	2.3 Batería analítica AOAC (humedad, peróxidos, CGA)	UdC			x	x	x	x	x	x					
	2.4 Preprocesamiento y curaduría de la base de datos	UdC/ DIT						x	x	x					H2 (Mes 8)
WP3: Modelado y Misión 2	3.1 Formulación benchmark 3 niveles (PLSR/CNN/PINN)	DIT						x	x	x					
	3.2 Entrenamiento distribuido clústeres GPU	DIT							x	x	x				
	3.3 Misión 2: Estancia 2 semanas Deggendorf	UdC								x	x				M2 en Mes 8–9
	3.4 Validación Leave-One-Batch e Interpretabilidad XAI	DIT/ UdC									x	x	x		H3 (Mes 9)
WP4: Síntesis y DFG	4.1 Taller bilateral de síntesis e integración	DIT/ UdC										x	x		
	4.2 Redacción de 2 artículos científicos Q1	DIT/ UdC										x	x	x	
	4.3 Elaboración y radicación de informe final BAYLAT	DIT/ UdC											x	x	
	4.4 Formulación y radicación propuesta DFG-Minciencias	DIT/ UdC											x	x	H4 (Mes 12)

7. Cooperación Bilateral, Plan de Movilidad y Presupuesto BAYLAT

7.1 Sinergia Científica e Institucional (UdC – DIT)

La cooperación bilateral formalizada en esta propuesta capitaliza una complementariedad disciplinaria e institucional de alto nivel entre Baviera y Colombia, donde ninguna de las dos partes podría alcanzar los objetivos propuestos actuando de forma aislada:

- **Universidad de Cartagena (UdC, Colombia) — Liderazgo Químico-Experimental:** A través del grupo de investigación liderado por el Prof. Dr. Ricardo Vivas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la UdC aporta más de dos décadas de excelencia en la caracterización fitoquímica de recursos naturales tropicales, química de lípidos y polifenoles, y control analítico normatizado de alimentos. La UdC dispone de laboratorios con espectrómetros FTIR de investigación, infraestructura para determinaciones fisicoquímicas estandarizadas (AOAC/ISO), vínculos directos con federaciones y cooperativas de caficultores de la región Caribe y Andina, y la capacidad logística para ejecutar estudios de vida útil bajo condiciones ambientales tropicales reales.
- **Technische Hochschule Deggendorf (DIT, Alemania) — Liderazgo en IA Aplicada y Supercómputo:** A través del Campus de IA y la Facultad de Informática Aplicada, bajo la dirección de la Prof. Dr. Isabel Suárez, la DIT es un centro de referencia en Baviera para la investigación algorítmica aplicada. La DIT aporta clústeres de cómputo con GPUs para deep learning, experiencia en el desarrollo de redes neuronales informadas por principios físicos (PINN),

modelos de espacio de estados para series temporales (Mamba SSM) y técnicas de explicabilidad algorítmica (XAI) para espectroscopía agroalimentaria.

Esta complementariedad cierra la brecha existente entre la recolección empírica de datos espectrales en zonas de producción tropicales y el modelado computacional avanzado en Baviera, capacitando a su vez a investigadores en una plataforma bioinformática especializada.

7.2 Plan de Movilidad Transatlántica y Formación de Investigadores

Para materializar la transferencia tecnológica y la cohesión científica del consorcio, el plan de movilidad se articula en dos misiones presenciales estratégicas:

Misión 1: Investigadora Senior DIT a Cartagena de Indias (10 Días, Mes 2)

- **Participante:** Prof. Dr. Isabel Suárez (Líder científica y solicitante principal DIT).
- **Itinerario y Duración:** Múnich (MUC) – Cartagena (CTG) – Múnich (MUC); estancia de 10 días y 10 noches durante el Mes 2.
- **Objetivos Académicos y Técnicos:**
 1. Impartir el workshop presencial intensivo de 1 semana «**Inteligencia Artificial y Modelado Físico-Químico en Espectroscopía Agroalimentaria**», capacitando a investigadores, docentes y al menos a 15 estudiantes de posgrado de la UdC en arquitecturas PINN, procesamiento de tensores y quimiometría espectral.
 2. Inspeccionar in situ los laboratorios de la UdC, verificar la calibración metrológica del espectrómetro ATR-FTIR y de los dataloggers en las bodegas tropicales de café.
 3. Establecer el protocolo conjunto de curaduría, metadatos y almacenamiento seguro en la nube para la transferencia continua de datos espectrales hacia Deggendorf.

Misión 2: Joven Investigador de la UdC al Campus de IA de Deggendorf (Estrictamente 2 Semanas / 14 Días / 14 Noches, Meses 8–9)

- **Participante:** Investigador joven en etapa de formación doctoral o de maestría adscrito al grupo de investigación del Prof. Dr. Ricardo Vivas (UdC).
- **Itinerario y Duración:** Cartagena (CTG) – Múnich (MUC) – Deggendorf; estancia programada de Estrictamente DOS SEMANAS (14 DÍAS / 14 NOCHES) entre los Meses 8 y 9.
- **Objetivos Académicos y Técnicos:**
 1. Entrenamiento inmersivo en el clúster GPU del Campus de IA de la DIT bajo la tutoría directa de la Prof. Suárez, dominando entornos de trabajo en PyTorch y JAX para optimización de funciones de pérdida acopladas a ecuaciones de Arrhenius.
 2. Ejecución de los scripts de benchmark factorial sobre la base de datos longitudinal completa remitida desde Cartagena y cálculo de mapas de atribución Grad-CAM y SHAP sobre las bandas diagnósticas.
 3. Participar en la estructuración de los paquetes de trabajo computacionales del proyecto mayor bilateral a postular ante la DFG y Minciencias.

7.3 Presupuesto Consolidado de la Cooperación BAYLAT

El presupuesto se ciñe de manera estricta y transparente a las directrices de financiamiento inicial (**Anschubfinanzierung**) de BAYLAT, cumpliendo rigurosamente con los límites normativos de cada rubro y situándose por debajo del techo financiero máximo (**Förderhöchstsatz**) de 8.000 €:

- **Vuelos Transatlánticos (Clase Económica con Reserva Anticipada):**
 - Misión 1 (Prof. Dr. Isabel Suárez: Múnich – Cartagena – Múnich): 1.450 €.
 - Misión 2 (Joven Investigador UdC: Cartagena – Múnich – Cartagena): 1.500 €.
 - Subtotal Vuelos: 2.950 €.
- **Gastos de Alojamiento:**
 - Misión 1: 10 noches en Cartagena a 110 €/noche = 1.100 €.
 - Misión 2: 14 noches en Deggendorf (residencia universitaria / casa de huéspedes DIT) a 55 €/noche = 770 €.
 - Subtotal Alojamiento: 1.870 €.
- **Viáticos Diarios / Dietas de Subsistencia (Según Normativa BayRKG / DAAD):**

- ▶ Misión 1: 10 días de estancia en Colombia a 50 €/día = 500 €.
- ▶ Misión 2: 14 días de estancia en Alemania a 45 €/día = 630 €.
- ▶ Subtotal Viáticos: 1.130 €.
- **Seguro Médico Internacional de Viaje y Accidentes (Tope BAYLAT de 100 € por persona):**
 - ▶ Misión 1: 100 €.
 - ▶ Misión 2: 100 €.
 - ▶ Subtotal Seguro: 200 €.
- **Gastos de Organización del Workshop Presencial en Cartagena:**
 - ▶ Alquiler de soporte logístico, material impreso de trabajo y refrigerios/catering para los participantes del curso intensivo en la UdC: 450 €.
- **Subtotal Movilidad Bilateral y Eventos Presenciales:**
 - ▶ Total Misión 1 (DIT -> UdC): 1.450 € + 1.100 € + 500 € + 100 € + 450 € = **3.600 €**.
 - ▶ Total Misión 2 (UdC -> DIT, 14 días): 1.500 € + 770 € + 630 € + 100 € = **3.000 €**.
 - ▶ Subtotal Movilidades (Misión 1 + Misión 2): **6.600 €**.
- **Materiales de Laboratorio Fungibles (Tope de Convocatoria BAYLAT):**
 - ▶ Reactivos analíticos de referencia, solventes y patrones de ácido 5-cafeoilquínico para ensayos de envejecimiento acelerado de café en laboratorio: **600 €** (tope máximo permitido por la normativa de financiamiento inicial de BAYLAT).
- **Medios Digitales y Difusión Técnica:**
 - ▶ Accesorios de hardware audiovisual para transmisión híbrida en alta definición del workshop y licencias de colaboración técnica en línea: **150 €**.
- **Monto Total Solicitado a BAYLAT:** 3.600 € + 3.000 € + 600 € + 150 € = **7.350 €**. Este valor resulta estrictamente inferior al techo financiero de 8.000 € autorizado por el programa de financiamiento inicial de BAYLAT.

Rubro Presupuestal	Misión 1 (DIT -> UdC)	Misión 2 (UdC -> DIT)	Otros Gastos	Total (€)	Base de Cálculo y Justificación Nor- mativa
Pasajes aéreos transatlánticos	1.450 €	1.500 €	-	2.950 €	Vuelos internacionales MUC-CTG y CTG-MUC en clase económica con tarifa reducida
Gastos de alojamiento	1.100 €	770 €	-	1.870 €	10 noches a 110 € (Cartagena) / 14 noches a 55 € (residencia DIT Degendorf)
Viáticos y dietas de subsistencia	500 €	630 €	-	1.130 €	10 días a 50 €/día (Colombia) / 14 días a 45 €/día (Alemania) según BayRKG
Seguro médico internacional	100 €	100 €	-	200 €	Póliza internacional de salud y accidentes (tope normativo de 100 € por persona)
Logística y catering workshop	450 €	-	-	450 €	Material didáctico, equipos audiovisuales y refrigerios de workshop en UdC
Materiales fungibles laboratorio	-	-	600 €	600 €	Reactivos y patrones puros de 5-CQA para cinética (tope máx. de 600 € en BAYLAT)
Medios digitales y licencias	-	-	150 €	150 €	Periféricos para streaming híbrido del workshop y soporte telemático
Total Presupuesto Solicitado	3.600 €	3.000 €	750 €	7.350 €	Monto total solicitado a BAYLAT (estrictamente inferior al tope de 8.000 €)

8. Proyección Estratégica: Escalabilidad a la Convocatoria Bilateral DFG - Minciencias

8.1 Hoja de Ruta para la Postulación Conjunta DFG - Minciencias (3 Años)

El financiamiento semilla otorgado por BAYLAT actúa como una herramienta catalizadora estratégica orientada a la eliminación sistemática de riesgos técnicos y metodológicos (**de-risking**). Las principales agencias de fomento a la investigación internacional de gran envergadura, en particular la Fundación Alemana para la Investigación (**Deutsche Forschungsgemeinschaft** - DFG) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (**Minciencias**), exigen en sus convocatorias bilaterales la existencia demostrada de una sólida trayectoria de cooperación interinstitucional, protocolos analíticos previamente armonizados y datos piloto empíricos reproducibles.

Durante los Meses 11 y 12 del presente proyecto, el equipo conjunto DIT – UdC redactará y radicará una propuesta de investigación colaborativa trianual (**36 meses**) bajo el esquema **DFG-Minciencias Bilateral Research Grants**. Dicho proyecto de gran escala contará con los siguientes pilares estructurales:

1. **Consorcio Científico Ampliado:** Consolidación de un grupo interdisciplinario binacional con intercambio de investigadores posdoctorales y codirección formal de tesis doctorales (**Cotutelle de Thèse**) entre la DIT y programas doctorales colombianos.
2. **Financiamiento Trianual de Gran Escala:** Solicitud presupuestal estimada en aproximadamente 350.000 € ante la DFG (para posiciones de investigadores en Baviera, tiempo de supercómputo y analítica metabolómica avanzada) y un presupuesto equivalente en pesos colombianos ante Minciencias (para personal técnico, trabajo de campo en regiones productoras y dotación de laboratorio en la UdC).
3. **Cronograma Estratégico de Radicación:** Presentación de la propuesta integral en la ventanilla anual bilateral de la DFG y Minciencias durante el Mes 12, garantizando la continuidad inmediata de la alianza científica una vez finalizado el financiamiento inicial BAYLAT.

8.2 Escalamiento hacia Matrices Agroalimentarias Estratégicas de la Biodiversidad Colombiana

El marco metodológico fundamentado en física informada (PIML), validado rigurosamente en café especial (**Coffea arabica**) durante la fase BAYLAT, será transferido y adaptado en la propuesta DFG-Minciencias hacia otras tres matrices agroalimentarias de altísimo valor comercial, ecológico y social en Colombia:

1. **Cacao Fino de Aroma** (*Theobroma cacao* L.): Colombia es reconocido por la ICCO como productor de cacao fino y de aroma, un cultivo estratégico para la sustitución de cultivos de uso ilícito en zonas de posconflicto. En el proyecto ampliado se modelará la cinética de autooxidación lipídica de la manteca de cacao (degradación de triglicéridos insaturados) y la degradación térmica de flavonoides antioxidantes (monómeros de epicatequina, catequina y procianidinas oligoméricas) durante el almacenamiento de grano seco y licor de cacao, acoplando bandas infrarrojas a índices de acidez y peróxidos normatizados.
2. **Miel de Abejas Artesanal** (*Apis mellifera*): Matriz dulce no fermentada producida por apicultores en agroecosistemas del bosque seco tropical del Caribe y vertientes andinas. El modelo de física informada incorporará cinéticas multivariantes para predecir la acumulación de 5-hidroxi-2-metilfurfural (5-HMF) según el ensayo normatizado AOAC 980.23, la inactivación térmica de enzimas sensibles (diastasa e invertasa) y la cinética higroscópica que induce fermentaciones indeseadas por levaduras osmofílicas.
3. **Aceite Virgen de Coco** (*Cocos nucifera*): Producto líder de bioeconomía costera en comunidades del litoral Caribe y Pacífico colombiano. El modelado abordará la lipólisis hidrolítica y la formación de hidroperóxidos primarios y compuestos carbonílicos secundarios volátiles (enlace éster en 1745 cm^{-1} y peróxidos según AOAC 965.33), preservando las propiedades nutraceuticas de los triglicéridos de cadena media (ácido láurico C12:0).

Matriz Agroalimentaria	Especie Botánica	Marcadores Moleculares Críticos	Análítica Normatizada de Referencia
Café Especial Lavado	Coffea arabica	Decaimiento de 5-CQA, peroxidación de lípidos diterpénicos y acidez libre	AOAC 965.33, AOAC 920.92, AOAC 968.11, ISO 6673
Cacao Fino de Aroma	Theobroma cacao	Oxidación de epicatequina, lipólisis de manteca y pérdida de metilxantinas	Folin-Ciocalteu UV-Vis, acidez titulable de grasa, AOAC 965.33
Miel de Abejas Artesanal	Apis mellifera	Generación de 5-HMF, actividad diastásica y decaimiento de azúcares reductores	Espectrofotometría UV-Vis AOAC 980.23, conductividad eléctrica

Matriz Agroalimentaria	Especie Botánica	Marcadores Moleculares Críticos	Análítica Normalizada de Referencia
Aceite Virgen de Coco	Cocos nucifera	Hidrólisis de triacilglicerolos de cadena media (ácido láurico) y peróxidos	Índice de peróxidos AOAC 965.33, acidez libre de lípidos, dienos conjugados

8.3 Integración de Metabolómica Cromatográfica Avanzada (LC-HRMS y GC-MS)

Mientras que el financiamiento inicial BAYLAT sienta las bases mediante espectroscopía rápida ATR-FTIR de bajo costo acoplada a química húmeda convencional, la fase de escalamiento con la DFG y Minciencias integrará plataformas cromatográficas de alta resolución para la caracterización y cuantificación detallada de los productos intermedios de degradación:

- **Metabolómica No Dirigida por LC-HRMS (Q-TOF / Orbitrap):** Permite la detección, elucidación estructural y cuantificación absoluta de metabolitos secundarios minoritarios, polifenoles conjugados, derivados de ácidos cafeoilquínicos y productos avanzados de glicación/oxidación en las cuatro matrices.
- **Perfilado de Volátiles por HS-SPME-GC-MS:** Monitoreo de la fracción volátil del aroma (pirazinas, ésteres aromáticos, terpenos) y de marcadores tempranos de rancidez y añejamiento (hexanal, nonanal, octen-3-ol y furanos).
- **Fusión de Datos Multinivel e Interpretabilidad Mecanicista:** Los perfiles cromatográficos de alta resolución se emplearán para anclar y parametrizar los términos cinéticos mecanísticos de las PINNs, correlacionando picos vibracionales FTIR con identidades químicas inequívocas mediante técnicas de fusión de datos (**low-level, mid-level y high-level data fusion** [19]).

Referencias Bibliográficas

- [1] Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, «Comportamiento de la producción y exportación del café colombiano: Informe de sostenibilidad y estadísticas cafeteras», Bogotá, Colombia, technical report, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://federaciondecafeteros.org/>
- [2] Specialty Coffee Association, «SCA Cupping Protocols and Specialty Coffee Grading Standards». Santa Ana, CA, USA, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://sca.coffee/research/protocols-best-practices>
- [3] A. Farah, «Coffee Constituents», en *Coffee: Emerging Health Effects and Disease Prevention*, Y.-F. Chu, Ed., Oxford, UK: John Wiley & Sons, Inc., 2012, pp. 21-58. doi: 10.1002/9781119949893.ch2.
- [4] AOAC International, *Official Method 920.92: Acidity (Titratable) of Coffee*. Rockville, MD, USA: AOAC International, 2023.
- [5] R. A. Buffo y C. Freire, «Coffee flavour: an overview», *Flavour and Fragrance Journal*, vol. 19, n.º 2, pp. 99-104, 2004, doi: 10.1002/ffj.1325.
- [6] AOAC International, *Official Method 965.33: Peroxide Value of Oils and Fats*. Rockville, MD, USA: AOAC International, 2023.
- [7] AOAC International, *Official Method 968.11: Moisture in Coffee and Tea*. Rockville, MD, USA: AOAC International, 2023.
- [8] International Organization for Standardization, *ISO 6673: Green coffee — Determination of loss in mass at 105 degrees C*. Geneva, Switzerland: ISO, 2003.
- [9] L. Manzocco y M. C. Nicoli, «Predicting the shelf-life of coffee: Modeling chemical and physical quality changes», *Current Opinion in Food Science*, vol. 33, pp. 74-80, 2020, doi: 10.1016/j.cofs.2020.02.004.
- [10] J. S. Ribeiro, M. M. C. Ferreira, y T. J. G. Salva, «Chemometric models for the quantitative analysis of coffee blends using diffuse reflectance infrared spectroscopy (DRIFTS)», *Food Chemistry*, vol. 124, n.º 3, pp. 1170-1175, 2011, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.07.039.
- [11] V. Boadu, «Developing a novel onsite detection technology by using chemometrical analysis of hand-held near-infrared sensor technique for assessing coffee quality», *Unknown journal*, 2024.
- [12] L. Feng, B. Wu, S. Zhu, Y. He, y C. Zhang, «Application of Visible/Infrared Spectroscopy and Hyperspectral Imaging With Machine Learning Techniques for Identifying Food Varieties and Geographical Origins», *Frontiers in Nutrition*, vol. 8, jun. 2021, doi: 10.3389/fnut.2021.680357.

-
- [13] S. Widiarto, L. Zakaria, S. H. Jamal, D. S. Pratama, y I. Saputra, «Detection of Adulteration in Coffee Products Using FTIR Spectroscopy and Multivariate Analysis», *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*, vol. 29, n.º 4, pp. 296-305, abr. 2026, doi: 10.14710/jksa.29.4.296-305.
- [14] D. Passos, «Convolutional neural networks in Vis–NIR chemometrics: From contradiction to conditional design», *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, vol. 203, p. 119015, oct. 2025, doi: 10.1016/j.trac.2026.119015.
- [15] P. Perré, «Toward mechanistic models “augmented” by machine learning. Example of a drying simulation data set exploited by a Physics Informed Neural Network», *Drying Technology*, vol. 43, n.º 1–2, pp. 147-161, oct. 2025, doi: 10.1080/07373937.2024.2411582.
- [16] M. Pronk y B. W. Anthony, «Neural-network placement in physics-informed machine learning for mechanistic process-model repair: a case study in industrial coffee roasting», *Scientific Reports*, sep. 2026, doi: 10.1038/s41598-026-67034-7.
- [17] A. Upadhyay y N. Chaudhary, «Enhancing spectral analysis of ghee adulteration via a deep learning-based multimodal attention mechanism», *Scientific Reports*, vol. 16, n.º 1, may 2026, doi: 10.1038/s41598-026-48661-6.
- [18] Q.-Y. Li, X. Zhang, S.-X. Wang, J. Wei, y Y. Xing, «ASGMamba: Adaptive Spectral Gating Mamba for Multivariate Time Series Forecasting», *ArXiv*, vol. abs/2602.01668, feb. 2026, doi: 10.48550/arxiv.2602.01668.
- [19] G. Felizzato, E. Bagnulo, A. Guglielmetti, y C. Bortolini, «Data Fusion for the Food Industry: Leveraging Machine Learning and Deep Learning Algorithms», *Unknown journal*, 2025.
- [20] H. H. Grundy, H. J. Hird, V. Bailey-Horne, M. Sykes, y A. Charlton, «Review of Current and Emerging Analytical Methods for the Testing of Edible Oil for Authenticity», *FSA Research and Evidence*, oct. 2025, doi: 10.46756/001c.145026.