



# BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

---

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

## TESIS

### DESAROLLO DE SOFTWARE CIENTÍFICO PARA EL CÁLCULO ESPECIALIZADO DE ENTALPÍAS DE FORMACIÓN

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN QUÍMICA

PRESENTA:

ÉDGAR GARCÍA JUÁREZ

DIRECTOR DE TESIS:

DR. JUAN MANUEL SOLANO ALTAMIRANO

ASESOR DE TESIS:

DR. JULIO MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, 2022



*IN MEMORIAM*

*Norma Juárez Loeza*

*Mí madre, venerada hasta la eternidad*

*[...] Le aflojé su eterna bufanda dorada, le humedecí las sienes, le dí de beber y no me atreví a preguntar más. Me miró gravemente, rodeándome el cuello con sus brazos. Sentí el latido de su corazón, era como el de un pajarillo herido [...]*

*[...] Le estreché entre mis brazos como si fuera un niño pequeño. No obstante, al ver que su mirada se perdía en la lejanía, sentí como si se me escurriera en un abismo, sin poder hacer nada para detenerlo [...]*

*[...] Me quedé helado por la sensación de algo irreparable y comprendí lo difícil que sería no volver a oír aquella risa que era para mí, como una fuente en el desierto [...]*

*[...] Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo [...]*

***El principito***  
***Antoine de Saint-Exupéry***

*I dreamt that I was going to be executed. I suddenly, realized that  
there are a lot of worthwhile things to do, if I were reprieved.*

***Stephen Hawking***

# Agradecimientos

A mi familia, asesores y amigos:

Por dedicar gran parte de su tiempo, esfuerzo y paciencia a mi formación académica y personal.

# Índice general

<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
<b>2. Objetivo y Justificación</b>	<b>6</b>
2.1. Objetivos . . . . .	6
2.1.1. Objetivo General . . . . .	6
2.1.2. Objetivos Particulares . . . . .	6
2.2. Justificación . . . . .	7
<b>3. Marco teórico</b>	<b>8</b>
3.1. Energía . . . . .	8
3.2. Entalpía de reacción . . . . .	9
3.3. Calorimetría . . . . .	10
3.4. Entalpía de formación estándar . . . . .	10
3.5. Ley de Hess . . . . .	12
3.6. Química computacional . . . . .	14
3.7. Métodos Gaussianos . . . . .	15
3.8. Métodos CBS . . . . .	17
3.9. Comparacion entre métodos . . . . .	18

## ÍNDICE GENERAL

---

3.10. Método de atomización . . . . .	19
3.11. Relaciones Generales de Termodinámica Estadística . . . . .	25
3.11.1. Función de partición . . . . .	26
3.11.2. Funciones termodinámicas . . . . .	27
3.11.3. Cálculos prácticos . . . . .	27
3.11.4. Función de partición traslacional . . . . .	28
3.11.5. Función de partición rotacional . . . . .	28
3.11.6. Función de partición vibracional . . . . .	29
3.11.7. Función de partición electrónica . . . . .	30
3.11.8. Cálculo de entalpía mediante Termodinámica Estadística . . . . .	30
3.12. Aproximación de Nicolaides y otros autores . . . . .	30
3.13. Hardware y software . . . . .	31
3.14. Lenguajes . . . . .	32
3.14.1. Lenguajes máquina . . . . .	32
3.14.2. Lenguajes ensambladores . . . . .	32
3.14.3. Lenguajes de alto nivel . . . . .	32
3.15. Una breve introducción a C++ . . . . .	33
3.15.1. Alcance de C++ en el ámbito científico . . . . .	33
3.15.2. C++ y la programación orientado a objetos . . . . .	35
<b>4. Resultados y discusión</b>	<b>37</b>
4.1. Algoritmo (diseño del programa) . . . . .	37
4.1.1. Inicio . . . . .	39
4.1.2. Paso 1 del diagrama de flujo general . . . . .	40
4.1.3. Paso 2 del diagrama de flujo general . . . . .	41
4.1.4. Paso 3 del diagrama de flujo general . . . . .	41



## ÍNDICE GENERAL

---

4.1.5. Paso 4 del diagrama de flujo general . . . . .	42
4.1.6. Paso 5 del diagrama de flujo general . . . . .	43
4.1.7. Paso 6 del diagrama de flujo general . . . . .	43
4.1.8. Paso 7, 8 y 9 del diagrama de flujo general . . . . .	44
4.1.9. Paso 10 del diagrama de flujo general . . . . .	46
4.1.10. Paso 11 del diagrama de flujo general . . . . .	46
4.2. Código . . . . .	47
4.3. Conjunto de pruebas . . . . .	49
4.3.1. Conjunto de pruebas: 2NBA, 3NBA y 4NBA . . . . .	50
<b>5. Conclusión</b>	<b>65</b>
<b>A. Funcionamiento del programa</b>	<b>66</b>
<b>B. Programas adicionales</b>	<b>70</b>
B.1. EnthalpyNIST . . . . .	70
B.2. EnthalpyTajti . . . . .	71
B.3. EnthalpyArgonne . . . . .	71
<b>Referencias</b>	<b>72</b>

# Índice de figuras

3.1. Diagrama de la entalpía de formación de monóxido de carbono. . . . .	14
3.2. Diagrama de entalpía de atomización de metanol. . . . .	21
4.1. Diagrama de flujo general . . . . .	38
4.2. Molécula de metanol, utilizada para explicar el diagrama de flujo general. . . .	39
4.3. Estructuras moleculares del 2-nitrobenzaldehído (2NBA), 3-nitrobenzaldehído (3NBA) y 4-nitrobenzaldehído (4NBA). . . . .	50

# Índice de tablas

3.1. La entalpía de formación aceptada en la literatura es de $-122. \pm 3.8 \text{ kJ mol}^{-1}$ [1].	19
3.2. Entalpías de formación experimentales reportadas por Nicolaides y otros autores [2]. . . . .	21
3.3. Entalpías de formación a $T = 0 \text{ K}$ obtenidas por el método G4 de Gaussian09. .	22
3.4. Entalpías experimentales de los elementos reportadas por Nicolaides y otros autores [2]. . . . .	24
4.1. Entalpías de formación en fase gaseosa obtenidas mediante el método G4 de Gaussian del 2-nitrobenzaldehído (2NBA), 3-nitrobenzaldehído (3NBA) y 4-nitrobenzaldehído (4NBA) a $T = 298.15 \text{ K}$ y $p^\circ = 0.1 \text{ MPa}$ , reportadas por Ximello y otros autores [3].	63
4.2. Entalpías de formación en fase gaseosa obtenidas mediante el método G3MP2 de Gaussian del 2-nitrobenzaldehído (2NBA), 3-nitrobenzaldehído (3NBA) y 4-nitrobenzaldehído (4NBA) a $T = 298.15 \text{ K}$ y $p^\circ = 0.1 \text{ MPa}$ , reportadas por Ximello y otros autores [3]. . . . .	64
4.3. Entalpías de formación en fase gaseosa obtenidas mediante el método G3MP2 de Gaussian del 2-nitrobenzaldehído (2NBA), 3-nitrobenzaldehído (3NBA) y 4-nitrobenzaldehído (4NBA) a $T = 298.15 \text{ K}$ y $p^\circ = 0.1 \text{ MPa}$ , reportadas por Ximello y otros autores [3]. . . . .	64

# Introducción

Las computadoras son máquinas potentes que podemos utilizar para resolver problemas de la vida cotidiana. Sin embargo, su propósito original fue la implementación de funciones aritméticas en los circuitos electrónicos que contiene para, posteriormente, configurarse y hacer cálculos algebraicos en la computadora. Este fue uno de los grandes logros de la comunidad científica en el siglo XX. Actualmente, el uso de las computadores en las ciencias es fundamental, al grado de que el desarrollo del cómputo creó una nueva rama de la química, la **química computacional**. Adicionalmente, las sorprendente evoluciones de las matemáticas, la física y la química teórica ha contribuido al florecimiento de la química computacional, al proveernos de conceptos, modelos teóricos, métodos numéricos y analíticos más eficientes que se han incorporado en algoritmos programables. Así, en nuestros días, es posible calcular geometrías moleculares, equilibrios de reacciones, espectros y otras propiedades físicas y químicas con las herramientas de esta nueva rama.

En la naturaleza y en el entorno científico, existen compuestos tan reactivos que no pueden aislarse, por lo que no pueden estudiarse mediante técnicas comunes de laboratorio. Sin embargo, este tipo de moléculas sí pueden estudiarse con métodos computacionales. Desde luego, no debe considerarse a la química computacional como una rival de las técnicas experimentales tradicionales, sino como una aliada, ya que cuando se utilizan ambas, se logran resultados que serían imposibles de obtener si se utilizasen de forma excluyente. Podemos decir, entonces, que la química computacional es una disciplina que comprende los aspectos

de la investigación en química que se benefician de la aplicación de las computadoras [4].

Las simulaciones efectuadas por computadoras tienen varias ventajas, entre éstas tenemos:

1. Son más económicas que los experimentos físicos.
2. Pueden resolver un amplio margen de problemas, comparado con los que se podrían resolver con equipos de laboratorio específicos o de tecnología actual.
3. Los cálculos están limitados sólo por la velocidad de la computadora y la capacidad de memoria de ésta.

La química computacional puede dividirse en dos categorías, los métodos basados en la mecánica molecular y los métodos basados en la mecánica cuántica. Los métodos basados en la mecánica molecular (MM) se fundamentan en las leyes de la mecánica clásica, y consideran a los átomos como partículas puntuales dotadas de masa y carga, unidos entre sí por enlaces que pueden modelarse como resortes.

Por otro lado, los métodos basados en la mecánica cuántica resuelven la ecuación de Schrödinger y utilizan la función de onda resultante para describir a los sistemas. En particular, con estos métodos se modela a las moléculas mediante un tratamiento directo de la estructura electrónica. Dicha estructura se puede abordar a través de métodos *ab initio* (significa “desde el principio” y se refiere a que en este tipo de cálculos se emplean sólo constantes fundamentales de la física y ningún dato experimental), o bien a través de métodos *semiempíricos* (emplea parámetros cuyos valores se ajustan con datos experimentales de cálculos *ab initio*). Tanto los métodos *ab initio* como los métodos *semiempíricos* se enfocan en predecir las propiedades de los sistemas atómicos y moleculares. En este sentido, no existe un método intrínsecamente “mejor” que otro, y en cambio, todo dependerá del sistema a analizar, los recursos de cómputo disponibles y la precisión requerida. Adicionalmente, existen dos factores importantes para elegir un método de cálculo adecuado: la naturaleza de la molécula y los parámetros conocidos de la molécula [4].

Dentro de las magnitudes más relevantes que pueden determinarse, con cierta facilidad,

empleando cálculos de estructura electrónica se encuentran la entalpía de formación, la entropía y la energía libre de Gibbs. Estas propiedades se consideran relevantes porque brindan información acerca de la estabilidad y la termodinámica de las moléculas, y porque a partir de ellas, es posible entender varios fenómenos que ocurren en los procesos químicos.

Se denomina **entalpía de formación** (representada como  $\Delta_f H^\circ$ ) a la energía involucrada en la reacción química que relaciona la formación de 1 mol de un compuesto a partir de sus elementos en su forma más estable a una atmósfera de presión y a una temperatura dada. Una forma experimental común de determinar la  $\Delta_f H^\circ$  consiste en calcinar un compuesto dentro de una bomba calorimétrica y cuantificar el cambio de temperatura, con el fin de medir la cantidad de calor involucrado en esa reacción. Teóricamente, es posible obtener la entalpía de formación haciendo uso de tablas (existen extensas tabulaciones de entalpías de formación determinadas experimentalmente [5, 6]). No obstante, también es posible cuantificar la entalpía de formación mediante cálculos *ab initio* [7]. Esta última opción es valiosa porque (1) es mucho más sencillo y económico que hacer un experimento termoquímico, (2) existen compuestos que no han sido medidos ni tabulados y (3) hay compuestos que son altamente reactivos, o compuestos de interés biológico que están disponibles sólo en pequeñas cantidades, por lo que no es posible someterlos a rígidos protocolos experimentales, *v.gr.* reacciones de combustión [7].

La precisión de un cálculo computacional, en particular en la energía, varía notablemente con el nivel de teoría y con el tipo de base utilizados para realizar el cálculo. Afortunadamente, existen metodologías que permiten conocer la energía con una precisión de hasta  $\pm 1$  cal/mol, respecto a una determinación experimental. Estos métodos constan de secuencias de cálculos predefinidos y fueron desarrollados específicamente para lograr valores muy precisos con costos computacionales aceptables (véase p. ej. los métodos introducidos por Pople y otros autores [4]). Una categoría muy popular de estos métodos combinados es la que está conformada por las denominadas teorías *Gaussian-n*. Éstas se usan para calcular energías en sistemas moleculares que contienen átomos desde el hidrógeno hasta el cloro, y su objetivo es desarrollar procedimientos generales, de amplia aplicabilidad para cualquier molécula, y ser capaces de reproducir valores termoquímicos experimentales con la precisión mencio-

nada arriba. Algunos de esos métodos son: Gn (G1, G2, G3, G4). Existen otras técnicas como CBS-N(CBS-APNO y CBS-QB3) [8], pero en este trabajo abordaremos exclusivamente los métodos G3 y G4 del software **Gaussian09** [9].

El método G4 es un procedimiento que ha sido empleado frecuentemente en el cálculo de energías de enlace, entalpías de formación, potenciales de ionización y afinidades electrónicas [4, 6]. Una vez conocida la energía molecular, se puede calcular la entalpía de formación de la molécula en cuestión a  $T = 0$  K. Para esto, se puede utilizar alguno de los tres enfoques más comunes: el método de atomización, el método de formación o el método de reacción isodésmica. De los tres enfoques anteriores, el método de atomización da mejores resultados, especialmente para moléculas orgánicas, y es conceptualmente el más sencillo, ya que consiste en romper los enlaces de la molécula para obtener a sus átomos en fase gaseosa [2]. Ahora bien, es común que las entalpías de formación estén tabuladas en condiciones normales de temperatura y presión, por lo que después de obtener las energías a  $T = 0$  K, es necesario calcularlas a 298.15 K. Esto se puede hacer mediante la Termodinámica Estadística.

En efecto, la Termodinámica Estadística permite obtener el valor de la energía interna de una molécula, a 298.15 K, mediante la función de partición de un gas ideal. Dicha función resulta ser un producto de funciones de partición relacionadas con movimientos traslacionales, rotacionales y vibracionales [2, 10]. Brevemente, el término translacional aporta  $\frac{3}{2} RT$ , el término rotacional aporta  $\frac{3}{2} RT$  (aunque sólo  $RT$  si la molécula es lineal) y el rotacional contribuye con  $RT$ . Estas cantidades son resultado de considerar a las moléculas como si fueran partículas libres en una caja para el movimiento translacional, la aproximación del rotor rígido para el movimiento rotacional y el oscilador armónico para el movimiento vibracional. Adicionalmente, pueden incorporarse correcciones más finas como la aproximación de Nicolaidis y otros autores [2, 10].

El procedimiento descrito anteriormente suele ser bastante tedioso si se realiza manualmente, por lo que resulta indispensable contar con una herramienta que permita realizar las correcciones térmicas de manera automática. Dicha herramienta se materializa como resultado de este trabajo en un algoritmo de cómputo que determina la entalpía de formación de compuestos orgánicos a  $T = 298.15$  K, utilizando archivos de salida del software *Gaussian*, y

de manera que se añadan a voluntad correcciones finas como las de Nicolaides.



## Objetivo y Justificación

### 2.1. Objetivos

#### 2.1.1. Objetivo General

Crear un conjunto de programas de cómputo científico que determinen la entalpía de formación de compuestos orgánicos a  $T = 298.15$  K con correcciones en la energía interna, empleando archivos de salida del software Gaussian.

#### 2.1.2. Objetivos Particulares

- Diseñar un algoritmo de programación que pueda utilizarse a través de la línea de comandos en un sistema operativo de GNU/Linux.
- Diseñar dichos programas con un lenguaje de programación orientado a objetos, de manera que sea posible fragmentar el código en partes independientes para futuros proyectos.

## **2.2. Justificación**

El desarrollo de software científico de alto rendimiento en Termoquímica es una de las principales líneas de investigación de nuestro grupo. Por lo tanto, el cálculo de funciones termodinámicas de forma optimizada dará como resultado una alta eficiencia en el flujo de trabajo.

## Marco teórico

### 3.1. Energía

Seguramente el concepto de energía sea el más usado, conocido e importante en ciencias. A pesar de su gran empleo en la actualidad, fue desarrollado con lentitud a lo largo de los siglos y culminó con la ley de la conservación de la energía. La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, por lo tanto, existe una gran cantidad de manifestaciones de la energía, y el calor es, quizá, la manifestación de energía más común. Es importante recordar que el calor no se considera como algo almacenado dentro de un cuerpo. Al igual que el trabajo, existe sólo como energía transitoria que va de un cuerpo a otro o entre un sistema y su medio. En termodinámica, existen varias cantidades que están relacionadas con la energía, entre ellas se encuentran la energía interna y la entalpía. Podemos definir a la **energía interna** como la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema (una definición muy conveniente para una escala macroscópica). No obstante, si nos refiriéramos a una escala microscópica, podríamos decir que, la energía interna es la energía relacionada con el movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas, es decir, la energía interna esta formada por energías de traslación, rotación, vibración, electrónica y nuclear, así como interacciones intermoleculares. El símbolo que representa a la energía interna es la letra **U** y escribimos su cambio como

$$\Delta U = U_2 - U_1 \quad (3.1)$$

donde  $U_2$  y  $U_1$  son las energías internas del sistema en su estado final e inicial, respectivamente [11].

El estudio de la variación de la energía interna en las transformaciones químicas es importante para el desarrollo de las bases teóricas de la química. Además, la variación de la energía interna es una magnitud indispensable para los cálculos termodinámicos de las reacciones químicas, porque tiene un gran significado para las investigaciones científicas y la industria. En el proceso de transformación de una sustancia, la energía interna se produce, como en otros casos, mediante la absorción o desprendimiento de calor y la realización de trabajo. El calor de una reacción química frecuentemente es apreciable; éste puede medirse directamente en muchos casos y es, precisamente, el objetivo de la **Termoquímica** estudiar el calor de las reacciones químicas [12].

A la cantidad de energía de un sistema que se encuentra a presión constante se le conoce como **entalpía (H)** y matemáticamente se define como

$$H = U + PV \quad (3.2)$$

donde  $U$ ,  $P$  y  $V$  son la energía interna, la presión y volumen del sistema.  $H$  tiene unidades de energía. Dado que  $U$ ,  $P$  y  $V$  son funciones de estado y  $H$  también lo será. Por lo tanto, el cambio en la entalpía dependerá sólo de las condiciones iniciales y finales del sistema:

$$\Delta H = H_2 - H_1 = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) \quad (3.3)$$

### 3.2. Entalpía de reacción

Existen procesos químicos que se llevan a cabo a presión constante, un ejemplo de ello son las reacciones químicas que pueden considerarse como sistemas termodinámicos. El cambio de entalpía que acompaña a una reacción se conoce como **entalpía de reacción** o

*calor de reacción* y algunas veces se representa como  $\Delta H_{\text{rxn}}$  [13, 14]. Como cualquier sistema, el cambio en la entalpía puede ser exotérmico o endotérmico. Dicho lo anterior, en una reacción, se puede escribir el cambio en la entalpía como

$$\Delta H = H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}} \quad (3.4)$$


### 3.3. Calorimetría

Es posible determinar en forma experimental el valor de  $\Delta H$ . A esta medición se le conoce como **calorimetría**; el calorímetro es un dispositivo empleado para medir el flujo de calor. Las técnicas y el equipo empleados en calorimetría dependen de la naturaleza del proceso en estudio. Para muchas reacciones, como las que ocurren en disolución, es fácil controlar la presión y medir directamente el  $\Delta H$ .


### 3.4. Entalpía de formación estándar

Un proceso particularmente importante, empleado para tabular datos termoquímicos, es la formación de un compuesto a partir de sus elementos constitutivos. Al cambio de entalpía asociado con este proceso se le conoce como **entalpía de formación**,  $\Delta_f H$ , donde el subíndice “f” indica que la sustancia se formó a partir de sus elementos constitutivos. Sus unidades son  $\text{kJ} (\text{mol de reacción})^{-1}$ . La magnitud de cualquier cambio de entalpía depende de la temperatura, la presión y el estado (gas, líquido o forma sólida cristalina) de los reactivos y productos. Para comparar las entalpías de diferentes reacciones, debe definirse un conjunto de condiciones, conocido como estado estándar, en el que se tabulan la mayoría de las entalpías. El estado estándar de una sustancia es su forma pura a presión atmosférica (1 atm) y la temperatura de interés, que generalmente se elige como 298.15 K (25 °C). El **cambio de entalpía estándar** de una reacción se define como el cambio de entalpía cuando todos los reactivos y productos se encuentran en sus estados estándar. El cambio de entalpía estándar se denota con  $\Delta H^\circ$ , donde el superíndice “°” indica condiciones de estado estándar [13].

La **entalpía estándar de formación** de un compuesto,  $\Delta_f H^\circ$ , es el cambio de entalpía de una reacción que forma un mol del compuesto a partir de sus elementos, con todas las sustancias en sus estados estándar:



Por lo regular, se reportan valores de  $\Delta_f H^\circ$  a  $T = 298.15 \text{ K}$ . Si un elemento existe en más de una forma en condiciones estándar, la forma más estable del elemento es la que normalmente se utiliza para la reacción de formación.



La fuente elemental de oxígeno es  $O_2$ , no  $O$  ni  $O_3$ , porque el  $O_2$  es la forma estable del oxígeno a  $T = 298.15 \text{ K}$  y a presión atmosférica. De forma similar, la fuente elemental del carbono es el grafito y no el diamante, porque el grafito es la forma más estable a  $T = 298.15 \text{ K}$  y a  $P = 1 \text{ atm}$ . De igual manera, la forma más estable del hidrógeno en condiciones estándar es el  $H_2(g)$ , así que este se utiliza como la fuente del hidrógeno en la ecuación 3.5.

Por convención, la *entalpía estándar de formación* de cualquier elemento es cero, porque no se necesita una reacción de formación cuando el elemento ya se encuentra en su estado estándar. Así, los valores de  $\Delta_f H^\circ$  para el  $C(\text{grafito})$ ,  $H_2(g)$ ,  $O_2(g)$  y los estados estándar de otros elementos son cero [11, 13].

$$\Delta_f H^\circ(\text{grafito}) = 0 \quad (3.6)$$

$$\Delta_f H^\circ(H_2) = 0 \quad (3.7)$$

$$\Delta_f H^\circ(O_2) = 0 \quad (3.8)$$

Como se mencionó antes, no podemos determinar el valor absoluto de la entalpía de una sustancia. Sólo se pueden calcular valores relativos a una referencia arbitraria. En termodinámica, lo que nos interesa son los cambios de  $H$ , aunque todo valor de  $\Delta_f H^\circ$  asignado

arbitrariamente a un elemento funcionaría; con ceros los cálculos se simplifican [11]. Los valores de  $\Delta_f H^\circ$  pueden obtenerse con un método directo o indirecto, los cuales se describen a continuación.

**Método directo.** Este método funciona en compuestos que se pueden sintetizar con facilidad a partir de sus elementos. Por ejemplo, la formación de  $\text{CO}_2$  a partir de grafito y  $\text{O}_2$ .

**Método indirecto.** La mayor parte de los compuestos no se pueden sintetizar directamente a partir de sus elementos. En algunos casos, las reacciones suceden con demasiada lentitud o no llegan a concretarse. Por lo tanto, el valor de  $\Delta_f H^\circ$  se puede determinar mediante la ley de Hess [11].





### 3.5. Ley de Hess

Con frecuencia, el  $\Delta H$  de una reacción se calcula a partir de los valores tabulados de otras reacciones. Por ello, no es necesario realizar mediciones calorimétricas para todos los compuestos. Como la entalpía es una función de estado, el cambio de entalpía asociado con cualquier proceso químico sólo depende de la cantidad de materia que experimenta el cambio, y de la naturaleza del estado inicial de los reactivos y del estado final de los productos. Esto significa que si una reacción se lleva a cabo en una o en varias etapas, la suma de los cambios de entalpía asociados con las etapas individuales debe ser igual al cambio de entalpía asociado con el proceso de una sola etapa.


La **ley de Hess** establece que si una reacción se realiza en una serie de etapas, el  $\Delta H$  de la reacción completa será igual a la suma de los cambios de entalpía en las etapas individuales. El cambio total de entalpía del proceso es independiente del número de etapas y de la trayectoria que siga la reacción. Esta ley es una consecuencia del hecho de que la entalpía es una función de estado. Por lo tanto, se puede calcular el  $\Delta H$  de cualquier proceso siempre y cuando se encuentre una trayectoria para la cual se conozca  $\Delta H$  en cada etapa. Esto quiere decir que un número relativamente pequeño de mediciones experimentales permite calcular el  $\Delta H$  de un gran número de reacciones. La ley de Hess es un medio útil para calcular

cambios de energía que son difíciles de medir directamente [13].

Sería imposible medir de forma directa la entalpía en el caso de la reacción de combustión de carbono para formar monóxido de carbono (la combustión de 1 mol de  $C$  con 0.5 moles de  $O_2$  produce tanto  $CO$  como  $CO_2$ , dejando algún  $C$  sin reaccionar). Sin embargo, el carbono sólido y el monóxido de carbono pueden quemarse por completo en  $O_2$  para producir  $CO_2$ . Por lo tanto, es posible utilizar los cambios de entalpía de estas reacciones para calcular el calor de combustión del carbono. Si se observa, la reacción general es la formación de  $CO_2$  (reacción 3.9) que se puede descomponer en dos partes (reacciones 3.10 y 3.11). La figura 3.1 muestra el esquema general del procedimiento.







**Figura 3.1:** El cambio de entalpía de la reacción total es igual a la suma de los cambios de entalpía de los dos pasos.

### 3.6. Química computacional

Los métodos comentados en la sección, permiten calcular los cambios de entalpía para una gran cantidad de reacciones (hay extensas tablas de entalpías de vaporización, entalpías de fusión y entalpías de combustión) [2, 5, 6]. No obstante, también es posible cuantificar la entalpía de formación mediante cálculos *ab initio* [7].

La determinación de entalpías de formación por métodos computacionales es fundamental, porque sirve como información de entrada para multitud de simulaciones numéricas. Tal es la importancia, que se ha invertido un gran esfuerzo en la tabulación y refinamiento de *JANAF*, *CODATA*, *Third Millenium* y *Active Thermochemical Tables (ATcT)* [15–19]. Aunque la determinación experimental (principalmente mediante calorimetría) es el método ideal para obtener  $\Delta_f H^\circ$ , es a la vez, laborioso y consume mucho tiempo. Es claro que obtener  $\Delta_f H^\circ$  experimental para todos los compuestos existentes es imposible y costoso. No obstante, ahora se acepta que la química teórica, ya sea de forma aislada o en conjunto con el experimento, pueda ofrecer un medio eficaz para obtener esta información en plazos factibles.

La búsqueda del “cielo químico” en química computacional esta sujeto en gran medida, al tipo de metodología que sea capaz de predecir calores de formación con desviaciones menores a  $1\text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$  respecto al valor experimental. Por lo tanto, la precisión de cualquier  $\Delta_f H^\circ$  depende del modelo químico aplicado y del tamaño del sistema molecular. Los métodos compuestos ofrecen una alternativa rentable a expensas de la precisión y consisten en una serie de optimizaciones de la geometría y cálculos de energía en un solo punto, con correcciones empíricas para superar las deficiencias cuando los métodos son comparados con entalpías de formación conocidas. Numerosos métodos se han usado en los últimos tiempos; los métodos CBS-x [20, 21] ( $x = \text{QBB3}$  y  $\text{APNO}$ ) y Gaussian-x [22–26] ( $x = 1, 2, 3, 4$ ), que son empleados en cálculos cinéticos y termodinámicos, siendo de gran relevancia para la termoquímica.

Variantes del método G3, tales como G3B3 [27] y G3MP2 [28] también son populares. El método G3 se emplea con frecuencia para la  $\Delta_f H^\circ$  reportada por Burcat y otros autores, como parte de la base de datos *Third Millenium*, con una incertidumbre de  $8\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ . Los métodos “estándar” se han ajustado en numerosas ocasiones para remediar las dificultades percibidas con el objetivo de mejorar el coste computacional; un ejemplo de ello, son las variantes de G4 [29, 30], W1 [31, 32] y W3 [33, 34]. Para superar las grandes incertidumbres y errores en  $\Delta_f H^\circ$  se emplea el método isodésmico, sin embargo, surge un gran número de problemas al emplear este método porque se requieren entalpías de formación experimentales o métodos computacionales con un alto nivel de teoría para crear estas reacciones de trabajo hipotéticas; los  $\Delta_f H^\circ$  calculados dependen de la calidad de la reacción isodésmica (dado que no hay una única respuesta), además, el costo computacional se incrementa bastante. Pese a esto, los métodos computacionales pueden ofrecer excelentes resultados [8].

### 3.7. Métodos Gaussianos

La clave de estos métodos es el uso de altos niveles de correlación y grandes conjuntos de bases. Esta serie comenzó en 1989 con *Gaussian 1*, G1 [22], continuó con G2 (1991) [24],

G3 (1998) [25], y G4 vio la publicación en 2007 [26]. G1 y G2 están obsoletos. Los métodos Gaussianos de alta precisión más populares en la actualidad son probablemente G4 y G3 en conjunto de sus variantes más rápidas, G4(MP2) [35] y G3(MP2) [28]. El uso continuo de G3 y G3(MP2) con G4 y G4(MP2) puede estar justificado por el deseo de comparar algunos trabajos actuales con resultados de métodos más antiguos. Para G3, la desviación absoluta media del experimento es  $1,13 \text{ kcal mol}^{-1}$  [ $4,7 \text{ kJ mol}^{-1}$ ], para G3(MP2)  $1,2 - 1,3 \text{ kcal mol}^{-1}$  [ $5,0 - 5,4 \text{ kJ mol}^{-1}$ ], G3(MP2) es 7-8 veces más rápido que G3 [25]. Curtis y otros autores proporcionan los detalles del método G4 [26] y lo compararon con G3 y cierta medida, con G1 y G2. Ellos informaron que “[...] la desviación absoluta promedio del experimento muestra una mejora significativa de  $1,13 \text{ kcal/mol}$  [ $4,7 \text{ kJ mol}^{-1}$ ] (teoría G3) a  $0,83 \text{ kcal/mol}$  [ $3,5 \text{ kJ mol}^{-1}$ ] (teoría G4). No obstante, para acelerar el método G4, sus pasos MP4 fueron reemplazados por MP2 y MP3 dando como resultado G4(MP2) y G4(MP3) [7,35]. Un cálculo G4, utiliza los siguientes pasos:

1. Obtención de la estructura de equilibrio en un nivel B3LYP/6-31G(2df,p).
2. Especificación de las frecuencias armónicas.
3. Determinación de límite de energía Hartree-Fock.
4. Corrección de la energía.
5. Evaluación de la energía MP4/6-31G(d), correcciones del paso anterior y combinación aditiva con el paso 3.
6. Especificación de un nivel alto (HLC) con parámetros empíricos.
7. Obtención de la energía total a  $T = 0 \text{ K}$  con una corrección en la energía de punto zero obtenida en el paso 2.

Estos siete pasos se utilizan para ensamblar una energía molecular como la suma de varias diferencias de energía y un incremento de energía empírica final (la “corrección de nivel superior”) en función del número de electrones apareados y no apareados. Debido a las correcciones de energía empírica en los métodos gaussianos, no son completamente *ab initio*,

sino algo *semiempíricos*, excepto cuando estas correcciones se anulan. Esta cancelación ocurre, por ejemplo, al calcular las afinidades de los protones como la diferencia de energía de las especies protonadas y no protonadas. Los métodos gaussianos, CBS y otros no mencionados aquí, son revisados por Peterson, Feller y Dixon (2012), con énfasis en termoquímica; estos autores reconocen una precisión química de  $1 \text{ kcal mol}^{-1}$  [ $4 \text{ kJ mol}^{-1}$ ] como aceptable [36].

### 3.8. Métodos CBS

En estos métodos se usa una extrapolación del conjunto de bases a un límite infinito (hasta el final). Hay tres métodos CBS básicos: CBS-4 (para extrapolación de cuarto orden), CBS-Q (para CI cuadrático) y CBS-APNO (para orbitales naturales de pares asintóticos, referidos a la extrapolación al límite establecido de base). Dichos métodos están disponibles en los programas *Gaussian 94* y posteriores. CBS-4M puede manejar moléculas con hasta 19 átomos pesados. Los errores CBS-4M más típicos son (desviación absoluta media del experimento)  $3,26 \text{ kcal mol}^{-1}$  [ $13,6 \text{ kJ mol}^{-1}$ ] [20]. Hay una modificación de CBS-4M diseñada para disminuir la acumulación de errores con el aumento del tamaño molecular [188]. CBS-QB3 puede manejar moléculas con hasta 13 átomos pesados y tiene una desviación media absoluta del experimento de  $1,10 \text{ kcal mol}^{-1}$  [ $4,6 \text{ kJ mol}^{-1}$ ] [37]. CBS-APNO puede manejar moléculas con hasta 7 átomos pesados y tiene una desviación absoluta media del experimento de  $0,53 \text{ kcal mol}^{-1}$  [ $2,2 \text{ kJ mol}^{-1}$ ] [38]. Este conjunto de métodos implican esencialmente siete u ocho pasos [7]:

1. Una optimización de geometría (en el nivel HF/3-21G(\*) o MP2/6-31G\*, dependiendo del método CBS en particular).
2. Cálculo de ZPE a nivel de optimización.
3. Determinación de punto único de HF con un conjunto de bases muy grande (6-311 + G(3d2f,2df,p) o 6-311 + G(3d2f,2df,2p), dependiendo del método CBS).
4. Cálculo de punto único MP2 (base que depende del método CBS).

5. Extrapolación de un par de orbitales naturales para estimar el error debido al uso de un conjunto de bases finitas.
6. Determinación de punto único MP4.
7. Para algunos métodos CBS, un cálculo de punto único QCISD(T).
8. Una o más correcciones empíricas, teniendo en cuenta el aspecto semiempírico de los métodos CBS.

### 3.9. Comparacion entre métodos

En este trabajo nos concentraremos en los métodos de tipo gaussiano y CBS (en especial de tipo gaussiano), porque estos han sido los más utilizados, y por lo tanto, han acumulado una gran cantidad de resultados publicados (además de ser los más accesibles). Sin embargo, como ya mencionamos, existen otros métodos de alta precisión, como los procedimientos de Weizmann de Martin y de Oliveira, W1 y W2 [39], Boese y otros autores, W3 y W4 [40] y las modificaciones más rápidas de estos como W2X y W3X-L de Chan y Radom [41], los cuales, al igual que los métodos CBS, se basan en la extrapolación de conjuntos de bases. El autor principal de esta revisión es el profesor K. A. Peterson de la Universidad Estatal de Washington; los métodos CBS provienen del grupo de investigación del profesor G. A. Petersson de la Universidad Wesleyana; ambos investigadores están activos en termoquímica cuántica computacional.

De los métodos de tipo gaussiano y CBS, para una alta precisión en moléculas muy pequeñas, CBS-APNO es la elección adecuada, y para moléculas "grandes", la elección recae en CBS-4M con la aceptación de la posibilidad de errores moderadamente grandes. Para moléculas de tamaño intermedio, la mejor elección es probablemente entre G4(MP2) y CBS-QB3. Recordemos que G4(MP2) es mucho más rápido que G4, con poca pérdida de precisión en la mayoría de los casos [7].

En la tabla 3.1 se muestra una comparación de los métodos gaussianos y un método CBS, usando 1,4-benzoquinona (p-benzoquinona,  $O = C_6H_4 = O$ ) al calcular la entalpía de formación por el método de atomización. Se debe tener en cuenta que el cálculo G4 tomó nueve veces más tiempo (160/18) que el G4 (MP2) y ambos dieron casi la misma entalpía de formación [7].

Entalpía de formación	$\text{kJ mol}^{-1}$	minutos/tiempo relativo
G4	-117.5	160/21
G4(MP2)	-118.5	18/2.4
G3	-118.6	24/3.2
G3(MP2)	-120.0	7.5/1
CBS-QB3	-115.9	16/2.1

**Tabla 3.1:** Los primeros cuatro valores calculados experimentalmente están dentro de  $1 \text{ kJ mol}^{-1}$ , sin embargo, el valor CBS-QB3 es de  $3 \text{ kJ mol}^{-1}$  y está por encima del mayor error estimado. No obstante, no se debe generalizar a partir de una muestra de un solo compuesto.

### 3.10. Método de atomización

En química computacional hay tres enfoques principales que predicen entalpías de formación.

1. Método de atomización.
2. Método de formación.
3. Método de reacciones isodésmicas.

De los 3 enfoques anteriores, el método de atomización da mejores resultados, especialmente para moléculas orgánicas y es el más sencillo, porque se basa en la ruptura de enlaces de una molécula para obtener a sus átomos en fase gas [2]. Veamos el principio del método


de atomización con la molécula de metanol.

La entalpía de atomización,  $\Delta_{a0}H^\ominus$  a  $T = 0$  K *ab initio*, del metanol es la diferencia de entalpía entre los átomos de la molécula y el metanol. Para calcular  $\Delta_{f0}H^\ominus$  necesitamos la entalpía de formación a  $T = 0$  K de los átomos de C, H y O y la entalpía de atomización a  $T = 0$  K del metanol (ecuaciones 3.13 y 3.14). Las entalpías de atomización del hidrógeno y el oxígeno se pueden calcular por un método *ab initio*, pero no de forma fiable y precisa. Para mantener la coherencia, utilizaremos valores experimentales de las tres entalpías de atomización elementales, como recomiendan Nicolaides y otros autores [2]. De la ecuación 3.15, la entalpía de atomización  $T = 0$  K del metanol es simplemente la suma de las entalpías *ab initio* de los átomos que la constituyen menos la entalpía *ab initio* corregida por ZPE del metanol:

$$\Delta_{f0}H^\ominus(CH_3OH) + \Delta_{a0}H^\ominus(CH_3OH) = \Delta_{f0}H^\ominus(C(^3P) + 4H(^2S) + O(^3S)) \quad (3.13)$$

$$\Delta_{f0}H^\ominus(CH_3OH) = \Delta_{f0}H^\ominus(C(^3P) + 4H(^2S) + O(^3S)) - \Delta_{f0}H^\ominus(CH_3OH) \quad (3.14)$$

$$\Delta_{a0}H^\ominus(CH_3OH) = \Delta_{0K}E^{total}(C(^3P) + 4H(^2S) + O(^3S)) - \Delta_{0K}E^{total}(CH_3OH) \quad (3.15)$$



**Figura 3.2:** El metanol se atomiza (conceptualmente) a  $T = 0$  K en los átomos que lo constituyen, es decir, carbono, hidrógeno y oxígeno (en sus estados electrónicos fundamentales). Además, los átomos de la molécula en sus estados estándar también son usados para formar dicha molécula. La entalpía de formación del metanol a  $T = 0$  K,  $\Delta_{f0}H^\ominus(\text{CH}_3\text{OH})$ , se obtiene al igualar la energía necesaria para generar los átomos a través del metanol ( $\Delta_{f0}H^\ominus(\text{CH}_3\text{OH}) + \Delta_{a0}H^\ominus(\text{CH}_3\text{OH})$ ) a la energía para hacerlo directamente desde sus elementos en sus estados estándar [7].

Los valores experimentales de las entalpías de atomización de los átomos a  $T = 0$  K de  $(\text{C(}^3\text{P)} + 4\text{H(}^2\text{S)} + \text{O(}^3\text{S)})$  se ilustran en la tabla 3.2.

Átomo	Entalpía experimental ( $\text{kJ mol}^{-1}$ )
C	711.2
H	216.035
O	246.8

**Tabla 3.2:** Entalpías de formación experimentales reportadas por Nicolaidis y otros autores [2].

Posteriormente, para calcular  $\Delta_{a0}H^\ominus(\text{CH}_3\text{OH})$  haremos uso de la ecuación 3.15 que toma el valor de  $\Delta_{0K}E^{total}$  para los átomos de C, H, y O. En lugar del método G2 que fue empleado por Nicolaidis y otros autores [2], usaremos el método G4 de *Gaussian09*. Los valores obtenidos para cada átomo y su respectiva molécula a  $T = 0$  K se muestran en la tabla 3.3.



Átomos	Entalpías G4 a T = 0 K (hartrees)
C	-37.834168
H	-0.501420
O	-75.045501
CH <sub>3</sub> OH	-115.651767

**Tabla 3.3:** Entalpías de formación a T = 0 K obtenidas por el método G4 de Gaussian09.

El valor de metanol de  $-115.651767h$  podría llamarse el “cero absoluto” de la entalpía del metanol, es decir, la entalpía relativa a la de los núcleos disociados y electrones; esto se muestra al final de cualquier geometría de conjunto gaussiano de un cálculo de optimización/frecuencia (aunque solo para cálculos de muy alta precisión) y es el valor adecuado para determinaciones precisas de la entalpía de atomización. Esta entalpía absoluta se utilizará en el cálculo de la entalpía de formación. De la ecuación 3.15 es posible calcular la energía de atomización de metanol a T = 0 K:

$$\begin{aligned}\Delta_{a0}H^{\ominus}(CH_3OH) &= -37.834168 + 4(-0.501420) - 75.045501 - (-115.651767)h = \dots \\ &\dots = 0.766418 \times 2625.5 kJmol^{-1} = 2012.230459 kJmol^{-1} \quad (3.16)\end{aligned}$$

De la ecuación 3.14 la entalpía de formación a T = 0 K de metanol es:

$$\Delta_{f0}H^{\ominus}(CH_3OH) = 711.2 + 4(216.035) + 246.8 - 2012.230459 kJmol^{-1} = -189.1 kJmol^{-1} \quad (3.17)$$

Nicolaides y otros autores [2] reportan el valor de  $195.7 kJmol^{-1}$  a  $T = 0$  K mediante el método de atomización y los valores experimentales son  $190.7 kJmol^{-1}$  y  $189.8 kJmol^{-1}$ , en concordancia con el valor G4 calculado aquí. Cualquier inexactitud en la energía de atomización calculada, se mostrará en la entalpía de formación, y solo un buen método de alta precisión puede mitigar este error de manera confiable. Para ajustar la entalpía de formación de  $T = 0$  K a  $T = 298.15$  K, debemos agregar dicho valor y restar los aumentos correspondientes para los elementos en sus estados estándar. El valor para el metanol es la diferencia de las dos cantidades G4 proporcionadas en el archivo de salida de Gaussian. El aumento de la entalpía del metanol al pasar de  $T = 0$  K a  $T = 298$  K es:

$$\Delta\Delta H^{\ominus}(CH_3OH) = G4Entalpia - G4(0K) \quad (3.18)$$

$$\begin{aligned} \Delta\Delta H^{\ominus}(CH_3OH) &= -115.647489 - (-115.651767) h = ... \\ &... = (0.004278)(2625.5 kJmol^{-1}) = 11.23188 kJmol^{-1} \end{aligned} \quad (3.19)$$

Las entalpías experimentales de los respectivos elementos también es reportada por Nicolaides y otros autores [2] en  $kJmol^{-1}$ , veáse la tabla 3.4.

Átomos	Entalpía experimental ( $kJmol^{-1}$ )
C(grafito)	1.050
H <sub>2</sub>	8.468
O <sub>2</sub>	8.680

**Tabla 3.4:** Entalpías experimentales de los elementos reportadas por Nicolaides y otros autores [2].

La parte de estos valores y  $\Delta\Delta H^\ominus(CH_3OH)$ , se calcula la entalpía a  $T = 298.15$  K del metanol. Ahora, para ajustar la entalpía de formación a un estado estándar, sumamos el aumento de entalpía del metanol al pasar de  $T = 0$  K a  $T = 298.15$  K y restamos los aumentos correspondientes de los elementos en sus estados estándar.

$$\Delta_f H^\ominus(CH_3OH) = \Delta_{f0} H^\ominus(CH_3OH) + \Delta\Delta H^\ominus(CH_3OH) - (\Delta\Delta H^\ominus(C) + 2\Delta\Delta H^\ominus(H_2) + \frac{1}{2}\Delta\Delta H^\ominus(O_2)) \quad (3.20)$$

$$\Delta_f H^\ominus(CH_3OH) = -190.1126 + 11.23188 - (1.05100 + 2(8.46700) + \frac{1}{2}(8.67000)) kJ \cdot mol^{-1} \quad (3.21)$$

$$\Delta_f H^\ominus(CH_3OH) = -201.21 kJ \cdot mol^{-1} \quad (3.22)$$

El valor experimental a  $T = 298.15$  K aceptado es de  $205 \pm 10 kJmol^{-1}$  [42]. Por lo tanto, la cifra calculada está dentro del error experimental esperado [7].

### 3.11. Relaciones Generales de Termodinámica Estadística

Algunos métodos computacionales, particularmente las técnicas *ab initio*, producen información molecular detallada pero no información termodinámica directamente. Se necesitan más cálculos para generar cantidades como la entropía molar estándar ( $S^\circ$ ), la capacidad calorífica ( $C_p^\circ$ ) y el cambio de entalpía [ $H^\circ(T) - H^\circ(0)$ ]. En algunos cálculos *ab initio*, los resultados ni siquiera corresponden a las propiedades a temperatura de cero absoluto y siempre deben corregirse. Estas correcciones se basan en la Termodinámica Estadística, en dependencia de la función de partición molecular,  $Q$ . La función de partición se usa no solo para predicciones teóricas, sino también para generar la mayoría de las tablas termoquímicas publicadas.

Los modelos *ab initio* también utilizan la aproximación Born-Oppenheimer. La base física de la aproximación de Born-Oppenheimer es que los núcleos son mucho más masivos que los electrones, por lo tanto, se mueven lentamente en relación con los electrones. En consecuencia, se puede considerar que los electrones se mueven en un campo producido por los núcleos fijados en alguna separación internuclear. Las energías resultantes son correctas para una molécula hipotética que no vibra. Aunque los osciladores pueden estar en reposo en la mecánica clásica, los osciladores reales (mecánica cuántica) siempre están en movimiento. El pequeño movimiento residual a la temperatura de cero absoluto es la energía vibracional de punto cero, abreviada como ZPVE o ZPE. Para un oscilador armónico simple, el ZPE es igual a la mitad de la frecuencia vibracional. Aunque todas las vibraciones moleculares reales son al menos ligeramente anarmónicas, por lo general se aproximan como armónicas. Así pues, la ZPE de una molécula puede calcularse como la mitad de la suma de las frecuencias vibracionales. En la ecuación 3.23,  $N$  es el número de átomos en la molécula,  $i$  son las frecuencias vibracionales fundamentales. Hay vibraciones  $3N - 6$  en una molécula no lineal y  $3N - 5$  en una molécula lineal; la ecuación 3.23 es para el caso no lineal. El ZPE debe agregarse a la energía *ab initio* para obtener una energía correspondiente a  $T = 0$  K.

$$ZPE = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N-6} \nu_i \quad (3.23)$$

En la práctica, la corrección ZPE se complica un poco debido a que las frecuencias vibracionales *ab initio* a menudo tienen un error de +5 % a +10 %. Para compensar este error, las frecuencias calculadas generalmente se multiplican por factores de escala empíricos. Las recomendaciones más recientes son las de Scott y otros autores [43]. Por ejemplo, sugieren escalar las frecuencias HF/6-31G\* en 0.8953 para predecir espectros de vibración (es decir, frecuencias fundamentales), en 0.9135 para el cálculo de ZPE, en 0.8905 para predecir diferencias de entalpía [ $H^\circ(298,15) - H^\circ(0)$ ].

La Termodinámica Estadística pretende incluir los métodos utilizados para convertir los niveles de energía molecular en propiedades macroscópicas, especialmente entalpías, entropías y capacidades caloríficas. Los niveles de energía molecular surgen de la traslación molecular (es decir, el movimiento a través del espacio), la rotación, la vibración y la excitación electrónica. Esta información constituye la espectroscopia de la molécula de interés y puede obtenerse experimentalmente o mediante cálculos *ab initio* [38].

### 3.11.1. Función de partición

Los niveles de energía molecular  $\varepsilon_i$  se utilizan para calcular la función de partición molecular, generalmente denotada por el símbolo  $Q$ , como se muestra en la ecuación 3.24 (se extiende sobre todos los niveles de energía).

$$Q(T) = \sum_{i=1} e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}} \quad (3.24)$$

Sin embargo, para temperaturas muy altas donde las moléculas se vuelven inestables, la extensión de la suma puede ser ambigua. Los datos termoquímicos tabulados deben utili-

zarse con precaución en tales condiciones porque los valores (1) pueden depender en gran medida del procedimiento de energía adoptado y (2) pueden desviarse implícitamente del modelo de gas ideal. Normalmente, uno elige el nivel de energía más bajo para que sea el cero de energía, de modo que ningún nivel se encuentre en energías negativas. De la ecuación 3.24 se deduce que las mayores contribuciones para  $Q$  provienen de los niveles de energía más bajos. Por el contrario, los niveles que se encuentran muy por encima de  $kT$  ( $207\text{ cm}^{-1}$  a temperatura ambiente) tienen solo un efecto menor sobre  $Q$  y sus cantidades termodinámicas derivadas [38].

### 3.11.2. Funciones termodinámicas

Dada la función de partición se pueden calcular las funciones termodinámicas habituales. No obstante, aquí solo usaremos las ecuaciones que permiten calcular la diferencia relativa de entalpía [38].

$$H(T) - H(0) = \int_0^T C_p dT = \frac{RT^2}{Q} \frac{\partial Q}{\partial T} + RT \quad (3.25)$$

### 3.11.3. Cálculos prácticos

Casi nunca se dispone de un conjunto completo de niveles de energía molecular. Para simplificar el problema, se suele adoptar un modelo en el que la traslación, la rotación, la vibración y la excitación electrónica están desacopladas. En otras palabras, se asume que la aproximación de los diferentes tipos de movimiento no se afectan entre sí y no se mezclan. Esto conduce a separar  $Q$  en cuatro factores que corresponden a funciones de partición separadas para traslación, rotación, vibración y excitación electrónica. Esto se muestra en la ecuación 3.26.

$$Q = Q_{tras} Q_{rot} Q_{vib} Q_{elec} \quad (3.26)$$

Cuando se consideran los estados electrónicamente excitados, a menudo se supone que los espectros de traslación, rotación y vibración del estado excitado son los mismos que los del estado electrónico fundamental. Esto es conveniente cuando no hay otra información disponible. Además, si el estado excitado se encuentra muy por encima de  $kT$ , los resultados finales no serán sensibles a tales detalles [38].

#### 3.11.4. Función de partición traslacional

$Q_{tras}$  debe calcularse a partir de una suma de todos los niveles de energía de traslación que están disponibles para una molécula confinada en una caja cúbica de volumen  $V = RT/p$  (volumen molar de un gas ideal a temperatura  $T$  y presión  $p$ ). Esto rara vez se hace. En cambio, la suma se aproxima como una integral para obtener la ecuación 3.27. Esta aproximación es buena siempre que  $m^{3/2}/T^{5/2} p^{-1} \gg h^3(2\pi)^{-3/2} k^{-5/2}$ . A la presión estándar  $p = 1 atm$ , esta condición se cumple para moléculas suficientemente pesadas,  $m$  (en una)  $\gg 11.4T^{-5/3}$  y para temperaturas suficientemente altas,  $T \gg 4.31m^{-3/5}$ . Afortunadamente, esto cubre las condiciones de interés químico. Para un gas ideal monoatómico, no hay movimiento vibratorio o rotacional [38].

$$[H(T) - H(0)]_{tras} = \frac{3}{2}RT \quad (3.27)$$

#### 3.11.5. Función de partición rotacional

La rotación libre de una molécula rígida también está cuantizada (el momento angular y su proyección son múltiplos enteros de  $h/2\pi$ ), por lo que la energía de rotación está restrin-

gida a ciertos niveles discretos. Los espectros de rotación se caracterizan por las constantes  $A, B, C$ , donde  $A \equiv h/(8\pi^2 I_A)$  y lo mismo para  $B$  y  $C$ . Las cantidades  $I_{A,B,C}$  son los momentos principales de inercia de la molécula, con la convención  $I_A \leq I_B \leq I_C$  (o  $A \geq B \geq C$ ). Muchos programas, incluidos los paquetes *ab initio*, informan las constantes de rotación cuando se les proporciona una geometría molecular. Los momentos también se pueden calcular manualmente como los valores propios del tensor de inercia, que tiene elementos como  $I_{xy} = -\sum m_i x_i y_i$  y  $I_{xx} = +\sum m_i x_i (y_i^2 + z_i^2)$ , donde el índice  $i$  recorre todos los átomos en la molécula y el origen de coordenadas está en el centro de masa. Las moléculas lineales ( $I_A = 0$ ) se describen mediante una sola constante de rotación  $B$ , y no solo por el momento de inercia,  $I$ . Afortunadamente, a temperaturas lo suficientemente altas ( $kT \gg hA$ ), la suma se puede reemplazar por una integral como lo es para la traslación. En el caso general, la función de partición rotacional viene dada por la ecuación 3.28. Para moléculas lineales, se debe usar la ecuación 3.29 en su lugar [38].

$$[H(T) - H(0)]_{rot} = \frac{3}{2}RT \quad (3.28)$$

$$[H(T) - H(0)]_{rot}^{lineal} = RT \quad (3.29)$$

### 3.11.6. Función de partición vibracional

Para completar el modelo simple de rotor rígido/oscilador armónico (RROA), se deben considerar las vibraciones moleculares. Como se indica en la discusión de ZPE (ecuación 3.23), una molécula que contiene  $N$  átomos tiene  $3N - 6$  frecuencias vibratorias ( $3N - 5$  para moléculas lineales). La función de partición para la entalpía está dada por la ecuación 3.29 [38].

$$[H(T) - H(0)]_{vib} = RT \sum_i \left( \frac{h\nu_i}{kT} \right) \left( \frac{e^{-\frac{h\nu_i}{kT}}}{1 - e^{-\frac{h\nu_i}{kT}}} \right) \quad (3.30)$$



### 3.11.7. Función de partición electrónica

Aunque es posible que no tengan excitación electrónica a baja temperatura estados, algunas moléculas tienen estados fundamentales electrónicos degenerados. Los radicales libres son un ejemplo común. Pueden tener electrones desapareados en sus estados básicos electrónicos y un espín electrónico neto de  $S = n_{desapareado}/2$ , donde  $n_{desapareado}$  es el número de electrones desapareados. La multiplicidad, o degeneración  $g$ , de tal estado es  $g = (2S + 1)$ . El uso de números de degeneración equivale a un recuento explícito de todos los estados, incluidos los degenerados. Por lo tanto,  $Q_{elec} = g$  es una constante y solo afecta la entropía [38].

### 3.11.8. Cálculo de entalpía mediante Termodinámica Estadística

Para calcular la entalpía se usan las ecuaciones 3.27, 3.28, 3.29 y 3.30. Esto es  $[H(298.15) - H(0)] = [H(T) - H(0)]_{vib} + [H(T) - H(0)]_{rot} + [H(T) - H(0)]_{tras}$ . La contribución electrónica es ignorada (es decir, la función de partición correspondiente se establece en la unidad). Por otra parte, es posible remplazar la diferencia de las dos cantidades  $G_n$  o CBS proporcionadas en el resumen termoquímico implementado en *Gaussian* por el valor de la entalpía (energía interna) a partir de su función de partición [38].

## 3.12. Aproximación de Nicolaides y otros autores

Nicolaides y otros autores, en 1996 [2], publicaron un artículo en el que intentan corregir los posibles errores cuando tenemos rotores internos en moléculas. Por ejemplo, para el caso de la molécula de tolueno, el metilo puede estar girando, en consecuencia, es una mala idea usar la aproximación de rotor rígido/oscilador armónico, donde tendríamos un rotor rígido (en un rotor rígido la distancias relativas entre todas las partículas siempre es constante). Cuando una molécula gira o rota, pensaríamos que su geometría y distancias entre sus átomos nunca va a cambiar (ese es un error que se observa en la molécula de tolueno, porque el metilo rota de forma independiente). Y cuando suponemos a la molécula como un rotor

rígido, estamos suponiendo que el metilo no rota, porque si rotase, la distancia relativa de los hidrógenos del metilo a los hidrógenos del anillo aromático cambiaría. Por lo tanto, ya no se cumpliría la definición de rotor rígido. No obstante, pensar en rotores rígidos, simplifica el problema matemático cuando se intenta calcular la función de partición, pero puede darnos errores con moléculas que contienen rotores internos. Es así, que en [2] se propone tratar a las rotaciones internas como rotores libres cuando las frecuencias vibraciones de las moléculas son menores a  $260\text{ cm}^{-1}$  y utilizar  $\frac{1}{2}$  de  $RT$  para la contribución vibracional por cada frecuencia que sea menor a  $260\text{ cm}^{-1}$ . Cuando esto no se cumpla, será necesario utilizar la aproximación de rotor rígido/oscilador armónico. Además, mencionan que se agregaría un  $RT$  adicional a la energía interna para convertir a la energía en entalpía (el llamado término  $PV$ ). La ecuación general para el cálculo de la entalpía (energía interna) tendrá la siguiente forma, obsérvese la ecuación 3.31.

$$[H(298.15) - H(0)] = [H(T) - H(0)]_{vib} + [H(T) - H(0)]_{rot} + [H(T) - H(0)]_{tras} + PV \quad (3.31)$$

### 3.13. Hardware y software

Actualmente, las computadoras pueden realizar cálculos y tomar decisiones lógicas con una rapidez difícil de imaginar (miles de millones de cálculos en un segundo), más de lo que un humano podría realizar en toda su vida. Las computadoras procesan datos, bajo el control de un conjunto de instrucciones conocidas como programas de computadora. Estos programas guían a la computadora a través de conjuntos ordenados de acciones especificadas por gente conocida como programadores. A los programas que se ejecutan en una computadora se les denomina software. A las partes de una computadora que consisten en varios dispositivos se les conoce como hardware (teclado, pantalla, ratón, discos duros, memoria, unidades de procesamiento) [44].

## **3.14. Lenguajes**

Los programadores escriben instrucciones en diversos lenguajes de programación, algunos de los cuales los comprende directamente la computadora, mientras que otros requieren pasos intermedios de traducción.

### **3.14.1. Lenguajes máquina**

Cualquier computadora puede entender de manera directa sólo su propio lenguaje máquina (también conocido como código máquina), el cual se define según su diseño de hardware. Por lo general, los lenguajes máquina consisten en cadenas de números (que finalmente se reducen a 1s y 0s). Dichos lenguajes son difíciles de comprender para los humanos.

### **3.14.2. Lenguajes ensambladores**

La programación en lenguaje máquina era demasiado lenta y tediosa para la mayoría de los programadores. Por lo tanto, empezaron a utilizar abreviaturas del inglés para representar las operaciones elementales. Estas abreviaturas formaron la base de los lenguajes ensambladores. Se desarrollaron programas traductores conocidos como ensambladores para convertir los programas que se encontraban en lenguaje ensamblador a lenguaje máquina. Aunque el código en lenguaje ensamblador es más claro para los humanos, las computadoras no lo pueden entender sino hasta que se traduce en lenguaje máquina.

### **3.14.3. Lenguajes de alto nivel**

Para agilizar el proceso de programación se desarrollaron los lenguajes de alto nivel, en donde podían escribirse instrucciones individuales para realizar tareas importantes. Los lenguajes de alto nivel, como C++, Java, C y Visual Basic nos permiten escribir instrucciones que son muy similares al inglés y contienen expresiones matemáticas de uso común. Los programas traductores llamados compiladores convierten los programas que se encuentran en lenguaje de alto nivel a programas en lenguaje máquina. El proceso de compilación de un

programa escrito en lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina puede tardar un tiempo considerable en la computadora. Los programas intérpretes se desarrollaron para ejecutar programas en lenguaje de alto nivel de manera directa (sin el retraso de la compilación), aunque con mayor lentitud de la que se ejecutan los programas compilados. Los lenguajes de secuencias de comandos, como los populares lenguajes JavaScript y PHP para Web, son procesados por intérpretes [44].

### **3.15. Una breve introducción a C++**

Existe una gran cantidad de lenguajes de programación para escribir software (un ejemplo muy conocido es C++, el cual fue desarrollado por Bjarne Stroustrup en 1979, en los laboratorios Bell). Si uno de estos lenguajes de programación fuera el más adecuado para todos los propósitos, entonces se esperaría que todos usaran este lenguaje, y todos los demás lenguajes eventualmente quedarían obsoletos. Esto, sin embargo, no es el caso. A continuación, se explicará por qué C++ es un lenguaje de programación adecuado para aplicaciones científicas y por qué no es la única opción [45].

#### **3.15.1. Alcance de C++ en el ámbito científico**

En el campo de la programación científica, se utilizan muchos lenguajes y la mayoría de los científicos optan por Matlab, C/C++ o Fortran. La primera y más convincente razón para usar C++ (así como C y Fortran) es porque es rápido. Es decir, con una programación y optimizaciones cuidadosas, un programa se puede compilar en código de máquina que puede usar todo el poder del hardware disponible. Muchos lenguajes de secuencias de comandos (como Matlab y Python) son lenguajes ensambladores (el código que se escribe, se traduce a código de máquina en tiempo de ejecución). Otros lenguajes (como Java y C) se compilan a la mitad, en un código de bytes independiente del hardware que luego se interpreta en tiempo de ejecución. La interpretación del tiempo de ejecución significa que parte de la potencia de la computadora se gasta en el proceso de conversión y también que es más difícil aplicar optimizaciones. Hoy en día, las implementaciones de Matlab, Python y Java utilizan trucos

inteligentes como el almacenamiento en memoria caché de los pasos de compilación y la compilación justo a tiempo para que los programas se ejecuten más rápido. No obstante, estos trucos requieren un esfuerzo computacional, por lo tanto, es posible que estos lenguajes no utilicen completamente el poder de todo el hardware. Una segunda razón para usar C++ es que hay una gran cantidad de bibliotecas numéricas para computación científica en C++ y lenguajes relacionados. Muchos algoritmos numéricos se establecieron en la década de 1950 y luego se incorporaron a las bibliotecas de software (como EISPACK y LINPACK) en la década de 1970. Si se optara por escribir código utilizando software bien establecido y probado, entonces se está construyendo sobre décadas de experiencia y mejora. Una tercera razón para elegir escribir código en C++ es que existe una amplia gama de herramientas comerciales y de código abierto que lo respaldan. En contraste, si estuviéramos distribuyendo programas de Matlab, se necesitaría tener Matlab y una licencia instalada porque es un producto propietario. Hay productos similares de código abierto (como GNU Octave), pero no existe garantía de que un programa de Matlab produzca la misma respuesta cuando se ejecute. En Octave, debido a que es de código cerrado, el significado de un programa puede cambiar entre versiones de Matlab. Por ejemplo, cuando se introdujo la compilación justo a tiempo en Matlab 7, la semántica operativa del lenguaje cambió sutilmente. Esto significa que una pequeña minoría de los programas de Matlab que se sabía que funcionaban bien con una versión de Matlab podría producir resultados incorrectos, errores o advertencias en otra versión. Una cuarta razón para elegir C++ es que tiene un modelo de gestión de memoria flexible. En un lenguaje como Java, parte de la memoria del sistema se usa en la interpretación y se usa un recolector de basura para ordenar la memoria que ya se no está usando, por lo que es posible que no se pueda predecir cuánta memoria va a necesitar un programa. En C++ podemos hacer esta predicción, pero es un arma de doble filo porque también se es responsable de que la memoria se administre correctamente. Una razón final para programar en C++ es que es un lenguaje orientado a objetos [45].

### 3.15.2. C++ y la programación orientado a objetos

C++ es un lenguaje “orientado a objetos”. ¿Qué distingue a un lenguaje que está orientado a objetos de uno que no lo está? Fundamentalmente, que la unidad básica del lenguaje es un objeto o clase, una entidad que reúne funcionalidad y datos relacionados. Algunos conceptos relacionados con la programación orientación a objetos son:

- **Modularidad.** Todos los datos de un objeto en particular, y las operaciones que realizamos en este objeto, se guardan en uno o dos archivos y se pueden trabajar en forma independiente.
- **Abstracción.** Las características esenciales y la funcionalidad de una clase se colocan en un solo lugar y los detalles de cómo funcionan no son importantes para el usuario de la clase. Por ejemplo, si se está utilizando una biblioteca de sistema lineal para resolver ecuaciones matriciales, no se debería necesitar conocer los detalles precisos de cómo se disponen las matrices en la memoria o el orden exacto en que un solucionador numérico realiza sus operaciones. Solo se debe saber cómo usar la funcionalidad de la biblioteca.
- **Encapsulación.** La implementación de un objeto se mantiene oculta para el usuario de la clase. No se trata solo de claridad (abstrayendo los detalles). También se trata de evitar que el usuario modifique accidentalmente el funcionamiento interno de, por ejemplo, un solucionador lineal, ocasionado que funcione de manera incorrecta.
- **Extensibilidad.** La funcionalidad se puede reutilizar con partes seleccionadas extendidas. Por ejemplo, gran parte del núcleo de un solucionador lineal se encuentra en los productos matriz-vector y los productos escalares; este tipo de funcionalidad solo necesita implementarse una vez, luego otras partes del programa pueden desarrollarse a partir de ella.
- **Polimorfismo.** El mismo código se puede utilizar para una variedad de objetos. Por ejemplo, nos gustaría usar un código C++ de apariencia similar para elevar una matriz de números complejos a una potencia dada como lo haríamos para elevar un número

real a una potencia dada, aunque las operaciones aritméticas básicas “detrás de escena” son diferentes.

- **Herencia.** Ésta es, quizá, la característica más importante de la programación orientada a objetos, permite la reutilización del código, la extensibilidad y el polimorfismo. Por ejemplo, un nuevo solucionador lineal para sistemas de matrices singulares compartirá muchas de las características de un solucionador lineal básico. La herencia permite que el nuevo solucionador derive la funcionalidad del solucionador básico y luego se base en esta funcionalidad.

La mayoría de los programas de C++ para computación científica se pueden escribir de manera muy efectiva utilizando solo una fracción de las capacidades totales del lenguaje. En este trabajo nos centraremos en los aspectos de C++ que es más probable que se utilicen o se encuentren en el código de otro programador, para aplicaciones informáticas científicas [45].

## Resultados y discusión

La esencia de esta tesis es crear un conjunto de programas de cómputo científico que calculan entalpías de formación de compuestos orgánicos a  $T = 298.15$  K partiendo de archivos de salida de **Gaussian09**. En consecuencia, es necesaria una explicación detallada de todo esto. Por lo que he dividido esta descripción en dos secciones; el algoritmo y su uso para la obtención de resultados.


Es importante mencionar que los programas creados fueron inspirados por un programa de cómputo científico que también calcula entalpías de formación de compuestos orgánicos, el lenguaje de programación usado fue **FORTRAN** en su versión 90. Dicho programa fue creado a inicios del año 2000 por el coasesor de esta tesis, **Dr. Julio Manuel Pérez Hernández**.

### 4.1. Algoritmo (diseño del programa)


La entalpía de formación fue calculada a partir del método de atomización [7] y varias correcciones térmicas de la energía interna [2]. La Termodinámica Estadística nos permitió separar la función de partición en un producto de los componentes traslacionales, rotacionales, vibracionales, electrónicas y nucleares, con la finalidad de obtener la función de estado de nuestro interés [10]. Todo ello culminó en la creación de varios programas de cómputo que automatizan el cálculo de entalpías de formación. Además, se produjeron versiones cu-



ya arquitectura de software permitirá en un futuro, añadir diferentes métodos de una manera rápida [8, 26]. El procedimiento general se observa en el siguiente diagrama de flujo (véase la figura 4.1). A continuación, se explica a detalle cada uno de los pasos del diagrama de flujo general junto con un ejemplo. Para esto, se eligió al metanol (figura 4.2), a la que nos referiremos desde ahora como **molécula X** ( Mol.X ).



**Figura 4.1:** Diagrama de flujo general



**Figura 4.2:** Molécula de metanol, utilizada para explicar el diagrama de flujo general.

#### 4.1.1. Inicio

El programa comienza con la lectura de un archivo de entrada que contiene la información necesaria de la molécula. Para la **molécula X**, el archivo de entrada tendrá la siguiente forma:

**Transcripción 4.1:** Output de CH3OH-G4.txt

```

1 G4
2 3
3 -115.651767
4 -115.647489
5 1 4
6 6 1
7 8 1
8 0
9 0
10 12
11 322.7598
12 1058.0227
13 1094.4693
    
```

14	1175.9092
15	1389.4710
16	1487.0775
17	1495.0437
18	1513.5228
19	2980.0300
20	3023.9572
21	3106.3296
22	3831.1143

#### 4.1.2. Paso 1 del diagrama de flujo general

Ahora, se leerá el archivo de entrada de la siguiente forma:

1. Categoría de método.
2. Número de especies atómicas.
3. Energía G4 a 0 K.
4. Entalpía G4 a 0 K.
5. Número atómico y número de átomos.
6. Tipo de molécula (lineal o no lineal).
7. Modelo de aproximación usada (Nicolaidies o Rotor Rígido/Oscilador Armónico).
8. Número de modos de vibración.
9. Frecuencias vibracionales de la molécula.

Las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 siempre se encargarán de leer la categoría del método, el número de especies atómicas, la energía G4 a  $T = 0$  K, la entalpía G4 a  $T = 0$  K, el número atómico y el

número de átomos, respectivamente. Mientras que las líneas 6, 7, 8 y 9 no siempre ocuparán el mismo lugar, porque éstas dependen de líneas anteriores.

Por ejemplo, para la **molécula X**, el número de especies atómicas serán tres: Hidrógeno, Carbono y Oxígeno. En consecuencia, la línea 5 se repetirá tres veces para las especies mencionadas. Después, se leerá el tipo de molécula (lineal o no lineal), posteriormente, el modelo de aproximación usada (Nicolaidis o Rotor Rígido/Oscilador Armónico). Por último, el número de modos de vibración que influirá en las frecuencias vibracionales de la molécula. Al terminar el proceso de lectura, toda esta información es almacenada en variables específicas del programa.

#### 4.1.3. Paso 2 del diagrama de flujo general

Como tercer paso en el diagrama general, se encuentra la determinación del método utilizado, que es indispensable para comenzar con los cálculos. **EnthalpyNIST** (uno de los 3 programas creados) cuenta con varios métodos de Gaussian, pero en nuestra explicación utilizaremos sólo el método **G4 de Gaussian09** (véase el apéndice B para obtener información sobre otros métodos de Gaussian). Hecho esto, el programa tiene la certeza de qué datos ocupar para las especies atómicas antes leídas.

#### 4.1.4. Paso 3 del diagrama de flujo general

En este paso se realiza el cálculo de la entalpía de atomización a  $T = 0$  K de la molécula. Aquí se utilizan los valores del método G4 para cada uno de los átomos presentes en la **molécula X**, la cantidad estequiométrica de estos y la entalpía G4 de la molécula a  $T = 0$  K (véase las ecuaciones 4.1 y 4.2). Para concluir, se realiza una conversión de unidades de energía (hartree a kJ). Obsérvese las ecuaciones 4.4 y 4.5.

$$\Delta_{a0}H^{\ominus}(CH_3OH) = \Delta_{0K}H^{\text{total}}(C(^3P) + 4H(^2S) + O(^3S)) - \Delta_{0K}E^{\text{total}}(CH_3OH) \quad (4.1)$$

$$\Delta_{a0}H^{\ominus}(CH_3OH) = -37.834170 + 4(-0.501420) - 75.045500 - (-115.651767) h \quad (4.2)$$

$$\Delta_{a0}H^{\ominus}(CH_3OH) = -114.885349 + 115.651767 h \quad (4.3)$$

$$\Delta_{a0}H^{\ominus}(CH_3OH) = (-0.766417 h)(2625.4997480 kJ \cdot mol^{-1}) \quad (4.4)$$

$$\Delta_{a0}H^{\ominus}(CH_3OH) = 2012.2276 kJ \cdot mol^{-1} \quad (4.5)$$

#### 4.1.5. Paso 4 del diagrama de flujo general

En este paso se realiza el cálculo de la entalpía de formación a  $T = 0$  K de la molécula. Nuevamente, se utilizan valores experimentales para cada uno de los átomos presentes en la molécula junto con su cantidad específica y el valor de la entalpía de atomización a  $T = 0$  K obtenido anteriormente (ecuaciones 4.6 y 4.7). Al valor obtenido en este paso se le conoce como **calor de formación** (ecuación 4.9). Por último, se realiza una conversión de unidades de energía (kJ a kcal), ver las ecuaciones 4.10 y 4.11.

$$\Delta_{f0}H^{\ominus}(CH_3OH) = \Delta_{f0}H^{\ominus}(C(^3P) + 4H(^2S) + O(^3S)) - \Delta_{f0}E^{\ominus}(CH_3OH) \quad (4.6)$$

$$\Delta_{f0}H^{\ominus}(CH_3OH) = 711.185 + 4(216.03500) + 246.7900 - 2012.2276 kJ \cdot mol^{-1} \quad (4.7)$$

$$\Delta_{f0}H^{\ominus}(CH_3OH) = 1822.115 - 2012.2276 kJ \cdot mol^{-1} \quad (4.8)$$

$$\Delta_{f0}H^{\ominus}(CH_3OH) = -190.1126 kJ \cdot mol^{-1} \quad (4.9)$$

$$\Delta_{f0}H^{\ominus}(CH_3OH) = (-190.1126 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1})(0.023888 \text{ kcal}) \quad (4.10)$$

$$\Delta_{f0}H^{\ominus}(CH_3OH) = -45.41 \text{ kcal} \quad (4.11)$$

#### 4.1.6. Paso 5 del diagrama de flujo general

El paso 5 se encarga de cuantificar la diferencia entre las dos cantidades G4 (T = 0 K y T = 298.15 K) leídas en el paso 1 (ecuación 4.13). Además, se realiza una conversión de unidades de energía (hartree a kJ), ecuaciones 4.14 y 4.15.

$$\Delta\Delta H^{\ominus}(CH_3OH) = G4Entalpia - G4(0K) \quad (4.12)$$

$$\Delta\Delta H^{\ominus}(CH_3OH) = -115.647489 - (-115.651767) h \quad (4.13)$$

$$\Delta\Delta H^{\ominus}(CH_3OH) = (0.004278)(2625.4997480 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \quad (4.14)$$

$$\Delta\Delta H^{\ominus}(CH_3OH) = 11.23188 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (4.15)$$

#### 4.1.7. Paso 6 del diagrama de flujo general

En el paso 6 se obtiene el valor de la entalpía de formación a T = 298.15 K (sumando el calor de formación, la diferencia de las dos cantidades G4 y restando los incrementos correspondientes para los elementos de la molécula en sus estados estándar), en consecuencia, se usan los valores obtenidos en los pasos 4 y 5 (véase las ecuaciones 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19). Finalmente, se realiza una conversión de unidades de energía de kJ a kcal (ecuaciones 4.20 y 4.21).

$$\Delta_{f298}H^{\ominus}(CH_3OH) = \Delta_{f0}H^{\ominus}(CH_3OH) + \Delta\Delta H^{\ominus}(CH_3OH) - (\Delta\Delta H^{\ominus}(C) + 2\Delta\Delta H^{\ominus}(H_2) + \frac{1}{2}\Delta\Delta H^{\ominus}(O_2)) \quad (4.16)$$

$$\Delta_{f298}H^{\ominus}(CH_3OH) = -190.1126 + 11.23188 - (1.05100 + 2(8.46700) + \frac{1}{2}(8.67000)) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (4.17)$$

$$\Delta_{f298}H^{\ominus}(CH_3OH) = -190.1126 + 11.23188 - 22.3265 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (4.18)$$

$$\Delta_{f298}H^{\ominus}(CH_3OH) = -201.21 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (4.19)$$

$$\Delta_{f298}H^{\ominus}(CH_3OH) = (-201.21 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1})(0.023888 \text{ kcal}) \quad (4.20)$$

$$\Delta_{f298}H^{\ominus}(CH_3OH) = -48.06 \text{ kcal} \quad (4.21)$$

#### 4.1.8. Paso 7, 8 y 9 del diagrama de flujo general

Los pasos 7 y 8 son de los más importantes del programa, porque calculan la energía interna (paso 6) usando ecuaciones que provienen de la Termodinámica Estadística. Se inicia con dos sentencias de condición que evalúan parámetros de la molécula, como son:

1. Qué aproximaciones usar.
2. El número de modos de vibración.
3. Frecuencias vibracionales.
4. Si es lineal o no.

El tipo de aproximación usada solo puede tener dos valores, 0 y 1. Si el archivo de entrada de la molécula muestra un valor de 0 significa que se usará la aproximación de Nicolaidis y otros autores [2] (no tomara en cuenta las frecuencias vibraciones de la molécula menores a  $260\text{ cm}^{-1}$  y devolverá  $\frac{1}{2}$  de  $RT$  para la contribución vibracional por cada frecuencia que sea menor a  $260\text{ cm}^{-1}$ ). Y si el valor es 1, la aproximación de rotor rígido y oscilador armónico [10] sera usada para los cálculos.

También existen dos posibles valores en el archivo de entrada para el parámetro de la linealidad de la molécula. Un valor de 1 devolverá un  $RT$  en la contribución rotacional, en cambio, si el valor es 0, el condicional retornará un  $\frac{3}{2}$  de  $RT$  en la contribución rotacional. Después, se inicia una estructura de control que se repetirá el mismo número de veces que el número de modos de vibración de la molécula (una molécula que tiene  $N$  especies atómicas puede tener solamente  $3N - 6$  modos fundamentales de vibración para una molécula no lineal, o  $3N - 5$  si la molécula es lineal).

La iteración usa las ecuaciones 3.27, 3.28, 3.29, y 3.30 que provienen de la Termodinámica Estadística [10, 38] ,para determinar a la energía interna como una suma de las contribuciones vibracionales, rotacionales, traslacionales y electrónicas (ecuación 3.31). La contribución traslacional siempre tendrá el valor de  $\frac{3}{2}RT$  para cualquier molécula (ecuación 3.27). Además, se agrega un  $RT$  adicional a la energía interna para convertir la energía en entalpía (el llamado término PV, ecuación 3.29). Cabe aclarar que el valor obtenido en la primera iteración es acumulativo para los subsecuentes. Concluida la determinación, se devuelve la suma total de la energía interna. Para la **molécula X** el número de modos de vibración será 12 (es una molécula no lineal), por lo consiguiente, la ecuación 3.30 se repetirá 12 veces con cada una de las frecuencias de la molécula. El resultado final es la suma de las contribuciones de la energía interna, véase la ecuación 3.31.

$$[H(298.15) - H(0)] = 1315.1747 + 3718.4568 + 3718.4568 + 2478.9712 = 11.2310\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (4.22)$$



#### 4.1.9. Paso 10 del diagrama de flujo general

El paso 9 simplemente reemplaza el valor obtenido anteriormente (energía interna), por el valor calculado en el paso 5 en la determinación de la entalpía de formación a  $T = 298.15$  K, es decir, en el paso 6. Para terminar, se hace una conversión de unidades de energía (kJ a kcal).

$$\Delta_{f298}H^{\ominus}(CH_3OH) = -190.1126 + 11.2310 - 22.3265 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (4.23)$$

$$\Delta_{f298}H^{\ominus}(CH_3OH) = -201.21 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (4.24)$$

$$\Delta_{f298}H^{\ominus}(CH_3OH) = -48.06 \text{ kcal} \quad (4.25)$$

#### 4.1.10. Paso 11 del diagrama de flujo general

El último paso del diagrama de flujo, se encarga de devolver los valores calculados anteriormente, imprimiéndolos en la pantalla a través de la línea de comandos de siguiente forma:

**Transcripción 4.2:** Output de CH3OH-G4.txt en EnthalpyNIST

```

1 $. / computeEnthalpyNIST.x  CH3OH-G4.txt$
2 =====
3           New calculation of molecular enthalpies of formation
4
5           Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal
6           corrections for elements in their standard state at 298.15 K from:
7
8           NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem.
9           Data Monograph 9, 1998, 1-1951.
10 =====
11 Heats of formation:

```

```

12 0K          -190.11 kJ mol-1
13 0K          -45.41 kcal mol-1
14
15 Using Nicolaides method:
16 298K        -201.21 kJ mol-1
17 298K        -48.06 kcal mol-1
18
19 Using G4:
20 298K        -201.21 kJ mol-1
21 298K        -48.06 kcal mol-1
22 =====

```

## 4.2. Código

El lenguaje de programación elegido para crear de estos programas es c++. El motivo principal de su uso fue que facilita una programación orientada a objetos que fragmenta el código en partes independientes, permitiendo así, reciclar el código para futuros proyectos [44–46].

### Clases

Ahora, se enlistan los nombres de las clases utilizadas para estos programas:

- Enthalpyinputdata.
- Method.
- EnthalpyG4.
- EnthalpyG3.
- EnthalpyG3MP2.
- EnthalpyCBS-APNO.

- EnthalpyCBS-QB3.

## Clase Enthalpyinputdata

Enthalpyinputdata se encarga de leer los datos (provenientes de Gaussian) del archivo de entrada. Los datos que lee esta clase son:

- Tipo de método.
- Número de especies atómicas.
- Energía G4 a 0 K.
- Entalpía G4 a 0 K.
- Número atómico y número de átomos .
- Tipo de molécula (lineal o no lineal).
- Tipo de aproximación usada (Nicolaidies o Rotor Rígido y Oscilador Armónico).
- Número de modos de vibración.
- Frecuencias vibracionales de la molécula.

La finalidad de esta clase es determinar y almacenar información indispensable para comenzar con el cálculo de la entalpía de formación [45].

## Clase Method

La clase Method se utiliza para seleccionar el tipo de método que se realizó en Gaussian, y así, devolver valores específicos para los átomos de Hidrógeno, Carbono, Oxígeno, Nitrógeno, Flúor y Azufre.

## Clases EnthalpyG4 y variantes

El trabajo de esta clase y sus variantes (EnthalpyG3, EnthalpyG3MP2, EnthalpyCBS-APNO y EnthalpyCBS-QB3) es realizar las operaciones aritméticas para obtener el calor de formación de la molécula, la entalpía de formación a  $T = 298.15$  K mediante el método de atomización y la entalpía de formación a  $T = 298.15$  K con correcciones en la energía interna. Para concluir, imprime los resultados a través de la línea de comandos.


### 4.3. Conjunto de pruebas

Como parte del proceso de diseño e implementación de software científico, es fundamental corroborar que los programas funcionan de forma correcta, por lo que se realizaron pruebas con moléculas que cuentan con entalpías de formación conocidas y que han sido reportadas en la literatura científica [3]. Las moléculas elegidas son isómeros del nitrobenzaldeído (figura 4.3) y son:

- 2-nitrobenzaldeído (2NBA).
- 3-nitrobenzaldeído (3NBA).
- 4-nitrobenzaldeído (4NBA).

Los derivados de nitrobenzaldeído son compuestos aromáticos que tienen un gran número de aplicaciones. Entre ellos se encuentran los intermediarios en la preparación de productos químicos de alto valor agregado, pesticidas, materiales ópticos no lineales, productos farmacéuticos, bases de Schiff, etcétera [3].

Las entalpías de formación de las moléculas fueron calculadas utilizando los métodos G4 y G3MP2, así mismo, se utilizaron las aproximaciones de Nicolaides y otros autores, oscilador armónico y rotor rígido en todas las moléculas [2, 10]. Para ello, las frecuencias se calcularon a un nivel teórico B3LYP/6-31G(2df,p) escaladas a 0.9854 y 0.89290. Las entalpías atómicas de formación fueron a  $T = 0$  K y sus correcciones térmicas a  $T = 298.15$  K se tomaron de la referencia [5] (excluyendo el valor del átomo de Carbono, cuyo dato coincide con Tajti y otros



**Figura 4.3:** Estructuras moleculares del 2-nitrobenzaldehído (2NBA), 3-nitrobenzaldehído (3NBA) y 4-nitrobenzaldehído (4NBA).

autores [6] para el método G4). Los archivos de salida proceden del software **Gaussian09**, mientras que el archivo que contiene la información necesaria para nuestro programa fue obtenida por el script **gendeltahfinputfile** (proviene del **Laboratorio de Fisicoquímica Orgánica Teórica de la BUAP**). Los valores de la entalpía de formación a  $T = 298.15$  K calculados por nuestro programa del 2-nitrobenzaldehído (2NBA), 3-nitrobenzaldehído (3NBA) y 4-nitrobenzaldehído (4NBA) se muestran a continuación.

#### 4.3.1. Conjunto de pruebas: 2NBA, 3NBA y 4NBA

Es posible apreciar la entalpía de formación a  $T = 298.15$  K de las 15 simulaciones realizadas en las líneas 22, 20 y 21 de cada molécula, respectivamente. Todos los resultados coinciden con los valores de las moléculas de 2NBA, 3NBA y 4NBA reportados por Ximello y otros autores [3], véase las tablas 4.1, 4.2 y 4.3.

**Transcripción 4.3:** Output de 2NBALa-2.txt en EnthalpyTajti

```
1 ./computeEnthalpyTajti.x 2NBALa-2.txt
```

```
2 =====
```

```

3       New calculation of molecular enthalpies of formation
4
5   Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K (with the exception of
6   carbon data 711.79 kJ/mol from A. Tajti et al. J. Chem. Phys. 121,
7   2004, 11599) and thermal corrections for elements in their standard
8   states at 298.15 K from:
9
10  NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem. Data Monograph 9, 1998,
11  1–1951.
12  =====
13  Heats of formation:
14  0K          -8.58 kJ mol-1
15  0K          -2.05 kcal mol-1
16
17  Using Nicolaides method:
18  298K        -30.82 kJ mol-1
19  298K        -7.36 kcal mol-1
20
21  Using G4 Enthalpy:
22  298K        -28.19 kJ mol-1
23  298K        -6.73 kcal mol-1
24  =====

```

**Transcripción 4.4:** Output de 2NBALb-2.txt en EnthalpyTajti

```

1  ./computeEnthalpyTajti.x 2NBALb-2.txt
2  =====
3       New calculation of molecular enthalpies of formation
4
5   Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K (with the exception of
6   carbon data 711.79 kJ/mol from A. Tajti et al. J. Chem. Phys. 121,

```

2004, 11599) and thermal corrections for elements in their standard states at 298.15 K from:

NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem. Data Monograph 9, 1998, 1–1951.

Heats of formation:

0K                   –16.26 kJ mol<sup>–1</sup>

0K                   –3.88 kcal mol<sup>–1</sup>

Using Nicolaides method:

298K               –38.73 kJ mol<sup>–1</sup>

298K               –9.25 kcal mol<sup>–1</sup>

Using G4 Enthalpy:

298K               –36.25 kJ mol<sup>–1</sup>

298K               –8.66 kcal mol<sup>–1</sup>

**Transcripción 4.5:** Output de 3NBALa-2.txt en EnthalpyTajti

./computeEnthalpyTajti.x 3NBALa-2.txt

New calculation of molecular enthalpies of formation

Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K (with the exception of carbon data 711.79 kJ/mol from A. Tajti et al. J. Chem. Phys. 121, 2004, 11599) and thermal corrections for elements in their standard states at 298.15 K from:

NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem. Data Monograph 9, 1998,

11 1–1951.

12 =====

13 Heats of formation:

14 0K               –35.36 kJ mol<sup>–1</sup>

15 0K               –8.45 kcal mol<sup>–1</sup>

16

17 Using Nicolaides method:

18 298K           –57.82 kJ mol<sup>–1</sup>

19 298K           –13.81 kcal mol<sup>–1</sup>

20

21 Using G4 Enthalpy:

22 298K           –55.46 kJ mol<sup>–1</sup>

23 298K           –13.25 kcal mol<sup>–1</sup>

24 =====

**Transcripción 4.6:** Output de 3NBALb-2.txt en EnthalpyTajti

1 ./computeEnthalpyTajti.x 3NBALb-2.txt

2 =====

3               New calculation of molecular enthalpies of formation

4

5 Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K (with the exception of  
6 carbon data 711.79 kJ/mol from A. Tajti et al. J. Chem. Phys. 121,  
7 2004, 11599) and thermal corrections for elements in their standard  
8 states at 298.15 K from:

9

10 NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem. Data Monograph 9, 1998,  
11 1–1951.

12 =====

13 Heats of formation:

14 0K               –33.75 kJ mol<sup>–1</sup>



15 0K -8.06 kcal mol<sup>-1</sup>

16

17 Using Nicolaides method:

18 298K -56.26 kJ mol<sup>-1</sup>

19 298K -13.44 kcal mol<sup>-1</sup>

20

21 Using G4 Enthalpy:

22 298K -53.82 kJ mol<sup>-1</sup>

23 298K -12.85 kcal mol<sup>-1</sup>

24

**Transcripción 4.7:** Output de 4NBALa-2.txt en EnthalpyTajti

1 ./computeEnthalpyTajti.x 4NBALa-2.txt

2

3 New calculation of molecular enthalpies of formation

4

5 Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K (with the exception of  
6 carbon data 711.79 kJ/mol from A. Tajti et al. J. Chem. Phys. 121,  
7 2004, 11599) and thermal corrections for elements in their standard  
8 states at 298.15 K from:

9

10 NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem. Data Monograph 9, 1998,  
11 1-1951.

12

13 Heats of formation:

14 0K -33.82 kJ mol<sup>-1</sup>

15 0K -8.08 kcal mol<sup>-1</sup>

16

17 Using Nicolaides method:

18 298K -56.33 kJ mol<sup>-1</sup>

19 298K            -13.45 kcal mol<sup>-1</sup>

20

21 Using G4 Enthalpy:

22 298K            -53.84 kJ mol<sup>-1</sup>

23 298K            -12.86 kcal mol<sup>-1</sup>

24

**Transcripción 4.8:** Output de 2NBALa-2.txt en EnthalpyNIST

1 ./ computeEnthalpyNIST.x 2NBALa-2.txt

2

3            New calculation of molecular enthalpies of formation

4

5            Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal  
6            corrections for elements in their standard state at 298.15 K from:

7

8            NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem.

9            Data Monograph 9, 1998, 1-1951.

10

11 Heats of formation:

12 0K            -16.61 kJ mol<sup>-1</sup>

13 0K            -3.97 kcal mol<sup>-1</sup>

14

15 Using Nicolaides method:

16 298K            -38.91 kJ mol<sup>-1</sup>

17 298K            -9.29 kcal mol<sup>-1</sup>

18

19 Using G3MP2 Enthalpy:

20 298K            -36.42 kJ mol<sup>-1</sup>

21 298K            -8.70 kcal mol<sup>-1</sup>

22

**Transcripción 4.9:** Output de 2NBALb-2.txt en EnthalpyNIST

```

1 ./ computeEnthalpyNIST.x 2NBALb-2.txt
2 =====
3           New calculation of molecular enthalpies of formation
4
5           Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal
6           corrections for elements in their standard state at 298.15 K from:
7
8           NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem.
9           Data Monograph 9, 1998, 1-1951.
10 =====
11 Heats of formation:
12 0K           -7.11 kJ mol-1
13 0K           -1.70 kcal mol-1
14
15 Using Nicolaides method:
16 298K         -29.28 kJ mol-1
17 298K         -6.99 kcal mol-1
18
19 Using G3MP2 Enthalpy:
20 298K         -26.60 kJ mol-1
21 298K         -6.35 kcal mol-1
22 =====

```

**Transcripción 4.10:** Output de 3NBALa-2.txt en EnthalpyNIST

```

1 ./ computeEnthalpyNIST.x 3NBALa-2.txt
2 =====
3           New calculation of molecular enthalpies of formation
4

```

Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal  
corrections for elements in their standard state at 298.15 K from:

NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem.  
Data Monograph 9, 1998, 1–1951.

Heats of formation:

0K             $-35.18 \text{ kJ mol}^{-1}$

0K             $-8.40 \text{ kcal mol}^{-1}$

Using Nicolaides method:

298K             $-57.44 \text{ kJ mol}^{-1}$

298K             $-13.72 \text{ kcal mol}^{-1}$

Using G3MP2 Enthalpy:

298K             $-54.94 \text{ kJ mol}^{-1}$

298K             $-13.12 \text{ kcal mol}^{-1}$

**Transcripción 4.11:** Output de 3NBALb-2.txt en EnthalpyNIST

./computeEnthalpyNIST.x 3NBALb-2.txt

New calculation of molecular enthalpies of formation

Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal  
corrections for elements in their standard state at 298.15 K from:

NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem.  
Data Monograph 9, 1998, 1–1951.

```

11 Heats of formation:
12 0K          -33.44 kJ mol-1
13 0K          -7.99 kcal mol-1
14
15 Using Nicolaides method:
16 298K        -55.77 kJ mol-1
17 298K        -13.32 kcal mol-1
18
19 Using G3MP2 Enthalpy:
20 298K        -53.19 kJ mol-1
21 298K        -12.70 kcal mol-1

```

**Transcripción 4.12:** Output de 4NBALa-2.txt en EnthalpyNIST

```

1 ./computeEnthalpyNIST.x 4NBALa-2.txt
2 =====
3           New calculation of molecular enthalpies of formation
4
5           Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal
6           corrections for elements in their standard state at 298.15 K from:
7
8           NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem.
9           Data Monograph 9, 1998, 1-1951.
10 =====
11 Heats of formation:
12 0K          -33.23 kJ mol-1
13 0K          -7.94 kcal mol-1
14
15 Using Nicolaides method:
16 298K        -55.54 kJ mol-1

```

17 298K            -13.27 kcal mol<sup>-1</sup>

18

19 Using G3MP2 Enthalpy:

20 298K            -52.91 kJ mol<sup>-1</sup>

21 298K            -12.64 kcal mol<sup>-1</sup>

22 =====

**Transcripción 4.13:** Output de 2NBALa-2.txt en EnthalpyArgonne

1 ./ computeEnthalpyArgonne.x 2NBALa-2.txt

2 =====

3            New calculation of molecular enthalpies of formation

4

5 Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal corrections  
6            for elements in their standard states at 298.15 K from:

7

8

9            ARGONNE Thermochemical Tables

10            Warning: sulfur is taken from NIST

11 =====

12 Heats of formation:

13 0K            -15.20 kJ mol<sup>-1</sup>

14 0K            -3.63 kcal mol<sup>-1</sup>

15

16 Using Nicolaides method:

17 298K            -37.49 kJ mol<sup>-1</sup>

18 298K            -8.96 kcal mol<sup>-1</sup>

19

20 Using G3MP2 Enthalpy:

21 298K            -35.01 kJ mol<sup>-1</sup>

22 298K            -8.36 kcal mol<sup>-1</sup>

23

**Transcripción 4.14:** Output de 2NBALb-2.txt en EnthalpyArgonne

```

1 ./computeEnthalpyArgonne.x 2NBALb-2.txt
2 =====
3           New calculation of molecular enthalpies of formation
4
5 Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal corrections
6   for elements in their standard states at 298.15 K from:
7
8
9           ARGONNE Thermochemical Tables
10          Warning: sulfur is taken from NIST
11 =====
12 Heats of formation:
13 0K          -5.69 kJ mol-1
14 0K          -1.36 kcal mol-1
15
16 Using Nicolaides method:
17 298K        -27.86 kJ mol-1
18 298K        -6.65 kcal mol-1
19
20 Using G3MP2 Enthalpy:
21 298K        -25.19 kJ mol-1
22 298K        -6.02 kcal mol-1
23 =====

```

**Transcripción 4.15:** Output de 3NBALa-2.txt en EnthalpyArgonne

```

1 ./computeEnthalpyArgonne.x 3NBALa-2.txt
2 =====

```

```

3       New calculation of molecular enthalpies of formation
4
5   Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal corrections
6       for elements in their standard states at 298.15 K from:
7
8
9       ARGONNE Thermochemical Tables
10      Warning: sulfur is taken from NIST
11  =====
12  Heats of formation:
13  0K          -33.76 kJ mol-1
14  0K          -8.06 kcal mol-1
15
16  Using Nicolaides method:
17  298K        -56.02 kJ mol-1
18  298K        -13.38 kcal mol-1
19
20  Using G3MP2 Enthalpy:
21  298K        -53.52 kJ mol-1
22  298K        -12.78 kcal mol-1
23  =====

```

**Transcripción 4.16:** Output de 3NBALb-2.txt en EnthalpyArgonne

```

1  ./ computeEnthalpyArgonne.x 3NBALb-2.txt
2  =====
3       New calculation of molecular enthalpies of formation
4
5   Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal corrections
6       for elements in their standard states at 298.15 K from:
7

```



8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23

ARGONNE Thermochemical Tables  
Warning: sulfur is taken from NIST

Heats of formation:

0K            -32.03 kJ mol<sup>-1</sup>  
0K            -7.65 kcal mol<sup>-1</sup>

Using Nicolaides method:

298K           -54.35 kJ mol<sup>-1</sup>  
298K           -12.98 kcal mol<sup>-1</sup>

Using G3MP2 Enthalpy:

298K           -51.78 kJ mol<sup>-1</sup>  
298K           -12.37 kcal mol<sup>-1</sup>

**Transcripción 4.17:** Output de 4NBALa-2.txt en EnthalpyArgonne

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

./ computeEnthalpyArgonne.x 4NBALa-2.txt

New calculation of molecular enthalpies of formation

Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal corrections  
for elements in their standard states at 298.15 K from:

ARGONNE Thermochemical Tables  
Warning: sulfur is taken from NIST

Heats of formation:

13 0K                -31.82 kJ mol<sup>-1</sup>  
 14 0K                -7.60 kcal mol<sup>-1</sup>  
 15  
 16 Using Nicolaides method:  
 17 298K             -54.12 kJ mol<sup>-1</sup>  
 18 298K             -12.93 kcal mol<sup>-1</sup>  
 19  
 20 Using G3MP2 Enthalpy:  
 21 298K             -51.50 kJ mol<sup>-1</sup>  
 22 298K             -12.30 kcal mol<sup>-1</sup>  
 23 =====

$\Delta_f H_m^\circ(298.15K) kJ \cdot mol^{-1}$		
n-NBA	Ximello y otros autores	EnthalpyTajti
2NBAA	-28.19	-28.19
2NBAb	-36.25	-36.25
3NBAA	-53.82	-53.82
3NBAb	-55.46	-55.46
4NBAA	-53.84	-53.84

**Tabla 4.1:** Obsérvese la segunda columna. Entalpías de formación en fase gaseosa obtenida por nuestro programa EnthalpyTajti, véase la tercer columna.

$\Delta_f H_m^\circ(298.15K) kJ \cdot mol^{-1}$		
n-NBA	Ximello y otros autores	EnthalpyNIST
2NBAA	-36.42	-36.42
2NBAb	-26.60	-26.60
3NBAA	-54.94	-54.94
3NBAb	-53.19	-53.19
4NBAA	-52.91	-52.91

**Tabla 4.2:** Obsérvese la segunda columna. Entalpías de formación en fase gaseosa obtenida por nuestro programa EnthalpyNIST, véase la tercer columna.

$\Delta_f H_m^\circ(298.15K) kJ \cdot mol^{-1}$		
n-NBA	Ximello y otros autores	EnthalpyArgonne
2NBAA	-35.01	-35.01
2NBAb	-25.19	-25.19
3NBAA	-53.52	-53.52
3NBAb	-51.78	-51.78
4NBAA	-51.50	-51.50

**Tabla 4.3:** Obsérvese la segunda columna. Entalpías de formación en fase gaseosa obtenida por nuestro programa EnthalpyArgonne, véase la tercer columna.

Las 15 pruebas preliminares también se realizaron con el fin de reconocer posibles errores en los resultados durante la ejecución de los programas **EnthalpyTajti**, **EnthalpyNIST** y **EnthalpyArgonne**. No obstante, lo anterior sirve para confirmar que la comparación con Ximello y otros autores [3] arroja datos con un alto nivel de precisión. Por esta razón, podemos ratificar la utilidad de nuestro programa para realizar cálculos que requieran un alto nivel de confiabilidad en los resultados teóricos.

## Conclusión

El trabajo realizado cumplió con el objetivo principal, es decir la creación de tres programas de cómputo científico que calculan entalpías de formación de compuestos orgánicos a  $T = 298.15$  K con correcciones opcionales a la energía interna utilizando aproximaciones como Nicolaides y otros autores, rotor rígido y oscilador armónico, empleando archivos de salida de Gaussian09. Además, se activaron otros métodos con un alto nivel de teoría y conjuntos de bases pequeñas, los cuales fueron: G3, G3MP2, CBS-APNO, CBS-QB3 y G4. De igual forma, se añadieron valores experimentales reportados por la comunidad científica: Tajti y otros autores, NIST y Argonne.

También, se lograron otros objetivos específicos:

- Los programas fueron diseñados para utilizarse a través de la línea de comandos en un sistema operativo de GNU/Linux, dando como resultado, una alta eficiencia en el flujo de trabajo.
- Se Implementó una programación orientada a objetos que fragmentó el código en partes independientes, permitiendo así, reciclar el código para futuros proyectos.

# Apéndice A

## Funcionamiento del programa

Para comenzar con el uso de los programas es necesario compilar el código. La herramienta de **Linux** que genera el ejecutable y otros archivos fuente y no fuente se conoce como **make**. Una vez hecho esto, se produce el ejecutable.

```
1 $computeEnthalpyNIST.x$
```

El funcionamiento adecuado de **EnthalpyNIST** se muestra a continuación.

**Transcripción A.1:** Output de CH3OH-G4.txt en EnthalpyNIST

```
1 $. / computeEnthalpyNIST.x CH3OH-G4.txt$
2 =====
3           New calculation of molecular enthalpies of formation
4
5           Enthalpies of formation of gaseous atoms at 0 K and thermal
6           corrections for elements in their standard state at 298.15 K from:
7
8           NIST-JANAF Thermochemical Tables J. Physics Chem.
9           Data Monograph 9, 1998, 1-1951.
10 =====
11 Heats of formation:
```

```

12 0K          -190.11 kJ mol-1
13 0K          -45.41 kcal mol-1
14
15 Using Nicolaides method:
16 298K        -201.21 kJ mol-1
17 298K        -48.06 kcal mol-1
18
19 Using G4:
20 298K        -201.21 kJ mol-1
21 298K        -48.06 kcal mol-1
22 =====

```

Al correr el programa sin un archivo de lectura se visualizará la siguiente información:

```

1 $./computeEnthalpyNIST.x$
2 terminate called after throwing an instance of std::logic_error
3 what():  basic_string::_M_construct null not valid
4 Abortado (core generado)

```

El código desarrollado para este programa puede ser mejorado incorporando las siguientes actualizaciones.

## Restricciones de ejecución

Para evitar una ejecución del programa de manera indefinida, es oportuno incorporar diferentes mensajes de error, que permitan al usuario identificar un posible problema. Los mensajes tendrían (o tienen) que ver con los siguientes escenarios.

- Ingresar un archivo que no contenga la información necesaria.
- Cuando no es posible leer el archivo de entrada.

- Si el archivo de entrada no cuenta con un formato determinado.

## Banderas de entrada

Incorporar banderas de entrada al código del programa permitirá tener distintas opciones en el cálculo de la entalpía de formación. Las opciones son necesarias porque calcularían el valor de la entalpía de formación por distintos métodos y valores. Éstas, podrían ser mostradas al usar la bandera “-h”. Las banderas pueden ser utilizadas de la siguiente manera:

```
1 $ ./computeEnthalpyNIST.x -h$
```

Por lo tanto, la nomenclatura del programa sería:

```
1 $ ./computeEnthalpyNIST.x -flag molecule.txt /.dat$
```

Dónde **molecule.txt** o **molecule.dat** es el archivo de entrada y **-flag** es la bandera de entrada que contiene las diferentes opciones para modificar el cálculo. Las banderas pueden ser las siguientes:

```
1 $-t$
```

Utilizar el valor experimental del átomo de Carbono reportado por Tajti y otros [6].

```
1 $-a$
```

Activar las tablas termoquímicas del Laboratorio Nacional de Argonne.

```
1 $-s$
```

Guardar el archivo de salida.

1 \$-h\$

Muestra un menú de ayuda para el manejo del programa.



## Programas adicionales

Además del programa **EnthalpyNIST**, se crearon 2 programas que permiten determinar la entalpía de formación por distintos métodos al G4 de **Gaussian09**, con diferentes valores reportados en la literatura científica [5, 6, 8]. Sus usos e interfaces son semejantes a **EnthalpyNIST**, por consiguiente, existe la posibilidad de incorporar nuevos métodos a dichos programas. Los siguientes hipervínculos contienen por separado, los 3 repositorios de los programas creados en este trabajo.

<https://github.com/Edgargj/EnthalpyNIST>  
<https://github.com/Edgargj/EnthalpyTajti>  
<https://github.com/Edgargj/EnthalpyArgonne>

### B.1. EnthalpyNIST

**EnthalpyNIST** es un programa de cómputo científico que calcula entalpías de formación de átomos en estado gaseoso a  $T = 0$  K con correcciones térmicas para elementos en su estado estándar a  $T = 298.15$  K [2, 5, 10]. **EnthalpyNIST** admite los siguientes métodos de **Gaussian**: G3, G3MP2, CBS-APNO, CBS-QB3 y G4. [8].

## B.2. EnthalpyTajti

**EnthalpyTajti** es un programa de cómputo científico que calcula entalpías de formación de átomos en estado gaseoso a  $T = 0$  K, a excepción de los datos del átomo de Carbono, reportados por Tajti y otros autores [6] con correcciones térmicas para elementos en su estado estándar a  $T = 298.15$  K [2, 5, 10]. **EnthalpyTajti** admite los siguientes métodos de **Gaussian**: G3, G3MP2, CBS-APNO, CBS-QB3 y G4 [8].

## B.3. EnthalpyArgonne

**EnthalpyArgonne** es un programa de cómputo científico que determina entalpías de formación de átomos en estado gaseoso a  $T = 0$  K con correcciones térmicas para elementos en su estado estándar a  $T = 298.15$  K [2, 10]. Por otra parte, utiliza tablas termoquímicas del Laboratorio Nacional de Argonne (ANL), no obstante, los valores del átomo de Azufre fueron tomados del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) [5]. **EnthalpyArgonne** admite los siguientes métodos de **Gaussian**: G3, G3MP2, CBS-APNO, CBS-QB3 y G4 [8].

# Bibliografía

- [1] Fattahi A., Kass S. R., Liebman J. F., Matos M. A. R., Miranda M. S., y Morais V. M. F., *Journal of the American Chemical Society* **127**, 6116 (2005), PMID: 15839713.
- [2] Nicolaides A., Rauk A., Glukhovtsev M. N., y Radom L., *J. Chem. Phys.* **100**, 17460 (1996).
- [3] Ximello A., Ramos E., Rojas A., Hernández-Pérez J. M., Camarillo E. A., Solano-Altamirano J. M., Sandoval-Lira J., y Flores H., *Journal of Chemical and Engineering Data* **65**, 4935 (2020).
- [4] G. Cuevas F. C., *Introducción a la química computacional*, pp. 11–26, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- [5] Chase M., *NIST-JANAF Thermochemical Tables, 4th Edition*, American Institute of Physics, 1998.
- [6] Tajti A., Szalay P. G., Császár A. G., Kállay M., Gauss J., Valeev E. F., Flowers B. A., Vázquez J., y Stanton J. F., *J. Chem. Phys.* **121**, 11599 (2004).
- [7] Lewars E. G., *Computational Chemistry: Introduction to the Theory and Applications of Molecular and Quantum Mechanics*, pp. 332–343, Springer Netherlands, 2016.
- [8] Simmie J. M. y Somers K. P., *J. Chem. Phys. A* **119**, 7235 (2015), PMID: 25580800.
- [9] Gaussian 09, Revision B.01, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G. A. Petersson, H. Na-

- katsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, Montgomery, Jr., J. A., J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, K. N. Kudin, V. N. Staroverov, R. Kobayashi, J. Normand, K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, Ö Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski and D. J. Fox, Gaussian Inc. Wallingford CT, 2009.
- [10] McQuarrie, *Statistical Mechanics*, pp. 81–138, Harper and Row, 1976.
- [11] Chang R., *Fisicoquímica para las ciencias químicas y biológicas*, pp. 75–104, McGraw-Hill Interamericana, 2008.
- [12] Guerasimov. Y., *Curso de Fisicoquímica*, pp. 62–68, Mir Moscú, 1971.
- [13] Brown T. L., *Química, la ciencia central*, pp. 158–183, Pearson Educación de México, 2014.
- [14] Garritz Ruiz L. y M. V., A. G. S, *Química universitaria*, pp. 305–332, Pearson Educación de México, 2005.
- [15] Cox J. D., Wagman D. D., y Medvedev V. A., *CODATA Key Values for Thermochemistry*, Hemisphere, New York, 1998.
- [16] Goos E., Burcat A., y Ruscic B., *Ideal Gas Thermochemical Database with Updates from Active Thermochemical*, 1998.
- [17] Ruscic B., Pinzon R. E., von Laszewski G., Kodeboyina D., Burcat A., Leahy D., Montoy D., y Wagner A. E., *J. Chem. Phys. A* **108**, 9979 (2004).
- [18] Ruscic B., Pinzon R. E., von Laszewski G., Kodeboyina D., Burcat A., Leahy D., Montoy D., y Wagner A. E., *Journal of Physics: Conference Series* **16**, 561 (2005).

- [19] Ruscic B., Active Thermochemical Tables, 2012.
- [20] Montgomery J. A., Frisch M. J., Ochterski J. W., y Petersson G. A., *J. Chem. Phys.* **112**, 6532 (2000).
- [21] Ochterski J. W., Petersson G. A., y Montgomery J. A., *J. Chem. Phys.* **104**, 2598 (1996).
- [22] Pople J. A., Head-Gordon M., Fox D. J., Raghavachari K., y Curtiss L. A., *J. Chem. Phys.* **90**, 5622 (1989).
- [23] Curtiss L. A., Jones C., Trucks G. W., Raghavachari K., y Pople J. A., *J. Chem. Phys.* **93**, 2537 (1990).
- [24] Curtiss L. A., Jones C., Trucks G. W., Raghavachari K., y Pople J. A., *J. Chem. Phys.* **94**, 7221 (1991).
- [25] Curtiss L. A., Raghavachari K., y Pople J. A., *J. Chem. Phys.* **109**, 7764 (1998).
- [26] Curtiss L. A., Redfern P. C., y Raghavachari K., *J. Chem. Phys.* **126**, 084108 (2007).
- [27] Baboul A. G., Curtiss L. A., Redfern P. C., y Raghavachari K., *J. Chem. Phys.* **110**, 7650 (1999).
- [28] Curtiss L. A., Redfern P. C., Raghavachari K., Rassolov V., y Pople J. A., *J. Chem. Phys.* **110**, 4703 (1999).
- [29] Chan B., Coote M. L., y Radom L., *Journal of Chemical Theory and Computation* **6**, 2647 (2010), PMID: 26616066.
- [30] Chan B., Deng J., y Radom L., *Journal of Chemical Theory and Computation* **7**, 112 (2011), PMID: 26606224.
- [31] Chan B. y Radom L., *Journal of Chemical Theory and Computation* **8**, 4259 (2012), PMID: 26605589.
- [32] Karton A. y Martin J. M. L., *J. Chem. Phys.* **136**, 124114 (2012).

- [33] Chan B. y Radom L., *Journal of Chemical Theory and Computation* **9**, 4769 (2013), PMID: 26583395.
- [34] Gruzman D., Karton A., y Martin J. M. L., *J. Chem. Phys. A* **113**, 11974 (2009), PMID: 19795892.
- [35] Curtiss L. A., Redfern P. C., y Raghavachari K., *J. Chem. Phys.* **127**, 124105 (2007).
- [36] Peterson D. D. D. A., K. A. F, *Theoretical Chemistry Accounts* **131**, 1079 (2012).
- [37] Montgomery J. A., Frisch M. J., Ochterski J. W., y Petersson G. A., *J. Chem. Phys.* **110**, 2822 (1999).
- [38] Irikura KK F. D. e., *Computational thermochemistry*, American Chemical Society, Washington, D.C, 1998.
- [39] Martin J. M. L. y de Oliveira G., *J. Chem. Phys.* **111**, 1843 (1999).
- [40] Boese A. D., Oren M., Atasoylu O., Martin J. M. L., Kállay M., y Gauss J., *J. Chem. Phys.* **120**, 4129 (2004).
- [41] Chan B. y Radom L., *Journal of Chemical Theory and Computation* **11** (2015), PMID: 26574414.
- [42] Liebman. H. Y. A. J. F y Stein S. E., *"Neutral Thermochemical Data", NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69*, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD, 20899, 2009.
- [43] Scott A. P. y Radom L., *J. Chem. Phys.* **100**, 16502 (1996).
- [44] Deitel P. y. H. D., *C++ How to program*, pp. 37–423, Pearson Education, Inc., 2014.
- [45] Joe Pitt-Francis J. W., *Guide to scientific computing in C++*, pp. 2–117, Springer, 2017.
- [46] Allain A., *Jumping into C++*, pp. 262–266, Cprogramming.com, 2013.