

### Reações adversas:

O risco de efeitos adversos provenientes de terapia por corticosteroides está diretamente relacionado a sua potência, dosagem, duração de ação, intervalo entre doses e duração de tratamento. A duração da ação é afetada pela capacidade do corpo em metabolizar e eliminar o corticosteroide, a dose usada e a velocidade de absorção, sendo que estes fatores sofrem modificações de um animal para outro. Doses imunossupressivas causam efeitos colaterais mais frequentes e mais graves. A administração de corticosteroides por mais de seis meses pode estar associada com infecções do trato urinário, especialmente em cadelas. O uso de corticosteroides pode causar um aumento do volume intravascular, agravando quadros de insuficiência cardíaca congestiva, pois facilita os desvios extracelulares de água e a retenção de sódio. A corticoideterapia frequentemente causa polidipsia, polifagia e poliúria em cães. Síndrome de Cushing em cães tem sido associada com

terapias prolongadas com corticosteroides. Conservar em local seco e fresco, entre 15°C a 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.

### Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma  
CRMV/SP 14.817

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.578 em 20/08/2010

### Apresentação:

Cartucho contendo blíster com 10 comprimidos de 200 mg e display com 15 blisters com 10 comprimidos cada.



Proprietário e fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298  
CEP: 14140-000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofino.com  
Indústria brasileira

100% brasileira, exportadora,  
gerando empregos no Brasil.



30001897/213 OF30

# Prediderm Comprimidos 20 mg

## USO VETERINÁRIO

Anti-inflamatório esteroide à base de prednisolona para cães.

### Fórmula:

Cada comprimido de 200 mg contém:  
Prednisolona ..... 20,00 mg  
Excipiente q.s.p. .... 200,00 mg

### Indicações:

**Prediderm Comprimidos 20 mg** é uma prednisolona, potente anti-inflamatório esteroide. A prednisolona é um glicocorticoide que apresenta maior potência anti-inflamatória (de 3 a 5 vezes mais potente do que o cortisol) e menor efeito mineralocorticoide (50% menos atividade mineralocorticoide do que o cortisol), o que resulta em menor retenção de sódio e água pelo organismo do animal, minimizando o risco de efeitos colaterais, como edema e hipertensão, comuns em terapias com esteroides.

**Prediderm Comprimidos 20 mg** é indicado para patologias de caráter inflamatório ou que se beneficiam com a ação metabólica da prednisolona.

### Modo de uso e dosagens:

O efeito terapêutico satisfatório de **Prediderm Comprimidos 20 mg**, assim como com outros corticosteroides, ocorre com a individualização da dosagem de acordo com a gravidade da doença, duração prevista para o tratamento e resposta individual do animal à terapia. A administração de **Prediderm Comprimidos 20 mg** deve ser calculada com o objetivo de se obter a menor dosagem possível que resulte no máximo efeito terapêutico desejado, com mínimos efeitos colaterais. As recomendações de dose que se seguem são baseadas na dosagem média diária total e contemplam as principais indicações de **Prediderm Comprimidos 20 mg**, devendo ser usadas apenas como referência. A terapia com **Prediderm Comprimidos 20 mg** deve ser iniciada com uma dose mais alta que é mantida até que se consiga a resposta terapêutica

desejada, o que normalmente ocorre num período de 2 a 7 dias na maioria das patologias. Tão logo uma resposta clínica satisfatória tenha sido obtida, a dose diária deve ser reduzida gradualmente para a finalização do tratamento, nos casos de doenças agudas. Nos casos de doenças crônicas, reduz-se gradativamente a dose inicial até uma mínima dose efetiva de manutenção. Recomenda-se, nestes casos, a administração de **Prediderm Comprimidos 20 mg** em dias

Indicações básicas	Dose inicial (ou de indução) de prednisolona	Dose aproximada de Prediderm Comprimidos 20 mg
Reposição de glicocorticoides	<b>Cães</b> - 0,25 mg/kg de peso corporal/dia.	1 comprimido para cada 80 kg de peso corporal/dia.
Tratamentos anti-inflamatórios e antialérgicos	<b>Cães</b> - 0,5 a 1,0 mg/kg de peso corporal cada 12 ou 24 horas.	<b>Cães</b> - 1 comprimido para cada 20 a 40 kg de peso corporal cada 12 a 24 horas.

#### Precauções:

Como a terapia com corticosteroides pode ocasionar uma leve retenção de sódio e água, o primeiro sinal de uma superdosagem de corticoide (isto é, aumento de peso corporal pela retenção de fluidos), não é um índice seguro de interpretação de superdosagem. Em consequência disto, a dose recomendada não deve ser excedida e os animais submetidos à terapia com

alternados, pois este regime de administração permite a recuperação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, minimizando o aparecimento de efeitos colaterais. A dose de manutenção deve ser ajustada periodicamente de acordo com as flutuações da atividade da doença e do estado geral do animal. O intervalo entre as doses, bem como a duração do tratamento, variam de acordo com a patologia a ser tratada.

prednisolona devem estar sob constante supervisão veterinária. A suspensão da terapia com corticosteroides, dependendo da dose utilizada e duração do tratamento, pode causar uma supressão na produção de esteroides endógenos, consequentemente, animais que tenham terminado a terapia recentemente, podem necessitar da administração de corticosteroides de ação rápida quando submetidos a

situações de stress como cirurgias, traumas ou infecções severas. A prednisolona pode mascarar sinais de infecção. Caso ocorra alguma infecção intercorrente ao tratamento com **Prediderm Comprimidos 20 mg**, esta deverá ser controlada com o uso de antibióticos apropriados ou a administração de **Prediderm Comprimidos 20 mg** deverá ser descontinuada.

#### Contraindicações e limitações de uso:

Os corticosteroides devem ser usados o mais criteriosamente possível em animais com doenças infecciosas, úlceras de córnea, hemorragias e/ou perfurações gastrintestinais, pancreatites, enteropatias, doenças renais, cardiopatias, diabetes mellitus ou animais em fase de crescimento. Não administrar a fêmeas gestantes e em lactação. Não administrar a animais com infecções fúngicas. A eliminação dos corticosteroides pode ser prejudicada na presença de hepatopatias.

#### Interações medicamentosas:

Drogas que usam o sistema glicuronil-transferase podem

competitivamente inibir a excreção de corticosteroides. Indutores enzimáticos como a fenitoína, fenobarbital, organoclorados e fenilbutazona podem acelerar a eliminação dos corticosteroides. O uso concomitante de corticosteroides com diuréticos depletos de potássio (furosemida) ou com a Anfotericina B pode intensificar a hipopotassemia. O uso de corticosteroides com glicosídeos cardíacos pode aumentar a possibilidade de arritmias ou intoxicação digitalica associada à hipopotassemia. Os glicocorticoides podem reduzir os níveis sanguíneos de salicilatos. O uso de corticosteroides em animais diabéticos pode acarretar a necessidade de aumento da dose de insulina. Não se recomenda a aplicação de vacinas com vírus atenuado a animais submetidos a tratamento com corticosteroides em doses imunossupressivas. A administração de anti-inflamatórios não esteroides concomitantemente com corticosteroides pode aumentar a incidência de úlceras gástricas.