

RAPPORT D'INTERVENTION MÉDICALE

Évaluation opérationnelle des cartouches anti Nx-A

Référence EMS-NXA-D1-EXP-01

Date [CLASSIFIÉ]

Zone District 1 – Zone contaminée active (Nx-A)

1. Objet

Évaluer la durabilité effective des cartouches de protection respiratoire anti Nx-A en conditions réelles d'exposition, et consigner toute observation clinique atypique.

2. Volontaires

Lim, Ryo – né le 22/09/2007

Lim, Ryu – né le 22/09/2007

Kabayashi, Kaito – né le 09/10/2006

Volontaires civils engagés sous protocole dérogatoire.

3. Protocole

Entrée simultanée en zone Nx-A

Port continu du masque

Surveillance EMS permanente

Effort physique différencié par sujet

Arrêt du test à saturation complète de la cartouche

4. Résultats

Durée moyenne de protection : 8 min 15 s

Aucune variation significative liée à l'effort physique

Saturation brutale des cartouches, sans phase d'alerte

5. Observation clinique

Un volontaire présentant un état de manque à la méthamphétamine a rapporté, en zone Nx-A :

- disparition subjective des symptômes de manque
- amélioration transitoire de l'état psychique
- perception d'une usure réduite de la cartouche

Aucune confirmation instrumentale à ce stade.

6. Examens biologiques

Prises de sang : aucun résultat notable

Biopsies tissulaires : séquençage ADN réalisé

Données génétiques archivées pour comparaisons ultérieures

7. Analyse

Aucune corrélation causale établie.

Une interaction potentielle entre substances psychoactives et exposition au Nx-A ne peut être exclue et nécessite des investigations complémentaires.

8. Recommandations

Poursuite d'évaluations sous protocole renforcé

Surveillance accrue des sujets exposés

Maintien du caractère classifié des données biologiques

9. Statut

Phase 1 terminée – Données validées

Piste expérimentale ouverte

Diffusion restreinte

Chefs d'intervention EMS – Unité Nx-A

Dr. Elias Varn