


Carnet de notes sur le gaz présent au district n°1

Écrit par les frères Corteiz.



Prévisions

Si aucune modification majeure du système n'intervient après cette phase de croissance (2022 à 2025) alors,


- la concentration en nx-a devrait atteindre **≈ 450 % en 2050**,
- le niveau restera donc **4,5 fois supérieur** à celui de 2022.

Cette prévision repose sur une **croissance linéaire stable**, sans accélération ni ralentissement.

L'évolution observée se compose de deux phases distinctes :

1. **Phase transitoire rapide (2022–2025)** : augmentation par un facteur 4.
2. **Phase stationnaire à croissance proportionnelle (2025–2050)** : augmentation lente et continue.

Échelle des effets cutanés (2022)



En considérant la concentration du nx-a mesurée en 2022 comme référence (100 %), il est possible de modéliser les effets cutanés en fonction du **temps d'exposition**.

Les contacts très courts (< 5 minutes) ne génèrent généralement **aucune réaction visible**.

Entre 10 et 15 minutes, une **dermite irritative légère à modérée** peut apparaître, liée à l'altération initiale de la barrière cutanée.

Au-delà de 30 minutes, les signes inflammatoires deviennent plus nets (érythème marqué, chaleur locale).

Une exposition de 1 heure peut entraîner une **dermatite de contact**, caractérisée par des lésions eczémateuses et du prurit.

Les temps d'exposition prolongés (≥ 1 à 2 heures) exposent la peau à des **dommages cutanés sévères**, notamment des fissurations, des vésiculations ou des phénomènes pseudo-caustiques. Cette échelle permet d'identifier les seuils critiques d'exposition .

Tests de différents antidotes sur sujet animal.

1. Antidote α -03

- C6H7O2 (solution aromatique oxydante) — **32 %**
- X13H (agent réactif dérivé du NX-A) — **11 %**
- NaR Δ (réducteur sodique modifié) — **7 %**
- Eau distillée S-0 — **48 %**
- Catalyseur interne K-7 — **2 %**

Résultat : instabilité après 6 minutes et 50 secondes, formation d'un précipité noir sur la muqueuse du sujet : piste intéressante

2. Antidote α -V11

- C6H3(OH)2-R Δ (di-phénol modifié) — **41 %**
- NH4X13 (ammonium lié au motif X-13) — **9 %**
- Solvant volatil V-3 — **27 %**
- Tampon acide TA-5 — **18 %**
- Trace stabilisante : Ion Δ -0,2 % — **0,2 %**
- Eau micro-filtrée — **4,8 %**

temps avant symptômes : 149 secondes : échec

3. Antidote K-β4

- C12H9N2O (nitrure organique) — **29 %**
- X13Cl2 (dichlorure réactif) — **16 %**
- H2O — **38 %**
- Agent polymérisant P-Beta — **11 %**
- Stabilisateur de surface S-Thin — **4 %**
- Correcteur de densité D-5 — **2 %**

résultat : sujet mort après 110 secondes : échec

4. Antidote Ω-X9

- C10H6N4O2 (nitrure tétracyclique) — **37 %**
- RΔ (radical solide broyé, lot A-51) — **5 %**
- H2 dissous — **2 %**
- Solvant S-17 (neutre) — **46 %**
- Amorce catalytique Cat-Ω — **8 %**
- Trace métallique Fe-Δ — **2 %**

Durée avant dégradation : 6 min 22 s : excellente piste

5. Antidote β-PRIME

Version actuelle : 2.4

- C₈H₅N₃O₂ (noyau antioxydant) — **34 %**
- Solvant S-17 de haute pureté — **39 %**
- Trace-RΔ (radical stabilisé, version diluée 0,03 %) — **0,03 % du total**
→ équivaut à **0,015 % du produit pur**
- Agent amphipathique A-Λ — **18 %**
- Régulateur ionique I-7 — **5 %**
- Eau ultra-pure E-0 — **4 %**

résultat : sujet mort 5min35 après injection : bonne piste

Rapport Synthétique –

Avancement des Projets Antidotes

A. Antidote α-03

Période du projet :

Début : 14/11/2022 — Fin : 05/01/2023

Objectif : Neutralisation oxydative du NX-A.

Résultats :

- Diminution très limitée de l'activité du gaz (~8 %)
- Déclenchement d'une réaction exothermique
- Formation de vapeurs secondaires dangereuses au niveau des muqueuses qui entraîne la mort du sujet.

Conclusion : Instable. Projet abandonné début 2023.

B. Antidote α-V11

Période du projet :

Début : 12/12/2022 — Fin : 18/02/2023

Objectif : Inhiber temporairement le motif chimique X-13.

Résultats :

- Baisse partielle de la permission
- Instabilité atmosphérique extrême
- Décomposition accélérée en présence d'humidité

Conclusion : Trop fragile, non exploitable sur le terrain.

C. Antidote K-β4

Période du projet :

Début : 27/12/2022 — Fin : 21/03/2023

Objectif : Immobiliser le NX-A,

Résultats :

- Bonne adsorption initiale
- Désorption complète au bout de **4 à 6 h**
- Structure polymérique trop instable pour contenir le gaz

Conclusion : Technologie absorbante abandonnée. Cependant bonne piste trouvée.

D. Antidote Ω-X9

Nom : Antidote Ω-X9

Début : 30/12/2022

Statut : EN COURS

Avancement : prometteur

Objectif : Développer un jet de solution d'antidote :

- capable de chasser le gaz présen
- ne produisant **aucun sous-produit toxique**,
- actif **plus de 1h minutes** en atmosphère ouverte,
- tolérant aux variations de **température** et d'**humidité**.

E - Antidote β-Prime — Projet Principal

Nom : Antidote β-Prime

Début : 30/12/2022

Statut : EN COURS

Avancement : Extrêmement prometteur

Objectif : Développer un inhibiteur :

- capable de se fixer durablement sur le motif X-13,
- ne produisant **aucun sous-produit toxique**,
- actif **plus de 30 minutes** en atmosphère ouverte,
- tolérant aux variations de température et d'humidité.

Observations principales (Résumé 2023–2025)

- Production de Δ -Shard quasi nulle ($< 0,01\%$) — record
- Stabilité thermique élevée ($\tau \approx 45\text{ min}$)