

**PROJET
CHESHIRE**

FICHE DE SUIVI DE PATIENT

Prénom : **Iris**

Nom : **MALONE**

Date de naissance : **04/09/1999**



Cheshire Chronic Center

	ETAPE	CONSTANTES	OBSERVATIONS
2026-01-27	ETAPE 1	• TA : 122 / 78 mmHg • FC : 74 bpm • FR : 14 / min • SpO₂ : 99 % • Température : 36.8 °C	Sujet réveillée et installée sur chaise d'observation. Comportement calme, respiration contrôlée, regard analytique de l'environnement.
	ETAPE 2	• TA : 140 / 88 • FC : 102 bpm • FR : 19 / min • SpO₂ : 97 %	Libération du gaz hallucinogène NX-A dans la salle.
	ETAPE 3	• TA : 134 / 84 • FC : 91 bpm • FR : 17 / min • SpO₂ : 98 %	Installation stimulus visuel
	ETAPE 4	• 152 / 94 • FC : 124 bpm • FR : 24 / min • SpO₂ : 96 %	Hallucinations constatés (Audio & visuels) augmentation du taux de noradrénaline
	ETAPE 5		Fin des hallucinations, le patient ne semble pas répondre positivement a des demandes simples. Augmentation des doses pour le prochain patient

Médecin en charge :

Dr. Koskov

FICHE DE SUIVI DE PATIENT

Prénom : **Ellie**

Nom : **GREENWOOD**

Date de naissance : **12/03/2008**

Dr. Koskov



Cheshire Chronic Center

N°7

	ETAPE	CONSTANTES	OBSERVATIONS
2026-03-08	ETAPE 1	• TA : 138 / 86 mmHg • FC : 102 bpm • FR : 20 / min • SpO₂ : 99 % • Température : 36.9 °C • Pupilles : 3.5 mm, réactives	Sujet visiblement anxieuse lors du prélèvement, respiration rapide et mains tremblantes. Comportement coopératif malgré un niveau de stress élevé
	ETAPE 2	• TA : 146 / 90 mmHg • FC : 114 bpm • FR : 23 / min • SpO₂ : 97 % • Température : 37.1 °C • Pupilles : 4.5 mm	Réaction physiologique rapide avec augmentation du stress et agitation légère. Le sujet rapporte une sensation de malaise et de désorientation progressive
	ETAPE 3	• TA : 152 / 94 mmHg • FC : 122 bpm • FR : 25 / min • SpO₂ : 96 % • Température : 37.3 °C • Pupilles : 5 mm	RAS, respiration légèrement irrégulière
	ETAPE 4	• TA : 148 / 90 mmHg • FC : 110 bpm • FR : 22 / min • SpO₂ : 97 % • Température : 37.2 °C • Pupilles : 4.5 mm	Le sujet reste anxieux mais répond partiellement aux consignes simples. Les effets observés indiquent une réponse "presque" positive au protocole. Hallucinations visuels observés.
	ETAPE 5	• TA : 138 / 84 mmHg • FC : 92 bpm • FR : 18 / min • SpO₂ : 98 % • Température : 37.0 °C	Réponse expérimentale proche du résultat attendu mais incomplète. Temps d'exposition au NX-A probablement trop court pour obtenir un résultat pleinement positif. Séquelles possibles.

FICHE DE SUIVI DE PATIENT

Prénom : **Jason**

Nom : **JEFFERSON**

Date de naissance : **01/09/1990**

Dr. Koskov



Cheshire Chronic Center

	ETAPE	CONSTANTES	OBSERVATIONS
2026-01-28	ETAPE 1	• TA : 136 / 86 mmHg • FC : 96 bpm • FR : 18 / min • SpO₂ : 99 % • Température : 36.9 °C • Pupilles : 3 mm, réactives	Sujet hostile et méfiant lors du prélèvement, forte tension musculaire. Contact visuel agressif et posture défensive dès l'installation.
	ETAPE 2	• TA : 148 / 92 mmHg • FC : 112 bpm • FR : 22 / min • SpO₂ : 97 % • Température : 37.1 °C • Pupilles : 4.5 mm	Agitation immédiate après diffusion, respiration accélérée et mouvements brusques. Le sujet manifeste une forte résistance et tente d'évaluer les issues de la pièce.
	ETAPE 3	• TA : 162 / 98 mmHg • FC : 128 bpm • FR : 26 / min • SpO₂ : 96 % • Température : 37.4 °C • Pupilles : 5 mm	Le sujet ne réagit pas aux images du film mais affirme voir un clown aux yeux lumineux dans la pièce. Tentatives répétées de se libérer des contraintes physiques.
	ETAPE 4	• TA : 170 / 104 mmHg • FC : 136 bpm • FR : 28 / min • SpO₂ : 95 % • Température : 37.6 °C • Pupilles : 5.5 mm	Sujet extrêmement agité, perception persistante de la présence du clown. Refuse toute consigne et tente activement de briser les dispositifs de maintien.
	ETAPE 5		Le sujet demeure négatif aux ordres simples et présente une réaction violente incontrôlable. Présence probable de traumatismes psychologiques sévères — préconisation d'une modification du dosage NX-A pour les futurs sujets.

Médecin en charge :

FICHE DE SUIVI DE PATIENT

Prénom : **Marley**

Nom : **GREENWOOD**

Date de naissance : **18/10/1995**



Cheshire Chronic Center

	ETAPE	CONSTANTES	OBSERVATIONS
2026-01-28	ETAPE 1	• TA : 102 / 64 mmHg • FC : 62 bpm • FR : 13 / min • SpO₂ : 99 % • Température : 36.7 °C • Pupilles : 3 mm, réactives •	Sujet calme, posture relâchée et réponses verbales lentes. Analyse sanguine préliminaire indique un taux très élevé de THC. Consommateur régulier.
	ETAPE 2	• TA : 104 / 66 mmHg • FC : 66 bpm • FR : 14 / min • SpO₂ : 98 % • Température : 36.8 °C • Pupilles : 3.5 mm	Réaction physiologique minimale après diffusion du gaz. Le sujet reste passif, regard ralenti et absence de signes d'anxiété Réaction faible face aux images gore et difformes du film. Le sujet mentionne vaguement une musique lointaine, sans manifestation d'hallucination visuelle claire.
	ETAPE 3	• TA : 134 / 84 • FC : 91 bpm • FR : 17 / min • SpO₂ : 98 %	Le sujet reste passif, regard ralenti et absence de signes d'anxiété Réaction faible face aux images gore et difformes du film, Le sujet mentionne vaguement une musique lointaine, sans manifestation d'hallucination visuelle claire.
	ETAPE 4	• TA : 104 / 65 mmHg • FC : 64 bpm • FR : 13 / min • SpO₂ : 99 % • Température : 36.8 °C • Pupilles : 3 mm	augmentation du taux de noradrénaline, Sujet décrit une sensation de lourdeur et de lenteur mentale, Voix et silhouette clown perçu à différents endroits de la pièce Aucune agitation ni réaction émotionnelle notable malgré la perception confirmé.
	ETAPE 5		Le sujet ne répond pas positivement au protocole expérimental et reste peu réactif aux stimuli. Hypothèse probable : fort taux de THC inhibant les effets du NX-A — aucune modification de la formule pour le moment.

Médecin en charge :

Dr. Koskov

FICHE DE SUIVI DE PATIENT

Prénom : **Biggy**

Nom : **SMOKE**

Date de naissance : **21/06/2001**

Dr. Koskov



Cheshire Chronic Center

	ETAPE	CONSTANTES	OBSERVATIONS
2026-01-28	ETAPE 1	• TA : 142 / 88 mmHg • FC : 102 bpm • FR : 20 / min • SpO₂ : 99 % • Température : 36.9 °C • Pupilles : 3.5 mm, réactives	Sujet tendu pendant le prélèvement, agitation des mains et respiration accélérée. Profil anxieux marqué, compatible avec la présence de THC détectée lors de l'analyse.
	ETAPE 2	• TA : 150 / 94 mmHg • FC : 116 bpm • FR : 24 / min • SpO₂ : 97 % • Température : 37.2 °C • Pupilles : 4.5 mm	Respiration irrégulière et regard instable après diffusion du gaz. Sujet rapporte percevoir une musique de cirque malgré l'absence de stimulus sonore réel.
	ETAPE 3	• TA : 156 / 96 mmHg • FC : 124 bpm • FR : 25 / min • SpO₂ : 96 % • Température : 37.3 °C • Pupilles : 5 mm	Réaction de rejet face aux séquences visuelles violentes et difformes. Sujet affirme percevoir une silhouette de clown aux yeux lumineux à proximité.
	ETAPE 4	• TA : 148 / 90 mmHg • FC : 108 bpm • FR : 21 / min • SpO₂ : 97 % • Température : 37.1 °C • Pupilles : 4 mm	Sujet décrit encore la présence d'une comptine enfantine persistante et une impression d'être observé. L'agitation diminue progressivement après arrêt de la diffusion.
	ETAPE 5	• TA : 138 / 84 mmHg • FC : 92 bpm • FR : 18 / min • SpO₂ : 98 % • Température : 37.0 °C	Le sujet répond correctement à des consignes simples et retrouve une stabilité physiologique. Réponse positive au protocole — stabilisation de la formule NX-A confirmée pour le prochain patient.