

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari

Matematica Discreta

Anno Accademico 2023/24

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Funzioni	1
1.2	Insiemi Discreti	2
1.2.1	Proprietà 1	4
1.2.2	Proprietà 2	4
1.2.3	Proprietà 3	5
1.2.4	Proprietà 4	6
1.3	Confronto tra Cardinalità	7

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Funzioni

Una **funzione** o **applicazione** tra due insiemi A e B è rappresentata:

$$f : A \rightarrow B \text{ t.c. } \forall a \in A \exists! b \in B \mid f(a) = b$$

1. la funzione si dice **iniettiva** se:

$$\forall a, a' \in A, f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$$

2. la funzione si dice **suriettiva** se:

$$\forall b \in B, \exists a \in A \mid f(a) = b$$

3. una funzione $f : A \rightarrow B$ si dice **biettiva** o **biunivoca** se è contemporaneamente *iniettiva* e *suriettiva* ovvero se:

$$\forall b \in B \exists! a \in A \text{ t.c. } f(a) = b$$

1.2 Insiemi Discreti

Due insiemi A e B si dicono **equipotenti** (o con la stessa **cardinalità**) se:

$$f : A \rightarrow B, f \text{ biunivoca}$$

E utilizzeremo come notazione: $\text{card}(A) = \text{card}(B)$, $|A| = |B|$ oppure $\#A = \#B$. Un insieme A si dice finito se:

$$\exists n \in \mathbb{N}, f : A \rightarrow \mathbb{N}_n, f \text{ biunivoca}$$

In questo caso diremo che la **cardinalità** di A è **n**: $\text{card}(A) = \text{card}(\mathbb{N}_n) = n$

Un insieme A si dice **numerabile** se:

$$\exists f : A \rightarrow \mathbb{N}, f \text{ biunivoca}$$

In questo caso si dice che A ha cardinalità numerabile e si può rappresentare attraverso la lettera **aleph** (è la prima lettera dell'alfabeto ebraico): $\text{card}(A) = \text{card}(\mathbb{N}) = \aleph_0$.

Alcuni esempi:

1. l'insieme \mathbb{Z} è **numerabile** ($\#\mathbb{N} = \#\mathbb{Z}$):

$$\begin{array}{l} 0 \rightarrow 1 \\ 1 \rightarrow 2 \quad -1 \rightarrow 3 \\ 2 \rightarrow 4 \quad -2 \rightarrow 5 \end{array}$$

possiamo quindi mappare i valori **positivi** dell'insieme \mathbb{Z} sono mappati nei valori **pari** dell'insieme \mathbb{N} e in maniera complementare i valori **negativi** dell'insieme \mathbb{Z} sono mappati nei valori **dispari** dell'insieme \mathbb{N} . È quindi possibile verificare la biunivocità dell'applicazione che mappa i valori da \mathbb{Z} a \mathbb{N} .

2. l'insieme dei numeri **pari** \mathbb{P} può definirsi numerabile, infatti: $\#\mathbb{P} = \#\mathbb{N}$, in questo caso avremo l'applicazione biunivoca del tipo:

$$f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{N} \mid \forall p = 2n \in \mathbb{P}, f(p) = \frac{1}{2}p = n$$

Un insieme A si dice **discreto** se è **finito** o **numerabile**.

Se A è finito di cardinalità n , i suoi elementi possono essere etichettati con gli elementi di \mathbb{N}_n :

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

Se A è numerabile, gli elementi possono essere “etichettati” con gli elementi di \mathbb{N} :

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$$

Dato un insieme discreto A ed un suo sottoinsieme $Y \subseteq A$ si dice **funzione caratteristica** di Y la funzione:

$$f_Y : A \rightarrow \{0, 1\} \quad \forall a \in A \quad f_Y(a) = \begin{cases} 1 & \text{se } a \in Y \\ 0 & \text{se } a \notin Y \end{cases}$$

Nel caso in cui A sia un insieme finito avremo che: $\#A = \sum_{a \in A} f_Y(a)$.

Se A è un insieme discreto, ed $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ una applicazione a valori in $\{0, 1\}$, risulta univocamente determinato il sottoinsieme $Y \subseteq A$ tale che f sia una funzione caratteristica di Y :

$$Y = \{a \in A \mid f(a) = 1\}$$

Un esempio, definiamo $A = \mathbb{N}$ e sia $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ definita da una **funzione caratteristica** del tipo: $n \rightarrow \frac{1+(-1)^n}{2}$. In questo caso la funzione f identifica, a partire dall'insieme \mathbb{N} , il sottoinsieme \mathbb{P} dei numeri pari.

Utilizzando la **funzione caratteristica** si può ricavare la seguente proprietà degli insiemi discreti:

- se A è finito di cardinalità n , l'insieme $\mathcal{P}(A)$ delle **parti di A** è in corrispondenza biunivoca con l'**insieme delle n -ple** a valori in $\{0, 1\}$.
- se A è numerabile, l'insieme $\mathcal{P}(A)$ delle parti di A è in corrispondenza biunivoca con l'**insieme delle successioni** a valori in $\{0, 1\}$.

1.2.1 Proprietà 1

Se X e Y sono insiemi **finiti**, con $\#X = n$, $\#Y = m$ e con $X \cap Y = \emptyset$, allora $\#(X \cup Y) = n + m$.

Dimostrazione: per Hp. esistono due funzioni biettive $f : X \rightarrow \mathbb{N}_n$ e $g : Y \rightarrow \mathbb{N}_m$.

Per dimostrare la proprietà occorre costruire una funzione biettiva $h : X \cup Y \rightarrow \mathbb{N}_{n+m}$.

Possiamo porre $\forall c \in X \cup Y$ come:

$$h(c) = \begin{cases} f(c) & \text{se } c \in X \\ g(c) + n & \text{se } c \in Y \end{cases}$$

1.2.2 Proprietà 2

Se X è un insieme **finito** con $\#X = n$ ed Y è un insieme **numerabile**, con $X \cap Y = \emptyset$ allora $\#(X \cup Y)$ è **numerabile**.

Dimostrazione: per Hp. esistono due funzioni biettive $f : X \rightarrow \mathbb{N}_n$ e $g : Y \rightarrow \mathbb{N}$.

Per dimostrare la proprietà occorre costruire una funzione biettiva $h : X \cup Y \rightarrow \mathbb{N}$.

Possiamo porre $\forall c \in X \cup Y$ come:

$$h(c) = \begin{cases} f(c) & \text{se } c \in X \\ g(c) + n & \text{se } c \in Y \end{cases}$$

Off-Topic:

Paradosso del Grand Hotel di Hilbert: il paradosso del *Grand Hotel* inventato dal matematico *David Hilbert* per mostrare alcune caratteristiche del concetto di infinito e le differenze fra opzioni con insiemi finiti ed infiniti. Hilbert immagina un hotel con infinite stanze, tutte occupate, e afferma che qualsiasi sia il numero di altri ospiti che sopraggiungano, sarà sempre possibile ospitarli tutti, anche se il loro numero è infinito, purché numerabile.

Nel caso semplice, arriva un singolo nuovo ospite. Il furbo albergatore sposterà tutti i clienti nella camera successiva (l'ospite della 1 alla 2, quello della 2 alla 3, etc.); in questo modo, benché l'albergo fosse pieno è comunque, essendo infinito, possibile sistemare il nuovo ospite.

1.2.3 Proprietà 3

Se X e Y sono due insiemi **numerabili**, allora anche $X \cup Y$ è **numerabile**.

Dimostrazione: senza perdere di generalità, supponiamo che $X \cap Y = \emptyset$. Per ipotesi esistono due funzioni biettive $f : X \rightarrow \mathbb{N}$ e $g : Y \rightarrow \mathbb{N}$. Per dimostrare la proprietà occorre costruire una funzione biettiva $h : X \cup Y \rightarrow \mathbb{N}$. Ad esempio, $\forall c \in (X \cup Y)$, si può porre:

$$h(c) = \begin{cases} 2f(c) - 1 & \text{se } c \in X \\ 2g(c) & \text{se } c \in Y \end{cases}$$

Off-Topic:

Paradosso del Grand Hotel di Hilbert: Un caso meno intuitivo si ha quando arrivano infiniti nuovi ospiti. Sarebbe possibile procedere nel modo visto in precedenza, ma solo scomodando infinite volte gli ospiti (già spazientiti dal precedente spostamento): sostiene allora Hilbert che la soluzione sta semplicemente nello spostare ogni ospite nella stanza con numero doppio rispetto a quello attuale (dalla 1 alla 2, dalla 2 alla 4, etc.), lasciando ai nuovi ospiti tutte le camere con i numeri dispari, che sono essi stessi infiniti, risolvendo dunque il problema. Gli ospiti sono tutti dunque sistemati, benché l'albergo fosse pieno.

Proposizione: se X è un insieme numerabile e $Y \subseteq X$ allora Y è un insieme **discreto**.

1.2.4 Proprietà 4

Se $\{A_i \mid i \in \mathbb{N}\} = \{A_1, A_2, \dots, A_i, \dots\}$ è un **insieme numerabile** di **insiemi numerabili**, si ha che:

$$\#(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \#\mathbb{N}$$

Dimostrazione: senza perdere di generalità, supponiamo che gli insiemi siano fra loro **disgiunti**: $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$. Per dimostrare la tesi, utilizziamo il *procedimento diagonale di Cantor*, enumerando per righe gli elementi di ciascun insieme:

$$\begin{array}{ccccccc} A_1: & a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1h} & \dots \\ A_2: & a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2h} & \dots \\ A_3: & a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3h} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_i: & a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \dots & a_{ih} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

Consideriamo le diagonali $D_1, D_2, \dots, D_k, \dots$, dove: $D_k = \{a_{ij} \mid i + j = k + 1\}$. Per dimostrare che $\#(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i)$ è **numerabile**, occorre costruire una applicazione biunivoca, tale che:

$$h : \bigcup_{i \in \mathbb{N}_n} A_i \rightarrow \mathbb{N}$$

Scorrendo ogni diagonale a partire dall'elemento che sta nell'insieme con indice maggiore, incontrerò l'elemento a_{ij} come j -esimo elemento della diagonale a cui esso appartiene, ovvero come j -esimo elemento della diagonale D_{i+j-1} .

Osservando che $\#D_k = k$ si ha che:

$$\sum_{k=1}^{i+j-2} \#D_k = \frac{(i+j-2)(i+j-1)}{2}$$

Si ottiene così una applicazione biunivoca $h : \bigcup_{i \in \mathbb{N}_n} A_i \rightarrow \mathbb{N}$ definita, $\forall a_{ij} \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}_n} A_i$, da:

$$h(a_{ij}) = j + \frac{(i+j-2)(i+j-1)}{2}$$

Conseguenze:

- \mathbb{Z} è numerabile: $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è numerabile: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{(n, m) \mid n, m \in \mathbb{N}\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{(n, m) \mid m \in \mathbb{N}\}$.
- \mathbb{Q} è numerabile.

1.3 Confronto tra Cardinalità

Si dice che un insieme A ha **cardinalità minore o uguale** ad un insieme B (e si indica con: $\#A \leq \#B$) se: $\exists f : A \rightarrow B$, f è *iniettiva*.

Proprietà:

- **riflessività:** $\forall A, \#A \leq \#A$.
- **transitività:** $\#A \leq \#B, \#B \leq \#C \Rightarrow \#A \leq \#C$.
- **antisimmetria:** $\#A \leq \#B, \#B \leq \#A \Rightarrow \#A = \#B$.
- **tricotomia:** $\forall A, B \Rightarrow \#A \leq \#B$ o $\#B \leq \#A$.

La relazione “ \leq ” fra cardinalità è una relazione di ordine totale.

$A \subseteq B \subseteq C$ con $\#A = \#B \Rightarrow \#A = \#B = \#C$.

Teorema di Cantor-Bernstein-Schroeder: Se $\exists f : A \rightarrow B$, f *iniettiva* ed $\exists g : B \rightarrow A$, g *iniettiva* allora $\exists h : A \rightarrow B$, h *biunivoca*.

Dimostrazione