

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Jueves 6 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

68
Nueva
normalidad

160
Conferencias
vespertinas

Agosto, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5		 7	 8
 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15
 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22
 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
 30	 31	1	2	3	4	5

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Información diaria

FASE 3 Jueves 6 agosto, 2020


SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional



506,252

Negativos

87,973

Sospechosos

462,690

Casos
confirmados

50,517

Defunciones
confirmadas

Fase 3

6 agosto, 2020

1,056,915


Personas
estudiadas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



308,848

Recuperados

52,479

Defunciones
estimadas

502,811

Casos
estimados

46,861 (9%)

Casos activos
estimados


Fase 3

6 agosto, 2020

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

**6 agosto,
2020**




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 05 agosto, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

**6 agosto,
2020**



FUENTE: RED IRAG, acumulado del 05 agosto, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

Componente estatal

FASE 3 Jueves 6 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD





Entidades ubicados en acmé o meseta de pandemia

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Coahuila | 3. Durango |
| 2. Ciudad de México | 4. Morelos |

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Coahuila

Fase 3

6 agosto, 2020



+ 7%

16,354

Casos estimados

2,596 (16%)

Casos activos estimados

10,982

Recuperados

842


Defunciones estimadas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Coahuila



65%

Ocupación
Camas General

40%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3


6 agosto, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Ciudad de México



56,790

Recuperados

9,974

Defunciones
estimadas

Fase 3

6 agosto, 2020

83,096

Casos
estimados

5,914 (7%)


Casos activos
estimados



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Demarcaciones Territoriales* de Ciudad de México



49%

Ocupación
Camas General

48%


Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3

6 agosto, 2020

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Durango



+ 7%

Fase 3

6 agosto, 2020

4,956

Casos estimados

678 (14%)

Casos activos estimados

3,263

Recuperados

318


Defunciones estimadas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Durango



32%

Ocupación
Camas General

30%


Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3

6 agosto, 2020

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Morelos



2,004

Recuperados

867

Defunciones
estimadas

Fase 3

6 agosto, 2020

4,484

Casos
estimados


379 (8%)

Casos activos
estimados



COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Morelos



30%

Ocupación
Camas General

26%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3

6 agosto, 2020

Componente Temático

FASE 3 Jueves 6 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 Temático: Prevención de mala nutrición en niñas y niños en México ante la pandemia de COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

6 agosto, 2020



Instituto Nacional
de Salud Pública



GOBIERNO DE
MÉXICO



GISAMAC
SALUD INTERSECTORIAL DE SALUD, ALIMENTACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



OPS

unicef  para cada niño

COVID-19 Temático


Una nutrición adecuada...

Fase 3

6 agosto, 2020



Es fundamental para la promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo óptimo de las niñas y los niños menores de 5 años, especialmente durante los primeros mil días de vida.



Es parte esencial de la defensa de un individuo contra las infecciones.

Las personas con desnutrición, obesidad o diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID-19.

COVID-19 Temático


Más de la mitad de los hogares tienen algún grado de **inseguridad alimentaria**

Fase 3

6 agosto, 2020

Debido a las grandes **desigualdades** presentes durante décadas, **México** atraviesa la **pandemia por COVID-19** en un contexto en el que **más de la mitad de los hogares** tienen algún grado de **inseguridad alimentaria**.

Seguridad Alimentaria en México



COVID-19 Temático

Fase 3


6 agosto, 2020

En México coexiste la desnutrición crónica con el sobrepeso y obesidad en niñas y niños pequeños.

Esto incrementa la **susceptibilidad** para el desarrollo de enfermedades crónicas como **diabetes, hipertensión y enfermedad coronaria** a lo largo de la vida.



Comparación de la prevalencia de bajo peso, baja talla, emaciación y sobrepeso más obesidad en niños menores de 5 años de 1988 a 2018





COVID-19 Temático:

Impacto en la nutrición global de la pandemia por COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

6 agosto, 2020

La pandemia por COVID19 ha desencadenado una crisis económica y social mundial **sin precedentes. Esto plantea graves riesgos para el estado nutricional y la supervivencia de los niños** pequeños en los países de bajos y medianos ingresos.

El aumento esperado de la desnutrición infantil debido a la fuerte **disminución de los ingresos** del hogar, los **cambios en la disponibilidad y asequibilidad de los alimentos nutritivos** y **las interrupciones en los servicios de salud, nutrición y protección social**, es de particular preocupación.



COVID-19 Temático:

Impacto estimado en la nutrición global de la pandemia por COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

6 agosto, 2020

La crisis por COVID-19 afectará principalmente a los grupos de la población más vulnerables y amenaza con **revertir los avances en materia de desarrollo social** alcanzados por el país hasta la fecha.

Según estimaciones, el porcentaje de **la población con un salario inferior al costo de la canasta básica aumentaría en el 2do. semestre de 37.3% al 45.8%**, lo que a su vez aumentaría **la población en condición de vulnerabilidad, inseguridad y pobreza.**

COVID-19 Temático:

Impacto estimado en la nutrición global de la pandemia por COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

6 agosto, 2020

Las **situaciones de emergencia y crisis económicas** profundizan la **inseguridad alimentaria** entre las poblaciones vulnerables.



Los **altos precios** de los alimentos **reducen la diversidad y la calidad nutricional de la dieta**, y para muchos también **disminuyen la cantidad de alimentos** disponibles en el hogar.

De Pee S et al. **How to ensure nutrition security in the global economic crisis to protect and enhance development of young children and our common future.** Journal of Nutrition. 2010; 140(1):138S-142S.

Vilar-Compte, M et al. **The impact of the 2008 financial crisis on food security and food expenditures in Mexico: a disproportionate effect on the vulnerable.** Public health nutrition, 2015;18(16), 2934-2942.

FAO, CEPAL. **Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria. Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe,** 2020



Fase 3

6 agosto, 2020

COVID-19 Temático:

Impacto estimado en la nutrición global de la pandemia por COVID-19



Particularmente los **grupos más vulnerables de población**, aumentan el **consumo de alimentos ricos en energía, azúcar, sal y grasa**, de baja calidad nutricional

Por el contrario, **tienden a disminuir el consumo de alimentos frescos, como verduras, frutas y alimentos de origen animal**





COVID-19 Temático:

Impacto estimado en la nutrición global de la pandemia por COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

6 agosto, 2020

Los niveles de **hambre y desnutrición** podrían **duplicarse** durante la pandemia, por lo tanto, a medida que se adoptan estrategias para frenar la propagación del COVID-19, se debe **asegurar que haya suficientes alimentos nutritivos, distribuidos de manera justa, para cubrir las necesidades básicas de nutrición, especialmente para los más vulnerables.**



COVID-19 Temático:

Medidas para mitigar el impacto

Fase 3

6 agosto, 2020

1. **Apoyar y fortalecer el recién creado Programa de Asistencia Social Alimentaria del SNDIF durante los mil días** para garantizar la **cobertura de todas las mujeres embarazadas, en período de lactancia y las niñas y niños menores de 2 años**, en condición vulnerable, iniciando por los municipios más afectados por la pandemia, garantizando el acceso a alimentos de origen animal y la suplementación con micronutrientes.
2. Mantener y fortalecer la continuidad de los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, incluida la atención al embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida durante y después de la pandemia.



Medidas para mitigar el impacto

Fase 3

6 agosto, 2020

3. Intensificar las acciones, programas y servicios para proteger, promover y apoyar la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada.

- Cumplimiento y monitoreo del Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna
- Reforzar los servicios de consejería y apoyo a la lactancia incluidas las recomendaciones para la continuidad en mujeres con COVID-19
- Capacitación de los profesionales de la salud/personal comunitario
- Aumentar la licencia de maternidad/paternidad
- Estrategias de comunicación (medios masivos)
- Financiamiento



Medidas para mitigar el impacto

Fase 3

6 agosto, 2020



4. Aprovechar los padrones de beneficiarios de los programas disponibles en el país, para atender a niñas y niños vulnerables y cubrir a los beneficiarios de los programas de alimentación escolar.
5. Implementar programas de orientación para la prevención de la doble carga de la mala nutrición en el contexto de COVID-19.
6. Promover el consumo de verduras, frutas, leguminosas y agua potable y facilitar su acceso, especialmente para la población de bajos recursos o que han visto afectado severamente su ingreso.

COVID-19 Temático:

Medidas para mitigar el impacto

Fase 3

6 agosto, 2020

7. Mejorar y facilitar el acceso al agua para prácticas de higiene
8. Impulsar y favorecer la compra de alimentos locales y frescos.
9. Promover el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura local y la diversificación productiva. Producción sana de alimentos sanos.



Conclusiones

Fase 3

6 agosto, 2020

- La actual pandemia de COVID-19 representa un gran desafío que podría tener efectos profundos y duraderos en la nutrición de la infancia mexicana.
- Si no actuamos a tiempo, se corre el riesgo de perder los logros que hasta la fecha se ha alcanzado como país en la reducción del hambre y la desnutrición y, por otra parte, continuará el aumento acelerado del sobrepeso y la obesidad.
- El combate a la mala nutrición infantil requiere del más alto compromiso político y acciones simultáneas de múltiples sectores.