

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Miércoles 15 julio, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Julio, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14		16	17	18
19	20	21		22	23	24
26	27	28		29	30	31
						1

Fase 3

45

Nueva
normalidad

138

Conferencias
vespertinas

Información diaria


FASE 3 Miércoles 15 julio, 2020

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 Internacional: Proporción de casos hospitalizados por COVID-19 en la región de las Américas


Escenario nacional




Fase 3

15 julio, 2020


NORTEAMÉRICA




CENTROAMÉRICA



SUDAMÉRICA



CARIBE




COVID-19 México: Casos positivos estimados, sospechosos y negativos

Escenario nacional

Fase 3

15 julio, 2020



369,411

Negativos

81,411

Sospechosos

317,635


Casos confirmados

36,906

Defunciones confirmadas

COVID-19 México: Casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



199,129

Recuperados

38,838

Defunciones estimadas

Fase 3

15 julio, 2020

356,602

Casos estimados

48,207 (14%)

Casos activos estimados

+ 10%


+ 14%

- 29%

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

al 14 julio,
2020



30,257
totales


16,512
disponibles

13,745
ocupadas
(45%)

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

al 14 julio,
2020



Escenarios estatales

FASE 3 Miércoles 15 julio, 2020

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 Estatal: Casos positivos estimados, sospechosos y negativos

Puebla

Fase 3

15 julio, 2020



14,792

Negativos

4,700

Sospechosos

14,876


Casos confirmados

1,864

Defunciones confirmadas

COVID-19 Estatal: Casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Puebla



Fase 3

15 julio, 2020

17,211

2,252 (13%)

+ 26%
- 9%

- 29%

Casos estimados

Casos activos estimados

9,397


Recuperados

1,992

Defunciones estimadas

COVID-19 Estatal: Tasa de incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Puebla



Fase 3



15 julio, 2020

63%
Ocupación
Camas General

50%
Ocupación
Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: Mapa de incidencia municipal por cada 100 mil habitantes

Puebla



Fase 3

15 julio, 2020




COVID-19 Estatal: Casos positivos estimados, sospechosos y negativos

Tlaxcala

Fase 3

15 julio, 2020



5,375

Negativos

716

Sospechosos

3,499


Casos
confirmados

486

Defunciones
confirmadas

COVID-19 Estatal: Casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Tlaxcala



+ 1%

+ 26%

- 8%

Fase 3

15 julio, 2020

3,867

574 (15%)

Casos estimados

Casos activos estimados

2,047

Recuperados

491


Defunciones estimadas

COVID-19 Estatal: Tasa de incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Fase 3

15 julio, 2020

Tlaxcala



51%


Ocupación
Camas General

43%

Ocupación
Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: Mapa de incidencia municipal por cada 100 mil habitantes

Tlaxcala



Fase 3


15 julio, 2020

COVID-19 Estatal: Casos positivos estimados, sospechosos y negativos

Veracruz

Fase 3

15 julio, 2020



8,049

Negativos

2,904

Sospechosos

15,073


Casos confirmados

2,058

Defunciones confirmadas

COVID-19 Estatal: Casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Veracruz



+ 21%

16,994

+ 30%

2,762 (16%)

- 16%

Fase 3

15 julio, 2020

Casos estimados


Casos activos estimados

COVID-19 Estatal: Tasa de incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Fase 3

15 julio, 2020

Veracruz




62%
 Ocupación
 Camas General

46%
 Ocupación
 Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: Mapa de incidencia municipal por cada 100 mil habitantes

Veracruz



Fase 3

15 julio, 2020

Tratamiento COVID-19

FASE 3 Miércoles 15 julio, 2020

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Fase 3

15 julio, 2020

“Primum Non Nocere”

Lo primero es no hacer daño

El principio básico de la medicina de no dañar, que se centra en el debate de la atención médica de la pandemia.

Fase 3

15 julio, 2020

La calidad de la atención médica depende de la toma de decisiones, sustentadas por datos científicos validados.

En el caso tratamientos, se basa en la evaluación de los **beneficios** y los **riesgos**.

COVID-19 México: Niveles de evidencia para la toma de decisiones en medicina

Fase 3

15 julio, 2020

Débil

Fuerte

Origen de la evidencia

Noticias en medios
Redes Sociales
Rumores

Serie de casos
Estudio de caso
Editoriales

Ensayo clínico no controlado
Estudios de cohorte, casos y controles o transversales

Revisión sistemática
Ensayo clínico controlado

COVID-19 México: ¿Qué dice la evidencia científica sobre tratamientos para COVID-19?

Fase 3

15 julio, 2020

No hay evidencia científica
suficiente para recomendar
tratamientos específicos para
COVID-19.

Para casos graves y
críticos de COVID-19 sólo
se recomienda el
soporte respiratorio y
hemodinámico.

Fase 3

15 julio, 2020

- **Informar y orientar al paciente** para reconocer síntomas, qué hacer y a dónde acudir para recibir atención médica;
- **Interrogar sobre los antecedentes patológicos y el uso cotidiano de fármacos;**
- Reiterar la **importancia de dar continuidad a los tratamientos de manera habitual y regular, para el control adecuado de padecimientos crónicos.**

**No hay tratamiento contra el virus,
sólo para los síntomas**

Fase 3

15 julio, 2020

NO SE RECOMIENDA el uso de:

- Arbidol
- Oseltamivir
- Ivermectina
- Azitromicina
- Nitazoxanida
- Factor de transferencia
- Colchicina
- Antioxidantes
- Nanomoléculas de cítricos
- Dióxido de cloro
- Inmunoglobulina intravenosa
- Interferones

Fase 3

15 julio, 2020

SÓLO USAR EN ENSAYOS CLÍNICOS CONTROLADOS:

- Remdesivir
- Favipiravir
- Lopinavir/ Ritonavir
- Cloroquina e Hidroxicloroquina
- Baricitinib (combinado con Remdesivir)
- Tocilizumab
- Sarilumab
- Anakinra
- Plasma convaleciente

Sólo para su uso en personas hospitalizadas y bajo condiciones específicas

Fase 3

15 julio, 2020

Dexametasona

Anticoagulantes

Consultar el micrositio:
www.coronavirus.gob.mx

Recomendaciones para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, agente causal de COVID-19

Recomendaciones para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, agente causal de COVID-19.
Versión 6 de julio de 2020

COVID-19 México: Conclusiones



Fase 3

15 julio, 2020

El tratamiento de COVID 19 debe basarse **en evidencia científica** de eficacia y seguridad apoyada por ensayos clínicos con metodología adecuada.

El empleo de medicamentos sin evidencia de efectividad, fuera de ensayos clínicos es **altamente cuestionable y debe ser reportado inmediatamente a la autoridad sanitaria por uso fuera de la información para prescribir.**

La automedicación puede generar problemas para la salud de la persona

Fase 3

15 julio, 2020

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

- **Hidroxicloroquina:** Pacientes COVID-19 latidos irregulares del corazón (137%), muerte (>34%).
Alteraciones oculares (retinopatía)
- **Ivermectina:** Dolor de cabeza, alergias, diarrea
- **Azitromicina:** latidos irregulares del corazón, alteraciones del hígado, resistencia antimicrobiana



La automedicación puede generar problemas para la salud de la persona



INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- **Hidroxicloroquina:** hipoglucemiantes (alteraciones de glucosa), anticonvulsivantes, antibióticos (disminuir absorción en intestino)
- **Azitromicina:** Alteración absorción de otros medicamentos (ciclosporina), riesgo de rabdomiólisis (estatinas)

Fase 3

15 julio, 2020

La automedicación puede generar problemas para la salud de la población

Fase 3

15 julio, 2020

FALTA DE ABASTO PARA POBLACIÓN QUE REQUIERE MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE SU CONDICIÓN CLÍNICA

- Tratamiento VIH, personas con enfermedades autoinmunes



RESISTENCIA ANTIMICROBIANA

Es importante mantener conductas saludables



- Seguir con sus medicamentos de uso habitual
- Mantener una dieta saludable y en buen estado de hidratación
- Procurar llevar actividad física en casa
- Consultar cualquier duda que tenga con una persona profesional de la medicina
- Seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud

Fase 3

15 julio, 2020