

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Domingo 2 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

64
Nueva
Normalidad

156
Conferencias
vespertinas

Agosto, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	31	
 3	 4	 5	 6	 7	 8	
 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15
 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22
 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
 30	 31	1	2	3	4	5

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Información diaria

FASE 3 Domingo 2 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional

Fase 3

2 agosto, 2020



483,333

Negativos

83,119

Sospechosos

439,046

Casos
confirmados

47,746


Defunciones
confirmadas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



289,394

Recuperados

49,621

Defunciones
estimadas

Fase 3

2 agosto, 2020

478,082

Casos
estimados


48,772 (10%)

Casos activos
estimados

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

2 agosto, 2020




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 01 agosto, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

2 agosto, 2020



Componente estatal

FASE 3 Domingo 2 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 Estatal: casos positivos, sospechosos y negativos

Hidalgo

Fase 3

2 agosto, 2020



5,091

Negativos

539

Sospechosos

6,994

Casos
confirmados

1,086


Defunciones
confirmadas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Hidalgo



3,798

Recuperados

1,096

Defunciones
estimadas

Fase 3

2 agosto, 2020

7,293

Casos
estimados

909 (12%)


Casos activos
estimados



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Hidalgo



39%

Ocupación
Camas General

27%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3


2 agosto, 2020

COVID-19 Estatal: Casos estimados por cada 100 mil habitantes por semana epidemiológica



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Hidalgo



Fase 3

2 agosto, 2020


Semana 10

COVID-19 Estatal: casos positivos, sospechosos y negativos

Estado de México

Fase 3

2 agosto, 2020



57,301

Negativos

20,643

Sospechosos

53,735

Casos
confirmados

6,511

Defunciones
confirmadas




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Estado de México

Fase 3

2 agosto, 2020



62,685

**Casos
estimados**

4,363 (7%)

**Casos activos
estimados**

29,922

Recuperados


6,828

Defunciones
estimadas



COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Estado de México



45%

Ocupación
Camas General

43%



Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3

2 agosto, 2020

COVID-19 Estatal: Casos estimados por cada 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Estado de México




Fase 3

2 agosto, 2020

Semana 10

COVID-19 Estatal: casos positivos, sospechosos y negativos

Morelos



3,962

Negativos

356

Sospechosos

4,131

Casos confirmados

842

Defunciones confirmadas

Fase 3


2 agosto, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Morelos



1,933

Recuperados

848

Defunciones
estimadas

Fase 3

2 agosto, 2020

4,306

Casos
estimados

323 (8%)

Casos activos
estimados

- 3%


+ 43%

- 64%



COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Morelos



32%

Ocupación
camas general

25%



Ocupación
camas ventilador

Fase 3

2 agosto, 2020

COVID-19 Estatal: Casos estimados por cada 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Morelos



Fase 3

2 agosto, 2020

Semana 10

Componente temático

FASE 3 Domingo 2 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Medicina **CON** evidencia

La medicina contemporánea se asienta en los pilares de la razón, el conocimiento y la evidencia científica.

COVID-19 Temático: Investigación clínica del COVID-19 en México

Fase 3

2 agosto, 2020

Medicina **CON** ciencia

La búsqueda de alternativas de tratamiento debe de guiarse por los fundamentos propios de la ciencia y no de manera desorganizada o azarosa.

COVID-19 Temático: Investigación clínica del COVID-19 en México

Fase 3


2 agosto, 2020

Medicina CON ética

Debe producirse y compartirse información que prevenga o resuelva problemas de salud y que no ponga en riesgo la integridad de las personas.

COVID-19 Temático: Investigación clínica del COVID-19 en México

¿Cómo se hace investigación clínica?



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

2 agosto, 2020

COVID-19 Temático: Investigación clínica del COVID-19 en México

Ensayo clínico



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

2 agosto, 2020



COVID-19 Temático: Investigación clínica del COVID-19

¿Por qué es importante la investigación clínica en la pandemia del COVID-19?



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

2 agosto, 2020

Permite obtener **información y evidencia** sobre:

Tratamiento

Diagnóstico

Prevención

COVID-19 Temático: Investigación clínica del COVID-19

Frente a la emergencia de una pandemia

Fase 3

2 agosto, 2020

**Se exige rigor científico
y actitudes éticas.**

Se busca rapidez y planeación
anticipada con procedimientos
ajustados a la urgencia.

COVID-19 Temático: Investigación clínica del COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Protocolos CCINSHAE

Hidroxiclороquina

Tocilizumab

Remdesivir/Baricitinib

Plasma convaleciente

Favipiravir

Favipiravir + Maraviroc

Maraviroc

Fase 3

2 agosto, 2020

Remdesivir

Acortó **el tiempo de recuperación** (15 vs 11 días) en adultos hospitalizados con Covid-19.

NO redujo la mortalidad.

Fase 3

2 agosto, 2020

Tocilizumab

Fase 3

2 agosto, 2020

**En ensayo clínico Fase 3.
NO mostró beneficios clínicos
en personas con neumonía
grave por Covid.**

COVID-19 Temático: Investigación clínica del COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Remdesivir/Baricitinib

Fase 3

2 agosto, 2020

**En estudio clínico controlado.
Se han reclutado 68 pacientes.**

Plasma convaleciente

Fase 3

2 agosto, 2020

En ensayo clínico controlado, aleatorizado y multicéntrico en casos de enfermedad grave por COVID-19 (receptores).

Se evalúa la capacidad para realizar determinación de anticuerpos de tipo neutralizante en el plasma de donadores.

COVID-19 Temático: Investigación clínica del COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Favipiravir

Fase 3

2 agosto, 2020

En ensayo clínico multicéntrico para determinar si detiene la progresión de la enfermedad y evita la ventilación mecánica (intubación).

Favipiravir vs Favipiravir + Maraviroc

Fase 3

2 agosto, 2020

En ensayo clínico multicéntrico para determinar si, en forma combinada, detiene la progresión de la enfermedad y evita la ventilación mecánica (intubación).

Algunos estudios y reportes han encontrado interesantes resultados en la modulación o resolución de condiciones inflamatorias generalizadas.

Hidroxiclороquina

Fase 3

2 agosto, 2020

No hay evidencia de beneficios clínicos que justifiquen su uso.

NO debe ser utilizada en el tratamiento para pacientes con Covid-19.

COVID-19 Temático: Investigación clínica del COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Tocilizumab

Fase 3

2 agosto, 2020

NO es útil para el tratamiento de personas con COVID-19.

Riesgos de inmunosupresión, costo elevado y potencial toxicidad.

Lecciones por aprender

Fase 3

2 agosto, 2020

Usar medicamentos SIN evidencia:

Es una mala práctica médica y tiene implicaciones éticas.

Puede causar graves daños a la salud.

Puede causar daño económico y moral.

COVID-19 Temático: Investigación clínica del COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

¿Cuáles son las alternativas existentes?

Fase 3

2 agosto, 2020

Uso de **Dexametasona**
para pacientes hospitalizados
que requieren oxígeno
suplementario.

NO se recomienda

- Terapia con células madre
- Dióxido de cloro
- Ivermectina
- Nitazoxamida
- Azitromizina
- Ozeltamivir

Ningún medicamento fuera
de sus indicaciones
terapéuticas

Fase 3

2 agosto, 2020

Conclusiones

Fase 3

2 agosto, 2020

Un tratamiento eficaz:

Debe disminuir la mortalidad de pacientes con Covid-19 grave.

Debe evitar la progresión del Covid-19 en personas con riesgo alto.

Debe determinarse mediante ensayos clínicos controlados.

Existen otros estudios en espera de ser analizados y, en su caso, aprobados para fase de ensayo clínico.