

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Domingo 30 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

Agosto, 2020

92
Nueva
Normalidad

184
Conferencias
vespertinas

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Julio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
  31		1	2	3	4	5

Información diaria

FASE 3 Domingo 30 agosto, 2020


SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional



Fase 3

30 agosto, 2020

1,340,466

**Personas
estudiadas**

43%

**Positividad
SE 33**

663,474

Negativos

81,151

Sospechosos

595,841

Casos
confirmados

64,158


Defunciones
confirmadas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



Fase 3

30 agosto, 2020

629,520

Casos estimados

41,959 (7%)

Casos activos estimados

412,580

Recuperados


65,844

Defunciones estimadas

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

**30 agosto,
2020**




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 29 agosto, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

**30 agosto,
2020**



Componente Temático

FASE 3 Domingo 30 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Políticas para el control de tabaco, una oportunidad para mejorar la salud de las y los mexicanos en tiempos de COVID-19

FASE 3 Domingo 30 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 Temático: Daños a la salud por el consumo de tabaco y exposición a humo de segunda mano



Instituto Nacional
de Salud Pública




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


Fase 3

30 agosto, 2020

Principal factor de riesgo causal de enfermedad y muerte, completamente prevenible



Hoy sabemos que consumir tabaco se asocia causalmente con **enfermedades crónicas e infecciosas como enfermedades coronarias, evento vascular cerebral, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, neumonía, tuberculosis, Diabetes Mellitus y Cáncer de pulmón** entre otros.



Los **niños expuestos al humo de segunda mano** tienen un mayor riesgo de síndrome de **muerte súbita infantil (SMSL)**, **infecciones respiratorias** agudas, problemas de oído (**otitis**), y episodios de asma más severa.

Las personas adultas expuestas al humo de segunda mano tienen mayor riesgo de sufrir **infarto agudo de miocardio y cáncer de pulmón**.

No existe un nivel seguro de exposición a humo de tabaco

COVID-19 Temático: Susceptibilidad al SARS-CoV-2 y COVID-19



Instituto Nacional
de Salud Pública




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

30 agosto, 2020

“tormenta inflamatoria” pulmonar por fumar y vapear



La evidencia concluye que fumar y vapear:

Altera ampliamente mecanismos de defensa pulmonar, incluyendo los de virus y bacterias.

Modifica microbiota y favorece la aparición de **Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA)**

COVID-19 Temático: Riesgo infección SARS-Cov 2 y Progresión COVID 19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3


30 agosto, 2020

Los adolescentes, jóvenes fumadores, vapeadores (duales) tienen 9 veces más riesgo de infección por COVID 19



Gaiha SM et al, en una **muestra nacional de adolescentes y adultos jóvenes en EUA (n=4,351)**

- Los adolescentes, jóvenes fumadores, vapeadores (duales) tienen **9 veces más riesgo de infección por COVID-19.**



Patanavanich R, Un meta-análisis de 19 estudios asociación de fumar y COVID 19

- El tabaquismo se asocia con el doble de riesgo de progresión a mayor severidad COVID-19**

COVID-19 Temático: La epidemia de tabaquismo en México por entidad federativa



Instituto Nacional
de Salud Pública




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

30 agosto, 2020

Focalizada principalmente en los estados del
norte, centro y occidente.



El 6% de los adolescentes y el 18%
de los adultos fuman cigarros
combustibles

**(1.3 millones de adolescentes y
14.8 millones de adultos)**

4.1 millones mujeres y 10.6 millones
hombres

Cerca de **1 millón de adultos y
335 mil adolescentes**

mexicanos consume cigarros
electrónicos, a pesar de la
prohibición establecida en la
Ley General para el Control de
Tabaco

COVID-19 Temático: Exposición a humo de tabaco de segunda mano



Instituto Nacional
de Salud Pública




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

30 agosto, 2020

En México, la mitad de la población no fumadora continua expuesta a humo de tabaco



- Desde 2008, **14 entidades** han **implementado legislaciones 100% LHT**, esto equivale al 51% de la población mexicana.

- Chiapas, Aguascalientes y Yucatán (2019) han regulado los productos de tabaco novedosos y emergentes (cigarro electrónico).

- La exposición a HTSM continua en lugares **públicos como privados:**

Los hombres **expuestos en bares y lugares de trabajo,**

Las mujeres en **restaurantes, transporte público y hogar.**

No existe un nivel de exposición libre de riesgo al humo de tabaco de segunda mano

COVID-19 Temático: Mensajes para recordar



Instituto Nacional
de Salud Pública



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

30 agosto, 2020

La evidencia científica actual es concluyente:

Fumar tabaco es un factor de riesgo **causal** de enfermedades infecciosas, crónicas y cáncer y el humo de tabaco de segunda mano afecta negativamente a los no fumadores, principalmente niñas, niños y mujeres.

Una persona que fuma tabaco y/o Vapea tiene más riesgo de infección y progresión a mayor severidad e incluso la muerte por COVID-19.

Los profesionales de la salud, padres de familia, maestros, organizaciones de la sociedad civil y tomadores de decisiones deben concientizar a la población, particularmente a los jóvenes, de la **asociación entre fumar tabaco / vapear y COVID 19, apoyándolos para dejar completamente el uso de tabaco/nicotina en cualquiera de sus presentaciones.**

COVID-19 Temático

Tabaquismo, vapeo y COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

30 agosto, 2020



**Los cigarros electrónicos
no son productos inofensivos,
cada vez hay mayor evidencia
científica de los daños que generan.**






SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

30 agosto, 2020

COVID-19 Temático

Mortalidad por tabaquismo



- El consumo de tabaco y la exposición pasiva a su humo, **son la causa prevenible más común** de las muertes en el mundo.
- El tabaquismo es un factor de riesgo para **6 de las 8 principales causas de muerte** en el mundo.
- A nivel mundial, causa la muerte de **una persona cada cuatro segundos**.

Mortalidad atribuible al tabaquismo en México

Fase 3

30 agosto, 2020

El tabaco causa **51 mil 575 muertes** cada año
(**141 defunciones al día**)

Enfermedades	Muertes
Enfermedades cardiovasculares	17,241
Enfermedad isquémica cardíaca	13,282
Neoplasias	12,397
Enfermedades respiratorias crónicas	10,484
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	10,329
Cáncer de tráquea, bronquios, pulmón	4,817
Diabetes Mellitus	3,906
Enfermedad cerebrovascular	3,371
Total	51,575

Costos médicos atribuibles al tabaquismo en México

Fase 3

30 agosto, 2020

El costo directo atribuible al tabaco es de casi
80 mil millones por año

Causa	Costos de la atención
Enfermedades cardíacas	\$27 mil millones
Accidente cerebrovascular	\$2 mil millones
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	\$26 mil millones
Cáncer de pulmón	\$6 mil millones
Otros cánceres	\$7 mil millones
Neumonía	\$484 millones
Tabaquismo pasivo y otras	\$9 mil millones
Total	\$80 mil millones

COVID-19 Temático

La respuesta debe ser integral

Fase 3

30 agosto, 2020



Eliminar la exposición al **humo de tabaco** ajeno en todos los lugares cerrados, lugares públicos y el transporte público



Implementar **advertencias sanitarias gráficas grandes** y de alto impacto en el empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco y/o medidas de empaquetado neutro



Establecer y hacer cumplir la **prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio** de los productos del tabaco



Implementar **campañas en medios masivos** de comunicación para sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo del Tabaco y el humo de segunda mano



Ofrecer ayuda para el **abandono del consumo** de productos de tabaco



Incrementar los impuestos a los productos del tabaco

COVID-19 Temático

Advertancias sanitarias



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

30 agosto, 2020



COVID-19 Temático


Solicitudes de apoyo en línea de vida

A partir del inicio de las acciones de confinamiento por COVID-19, en los servicios de apoyo de la **línea de la vida** se incrementó de manera significativa las **solicitudes de ayuda para dejar de fumar**.

Fase 3

30 agosto, 2020

Droga de impacto en servicios de apoyo de la línea de la vida, 2020



COVID-19 Temático

Productos novedosos y emergentes de tabaco y nicotina



- Durante esta contingencia por COVID-19, una de las medidas más importantes en beneficio de la salud es **dejar de fumar y vapear**.
- Evite fumar o vapear en los espacios de convivencia colectiva y familiar, sobre todo si hay **menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores o alguna persona enferma**.
- Además de los espacios 100% libres de humo de tabaco, es muy recomendable que en los restaurantes, bares y hoteles mientras dure la pandemia **no se permita el consumo de tabaco en sus instalaciones**.

COVID-19 Temático

Recomendaciones y consideraciones



- El uso de estos sistemas de administración de nicotina y tabaco, en cualquiera modalidad **constituye un riesgo para la salud.**

- Estos productos **son potencialmente nocivos para la salud de menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas.**

- Al emplear nicotina estos dispositivos incrementan significativamente **el riesgo de adicción** (dependencia) en usuarios, principalmente en menores de edad y jóvenes.

- Ninguno de estos productos cuenta con el aval o reconocimiento de la Secretaría de Salud** como productos de riesgo reducido y menos como una alternativa para dejar de fumar.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

30 agosto, 2020

Si requieres apoyo para dejar de fumar:

**Línea de la vida de la CONADIC
800 911 2000**

- 24 horas, todo el año.
- Orientación y asistencia especializada para dejar de fumar y/o vapear.
- Prevención y apoyo psicológico por epidemia del COVID-19.

**Centros de Integración Juvenil (CIJ)
55 5212 1212**

Servicios Estatales (Locales) de Salud

Llama a la Línea de la Vida 800 911 2000



En la Línea de la Vida te escuchamos.

Durante esta contingencia pueden presentarse casos de estrés y ansiedad.

GOBIERNO DE MÉXICO | SALUD SECRETARÍA DE SALUD | CONADIC COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL DROGATRAÍFICO

gob.mx/salud/conadic

Políticas para el control de tabaco, una oportunidad para mejorar la salud de los mexicanos en tiempos de COVID-19

Dr. Miguel Malo Serrano
Asesor de ENT y Salud Mental
OPS/OMS, México

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Cuando hablamos de tabaco...

Fase 3

30 agosto, 2020

Negocio
que causa
**enfermedad y
muerte**

Aumenta riesgo de
desenlace fatal con
COVID-19

- Ocasiona 8.1 millones de muertes al año en el mundo.
- De ellas 1 millón de muertes al año es en la región de las Américas.
- Roba 10 años de vida a aquellos que fuman.

COVID-19 Temático

Fase 3

30 agosto, 2020

Desde el punto de vista del Estado y la Sociedad **y para las familias** es “buen negocio” acabar con esta causa de enfermedad y muerte


Más ahora en tiempo de **pandemia**

- Cada año el tabaquismo es responsable de \$33,576 millones de dólares en costos directos para los sistemas de salud.
- Esto equivale a más del 8% del presupuesto de salud.

COVID-19 Temático

...ES EVITABLE

Todos
los conocimientos
necesarios y la
mejor evidencia
posible



Fase 3


30 agosto, 2020

COVID-19 Temático

Fase 3

30 agosto, 2020

Entre 2002 y 2016 el consumo de tabaco cayó en 11%, con una caída importante en la prevalencia de fumadores diarios (50%)



COVID-19 Temático

Fase 3

30 agosto, 2020



Por eso queremos una generación libre de tabaco y de la exposición a su humo; libre de las muertes y enfermedades que estos provocan.

Fase 3

30 agosto, 2020

La mejor medida siempre es la que protege más, sobre todo a los jóvenes

Ambientes 100% libres de humo de tabaco

Impuestos al tabaco

Prohibición total de la publicidad de tabaco y sus productos

COVID-19 Temático

Los niños que utilizan cigarrillos electrónicos

tienen el doble de probabilidades de fumar

cigarrillos normales en la edad adulta.



OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
Américas

Alcemos la voz. #TobaccoExposed

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

31 DE MAYO
2020

La Organización Mundial de la Salud otorga este **Certificado de Reconocimiento** a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Estados Unidos Mexicanos

por su contribución excepcional al control del tabaco

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General

Organización
Mundial de la Salud

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

31 DE MAYO
2020

La Organización Mundial de la Salud otorga este **Certificado de Reconocimiento** a la

Secretaría de Economía
Estados Unidos Mexicanos

por su contribución excepcional al control del tabaco

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General

Organización
Mundial de la Salud

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

31 DE MAYO
2020

La Organización Mundial de la Salud otorga este **Certificado de Reconocimiento** a la

Secretaría de Salud
Estados Unidos Mexicanos

por su contribución excepcional al control del tabaco

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General

Organización
Mundial de la Salud

Organización
Panamericana
de la Salud
Organización
Mundial de la Salud
Américas

OPS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

30 agosto, 2020

COVID-19 Temático



OPS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

30 agosto, 2020

Una de las maneras de transmisión del COVID-19 es a través de las manos contaminadas al tocar la boca, nariz y ojos, el fumar te acerca los dedos a la cara aumentando la posibilidad de contagio.



Deja de fumar y evita enfermarse

GOBIERNO DE
MÉXICO

f t i g y o b . m x



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



CONADIC
COMISIÓN NACIONAL CONTRA
LAS ADICCIONES

Secretaría de Salud
Comisión Nacional contra las Adicciones

Dejar de fumar o vapear es hoy una de las mejores decisiones en la prevención de la pandemia del COVID 19

Organización
Panamericana
de la Salud
Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

OPS



EL TABACO ES UNA AMENAZA PARA TODOS



DIGAMOS NO AL TABACO

PROTEJAMOS LA SALUD,
REDUZCAMOS LA POBREZA,
PROMOVAMOS EL DESARROLLO