COVID-19 MÉXICO Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Viernes 7 agosto, 2020







Avance de estrategia

de estrategra

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
	1-	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1		3	4
dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25

Julio

Agosto, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6		8
9		11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	7	2	3	4	5

Fase 3

69 Nueva normalidad 161 Conferencias vespertinas


Información diaria

FASE 3 Viernes 7 agosto, 2020



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos





Fase 3

7 agosto, 2020

1,071,706

Personas estudiadas

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana





7 agosto, 2020


Casos estimados

510,232

47,999 (9%)

Casos activos estimados





313,386

Recuperados

53,283


Defunciones estimadas

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general






7 agosto, 2020



COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador






Fase 3

7 agosto, 2020

Componente estatal

FASE 3 Viernes 7 agosto, 2020






Entidades en acmé con descenso de 1 semana epidemiológica

- 1. Chihuahua
- 2. Jalisco

- 3. San Luis Potosí
- 4. Tabasco

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas





20%

10%

0%



Semana epidemiológica

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

200

100

0


COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica





7 agosto, 2020







22%
Ocupación
Camas General

16%
Ocupación
Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas







estimadas


COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica





7 agosto, 2020





57% Ocupación


46%

Ocupación **Camas Ventilador**

Camas General

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas





20%

10%

0%



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Semana epidemiológica

> 2,903 **Defunciones** estimadas

500

0


COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica





7 agosto, 2020

Municipios* de Puebla




57%
Ocupación
Camas General

46%
Ocupación
Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas





20%

10%

0%



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Semana epidemiológica



,000

500

0


COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica






7 agosto, 2020

Municipios* de San Luis Potosí



COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas





20%

10%

0%

18,146 Recuperados

Semana epidemiológica

2,176 Defunciones estimadas

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

,000

500

0

10 11 12 13 14 15


COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica





7 agosto, 2020






57%
Ocupación
Camas General

52%
Ocupación
Camas Ventilador

Componente Temático

FASE 3 Viernes 7 agosto, 2020






Fase 3

7 agosto, 2020









Fase 3

7 agosto, 2020

Tipos de transmisión de COVID-19, OMS

Categorías por tipo de transmisión	Definición			
Sin casos	Países/territorios /áreas sin casos.*			
Casos esporádicos	Países/territorios /áreas con uno o más casos , importados o detectados localmente.			
Conglomerado de casos	Países/territorios /áreas que presentan casos agrupados en tiempo, ubicación geográfica y/o exposición común.			
Transmisión comunitaria	 Países/territorios /áreas que experimentan brotes más grandes de transmisión local, definidos a través de una evaluación de factores que incluyen, entre otros: Gran cantidad de casos no vinculados a cadenas de transmisión. Gran cantidad de casos de vigilancia por laboratorio centinela o aumento en las pruebas positivas de muestra centinela (pruebas sistemáticas de muestras respiratorias de laboratorios establecidos). Múltiples grupos no relacionados en varias áreas del país/ territorio /área. 			

^{*} Los países / áreas / territorios pueden moverse en ambas direcciones entre escenarios de transmisión, de modo que "Sin casos" incluye países / áreas / territorios que nunca han tenido ningún caso por COVID-19, y aquellos que han tenido casos COVID-19 pero que actualmente no tienen casos activos.



Fase 3

7 agosto, 2020








Tipos de transmisión de COVID-19 por países







Casos nuevos confirmados por millón de habitantes, promedio de 7 días






7 agosto, 2020



Fase 3


Defunciones de COVID-19 por millón de habitantes






COVID-19 Temático: Región Europa, OMS







8,000



2,000

COVID-19 Temático: Región Pacífico Occidental, OMS



