

# COVID-19 MÉXICO

## Comunicado Técnico Diario

---

**FASE 3**    **Miércoles 7 octubre, 2020**

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD





**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

# Avance de estrategia

## Octubre, 2020

**Fase 3**

**130**  
Nueva  
Normalidad

**220**  
Conferencias  
vespertinas

marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

julio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

agosto






dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

septiembre

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6		 8	 9	 10
 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17
 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24
 25	 26	 27	 28	 29	 30	7

# Información diaria

---

**FASE 3    Miércoles 7 octubre, 2020**


**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD



# COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

## Escenario nacional



**Fase 3**

7 octubre, 2020

**2,037,413**

**Personas notificadas**

**38%**

**Positividad SE 39**

**940,994**

Negativos

**169,245**

Sosp. sin muestra

**36,802**

Sosp. con posibilidad de resultado

**799,188**

Confirmados

**91,184**

Sosp. sin posibilidad de resultado

**82,726**


Defunciones confirmadas



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

# COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

## Escenario nacional



**Fase 3**

7 octubre, 2020

**926,906**

**Casos estimados**

**36,768 (4%)**

**Casos activos estimados**

**560,895**

Recuperados


**94,015**

Defunciones estimadas

# COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

**Fase 3**

7 octubre, 2020




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 06 octubre, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

# COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

**Fase 3**

7 octubre, 2020



FUENTE: RED IRAG, acumulado del 06 octubre, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

# Componente temático

VIH y otras infecciones de transmisión sexual

---

**FASE 3    Miércoles 7 octubre, 2020**

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD





## COVID-19 Temático: VIH e ITS

### Virus de Inmunodeficiencia Humana

- ⚡ Se transmite principalmente por contacto sexual, contacto con sangre y de madres a hijos e hijas durante el embarazo, parto o lactancia.
- ⚡ Actualmente se considera una **enfermedad crónica controlable** con la toma diaria de medicamentos.
- ⚡ Cuando **no** se trata, debilita las defensas del organismo y aparecen infecciones o complicaciones que pueden producir la muerte.



**Fase 3**


7 octubre, 2020

# COVID-19 Temático: VIH e ITS

## Panorama Mundial

**Fase 3**

**7 octubre, 2020**



## COVID-19 Temático: VIH e ITS

# La cascada del continuo de la atención de VIH en México

**Fase 3**

**7 octubre, 2020**



Se estima que 270 mil personas viven con VIH en México



7 de cada 10 personas con VIH han sido diagnosticadas



6 de cada 10 personas con VIH se encuentran en tratamiento ARV



**6 de cada 10 personas con VIH se encuentran con supresión viral**

**Notas:** En el año 2020, el CENSIDA trabajó con Onusida para obtener estimaciones que describan con mayor precisión la epidemia del VIH en México, por lo cual se realizó un cambio en el método utilizado por el Modelo *Spectrum*, al incluir un ajuste por mortalidad. Es importante señalar que, el modelo se encuentra aún en validación y que los datos podrían requerir ajuste.

**Fuente:** Onusida y SS/Censida. Modelo Spectrum, versión 5.87. Datos al cierre 2019.

## COVID-19 Temático: VIH e ITS



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

### ¿Debo hacerme la prueba de VIH?

El diagnóstico temprano y el inicio oportuno de tratamiento garantiza la calidad de vida



**TODAS** las personas que tengan vida sexual activa al menos una vez al año



Mujeres embarazadas en el primer y tercer trimestre del embarazo



Personas con más de una pareja sexual y usuarios de drogas inyectables cada 6 meses



**Fase 3**

7 octubre, 2020

### Beneficios de la detección del VIH

- ⚔️ Toda persona con una prueba reactiva (positiva) a VIH requiere ser vinculada para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento cuanto antes.
- ⚔️ El tratamiento evita que la infección progrese y afecte el sistema inmunológico.
- ⚔️ Las personas en tratamiento que mantienen controlado al virus pueden tener una calidad y expectativa de vida similar a las personas sin VIH.



**INDETECTABLE**  
**=**  
**INTRASMISIBLE**

Las personas en control que alcanzan un nivel tan bajo de virus que se denomina “indetectable” y no pueden transmitir la infección

## Optimización de tratamiento

**Fase 3**

7 octubre, 2020




# COVID-19 Temático: VIH e ITS

## Avances en la optimización

**79% tableta  
única**

**Mejora  
adherencia y  
calidad de  
vida de las  
PVV.**

**Medicamentos  
potentes y  
efectivos**



**Fase 3**

**7 octubre, 2020**



## COVID-19 Temático: VIH e ITS

# Impacto mundial del COVID-19 en la atención de personas con VIH e ITS



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**Fase 3**

7 octubre, 2020



II ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DE  
COVID-19 ENTRE PVVIH  
ANÁLISIS DE RESULTADOS REGIONALES  
Junio 2020

La oferta de servicios adaptados a la pandemia de COVID-19, NO se ve reflejada en muchas opciones para las personas viviendo con VIH.



5 de cada 10 personas han presentado dificultades para obtener su tratamiento.



Solo 3 de cada 10 encuestados tiene tratamiento ARV para más de 2 meses y casi la mitad (49%) solo tiene para un mes. Preocupa que 2 de cada 10 NO tenía para terminar el mes.

ONUSIDA hizo un llamado a los países, ministerios de salud y programas nacionales, para adoptar la provisión de 3 a 6 meses de tratamiento antirretroviral, para personas que viven con VIH y que se encuentran en supresión viral, según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.




## COVID-19 Temático: VIH e ITS

# Acciones realizadas para la protección de personas con VIH ante la COVID-19

**Fase 3**

7 octubre, 2020

[vih\\_covid-19@salud.gob.mx](mailto:vih_covid-19@salud.gob.mx)



# COVID-19 Temático: VIH e ITS

## VIH y COVID-19



Los medicamentos para controlar el VIH no protegen contra la COVID-19

No hay evidencia científica de que exista un riesgo diferente de padecer COVID-19 para personas que viven con VIH.

Es posible que las personas que viven con VIH que no están en tratamiento se enfermen gravemente si su sistema inmune se encuentra debilitado (linfocitos T CD4 <200)

**Fase 3**

7 octubre, 2020

## COVID-19 Temático: VIH e ITS

# Recomendaciones para la atención de personas con VIH



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**Fase 3**

7 octubre, 2020



**Abril 2020**

En pacientes controlados suspensión de estudios de carga viral y conteo de CD4

Postergar citas presenciales, favoreciendo atención telefónica o virtual y favorecer la entrega de mínimo 2 meses de medicamento

Citas por llamada telefónica o bien a través de videollamada

**NO** se suspendieron inicios de tratamiento, ni estudios en personas sin control



**Agosto 2020**

Reanudar la toma de laboratorios de carga viral y CD4

Reanudar consultas de acuerdo a las condiciones de cada unidad

Programación de citas y estudios para evitar aglomeraciones

Continuar el surtimiento de al menos dos meses en personas con carga viral indetectable

## COVID-19 Temático: VIH e ITS

# Semáforo de riesgo COVID durante encuentros sexuales

**Fase 3**

**7 octubre, 2020**



### Seguro

- Contigo mismo(a) recordando el lavado de manos y juguetes sexuales.



### Bajo riesgo

- Sexo consensuado con persona(s) con las que vives, conoces su estado de salud y siguen las medidas preventivas para COVID-19.



### Alto riesgo

- Con tu (s) pareja(s) habitual (es) a quienes conoces y con quienes puedes negociar medidas de prevención de COVID-19.



### Muy alto riesgo

- Con una o más personas desconocidas, de las que no sabes su estado de salud ni las medidas que han seguido para prevención de COVID-19.

## COVID-19 Temático: VIH e ITS

# Impacto del COVID-19 en personas con VIH en México

**Fase 3**

7 octubre, 2020

**6,315**

casos probables de COVID-19

- **38%** casos confirmados por PCR
- **33%** casos confirmados requirieron hospitalización
- **13%** casos confirmados fallecieron



**3,692** casos registrados en SSA

**1,694** casos con registro de atención previa

**1,061** seguimiento activo

- **75%** carga viral indetectable
- **22%** con enfermedad avanzada

## COVID-19 Temático: VIH e ITS

# Prevención de la transmisión vertical de VIH y sífilis



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**Fase 3**

7 octubre, 2020

Durante la pandemia por COVID-19 ha disminuido el número de mujeres que acuden a control de embarazo y se aplican pruebas



Las pruebas de VIH y sífilis debe aplicarse en **TODAS** las mujeres embarazadas

El diagnóstico y el tratamiento protegen la salud de tu bebé y la tuya

## COVID-19 Temático: VIH e ITS

# Impacto del COVID-19 en la detección de VIH e ITS

Comparado con el segundo trimestre del 2019:

**59%** ↓ pruebas aplicadas de **VIH** en población general

**57%** ↓ pruebas aplicadas de **sífilis** en población general

Cobertura de prueba en **mujeres embarazadas**

**VIH 33%** ↓

**Sífilis 48%** ↓



Sólo 1 de cada 3 mujeres embarazadas cuenta con prueba de VIH y 1 de cada 5 con prueba de sífilis (2020)



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**Fase 3**

7 octubre, 2020



### Vacunación para personas con VIH

En temporada invernal se recomienda que las personas que viven con VIH se vacunen contra:



#### Influenza

Se aplica 1 vez al año (oct- dic)

- ✓ Pueden aplicarse en cualquier nivel de control del VIH.
- ✓ Las vacunas son seguras y gratuitas.
- ✓ Puedes solicitarse en la unidad médica en la que recibes tratamiento.



## COVID-19 Temático: VIH e ITS

# Eliminación de la infección por hepatitis C en personas con VIH

**Fase 3**

7 octubre, 2020

En personas con VIH la hepatitis C produce una progresión más rápida a cirrosis o cáncer de hígado


Todas las personas con VIH deben hacerse la prueba de hepatitis C al menos una vez al año

**La Hepatitis C es curable**

**#MéxicoSinVHC**

La hepatitis C interfiere con el control adecuado del VIH

El tratamiento permite curar la hepatitis C en menos de 3 meses



En tu siguiente visita solicita tu prueba de hepatitis C  
**[hepatitisc@salud.gob.mx](mailto:hepatitisc@salud.gob.mx)**

# COVID-19 Temático: VIH e ITS

## Fase 3

7 octubre, 2020

## Conclusiones

- Si vives con VIH, es importante mantener tu tratamiento y en tu próxima visita solicita tu prueba de hepatitis C y otras ITS.
- Recuerda aplicarte la vacuna contra influenza.
- Si no te has hecho pruebas de VIH, **¡es el momento!** Conocer tu estado es el primer paso para mantenerte saludable.

Si estás **embarazada** solicita tu prueba de VIH y **sífilis** para proteger tu salud y la de tu bebé.

Si tienes dudas o problemas con tu tratamiento, escríbenos a:

[vih\\_covid-19@salud.gob.mx](mailto:vih_covid-19@salud.gob.mx)

