

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Domingo 23 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

Agosto, 2020

85
Nueva
Normalidad

177
Conferencias
vespertinas

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Julio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
  24	 25	 26	 27	 28	 29	
 30	 31	1	2	3	4	5

COVID-19 Internacional: Clasificación de la transmisión por COVID-19


Escenario mundial



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

23 agosto, 2020



23,057,288

Casos confirmados en el mundo

3,540,119
(15%)

Casos confirmados en los últimos 14 días en el mundo


3.5 %

Tasa de letalidad global

Fuente: Situación por COVID-19, 23 de agosto de 2020 (Datos de OMS).

COVID-19 Internacional: casos nuevos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes

Escenario regional: América



12,283,953

Casos confirmados en América

1,835,145
(15%)

Casos confirmados en los últimos 14 días en América

3.6 %

Tasa de letalidad en América

Fuente: Situación por COVID-19, 23 de agosto de 2020 (Datos de OMS).

Fase 3

23 agosto, 2020

Información diaria

FASE 3 Domingo 23 agosto, 2020


SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional



Fase 3

23 agosto, 2020

1,259,141

**Personas
estudiadas**

43%

**Positividad
SE 33**

618,779

Negativos

80,198

Sospechosos

560,164

Casos
confirmados

60,480


Defunciones
confirmadas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



Fase 3

23 agosto, 2020

595,144

Casos estimados

41,563 (7%)

Casos activos estimados

383,872

Recuperados


62,241

Defunciones estimadas

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

23 agosto, 2020



30,608

totales

19,473

disponibles


11,135

ocupadas
(36%)

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

23 agosto, 2020



Componente temático

FASE 3 Domingo 23 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Consumo de alcohol y COVID-19

COVID-19 Temático:

Uso nocivo del alcohol en la JNSD

- Durante el confinamiento es probable que las personas consideren que beber les ayuda a sentirse menos estresados y con menos ansiedad; sin embargo, lo más seguro es que el **alcohol tenga el efecto contrario**.
- El uso nocivo del alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir otros problemas de salud graves, además de ser factor de riesgo para **conductas temerarias y agresivas**, que pueden derivar en violencia y accidentes.
- La combinación de la situación que vivimos en este momento por el COVID-19 y el consumo de alcohol, particularmente el uso excesivo de alcohol, pueden **disparar nuestra respuesta al estrés** y empeorar la reacción que tenemos ante ambos sucesos.



Fase 3

23 agosto, 2020

COVID-19 Temático:

Uso nocivo del alcohol en la JNSD

- El consumo de alcohol no solo altera la mente y produce dependencia, también debilita el sistema inmunológico y reduce la capacidad del cuerpo para defenderse de enfermedades infecciosas, **incluido el COVID-19**.
- El mecanismo por el nos pone en riesgo se debe a que interrumpe la expulsión normal de secreciones en las vías respiratorias, **disminuye la función de nuestras células inmunes** y debilita la función de barrera para las infecciones en el tejido pulmonar.
- A menudo, estos daños provocados por el alcohol no se detectan hasta que se manifiesta una segunda afectación, como **una infección respiratoria**, que conduce a enfermedades pulmonares más graves.



Fase 3

23 agosto, 2020

COVID-19 Temático:

MITOS - Alcohol y COVID-19

Fase 3

23 agosto, 2020

Mito	Realidad
Beber alcohol elimina el virus que causa COVID-19.	<ul style="list-style-type: none">• Beber alcohol no destruye al virus• Probable que su consumo aumente los riesgos para la salud si una persona se infecta• Los preparados de alcohol en gel funcionan como desinfectantes en superficies sólidas y en la piel
Beber alcohol de alta concentración puede matar al virus en el aire que se inhala.	Ingerir alcohol NO: <ul style="list-style-type: none">• matará al virus en el aire inhalado• desinfectará su nariz, boca o garganta, y• dará ningún tipo de protección contra COVID-19.
El alcohol (cerveza, vino, licores destilados o alcohol de hierbas) estimula la inmunidad y resistencia al virus.	El alcohol reduce la capacidad de respuesta de su sistema inmunológico y la resistencia a los virus.

BEBER ALCOHOL DURANTE EL COVID-19



MITO

Beber alcohol de alta concentración o “fuerte” mata al virus.

REALIDAD

Ingerir alcohol no hará que se desinfecte su nariz, boca o garganta y no te dará ningún tipo de protección contra el COVID-19.

 GOBIERNO DE MÉXICO |  SALUD |  CONADIC

gob.mx/salud/conadic

COVID-19 Temático:

Consumo de alcohol adulterado durante la pandemia

- Reportes recientes en nuestro país el fallecimiento de personas en diferentes entidades federativas, debido al consumo de bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas.
- El consumo de bebidas alcohólicas adulteradas se considera un serio problema de salud pública debido a la alta toxicidad y mortalidad asociada a ellas (que puede llegar hasta al 50% de los casos).
- Por el potencial de riesgo a la salud que su ingesta ocasiona, es necesario que la población identifique de manera temprana los síntomas asociados a la intoxicación por estas sustancias



COVID-19 Temático:

Consumo de alcohol adulterado durante la pandemia

Fase 3

23 agosto, 2020

Recomendaciones

Evita consumir bebidas

- De bajo o muy bajo precio.
- De marcas desconocidas.
- Que la etiqueta no cumpla con los requisitos obligatorios
- Adquiridas en el mercado ilegal o informal (tianguis, tendidos, casas sin registro de venta) o en lugares que son desconocidos para usted.
- Con etiquetas en mal estado (quemadas, desgastadas, despegadas) o botellas desgastadas, ralladas y sucias, lo que puede sugerir que son botellas reutilizadas.
- Con huellas de violación en las tapas (cintilla rota o botella abierta), o fugas en la tapa al poner la botella boca abajo.
- Con partículas o residuos sólidos visibles a trasluz dentro de la botella.



Tabaquismo, vapeo y COVID-19


COVID-19 Temático:

Llamadas a la línea de la vida

Fase 3

23 agosto, 2020

Droga de impacto en servicios de apoyo de la línea de la vida, 2020



COVID-19 Temático:

El tabaquismo se asocia con el doble de riesgo de progresión a mayor severidad COVID-19

- **Fumar aumenta el riesgo y la severidad de las infecciones pulmonares** debido al daño en las vías aéreas superiores y produce una disminución de la función inmune a nivel pulmonar.
- Diversos estudios y análisis han mostrado una asociación significativa entre el **tabaquismo y la progresión de COVID-19**.
- Altera **ampliamente** mecanismos de defensa, incluyendo los de virus, MERS, y bacterias.



COVID-19 Temático:

El tabaquismo se asocia con el doble de riesgo de progresión a mayor severidad COVID-19

- Es un factor de riesgo de progresión a **mayor severidad e incluso la muerte por COVID-19.**
- El historial de tabaquismo debe ser parte del tratamiento clínico de los pacientes con COVID-19 y
- La cesación tabáquica debe agregarse a la **lista de prácticas para mitigar la pandemia de COVID-19.**



COVID-19 Temático:

Cigarros electrónicos y COVID-19

- Los adolescentes y adultos jóvenes fumadores, vapeadores y usuarios duales tienen **mayor riesgo de desarrollar COVID 19**.
- Un estudio reciente muestra que en adolescentes y adultos jóvenes el uso de cigarros electrónicos y el uso dual de estos con cigarros convencionales son **factores de riesgo importantes** para la **enfermedad por COVID-19***.
- La mayor exposición a la nicotina y otras sustancias químicas en los cigarros electrónicos **afecta negativamente la función pulmonar**.



Fase 3

23 agosto, 2020

COVID-19 Temático:

Cigarros electrónicos y COVID-19

- El COVID-19 se transmite mediante el contacto repetido de las manos con la boca y la cara, que es común entre los usuarios de cigarros convencionales y cigarros electrónicos.
- Los prestadores de atención médica, padres, escuelas, organizaciones comunitarias y legisladores deben ayudar a que los jóvenes tomen conciencia de la **asociación entre fumar y vapear y la enfermedad por coronavirus**.

Fase 3


23 agosto, 2020



COVID-19 Temático:

Humo de tabaco y COVID-19

- Ante la pandemia de COVID-19 y el consecuente aislamiento de la población como medida precautoria durante el confinamiento, se puede dar lugar a otros riesgos sanitarios como la **inhalación de humo de tabaco ajeno** en el hogar.
- Este humo contiene más de **7,000 sustancias químicas**, de los cuales al menos 250 son nocivas y 69 son cancerígenas (causan cáncer).
- El **fumador “involuntario” o pasivo**, se refiere a la persona que no fuma, pero está expuesta al humo de segunda y tercera mano, respirando nicotina y otros químicos tóxicos.



COVID-19 Temático:

RECOMENDACIONES

- Durante esta contingencia por COVID-19, una de las medidas preventivas más importantes que se pueden tomar en beneficio de la salud individual y familiar es

DEJAR DE FUMAR Y VAPEAR

- Además de evitar fumar o vapear en los espacios cerrados como el hogar o el automóvil, también evite hacerlo en los espacios de convivencia colectiva y familiar, sobre todo si hay **menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores o alguna persona enferma**.
- Se invita a los restaurantes, bares y hoteles a no permitir el consumo de tabaco en sus instalaciones incluidos los **espacios abiertos** durante la pandemia.
- Cualquier nivel de exposición al humo de tabaco es dañino y perjudicial.



Fase 3

23 agosto, 2020