

Chapitre 8. Intégrales généralisées.

Intégrales généralisées sur un intervalle borné.

Déf Soit $a < b$ et $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Alors on définit l'intégrale généralisée par la limite

$$\int_a^{b-} f(t) dt \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \rightarrow b-} \int_a^x f(t) dt, \text{ si la limite existe}$$

Sinon, l'intégrale généralisée $\int_a^{b-} f(t) dt$ est divergente.

Si $f:]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, on définit l'intégrale généralisée par la limite

$$\int_{a+}^b f(t) dt \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^b f(t) dt, \text{ si la limite existe}$$


Sinon, l'intégrale généralisée $\int_{a+}^b f(t) dt$ est divergente.

Notations

Ex 1. L'aire sous la courbe $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $x \in]0, 1]$

$$\int_{0+}^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0+ \\ h > 0}} \int_h^1 x^{-\frac{1}{2}} dx = \lim_{h \rightarrow 0+} \left(\frac{1}{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} \Big|_h^1 \right) =$$


$$= \lim_{h \rightarrow 0+} 2(1 - \sqrt{h}) = 2$$



Ex 2. L'aire sous la courbe $y = \frac{1}{x}$, $x \in]0, 1]$

$$\int_{0+}^1 \frac{dx}{x} = \lim_{h \rightarrow 0+} \int_h^1 \frac{dx}{x} = \lim_{h \rightarrow 0+} (\underbrace{\ln 1}_{=0} - \underbrace{\ln h}_{\rightarrow -\infty}) = +\infty$$


L'intégrale généralisée $\int_{0+}^1 \frac{dx}{x}$ est divergente.



Proposition. Critère de comparaison. Soient $f, g : [a, b[$ fonctions continues telles qu'il existe $c \in]a, b[: 0 \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [c, b[$

Alors si $\int_a^{b-} g(x) dx$ converge $\Rightarrow \int_a^{b-} f(x) dx$ converge
(la limite finie existe)

si $\int_a^{b-} f(x) dx$ diverge $\Rightarrow \int_a^{b-} g(x) dx$ diverge



Il existe un critère similaire pour $f, g :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues.

Ex. $\int_a^{b-} \frac{dt}{(b-t)^\alpha} = - \int_{b-a}^{0+} \frac{du}{u^\alpha} = \int_{0+}^{b-a} \frac{du}{u^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0+} \left. \frac{1}{1-\alpha} u^{1-\alpha} \right|_x^{b-a} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{1-\alpha} \left((b-a)^{1-\alpha} - x^{1-\alpha} \right) =$

changement de variable

$u = b-t \Rightarrow du = -dt$

$t=a \Rightarrow u=b-a, t=b- \Rightarrow u=0+$

$\left[\frac{1}{1-\alpha} (b-a)^{1-\alpha}, \quad \alpha < 1 \right.$
 $\left. \text{divergente}, \quad \alpha > 1 \right]$

$\alpha=1 \Rightarrow \int_a^{b-} \frac{dt}{b-t} = - \lim_{x \rightarrow b-} \left(\ln(b-x) - \ln(b-a) \right) = +\infty$ divergent

$$\int_a^{b-} \frac{dt}{(b-t)^\alpha} = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} (b-a)^{1-\alpha}, & \alpha < 1 \\ \text{divergente}, & \alpha \geq 1. \end{cases}$$

Corollaire Soit $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ continue. Supposons qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \cdot (b-x)^\alpha = l \neq 0$. Alors l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t) dt$ converge $\Leftrightarrow \alpha < 1$ et diverge $\Leftrightarrow \alpha \geq 1$.

Dém: Soit $l > 0$; $\lim_{x \rightarrow b^-} (b-x)^\alpha f(x) = l \Rightarrow \exists c \in [a, b[: \forall x \in [c, b[$ on a

$$\frac{1}{2}l \leq \underbrace{(b-x)}_{\rightarrow 0}^\alpha f(x) \leq \frac{3}{2}l \Rightarrow \frac{l}{2} \frac{1}{(b-x)^\alpha} \leq f(x) \leq \frac{3l}{2} \frac{1}{(b-x)^\alpha} \Rightarrow$$

\Rightarrow Par le critère de comparaison $\Rightarrow \int_a^b f(t) dt$ est convergente $\Leftrightarrow \alpha < 1$
divergente $\Leftrightarrow \alpha \geq 1$ □

D'une façon similaire on obtient: Soit $f:]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Supposons qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)(x-a)^\alpha = l \neq 0$. Alors l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t) dt$ converge $\Leftrightarrow \alpha < 1$
diverge $\Leftrightarrow \alpha \geq 1$.

Ex. $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^3}}$ converge ou diverge? (la primitive ne s'exprime pas en fonctions élémentaires)

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(1-x)^\alpha}{\sqrt{1-x^3}} \stackrel{\text{on veut}}{=} l \neq 0 = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(1-x)^\alpha}{\sqrt{(1-x)(1+x+x^2)}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(1-x)^{\alpha-1/2}}{\sqrt{1+x+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \neq 0.$$

\rightarrow il faut prendre $\alpha = \frac{1}{2}$

Puisque $\alpha = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ par le Corollaire $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^3}}$ converge

Déf Soit $a < b$, $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ continue, $c \in]a, b[$ arbitraire

Alors l'intégrale généralisée

$$\int_{a+}^{b-} f(t) dt \stackrel{\text{dét}}{=} \int_{a+}^c f(t) dt + \int_c^{b-} f(t) dt \text{ converge si et seulement si}$$

les deux intégrales généralisées convergent. La définition ne dépend pas du choix de $c \in]a, b[$.

Ex. $\int_{0+}^{1-} \frac{dx}{x^r (1-x)^s} \stackrel{\text{dét}}{=} \int_{0+}^{1/2} \frac{dx}{x^r (1-x)^s} + \int_{1/2}^{1-} \frac{dx}{x^r (1-x)^s}$

(1) On cherche $\alpha_1 \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \cdot x^{\alpha_1} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^{\alpha_1}}{x^r (1-x)^s} = \ell \neq 0 \neq \infty$$

\Rightarrow il faut prendre $\alpha_1 = r$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^r}{x^r (1-x)^s} = 1$$

$$\Rightarrow \int_{0+}^{1/2} \frac{dx}{x^r (1-x)^s} \text{ converge} \Leftrightarrow r < 1$$

(2) On cherche $\alpha_2 \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) (1-x)^{\alpha_2} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{(1-x)^{\alpha_2}}{x^r (1-x)^s} = \ell \neq 0 \neq \infty$$

\Rightarrow il faut prendre $\alpha_2 = s$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{(1-x)^s}{x^r (1-x)^s} = 1$$

$$\Rightarrow \int_{1/2}^{1-} \frac{dx}{x^r (1-x)^s} \text{ converge} \Leftrightarrow s < 1$$

$$\Rightarrow \int_{0+}^{1-} \frac{dx}{x^r (1-x)^s}$$

converge \Leftrightarrow

$$r < 1 \text{ et } s < 1$$

Intégrales généralisées sur un intervalle non borné.

-26/-

Déf. Soit $f: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors l'intégrale généralisée

$$\int_a^{\infty} f(t) dt \stackrel{\text{dit}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t) dt \quad \text{si la limite existe. (un nombre réel)}$$

Sinon, l'intégrale généralisée $\int_a^{\infty} f(t) dt$ est divergente.

Soit $f:]-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.^a Alors l'intégrale généralisée


$$\int_{-\infty}^b f(t) dt \stackrel{\text{dit}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_x^b f(t) dt \quad \text{si la limite existe. (un nombre réel).}$$

Sinon, l'intégrale généralisée $\int_{-\infty}^b f(t) dt$ est divergente.

Ex 1. L'aire sous la courbe $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, $x \in [e, +\infty[$

$$\int_e^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_e^x \frac{dt}{t \ln t} \stackrel{\substack{u = \ln t \\ du = \frac{dt}{t} ; \ln e = 1, \ln x = y \rightarrow \infty}}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} \int_1^y \frac{du}{u} = \lim_{y \rightarrow \infty} \ln u \Big|_1^y =$$

$$= \lim_{y \rightarrow \infty} (\ln y - \ln 1) = \infty \quad \Rightarrow \quad \int_e^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} \text{ diverge.}$$




Ex 2. L'aire sous la courbe $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$, $x \in [e, \infty[$.

$$\int_e^{\infty} \frac{dt}{t(\ln t)^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_e^x \frac{dt}{t(\ln t)^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x \frac{du}{u^2} =$$

$u = \ln t \Rightarrow du = \frac{dt}{t}$
 $t = e \Rightarrow \ln t = 1 \quad x \rightarrow \infty \Rightarrow \ln x = y \rightarrow \infty$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{u} \right) \Big|_1^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x} + 1 \right) = 1$$



Critère de comparaison. Si $0 \leq f(x) \leq g(x)$ pour tout $x > c$ pour un certain $c > a$, Alors


si $\int_a^{\infty} g(x) dx$ converge $\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x) dx$ converge ; si $\int_a^{\infty} f(x) dx$ diverge $\Rightarrow \int_a^{\infty} g(x) dx$ diverge.

Ex. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{\beta}}$ $\beta \neq 1$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{dx}{x^{\beta}} = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{1-\beta} x^{1-\beta} \Big|_1^R = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{1-\beta} (R^{1-\beta} - 1) =$$

$$= \begin{cases} -\frac{1}{1-\beta} = \frac{1}{\beta-1}, & \text{si } \beta > 1 \\ \text{diverge, } & \beta < 1. \end{cases}$$

; Si $\beta = 1 \Rightarrow \int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{R \rightarrow \infty} \ln x \Big|_1^R = \lim_{R \rightarrow \infty} (\ln R - \ln 1) = \infty$
divergente.



$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{\beta}} = \frac{1}{\beta-1}, \text{ si } \beta > 1$$

divergente, si $\beta \leq 1$

à comparer
avec

$$\int_{0+}^1 \frac{dx}{x^{\alpha}} = \frac{1}{1-\alpha}, \alpha < 1$$

divergente, $\alpha \geq 1$

Corollaire Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et $\beta \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \cdot x^{\beta} = \ell \neq 0$
 $\ell \in \mathbb{R}$

Alors $\int_a^{\infty} f(t) dt$ converge $\Leftrightarrow \beta > 1$
diverge $\Leftrightarrow \beta \leq 1$

Ex. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3+1}}$ converge ou diverge? (ne s'exprime pas en fonctions élémentaires)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\beta}}{\sqrt{x^3+1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\beta}}{x^{3/2} \sqrt{1+\frac{1}{x^3}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\beta}}{x^{3/2} \sqrt{1+\frac{1}{x^3}}} = 1 \neq 0 \Rightarrow \beta = \frac{3}{2} > 1$$

pour avoir une limite $\neq 0, \neq \infty$, il faut $\beta = \frac{3}{2} \Rightarrow$ l'intégrale $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3+1}}$ converge.

Déf Soit f une fonction continue sur $]a, +\infty[$. Alors l'intégrale généralisée

$$\int_{a+}^{\infty} f(t) dt \stackrel{\text{dét}}{=} \int_{a+}^c f(t) dt + \int_c^{\infty} f(t) dt \quad \text{pour un } c \in]a, \infty[$$

converge si et seulement si les deux intégrales généralisées convergent.

Sinon, l'intégrale généralisée $\int_{a+}^{\infty} f(t) dt$ diverge.

Déf Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue, alors on peut aussi considérer

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt \stackrel{\text{d} \equiv}{=} \int_{-\infty}^c f(t) dt + \int_c^{\infty} f(t) dt, \quad c \in \mathbb{R}, \text{ qui est convergente si et seulement si les deux intégrales convergent.}$$

La définition ne dépend pas du choix de $c \in \mathbb{R}$.

Ex. $\int_{0+}^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^2 x}$ convergente? $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^\alpha}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^2}{\sin^2 x} = 1$ et $\alpha = 2 > 1 \Rightarrow$ par le Corollaire l'intégrale $\int_{0+}^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^2 x}$ diverge

Directement: $\int_{0+}^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^2 x} = \lim_{h \rightarrow 0+} \int_h^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^2 x} = \lim_{h \rightarrow 0+} (-\cot x) \Big|_h^{\pi/2} = \lim_{h \rightarrow 0+} (-\cot \frac{\pi}{2} + \cot h) = \infty$ diverge

Exercice. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4x+9} = ?$ calculer l'intégrale généralisée si elle converge.

Critère de comparaison $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^\beta}{x^2+4x+9} = \ell \neq 0 \Rightarrow \beta = 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2+4x+9} = 1 \neq 0$

Puisque $\beta = 2 > 1 \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+4x+9} dx$ converge.


$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4x+9} = \int_{-\infty}^{-2} \frac{dx}{x^2+4x+9} + \int_{-2}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4x+9} = \int_{-\infty}^{-2} \frac{dx}{(x+2)^2+5} + \int_{-2}^{\infty} \frac{dx}{(x+2)^2+5} =$$

Changement de variable

$$\left[\begin{array}{l} u = \frac{x+2}{\sqrt{5}} \Rightarrow du = \frac{1}{\sqrt{5}} dx \\ x \rightarrow \pm \infty \Leftrightarrow u \rightarrow \pm \infty \\ x = -2 \Leftrightarrow u = 0 \end{array} \right] = \lim_{R \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{5}} \int_R^0 \frac{du}{u^2+1} + \lim_{S \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{5}} \int_0^S \frac{du}{u^2+1} =$$

$$= \lim_{R \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{5}} \arctan u \Big|_R^0 + \lim_{S \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{5}} \arctan u \Big|_0^S = \lim_{R \rightarrow -\infty} \left(0 - \frac{1}{\sqrt{5}} \arctan R \right) + \lim_{S \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \arctan S - 0 \right) =$$

$$= 0 - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(-\frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{\sqrt{5}}$$



$$\underline{Ex 1.} \quad \int_0^{\infty} \frac{dx}{e^x + 2e^{-x} + 3} = \int_0^{\infty} \frac{\boxed{e^x dx}}{e^{2x} + 3e^x + 2} =$$

$$u = e^x \Rightarrow du = e^x dx$$

$$x=0 \Rightarrow e^x = u = 1, \quad x \rightarrow \infty \Rightarrow u \rightarrow \infty$$

$$= \int_1^{\infty} \frac{du}{u^2 + 3u + 2} = \int_1^{\infty} \frac{du}{(u+1)(u+2)} = \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{u+1} - \frac{1}{u+2} \right) du =$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \left(\frac{1}{u+1} - \frac{1}{u+2} \right) du = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\ln(u+1) - \ln(u+2) \right) \Big|_1^R = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{u+1}{u+2} \right) \Big|_1^R =$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\ln \left(\frac{R+1}{R+2} \right) - \ln \frac{2}{3} \right) = -\ln \frac{2}{3} = \ln \frac{3}{2} > 0$$

↘ 1
↘ 0

