



ZENICARE
EXCELÊNCIA EM ANESTESIA

PROTOCOLO DE SUSPENSÃO DE MEDICAMENTOS ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO COM ANESTESIA .

21 DIAS ANTES:

- OZEMPIC (Semaglutida)
- WEGOVY (Semaglutida)
- RYBELSUS (Semaglutida)

15 DIAS ANTES:

- MOUNJARO (Tirzepatida)

10 DIAS ANTES:

- TRULICITY (Dulaglutida)
- TICLID (Ticlopidina)

7 DIAS ANTES:

- EXTRATO DE ALHO (CÁPSULA) , GINSENG , CHÁ VERDE , ERVA DE SÃO JOÃO
- MAREVAN (Varfarina)
- COUMADIN (Varfarina)
- JANTOVEN (Varfarina)
- PLAVIX (Clopidogrel)
- ISCOVER (Clopidogrel)
- PERSANTIN (Dipiridamol)
- BRILLINTA (Ticagrelor)
- AGASTRAT (Tirofibana)
- EFFIENT (Prasugrel)

3 DIAS ANTES (72 HORAS) :

- XULTOPHY (Liraglutida)
- JARDIANCE (Empaglifozina)
- XARELTO (Rivaroxabana)
- FORXIGA (Dapaglifozina)
- PRADAXA (Dabigatrana)
- ELIQUIS (Apixabana)
- REVIA (Naltrexona)
- CONTRAVE (Naltrexona + Bupropiona)

2 DIAS ANTES (48 HORAS) :

- XENICAL (Orlistate)
- PLETAL, VASOGUARD (Cilostazol)
- ARIXTA (Fondaparinux)
- PERSANTIN (Dipridamol)

- REOPRO (Abciximab)
- VICTOZA (Liraglutida)
- SAXENDA (Liraglutida)
- GINKGO BILOBA

1 DIA ANTES (24 HORAS):

- CLEXANE (Enoxaparina)
- VERSA (Enoxaparina)
- LEVONOX (Enoxaparina)
- DAONIL (Glibenclamida)
- DIAMICRON (Glicazida)
- EPHEDRA

JEJUM:

- 8 HORAS PARA TODAS(OS) AS PACIENTES

**- APLIQUES NO CABELO, UNHAS DE GEL OU CÍLIOS POSTIÇOS
DEVEM SER RETIRADOS ANTES DO PROCEDIMENTO PARA
SEGURANÇA DO PACIENTE**