



**ESCALA DE CATEGORIZACIÓN DE RIESGO DE CAÍDAS**  
**E-CAS-SP-PG-001-PR-001-IN-001 V1 29/09/2021**

**1 OBJETIVO**

Ayudar a los profesionales de la salud en CECIMIN SAS, a detectar, evaluar, prevenir y evitar, el riesgo potencial de sufrir caídas durante la atención en los servicios prestados.

**2 RESPONSABLE**

Personal médico asistencial.

**3 RECURSOS**

N/A

**4 PASO A PASO**

**4.1 ESCALA DE CATEGORIZACIÓN DE RIESGO DE CAÍDAS JH. DOWNTON  
MODIFICADA. CECIMIN S.A.S**

FACTORES DE RIESGO	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE
CAÍDAS PREVIAS	SI	1
	NO	0
MAYOR DE 64 AÑOS	SI	1
	NO	0
MEDICAMENTOS	NO	0
	Diuréticos	1
	Anti parkinsonianos	1
	Tranquilizantes – Sedantes	1
	Hipotensores no diuréticos	1
	Antidepresivos	1
	Analgésicos Opioides	1
	Otros	1
DÉFICIT SENSORIAL	Ninguno	0



**ESCALA DE CATEGORIZACIÓN DE RIESGO DE CAÍDAS**  
**E-CAS-SP-PG-001-PR-001-IN-001 V1 29/09/2021**

	Alteraciones visuales	1
	Alteraciones auditivas	1
	Déficit de miembros	1
<b>ESTADO MENTAL</b>	Orientado	0
	Confuso	1
<b>MARCHA</b>	Normal	0
	Segura con ayuda	1
	Insegura con o sin Ayuda	1
	Imposible	1

Puntaje de uno (1) en los parámetros evaluados y que sean encontrados positivos en el paciente y un puntaje de cero (0) en los parámetros negativos o que no aplica al paciente. Una vez se valoran todos los parámetros de la escala, se hace una sumatoria; si el resultado es mayor o igual a tres (3) se clasifica como un paciente con alto riesgo de caída lo que activará una alerta, por lo cual enfermería colocará un adhesivo de color azul en la manilla del paciente y/o tablero de identificación.

**4.2 ESCALA HUMPTY DUMPTY PARA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE CAÍDAS  
 EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO. CECIMIN S.A.S**

**ESCALA DE CATEGORIZACIÓN DE RIESGO DE CAÍDAS**  
**E-CAS-SP-PG-001-PR-001-IN-001 V1 29/09/2021**

PARAMETROS	CRITERIOS	PUNTOS
Edad	Menos de 3 años	4
	De 3-7 años	3
	De 7-13 años	2
	Más de 13 años	1
Genero	Hombre	2
	Mujer	1
Diagnostico	Problemas neurológicos	4
	Alteraciones de oxigenación: (problemas respiratorios, anemia) deshidratación, anorexia, vértigo.	3
	Trastornos psíquicos o de conducta	2
	Otro diagnostico	1
Deterioro cognitivo	No conoce sus limitaciones	3
	Se le olvida sus limitaciones	2
	Orientado en sus propias capacidades	1
Factores Ambientales	Historia de caída de bebés o niños pequeños desde la cama	4
	Utiliza dispositivos de ayuda en la cuna, iluminación, muebles	3
	Paciente en la cuna	2
	Paciente que deambula	1
Cirugía o sedación anestésica	Dentro de las 24 horas	3
	Dentro de las 48 horas	2
	Más de 48 horas/ninguna	1
Medicación	Uso de múltiples medicamentos sedantes ( Incluye pacientes en UCIP con sedantes o relajantes), Hipnóticos, barbitúricos, fenotiazidas, antidepresivos, laxantes/diuréticos narcóticos	3
	Uno de medicamentos antes mencionados	2
	Ninguno	1
TOTAL		

Cada uno de estos parámetros tiene sus respectivas criterios, que cuentan con una calificación específica dependiendo el caso, ver tabla; en donde menos de 7 puntos significa sin riesgo aparente, entre 7 y 11 puntos es riesgo bajo y mayor o igual a 12 es un riesgo alto y en este último caso se aplica las medidas del adulto.