

荆防合剂治疗过敏性鼻炎的临床研究 和机制探索

病例报告表 (Case Report Form)

研究中心号：|_|_|

受试者姓名缩写：|_|_|_|_|

受试者筛选号：|_|_|_|_|_|

受试者随机编号（药物编号）：|_|_|_|_|

入组日期：20|_|_|年|_|_|月|_|_|日

研究者：_____

在正式填表前，请认真阅读以下说明：

填表说明

1. 此原始病历必须由研究者或经授权的人员填写，并尽可能由同一人填写。本表完成后，主要研究者需仔细阅读，核对本表内容的完整性和准确性，然后在签字页上签字确认，并对本表最终负责。
2. 已入选的受试者，无论筛选成功或失败，都需填写此表。表中时间均采用24小时制填写。
3. 请使用黑色、蓝色或蓝黑签字笔。
4. 原始病历填写务必准确、清晰、规范，不得随意涂改，错误之处纠正时需用横线居中划出，并签署修改者姓名及修改时间。如：~~8.5~~^{7.5 王磊 2010-10-19}。切勿使用修正液涂改。
5. 原始病历的每一页都须完成，所有项目均应填写。在符合的方框内打“×”表示选择此项。如果此项“未做”则填入“ND”；“不知道”则填入“UK”；“不能提供”或“不适用”则填入“NA”。
6. 原始病历中须填入数值的部位均预留了空位，如“|_|_|_|_|”，填写时请将个位数字填入最右边的空格，如左侧留有空位，请以“0”填充，不可出现空格，如：患者血压为120/80mmHg，则填入“血压|1|2||0|/||0|8||0|mmHg”。
7. 严格观察和如实填写不良事件记录表。如果出现任何与研究药物相关的严重不良事件或新不良事件，或有临床意义的异常实验室检测结果，请如实记录不良事件的发生时间、严重程度、持续时间、采取的措施和转归等信息。
8. 疾病名称请用规范的全称，药物名称请用通用名，请不要使用简称或缩写。
9. 患者姓名拼音缩写四格需填满，两字姓名填写两字拼音前两个字母；三字姓名填写三字首字母及第三字第二字母；四字姓名填写每一个字的首字母。特殊情况下，用字母X代替。举例：张红 |Z|H|H|O| 李淑明 |L|S|M|I| 欧阳青山|O|Y|Q|S|。
10. 研究中心编号：01 中国中医科学院广安门医院呼吸科、02中国中医科学院广安门医院耳鼻喉科、03中国中医科学院西苑医院、04北京中医药大学东直门医院。
11. 受试者筛选号由5位数字组成，筛选号根据研究中心在本试验中的编号和筛选患者的情况填写，例如01号中心，第5位筛选患者，筛选号“01005”；受试者随机编号由3位数字组成。随机号填入最右边的空格，如左侧还留有空位，请以“0”填充，不可出现空格，例如随机编号48的患者，随机号“048”，受试者随机编号即为药物编号。

目录

研究流程图..... 4

V1 筛查期的筛选记录..... 5

V2 治疗期的动态记录（D7） 14

V3 治疗期的动态记录（D14） 19

V4 治疗期的动态记录（D28） 25

V5 随访期的动态记录（M2） 31

V6 随访期的动态记录（M3） 36

实验完成情况总结 41

研究流程图

项目	筛选/基线期	治疗期			随访期	
访视（V）	V1	V2	V3	V4	V5	V6
方式时间（天）	-2~0天	D7	D14	D28	M2	M3
签署知情同意书	X					
核查人选/排除标准	X					
随机分组	X					
人口学资料	X					
病史与治疗	X					
安全性指标						
生命体征	X	X	X	X	X	X
血常规	X		X	X		
肝肾功能	X		X	X		
心电图	X			X		
尿常规	X		X	X		
疗效指标						
鼻眼部症状四分法评分	X	X	X	X	X	X
鼻眼部症状VAS评分	X	X	X	X	X	X
鼻结膜炎生活质量调查问卷（RQLQ）	X	X	X	X	X	X
中医证候量表评分	X	X	X	X	X	X
药物评分		X	X	X	X	X
其他						
记录合并用药		X	X	X		
记录不良事件		X	X	X		

V1筛查期的筛选记录

知情同意书签署日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日			
人群社会学资料			
性别： _ _ _		年龄： _ _ _	
体重： _ _ _ . _ Kg		身高： _ _ _ . _ cm	
BMI： _ _ _ . _ Kg/m2		户籍： _ _ _	
职业： _ _ _ 环境暴露： ☐ 粉尘 ☐ 宠物 ☐ 装修史 ☐ 无			
吸烟史：无 ☐ 有 ☐ 烟龄 _ _ 年 每日 _ _ 包； 戒烟 _ _ 年			
饮酒史：无 ☐ 有 ☐ 酒龄 _ _ 年 每日 _ _ 毫升； 戒酒 _ _ 年			
饮食习惯： ☐ 辛辣 ☐ 生冷 ☐ 清淡 ☐ 其他 _ _ _			
居住环境： ☐ 通风良好 ☐ 霉斑 ☐ 尘螨 ☐ 其他 _ _ _			
居住地气候： ☐ 潮湿 ☐ 干燥 ☐ 寒冷 ☐ 温热			
生命体征			
体温： _ _ _ . _ °C		脉搏： _ _ _ 次/分	
血压： _ _ _ / _ _ _ mmHg		呼吸： _ _ 次/分	
过敏史			
☐ 无		☐ 有，药物引起的，请说明 _ _ _	
		☐ 有，非药物引起的，请说明 _ _ _	
既往呼吸系统疾病史： ☐ 无 ☐ 有，请填写下表：			
疾病名称	确诊日期	目前疾病是否持续？	
		是	否，结束日期
	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
家族史			
☐ 无		☐ 有 _ _ _	

现病史	
过敏性鼻炎确诊时间： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	
发作周期： ☐ 常年性（ ☐ 尘螨 ☐ 蟑螂 ☐ 动物皮屑 ☐ 不详） ☐ 季节性（季节____，过敏原____）	
合并疾病： ☐ 鼻窦炎 ☐ 鼻息肉 ☐ 过敏性哮喘 ☐ 过敏性结膜炎 ☐ 睡眠障碍 ☐ 特应性皮炎 ☐ 食物过敏 ☐ 无 其他：_____	
过敏原检测： ☐ 未查 检测日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	
☐ 总IgE ____IU/ml ☐ 皮肤点刺 ☐ 阳性 ☐ 阴性 ☐ 血清特异性IgE ____IU/ml ☐ 鼻内激发 ☐ 阳性 ☐ 阴性	

既往治疗史（记录签署知情同意书前1个月内的治疗情况） ☐ 无 ☐ 有，请填写下表：						
中药使用史： ☐ 无 ☐ 有 方剂名称：_____ 疗程：_____ 疗效： ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差						
过敏原免疫治疗情况： ☐ 未接受 ☐ 接受中（疗程____） ☐ 已完成（结束时间____，疗效： ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差）						
当前用药（抗组胺药、鼻喷剂、生物制剂）						
药物名称	日剂量	单位	给药途径	开始用药日期	目前是否持续？	
					是	否→结束用药日期
				_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
				_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
				_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
				_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
				_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
				_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日

发病时诱发因素		
☐ 无 ☐ 有，_____		
中医四诊		
望诊	鼻窍	鼻黏膜： ☐ 淡白肿胀 ☐ 红肿充血
		涕质： ☐ 清稀如水 ☐ 黄黏成缕
	舌象	舌质： ☐ 淡红 ☐ 淡白 ☐ 红赤
		舌苔： ☐ 薄白 ☐ 薄黄
	咽喉	☐ 咽壁淡红、不肿 ☐ 咽峡充血、微肿
闻诊	喷嚏： ☐ 低频有力 ☐ 高频短促	
问诊	症状加重情况： ☐ 遇冷 ☐ 遇热 ☐ 无	
	二便	大便： ☐ 溏 ☐ 干 ☐ 正常；小便： ☐ 清 ☐ 黄赤
切诊	脉象： ☐ 浮紧 ☐ 浮缓 ☐ 浮数	

实验室检查						
血常规 采样日期 _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日						
检查项目	测量结果		结果判定			未查
	实测值	单位	正常	异常		
				无临床意义	有临床意义	
血红蛋白（Hb）		g/L	☐	☐	☐	☐
红细胞计数（RBC）		10 ¹² /L	☐	☐	☐	☐
白细胞计数（WBC）		10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
中性粒细胞计数（Neu）		10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
嗜酸性粒细胞计数（EOS）		10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
嗜碱性粒细胞计数（BAS）		10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
淋巴细胞计数（Lym）		10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
血小板计数（PLT）		10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐

尿常规

采样日期|_|_|_|_|年|_|_|月|_|_|日

检查项目	测量结果	结果判定			未查
		正常	异常		
			无临床意义	有临床意义	
尿蛋白	☐ - ☐ ± ☐ + ☐ ++ ☐ +++	☐	☐	☐	☐
尿葡萄糖	☐ - ☐ ± ☐ + ☐ ++ ☐ ≥+++	☐	☐	☐	☐
尿酮体	☐ - ☐ ± ☐ + ☐ ++ ☐ +++	☐	☐	☐	☐
尿潜血	☐ 阴性 ☐ 阳性	☐	☐	☐	☐
尿白细胞	☐ 阴性 ☐ 阳性	☐	☐	☐	☐

血生化

采样日期|_|_|_|_|年|_|_|月|_|_|日

检查项目		测量结果		结果判定			未查
		实测值	单位	正常	异常		
					无临床意义	有临床意义	
肝功能	谷丙转氨酶（ALT）		U/L	☐	☐	☐	☐
	谷草转氨酶（AST）		U/L	☐	☐	☐	☐
肾功能	血尿素氮（BUN）		mmol/L	☐	☐	☐	☐
	血清肌酐（Cr）		μmol/L	☐	☐	☐	☐

呼出气一氧化氮（FeNO）☐+☐鼻 检测☐未查 检查日期：|_|_|_|_|年|_|_|月|_|_|日

FeNO（☐）：_____ppb ☐正常 ☐升高

FeNO（☐鼻）：_____ppb ☐正常 ☐升高

心电图检查

☐未查 检查日期：|_|_|_|_|年|_|_|月|_|_|日

☐正常 ☐异常，但无临床意义
☐异常，且有临床意义，请详细描述：_____。

视觉模拟量表（VAS）评分：
评分标准：0分代表“没有症状”，10分代表“症状最重”。1-3分为轻度，4-7分为中度，8-10分为重度。

症状	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
喷嚏											
流涕											
鼻痒											
鼻塞											
眼痒/异物感/眼红											
流泪											
VAS总分											

4项鼻部症状+2项眼部症状评分：		
喷嚏	☐ 0分	无
	☐ 1分	每日3-5次；
	☐ 2分	每日6-10次；
	☐ 3分	每日≥11次。
流涕	☐ 0分	无
	☐ 1分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭
	☐ 2分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；
	☐ 3分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭
鼻痒	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性鼻痒，可忍受；
	☐ 2分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。
鼻塞	☐ 0分	无
	☐ 1分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；
	☐ 2分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；
	☐ 3分	几乎全天张口呼吸。
眼痒/异物感/眼红	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
流泪	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
鼻部症状总分		
鼻眼症状总分		

鼻结膜炎生活质量问卷（RQLQ）评分：（由患者本人根据过去一周的情况填写）		
评分标准：每项问题按 0-6 分计分。0=从无困扰，1=几乎无困扰，2=有些困扰，3=中度困扰，4=困扰较多，5=非常困扰，6=极度困扰		
维度	问题	评分（0-6）
活动受限	1. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的休闲或体育活动？	
	2. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的工作或日常家务？	
	3. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的社交活动？	
睡眠	4. 因鼻塞、流涕或喷嚏而难以入睡？	
	5. 夜间因鼻塞、流涕或喷嚏而醒来？	
	6. 因鼻塞、流涕或喷嚏而睡眠质量欠佳？	
非鼻/眼症状	7. 精力不足？	
	8. 口渴？	
	9. 工作效率下降？	
	10. 疲倦	
	11. 注意力难以集中	
	12. 头痛	
	13. 疲惫不堪	
实际问题	14. 需要随身携带纸巾或手帕？	
	15. 需要揉鼻子/眼睛？	
	16. 频繁擤鼻涕？	
鼻部症状	17. 鼻塞？	
	18. 流清涕？	
	19. 打喷嚏？	
	20. 鼻痒？	
眼部症状	21. 眼痒？	
	22. 流泪？	
	23. 眼痛？	
	24. 眼肿？	
情绪	25. 因鼻/眼症状感到沮丧？	
	26. 因鼻/眼症状感到内心不耐烦或不安宁？	
	27. 因鼻/眼症状易恼怒？	

	28. 因鼻/眼症状感到难堪？	
RQLQ总分		
过敏性鼻炎中医症状评分：		
主 症		
鼻痒	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	间断性鼻痒，可忍受；
	☐ 中度4分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 重度6分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。
阵发性/连续喷嚏	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	每日3-5次；
	☐ 中度4分	每日6-10次；
	☐ 重度6分	每日≥11次。
流清涕	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭
	☐ 中度4分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；
	☐ 重度6分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭
鼻塞	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；
	☐ 中度4分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；
	☐ 重度6分	几乎全天张口呼吸。
次 症		
怕风怕冷	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度1分	轻度怕风冷；
	☐ 中度2分	怕风冷欲披衣被；
	☐ 重度3分	怕风冷披衣被而不能解。
周身酸痛	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度1分	偶发局部酸痛，可自行缓解
	☐ 中度2分	多处酸痛，活动后稍加重，轻度影响活动
	☐ 重度3分	全身酸痛剧烈，活动受限，影响日常行动
汗出	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度1分	轻微少汗，仅活动后少量汗出
	☐ 中度2分	明显少汗，活动后汗出极少，皮肤干燥
	☐ 重度3分	完全无汗，剧烈活动也无汗，周身发紧。

咳嗽	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度1分	偶发咳嗽，每日≤3 声；
	☐ 中度2分	间断咳嗽，每日 4-10 声，轻微影响日常；
	☐ 重度3分	频繁咳嗽，每日≥11 声，影响睡眠日常。
面色淡白	☐ 正常0分	面色正常
	☐ 轻度1分	面色稍淡，无苍白感
	☐ 中度2分	面色明显淡白，略带苍白
	☐ 重度3分	面色苍白无华，精神萎靡
舌 象	请描述：	
脉 象	请描述：	
中医证候积分		

诊断标准		
1. 西医诊断标准：参照《变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022年，修订版）》： ①症状：打喷嚏、清水样涕、鼻痒和鼻塞等症状出现2个或以上，每天症状持续或累计在1小时以上，可伴有眼痒、流泪和眼红等眼部症状。 ②体征：常见鼻黏膜苍白、水肿，鼻腔水样分泌物。 ③分类：属于常年性过敏性鼻炎（PAR）。症状发作呈常年性，常见过敏原为尘螨、蟑螂、动物皮屑等室内常年性吸入过敏原，以及某些职业性过敏原。 ④ 变应原检测：尘螨皮肤点刺试验（SPT）和/或血清特异性IgE阳性，或鼻激发试验阳性。 ⑤ 严重程度：属中-重度过敏性鼻炎，即症状较重或严重，对生活质量产生明显影响。		
2、中医辨证标准：参照《中医耳鼻咽喉科常见病诊疗指南》、《中医临床诊疗术语证候部分》有关鼻鼽之风寒犯鼻证的诊断标准： ① 鼻鼽：指以突然和反复发作的鼻痒、连续喷嚏、流清涕、鼻塞为特征的疾病。 ② 风寒犯鼻证：主症为鼻痒，阵发性、连续性喷嚏，鼻涕清稀如水、量多，遇风或遇寒加重、遇热则缓解；次症为怕风怕冷，周身酸痛，无汗或少汗，轻微咳嗽，面色淡白。舌质淡红或淡、舌苔薄白；脉象浮紧或浮缓。		
入选标准		
1. 确诊为过敏性鼻炎患者，病程≥2年；	☐ 是	☐ 否
2. 符合中医鼻鼽风寒犯鼻证；	☐ 是	☐ 否
3. 年龄 18-60 岁，性别不限；	☐ 是	☐ 否
4. 过敏原SPT和/或血清特异性IgE阳性，或鼻激发试验阳性；	☐ 是	☐ 否
5. 至少有一个主要鼻部症状在中度以上（四分法评分≥2分）；	☐ 是	☐ 否
6. 符合GCP规定，签署知情同意书，自愿受试；	☐ 是	☐ 否

排除标准（任何一项选“是”即不能进入本研究）		
1. 严重鼻部充血、血管舒缩性、药物性鼻炎、呼吸道感染、严重阻塞性鼻息肉或近期上气道手术患者	☐ 是	☐ 否
2. 发热>38℃或伴有其他急性感染者；	☐ 是	☐ 否
3. 进入试验前使用其他治疗过敏性鼻炎的中西药物，具体如下：1 个月内使用系统皮质类固醇；2 周内使用色甘酸钠；3 天内使用减充血剂；2 周内服用中药汤剂或中成药等。	☐ 是	☐ 否
4. 血糖控制不佳者；	☐ 是	☐ 否
5. 长期使用伴随用药（如三环抗抑郁药）者；	☐ 是	☐ 否
6. 对试验药物成分有过敏史者；	☐ 是	☐ 否
7. 进入本研究前 3 个月内曾参加其它药物临床试验者；	☐ 是	☐ 否
8. 具有严重心血管病、肝脏病、肾脏病、血液学病变、间质病等肺脏疾病、或影响其生存的严重疾病，如肿瘤或艾滋病；	☐ 是	☐ 否
9. 患有严重的精神性及神经性疾病者	☐ 是	☐ 否
10. 孕妇、哺乳期妇女或研究期间不能采取有效措施避孕的育龄妇女；	☐ 是	☐ 否
11. 不宜胃肠道给药者；	☐ 是	☐ 否

基线
基线检查符合入选排除标准 ☐ 是，最终筛选成功，请完成随机并继续填写研究病历表 ☐ 否，最终筛选失败，该患者不能进入本研究，原因：_____。

发放研究药物
发放至下次访视所需研究药物： ☐ 研究药物， _ _ 支

负责医师签字：

签字日期：|_|_|_|年|_|_|月|_|_|

V2治疗期的动态记录 (D7)

本次访视日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	
生命体征	
体温： _ _ . _ °C	脉搏： _ _ _ 次/分
呼吸： _ _ 次/分	血压： _ _ _ / _ _ _ mmHg
记录上次访视后情况	
是否出现不良事件？ ☐ 否 ☐ 是，请填写“不良事件”页	
自上次访视以来，是否存在新的合并用药/合并非药物治疗，或原有的合并用药/合并非药物治疗情况发生任何变化？ ☐ 否 ☐ 是，请填写“合并用药”或“合并非药物治疗”页	

视觉模拟量表 (VAS) 评分：

评分标准：0 分代表“没有症状”，10 分代表“症状最重”。1-3 分为轻度，4-7 分为中度，8-10 分为重度。

症状	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
喷嚏											
流涕											
鼻痒											
鼻塞											
眼痒/异物感/眼红											
流泪											
VAS总分											

4项鼻部症状+2项眼部症状评分：

喷嚏	☐ 0分	无
	☐ 1分	每日3-5次；
	☐ 2分	每日6-10次；
	☐ 3分	每日≥11次。
流涕	☐ 0分	无
	☐ 1分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭
	☐ 2分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；
	☐ 3分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭
鼻痒	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性鼻痒，可忍受；
	☐ 2分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。

鼻塞	☐ 0分	无
	☐ 1分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；
	☐ 2分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；
	☐ 3分	几乎全天张口呼吸。
眼痒/异物感/眼红	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
流泪	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
鼻部症状总分		
鼻眼症状总分		
鼻结膜炎生活质量问卷（RQLQ）评分：（由患者本人根据过去一周的情况填写） 评分标准：每项问题按 0-6 分计分。0=从无困扰，1=几乎无困扰，2=有些困扰，3=中度困扰，4=困扰较多，5=非常困扰，6=极度困扰		
维度	问题	评分（0-6）
活动受限	1. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的休闲或体育活动？	
	2. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的工作或日常家务？	
	3. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的社交活动？	
睡眠	4. 因鼻塞、流涕或喷嚏而难以入睡？	
	5. 夜间因鼻塞、流涕或喷嚏而醒来？	
	6. 因鼻塞、流涕或喷嚏而睡眠质量欠佳？	
非鼻/眼症状	7. 精力不足？	
	8. 口渴？	
	9. 工作效率下降？	
	10. 疲倦	
	11. 注意力难以集中	
	12. 头痛	
	13. 疲惫不堪	

实际问题	14. 需要随身携带纸巾或手帕？	
	15. 需要揉鼻子/眼睛？	
	16. 频繁擤鼻涕？	
鼻部症状	17. 鼻塞？	
	18. 流清涕？	
	19. 打喷嚏？	
	20. 鼻痒？	
眼部症状	21. 眼痒？	
	22. 流泪？	
	23. 眼痛？	
	24. 眼肿？	
情绪	25. 因鼻/眼症状感到沮丧？	
	26. 因鼻/眼症状感到内心不耐烦或不安宁？	
	27. 因鼻/眼症状易恼怒？	
	28. 因鼻/眼症状感到难堪？	
RQLQ总分		
过敏性鼻炎中医症状评分：		
主 症		
鼻痒	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	间断性鼻痒，可忍受；
	☐ 中度4分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 重度6分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。
阵发性/连续喷嚏	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	每日3-5次；
	☐ 中度4分	每日6-10次；
	☐ 重度6分	每日≥11次。
流清涕	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭
	☐ 中度4分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；
	☐ 重度6分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭
鼻塞	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；
	☐ 中度4分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；
	☐ 重度6分	几乎全天张口呼吸。

次 症			
怕风怕冷	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	轻度怕风冷；	
	☐ 中度2分	怕风冷欲披衣被；	
	☐ 重度3分	怕风冷披衣被而不能解。	
周身酸痛	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	偶发局部酸痛，可自行缓解	
	☐ 中度2分	多处酸痛，活动后稍加重，轻度影响活动	
	☐ 重度3分	全身酸痛剧烈，活动受限，影响日常行动	
汗出	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	轻微少汗，仅活动后少量汗出	
	☐ 中度2分	明显少汗，活动后汗出极少，皮肤干燥	
	☐ 重度3分	完全无汗，剧烈活动也无汗，周身发紧。	
咳嗽	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	偶发咳嗽，每日≤3 声；	
	☐ 中度2分	间断咳嗽，每日 4-10 声，轻微影响日常；	
	☐ 重度3分	频繁咳嗽，每日≥11 声，影响睡眠日常。	
面色淡白	☐ 正常0分	面色正常	
	☐ 轻度1分	面色稍淡，无苍白感	
	☐ 中度2分	面色明显淡白，略带苍白	
	☐ 重度3分	面色苍白无华，精神萎靡	
舌 象	请描述：		
脉 象	请描述：		
中医证候积分			
药物评分：			
用药类型	每日计分	用药天数	总分
☐ 口服抗组胺药	1		
☐ 鼻用抗组胺药	1		
☐ 眼用抗组胺药	1		
☐ 鼻用激素	2		
☐ 口服糖皮质激素	3		

治疗评估
疗效指数：____%；疗效指数=（治疗前积分-治疗后积分）/治疗前积分×100%
疗效评价： ☐ 临床控制（≥90%） ☐ 显效（70%-89%） ☐ 有效（30%-69%） ☐ 无效（<30%）
症状缓解情况
是否所有症状评分均为轻度或无，并持续24小时以上？
☐ 是（缓解日期：____） ☐ 否，如未缓解，请记录当前症状：_____
转重与并发症评估
是否发生转重？ ☐ 是（请记录） ☐ 否
是否发生新发并发症？ ☐ 是（请记录） ☐ 否
如“是”，请描述：_____
回收研究药物
回收首次发放的剩余药物： _ _ 支，应服药物： _ _ 支，依从性： _ _ . _ _ %
依从性=实际服药数/应服药数×100%。如果受试者依从性<80%或>120%，则退出试验。
发放研究药物
发放至下次访视所需研究药物：
☐ 研究药物， _ _ 支
负责医师签字：_____ 签字日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日

V3治疗期的动态记录（D14）

本次访视日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	
生命体征	
体温： _ _ . _ °C	脉搏： _ _ _ 次/分
呼吸： _ _ 次/分	血压： _ _ _ / _ _ _ mmHg
记录上次访视后情况	
是否出现不良事件？ ☐ 否 ☐ 是，请填写“不良事件”页	
自上次访视以来，是否存在新的合并用药/合并非药物治疗，或原有的合并用药/合并非药物治疗情况发生任何变化？ ☐ 否 ☐ 是，请填写“合并用药”或“合并非药物治疗”页	

视觉模拟量表（VAS）评分：

评分标准：0分代表“没有症状”，10分代表“症状最重”。1-3分为轻度，4-7分为中度，8-10分为重度。

症状	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
喷嚏											
流涕											
鼻痒											
鼻塞											
眼痒/异物感/眼红											
流泪											
VAS总分											

4项鼻部症状+2项眼部症状评分：

喷嚏	☐ 0分	无
	☐ 1分	每日3-5次；
	☐ 2分	每日6-10次；
	☐ 3分	每日≥11次。
流涕	☐ 0分	无
	☐ 1分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭
	☐ 2分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；
	☐ 3分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭
鼻痒	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性鼻痒，可忍受；
	☐ 2分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。

鼻塞	☐ 0分	无
	☐ 1分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；
	☐ 2分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；
	☐ 3分	几乎全天张口呼吸。
眼痒/异物感/眼红	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
流泪	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
鼻部症状总分		
鼻眼症状总分		
鼻结膜炎生活质量问卷（RQLQ）评分：（由患者本人根据过去一周的情况填写） 评分标准：每项问题按 0-6 分计分。0=从无困扰，1=几乎无困扰，2=有些困扰，3=中度困扰，4=困扰较多，5=非常困扰，6=极度困扰		
维度	问题	评分（0-6）
活动受限	1. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的休闲或体育活动？	
	2. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的工作或日常家务？	
	3. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的社交活动？	
睡眠	4. 因鼻塞、流涕或喷嚏而难以入睡？	
	5. 夜间因鼻塞、流涕或喷嚏而醒来？	
	6. 因鼻塞、流涕或喷嚏而睡眠质量欠佳？	
非鼻/眼症状	7. 精力不足？	
	8. 口渴？	
	9. 工作效率下降？	
	10. 疲倦	
	11. 注意力难以集中	
	12. 头痛	
	13. 疲惫不堪	

实际问题	14. 需要随身携带纸巾或手帕？			
	15. 需要揉鼻子/眼睛？			
	16. 频繁擤鼻涕？			
鼻部症状	17. 鼻塞？			
	18. 流清涕？			
	19. 打喷嚏？			
	20. 鼻痒？			
眼部症状	21. 眼痒？			
	22. 流泪？			
	23. 眼痛？			
	24. 眼肿？			
情绪	25. 因鼻/眼症状感到沮丧？			
	26. 因鼻/眼症状感到内心不耐烦或不安宁？			
	27. 因鼻/眼症状易恼怒？			
	28. 因鼻/眼症状感到难堪？			
RQLQ总分				
过敏性鼻炎中医症状评分：				
主 症				
鼻痒	☐ 正常0分	无		
	☐ 轻度2分	间断性鼻痒，可忍受；		
	☐ 中度4分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；		
	☐ 重度6分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。		
阵发性/连续喷嚏	☐ 正常0分	无		
	☐ 轻度2分	每日3-5次；		
	☐ 中度4分	每日6-10次；		
	☐ 重度6分	每日≥11次。		
流清涕	☐ 正常0分	无		
	☐ 轻度2分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭		
	☐ 中度4分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；		
	☐ 重度6分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭		
鼻塞	☐ 正常0分	无		
	☐ 轻度2分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；		
	☐ 中度4分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；		
	☐ 重度6分	几乎全天张口呼吸。		

次 症			
怕风怕冷	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	轻度怕风冷；	
	☐ 中度2分	怕风冷欲披衣被；	
	☐ 重度3分	怕风冷披衣被而不能解。	
周身酸痛	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	偶发局部酸痛，可自行缓解	
	☐ 中度2分	多处酸痛，活动后稍加重，轻度影响活动	
	☐ 重度3分	全身酸痛剧烈，活动受限，影响日常行动	
汗出	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	轻微少汗，仅活动后少量汗出	
	☐ 中度2分	明显少汗，活动后汗出极少，皮肤干燥	
	☐ 重度3分	完全无汗，剧烈活动也无汗，周身发紧。	
咳嗽	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	偶发咳嗽，每日≤3 声；	
	☐ 中度2分	间断咳嗽，每日 4-10 声，轻微影响日常；	
	☐ 重度3分	频繁咳嗽，每日≥11 声，影响睡眠日常。	
面色淡白	☐ 正常0分	面色正常	
	☐ 轻度1分	面色稍淡，无苍白感	
	☐ 中度2分	面色明显淡白，略带苍白	
	☐ 重度3分	面色苍白无华，精神萎靡	
舌 象	请描述：		
脉 象	请描述：		
中医证候积分			
药物评分：			
用药类型	每日计分	用药天数	总分
☐ 口服抗组胺药	1		
☐ 鼻用抗组胺药	1		
☐ 眼用抗组胺药	1		
☐ 鼻用激素	2		
☐ 口服糖皮质激素	3		

实验室检查							
血常规 采样日期 _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日							
检查项目		测量结果		结果判定			未查
		实测值	单位	正常	异常		
无临床意义	有临床意义						
血红蛋白（Hb）			g/L	☐	☐	☐	☐
红细胞计数（RBC）			10 ¹² /L	☐	☐	☐	☐
白细胞计数（WBC）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
中性粒细胞计数（Neu）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
嗜酸性粒细胞计数（EOS）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
嗜碱性粒细胞计数（BAS）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
淋巴细胞计数（Lym）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
血小板计数（PLT）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
尿常规 采样日期 _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日							
检查项目	测量结果		结果判定			未查	
			正常	异常			
				无临床意义	有临床意义		
尿蛋白	☐ - ☐ ± ☐ + ☐ ++ ☐ +++		☐	☐	☐	☐	
尿葡萄糖	☐ - ☐ ± ☐ + ☐ ++ ☐ ≥+++		☐	☐	☐	☐	
尿酮体	☐ - ☐ ± ☐ + ☐ ++ ☐ +++		☐	☐	☐	☐	
尿潜血	☐ 阴性 ☐ 阳性		☐	☐	☐	☐	
尿白细胞	☐ 阴性 ☐ 阳性		☐	☐	☐	☐	
血生化 采样日期 _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日							
检查项目		测量结果		结果判定			未查
		实测值	单位	正常	异常		
无临床意义	有临床意义						
肝功能	谷丙转氨酶（ALT）		U/L	☐	☐	☐	☐
	谷草转氨酶（AST）		U/L	☐	☐	☐	☐
肾功能	血尿素氮（BUN）		mmol/L	☐	☐	☐	☐
	血清肌酐（Cr）		μmol/L	☐	☐	☐	☐

治疗评估
疗效指数：____%；疗效指数=（治疗前积分-治疗后积分）/治疗前积分×100% 疗效评价： ☐ 临床控制（≥90%） ☐ 显效（70%-89%） ☐ 有效（30%-70%） ☐ 无效（<30%）
症状缓解情况 是否所有症状评分均为轻度或无，并持续24小时以上？ ☐ 是（缓解日期：____） ☐ 否，如未缓解，请记录当前症状：_____
转重与并发症评估 是否发生转重？ ☐ 是（请记录） ☐ 否 是否发生新发并发症？ ☐ 是（请记录） ☐ 否 如“是”，请描述：_____
回收研究药物
回收上次访视发放的剩余药物： _ _ 支，应服药物： _ _ 支，依从性： _ _ . _ % 依从性=实际服药数/应服药数×100%。如果受试者依从性<80%或>120%，则退出试验。
发放研究药物
发放至下次访视所需研究药物： ☐ 研究药物， _ _ 支
负责医师签字：_____ 签字日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日

V4治疗期的动态记录（D28）

本次访视日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	
生命体征	
体温： _ _ . _ °C	脉搏： _ _ _ 次/分
呼吸： _ _ 次/分	血压： _ _ _ / _ _ _ mmHg
记录上次访视后情况	
是否出现不良事件？ ☐ 否 ☐ 是，请填写“不良事件”页	
自上次访视以来，是否存在新的合并用药/合并非药物治疗，或原有的合并用药/合并非药物治疗情况发生任何变化？ ☐ 否 ☐ 是，请填写“合并用药”或“合并非药物治疗”页	

视觉模拟量表（VAS）评分：

评分标准：0分代表“没有症状”，10分代表“症状最重”。1-3分为轻度，4-7分为中度，8-10分为重度。

症状	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
喷嚏											
流涕											
鼻痒											
鼻塞											
眼痒/异物感/眼红											
流泪											
VAS总分											

4项鼻部症状+2项眼部症状评分：

喷嚏	☐ 0分	无
	☐ 1分	每日3-5次；
	☐ 2分	每日6-10次；
	☐ 3分	每日≥11次。
流涕	☐ 0分	无
	☐ 1分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭
	☐ 2分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；
	☐ 3分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭
鼻痒	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性鼻痒，可忍受；
	☐ 2分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。

鼻塞	☐ 0分	无
	☐ 1分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；
	☐ 2分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；
	☐ 3分	几乎全天张口呼吸。
眼痒/异物感/眼红	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
流泪	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
鼻部症状总分		
鼻眼症状总分		
鼻结膜炎生活质量问卷（RQLQ）评分：（由患者本人根据过去一周的情况填写） 评分标准：每项问题按 0-6 分计分。0=从无困扰，1=几乎无困扰，2=有些困扰，3=中度困扰，4=困扰较多，5=非常困扰，6=极度困扰		
维度	问题	评分（0-6）
活动受限	1. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的休闲或体育活动？	
	2. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的工作或日常家务？	
	3. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的社交活动？	
睡眠	4. 因鼻塞、流涕或喷嚏而难以入睡？	
	5. 夜间因鼻塞、流涕或喷嚏而醒来？	
	6. 因鼻塞、流涕或喷嚏而睡眠质量欠佳？	
非鼻/眼症状	7. 精力不足？	
	8. 口渴？	
	9. 工作效率下降？	
	10. 疲倦	
	11. 注意力难以集中	
	12. 头痛	
	13. 疲惫不堪	

实际问题	14. 需要随身携带纸巾或手帕？	
	15. 需要揉鼻子/眼睛？	
	16. 频繁擤鼻涕？	
鼻部症状	17. 鼻塞？	
	18. 流清涕？	
	19. 打喷嚏？	
	20. 鼻痒？	
眼部症状	21. 眼痒？	
	22. 流泪？	
	23. 眼痛？	
	24. 眼肿？	
情绪	25. 因鼻/眼症状感到沮丧？	
	26. 因鼻/眼症状感到内心不耐烦或不安宁？	
	27. 因鼻/眼症状易恼怒？	
	28. 因鼻/眼症状感到难堪？	
RQLQ总分		
过敏性鼻炎中医症状评分：		
主 症		
鼻痒	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	间断性鼻痒，可忍受；
	☐ 中度4分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 重度6分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。
阵发性/连续喷嚏	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	每日3-5次；
	☐ 中度4分	每日6-10次；
	☐ 重度6分	每日≥11次。
流清涕	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭
	☐ 中度4分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；
	☐ 重度6分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭
鼻塞	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；
	☐ 中度4分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；
	☐ 重度6分	几乎全天张口呼吸。

次 症			
怕风怕冷	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	轻度怕风冷；	
	☐ 中度2分	怕风冷欲披衣被；	
	☐ 重度3分	怕风冷披衣被而不能解。	
周身酸痛	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	偶发局部酸痛，可自行缓解	
	☐ 中度2分	多处酸痛，活动后稍加重，轻度影响活动	
	☐ 重度3分	全身酸痛剧烈，活动受限，影响日常行动	
汗出	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	轻微少汗，仅活动后少量汗出	
	☐ 中度2分	明显少汗，活动后汗出极少，皮肤干燥	
	☐ 重度3分	完全无汗，剧烈活动也无汗，周身发紧。	
咳嗽	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	偶发咳嗽，每日≤3 声；	
	☐ 中度2分	间断咳嗽，每日 4-10 声，轻微影响日常；	
	☐ 重度3分	频繁咳嗽，每日≥11 声，影响睡眠日常。	
面色淡白	☐ 正常0分	面色正常	
	☐ 轻度1分	面色稍淡，无苍白感	
	☐ 中度2分	面色明显淡白，略带苍白	
	☐ 重度3分	面色苍白无华，精神萎靡	
舌 象	请描述：		
脉 象	请描述：		
中医证候积分			
药物评分：			
用药类型	每日计分	用药天数	总分
☐ 口服抗组胺药	1		
☐ 鼻用抗组胺药	1		
☐ 眼用抗组胺药	1		
☐ 鼻用激素	2		
☐ 口服糖皮质激素	3		

实验室检查							
血常规 采样日期 _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日							
检查项目		测量结果		结果判定			未查
		实测值	单位	正常	异常		
					无临床意义	有临床意义	
血红蛋白（Hb）			g/L	☐	☐	☐	☐
红细胞计数（RBC）			10 ¹² /L	☐	☐	☐	☐
白细胞计数（WBC）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
中性粒细胞计数（Neu）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
嗜酸性粒细胞计数（EOS）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
嗜碱性粒细胞计数（BAS）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
淋巴细胞计数（Lym）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
血小板计数（PLT）			10 ⁹ /L	☐	☐	☐	☐
尿常规 采样日期 _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日							
检查项目	测量结果		结果判定			未查	
			正常	异常			
				无临床意义	有临床意义		
尿蛋白	□- □±□+□++□+++		☐	☐	☐	☐	
尿葡萄糖	□- □±□+□++□≥+++		☐	☐	☐	☐	
尿酮体	□- □±□+□++□+++		☐	☐	☐	☐	
尿潜血	□阴性 □阳性		☐	☐	☐	☐	
尿白细胞	□阴性 □阳性		☐	☐	☐	☐	
血生化 采样日期 _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日							
检查项目		测量结果		结果判定			未查
		实测值	单位	正常	异常		
					无临床意义	有临床意义	
肝功能	谷丙转氨酶（ALT）		U/L	☐	☐	☐	☐
	谷草转氨酶（AST）		U/L	☐	☐	☐	☐
肾功能	血尿素氮（BUN）		mmol/L	☐	☐	☐	☐
	血清肌酐（Cr）		μmol/L	☐	☐	☐	☐

血清总 IgE 监测 ☐ 未查 检查日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	
总 IgE：____ IU/mL	
呼出气一氧化氮 (FeNO) □+鼻检测 ☐ 未查 检查日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	
FeNO (□)：____ ppb ☐ 正常 ☐ 升高	
FeNO (鼻)：____ ppb ☐ 正常 ☐ 升高	
心电图检查 ☐ 未查 检查日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	
☐ 正常 ☐ 异常，但无临床意义 ☐ 异常，且有临床意义，请详细描述：_____。	

治疗评估
疗效指数：____%；疗效指数=（治疗前积分-治疗后积分）/治疗前积分×100% 疗效评价： ☐ 临床控制（≥90%） ☐ 显效（70%-89%） ☐ 有效（30%-69%） ☐ 无效（<30%）
症状缓解情况
是否所有症状评分均为轻度或无，并持续24小时以上？ ☐ 是（缓解日期：____） ☐ 否，如未缓解，请记录当前症状：_____
转重与并发症评估
是否发生转重？ ☐ 是（请记录） ☐ 否 是否发生新发并发症？ ☐ 是（请记录） ☐ 否 如“是”，请描述：_____
回收研究药物
回收上次访视发放的剩余药物： _ _ 支，应服药物： _ _ 支，依从性： _ _ . _ _ % 依从性=实际服药数/应服药数×100%。如果受试者依从性<80%或>120%，则退出试验。
发放研究药物
发放至下次访视所需研究药物： ☐ 研究药物， _ _ 支

负责医师签字：

签字日期：|_|_|_|_|年|_|_|月|_|_|日

V5随访期的动态记录（M2）

本次访视日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日											
生命体征											
体温： _ _ . _ ℃						脉搏： _ _ _ 次/分					
呼吸： _ _ 次/分						血压： _ _ _ / _ _ _ mmHg					
视觉模拟量表（VAS）评分：											
评分标准：0分代表“没有症状”，10分代表“症状最重”。1-3分为轻度，4-7分为中度，8-10分为重度。											
症状	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
喷嚏											
流涕											
鼻痒											
鼻塞											
眼痒/异物感/眼红											
流泪											
VAS总分											
4项鼻部症状+2项眼部症状评分：											
喷嚏	☐ 0分	无									
	☐ 1分	每日3-5次；									
	☐ 2分	每日6-10次；									
	☐ 3分	每日≥11次。									
流涕	☐ 0分	无									
	☐ 1分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭									
	☐ 2分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；									
	☐ 3分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭									
鼻痒	☐ 0分	无									
	☐ 1分	间断性鼻痒，可忍受；									
	☐ 2分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；									
	☐ 3分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。									
鼻塞	☐ 0分	无									
	☐ 1分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；									
	☐ 2分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；									
	☐ 3分	几乎全天张口呼吸。									

眼痒/异物感/眼红	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
流泪	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
鼻部症状总分		
鼻眼症状总分		
鼻结膜炎生活质量问卷（RQLQ）评分：（由患者本人根据过去一周的情况填写） 评分标准： 每项问题按 0-6 分计分。0=从无困扰，1=几乎无困扰，2=有些困扰，3=中度困扰，4=困扰较多，5=非常困扰，6=极度困扰		
维度	问题	评分（0-6）
活动受限	1. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的休闲或体育活动？	
	2. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的工作或日常家务？	
	3. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的社交活动？	
睡眠	4. 因鼻塞、流涕或喷嚏而难以入睡？	
	5. 夜间因鼻塞、流涕或喷嚏而醒来？	
	6. 因鼻塞、流涕或喷嚏而睡眠质量欠佳？	
非鼻/眼症状	7. 精力不足？	
	8. 口渴？	
	9. 工作效率下降？	
	10. 疲倦	
	11. 注意力难以集中	
	12. 头痛	
	13. 疲惫不堪	
实际问题	14. 需要随身携带纸巾或手帕？	
	15. 需要揉鼻子/眼睛？	
	16. 频繁擤鼻涕？	

鼻部症状	17. 鼻塞？	
	18. 流清涕？	
	19. 打喷嚏？	
	20. 鼻痒？	
眼部症状	21. 眼痒？	
	22. 流泪？	
	23. 眼痛？	
	24. 眼肿？	
情绪	25. 因鼻/眼症状感到沮丧？	
	26. 因鼻/眼症状感到内心不耐烦或不安宁？	
	27. 因鼻/眼症状易恼怒？	
	28. 因鼻/眼症状感到难堪？	
RQLQ总分		
过敏性鼻炎中医症状评分：		
主 症		
鼻痒	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	间断性鼻痒，可忍受；
	☐ 中度4分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 重度6分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。
阵发性/连续喷嚏	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	每日3-5次；
	☐ 中度4分	每日6-10次；
	☐ 重度6分	每日≥11次。
流清涕	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭
	☐ 中度4分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；
	☐ 重度6分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭
鼻塞	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；
	☐ 中度4分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；
	☐ 重度6分	几乎全天张口呼吸。

次 症			
怕风怕冷	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	轻度怕风冷；	
	☐ 中度2分	怕风冷欲披衣被；	
	☐ 重度3分	怕风冷披衣被而不能解。	
周身酸痛	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	偶发局部酸痛，可自行缓解	
	☐ 中度2分	多处酸痛，活动后稍加重，轻度影响活动	
	☐ 重度3分	全身酸痛剧烈，活动受限，影响日常行动	
汗出	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	轻微少汗，仅活动后少量汗出	
	☐ 中度2分	明显少汗，活动后汗出极少，皮肤干燥	
	☐ 重度3分	完全无汗，剧烈活动也无汗，周身发紧。	
咳嗽	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	偶发咳嗽，每日≤3 声；	
	☐ 中度2分	间断咳嗽，每日 4-10 声，轻微影响日常；	
	☐ 重度3分	频繁咳嗽，每日≥11 声，影响睡眠日常。	
面色淡白	☐ 正常0分	面色正常	
	☐ 轻度1分	面色稍淡，无苍白感	
	☐ 中度2分	面色明显淡白，略带苍白	
	☐ 重度3分	面色苍白无华，精神萎靡	
舌 象	请描述：		
脉 象	请描述：		
中医证候积分			
药物评分：			
用药类型	每日计分	用药天数	总分
☐ 口服抗组胺药	1		
☐ 鼻用抗组胺药	1		
☐ 眼用抗组胺药	1		
☐ 鼻用激素	2		
☐ 口服糖皮质激素	3		

治疗评估
疗效指数：____%；疗效指数=（治疗前积分-治疗后积分）/治疗前积分×100% 疗效评价： ☐ 临床控制（≥90%） ☐ 显效（70%-89%） ☐ 有效（30%-69%） ☐ 无效（<30%）
症状缓解情况 是否所有症状评分均为轻度或无，并持续24小时以上？ ☐ 是（缓解日期：____） ☐ 否，如未缓解，请记录当前症状：_____
转重与并发症评估 是否发生转重？ ☐ 是（请记录） ☐ 否 是否发生新发并发症？ ☐ 是（请记录） ☐ 否 如“是”，请描述：_____

负责医师签字：

签字日期：|_|_|_|_|年|_|_|月|_|_|日

V6随访期的动态记录（M3）

本次访视日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	
生命体征	
体温： _ _ . _ °C	脉搏： _ _ _ 次/分
呼吸： _ _ 次/分	血压： _ _ _ / _ _ _ mmHg

视觉模拟量表（VAS）评分： 评分标准：0 分代表“没有症状”，10 分代表“症状最重”。1-3 分为轻度，4-7 分为中度，8-10 分为重度。											
症状	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
喷嚏											
流涕											
鼻痒											
鼻塞											
眼痒/异物感/眼红											
流泪											
VAS总分											
4项鼻部症状+2项眼部症状评分：											
喷嚏	☐ 0分	无									
	☐ 1分	每日3-5次；									
	☐ 2分	每日6-10次；									
	☐ 3分	每日≥11次。									
流涕	☐ 0分	无									
	☐ 1分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭									
	☐ 2分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；									
	☐ 3分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭									
鼻痒	☐ 0分	无									
	☐ 1分	间断性鼻痒，可忍受；									
	☐ 2分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；									
	☐ 3分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。									
鼻塞	☐ 0分	无									
	☐ 1分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；									
	☐ 2分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；									
	☐ 3分	几乎全天张口呼吸。									

眼痒/异物感/眼红	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
流泪	☐ 0分	无
	☐ 1分	间断性，可忍受；
	☐ 2分	症状明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 3分	难以忍受，影响日常生活。
鼻部症状总分		
鼻眼症状总分		
鼻结膜炎生活质量问卷（RQLQ）评分：（由患者本人根据过去一周的情况填写） 评分标准： 每项问题按 0-6 分计分。0=从无困扰，1=几乎无困扰，2=有些困扰，3=中度困扰，4=困扰较多，5=非常困扰，6=极度困扰		
维度	问题	评分（0-6）
活动受限	1. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的休闲或体育活动？	
	2. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的工作或日常家务？	
	3. 在过去一周，您的过敏症状在多大程度上限制了您的社交活动？	
睡眠	4. 因鼻塞、流涕或喷嚏而难以入睡？	
	5. 夜间因鼻塞、流涕或喷嚏而醒来？	
	6. 因鼻塞、流涕或喷嚏而睡眠质量欠佳？	
非鼻/眼症状	7. 精力不足？	
	8. 口渴？	
	9. 工作效率下降？	
	10. 疲倦	
	11. 注意力难以集中	
	12. 头痛	
	13. 疲惫不堪	
实际问题	14. 需要随身携带纸巾或手帕？	
	15. 需要揉鼻子/眼睛？	
	16. 频繁擤鼻涕？	

鼻部症状	17. 鼻塞？	
	18. 流清涕？	
	19. 打喷嚏？	
	20. 鼻痒？	
眼部症状	21. 眼痒？	
	22. 流泪？	
	23. 眼痛？	
	24. 眼肿？	
情绪	25. 因鼻/眼症状感到沮丧？	
	26. 因鼻/眼症状感到内心不耐烦或不安宁？	
	27. 因鼻/眼症状易恼怒？	
	28. 因鼻/眼症状感到难堪？	
RQLQ总分		
过敏性鼻炎中医症状评分：		
主 症		
鼻痒	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	间断性鼻痒，可忍受；
	☐ 中度4分	鼻痒明显，令人厌烦但可忍受；
	☐ 重度6分	鼻痒难以忍受，影响日常生活。
阵发性/连续喷嚏	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	每日3-5次；
	☐ 中度4分	每日6-10次；
	☐ 重度6分	每日≥11次。
流清涕	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	少量分泌物，仅前鼻孔可见，无需擦拭
	☐ 中度4分	分泌物中等，超过前鼻孔，需间断擦拭；
	☐ 重度6分	分泌物大量，沿鼻唇沟下流，需持续擦拭
鼻塞	☐ 正常0分	无
	☐ 轻度2分	有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸；
	☐ 中度4分	间歇性或交替性鼻塞，伴张口呼吸；
	☐ 重度6分	几乎全天张口呼吸。

次 症			
怕风怕冷	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	轻度怕风冷；	
	☐ 中度2分	怕风冷欲披衣被；	
	☐ 重度3分	怕风冷披衣被而不能解。	
周身酸痛	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	偶发局部酸痛，可自行缓解	
	☐ 中度2分	多处酸痛，活动后稍加重，轻度影响活动	
	☐ 重度3分	全身酸痛剧烈，活动受限，影响日常行动	
汗出	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	轻微少汗，仅活动后少量汗出	
	☐ 中度2分	明显少汗，活动后汗出极少，皮肤干燥	
	☐ 重度3分	完全无汗，剧烈活动也无汗，周身发紧。	
咳嗽	☐ 正常0分	无	
	☐ 轻度1分	偶发咳嗽，每日≤3 声；	
	☐ 中度2分	间断咳嗽，每日 4-10 声，轻微影响日常；	
	☐ 重度3分	频繁咳嗽，每日≥11 声，影响睡眠日常。	
面色淡白	☐ 正常0分	面色正常	
	☐ 轻度1分	面色稍淡，无苍白感	
	☐ 中度2分	面色明显淡白，略带苍白	
	☐ 重度3分	面色苍白无华，精神萎靡	
舌 象	请描述：		
脉 象	请描述：		
中医证候积分			
药物评分：			
用药类型	每日计分	用药天数	总分
☐ 口服抗组胺药	1		
☐ 鼻用抗组胺药	1		
☐ 眼用抗组胺药	1		
☐ 鼻用激素	2		
☐ 口服糖皮质激素	3		

治疗评估
疗效指数： ____%； 疗效指数=（治疗前积分-治疗后积分）/治疗前积分×100% 疗效评价： ☐ 临床控制（>=90%） ☐ 显效（70%-89%） ☐ 有效（30%-69%） ☐ 无效(<30%)
症状缓解情况 是否所有症状评分均为轻度或无，并持续24小时以上？ ☐ 是（缓解日期： ____） ☐ 否，如未缓解，请记录当前症状： _____
转重与并发症评估 是否发生转重？ ☐ 是（请记录） ☐ 否 是否发生新发并发症？ ☐ 是（请记录） ☐ 否 如“是”，请描述： _____

负责医师签字：

签字日期：|_|_|_|_|年|_|_|月|_|_|日

实验完成情况总结	
研究阶段完成/终止	
受试者是否按研究方案完成了28天的研究治疗？ ☐ 是； 研究完成日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ ☐ 否； 末次给药日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ ，请填写完毕此页及末次访视内容	
如受试者提前退出治疗，尽可能安排进行末次访视，完成提前终止访视的各项评估并记录	
如提前退出治疗，是否联系受试者进行了末次访视？ ☐ 是； ☐ 否，请说明原因 如提前退出治疗，请选择最重要的原因（单选）： ☐发生不良事件（包括胃肠道不良反应）、有临床意义的实验室指标变化或者异常时，研究者决定患者退出，对应AE编号 _ _ 。 ☐使用禁忌的伴随用药。 ☐患者出现怀孕或打算怀孕。 ☐患者撤回知情同意。 ☐患者依从性差。 ☐患者试验期间参见了其他临床试验。 ☐患者失访。 ☐患者死亡（死亡日期 _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日，死亡原因_____） ☐其他，请描述：_____	
负责医师签字：	签字日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日

不良事件： ☐ 否 ☐ 是，请参照表格下方的注释用正楷详细填写在下表中												
编号	不良事件名称	不良事件情况描述	开始日期	是否持续？		严重程度	采取的措施		与研究药物的关系	AE的转归	是否SAE	
				是	否→结束日期		对研究药物的措施	其他措施(如有), 请写明			否	是, SAE具体类型
1.			_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日						☐	
2.			_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日						☐	
3.			_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日						☐	
4.			_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日						☐	
5.			_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日						☐	
6.			_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日						☐	
7.			_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日						☐	
8.			_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日						☐	

严重程度	对研究药物采取的措施	其他措施	与研究药物的关系	AE的转归	SAE具体类型
请参照研究方案的附件2《不良事件分级表》进行判断，如表中未涉及，可按照下列标准对不良反应进行强度分级评估： 1级（轻度）：受试者能觉察到体征或症状，但是易耐受。 2级（中度）：事件足以干扰日常活动，受试者感觉明显不适。 3级（重度）：受试者无法工作或进行日常的活动。	1=维持目前治疗 2=退出研究 3=减小剂量 4=增加剂量 5=治疗中断	1=无 2=住院或延长住院时间，填写SAE表格 3=合并用药，填写合并用药表格 4=合并非药物治疗，填写合并非药物治疗表格	1=肯定有关 2=很可能有关 3=可能有关 4=可能无关 5=无关	1=无变化 2=病情恶化 3=恢复/治愈 4=改善中/恢复中 5=恢复留有后遗症 6=死亡	1=导致死亡 2=危及生命 3=导致住院 4=延长住院时间 5=导致永久或显著的残疾/功能丧失 6=导致先天出生畸形 7=其他重要的医学事件

合并用药： ☐ 否 ☐ 是，请填写在下表中									
编号	药品名	适应症 / 用药原因	剂型	用法用量	开始日期	是否持续？		与研究药物的关系	备注
						是	否→结束日期		
1.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
2.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
3.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
4.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
5.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
6.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
7.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
8.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		

合并非药物治疗： ☐ 否 ☐ 是，请填写在下表中									
编号	治疗名称 (非药物)	治疗类型	治疗方式 / 强度 / 频次	实施地 点	开始日期	是否持续？		与研究药物 的关系	备注
						是	否→结束日期		
1.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
2.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
3.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
4.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
5.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
6.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		
7.					_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日	☐	_ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日		

负责医师签字：

签字日期：|_|_|_|_|年|_|_|月|_|_|日