

- 1

우리가 증명할 필요는 없고 수학자들이 알아낸 바에 따르면 표본평균은 (어차피 문제풀텐 상관없이 대체적으로) 기댓값이 m , 표준편차가 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 인 정규분포를 따른다. 여기서 조심할 건, ‘표본평균의 표준편차’는 그냥 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 일 뿐이고, ‘표본 표준편차’인 s 와는 하등 무관함.

하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등
무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함.
하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등
무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함.
하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등
무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함.
하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함. 하등 무관함.

2

표본평균이 정규분포를 따른다는 점을 이용하여 정규분포 확률 구하는 방식을 역이용하여 적절히 수식을 변형하면

$$\bar{X} - a \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + a \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

1

3

2번은 탁상공론. 인생은 실전이다. 대충 되면 그만이야. 2번은 참이긴 하겠지만 현실에 적용할 수 없다. 시그마는 아까 말했듯이 '전수조사 안하면 모르는 값'이니까. 그래서 아예 모르는 값인 시그마 대신에, 지금 알고 있는 값인 S를 대체하여 써도 허용됨. 안그럼 추정 자체를 못하니까.

따라서 현실적으로 우리가 세우는 부등식은

$$\bar{X} - a \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + a \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

인 척 하는

$$\bar{X} - a \frac{s}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + a \frac{s}{\sqrt{n}}$$

이고, 이걸로 풀면 됨. 끝.