

Hellsten – Linja-aho – Mauno – Mäkinen
– Piironen – Sottinen ...

Avoim matikka 1

Kirja on työn alla!

MAA1 – Funktiot ja yhtälöt

**Oppikirjamaraton - tätä lukee kuin avointa kirjaa!
Sisältö on lisensoitu avoimella CC-BY-lisenssillä.**

Sisältö

1 Esipuhe 4

I Lukualueet

5

2 Luonnolliset luvut 6

3 Joukko-oppia 7

4 Logiikkaa 8

5 Kokonaisluvut 9

6 Kokonaislukujen aritmetiikkaa 10

7 Jaollisuus & tekijät 11

8 Rationaaliluvut ja laskusäännöt 12

9 Potenssisäännöt & murtolausekkeiden sieventämistä 13

10 Juuret 14

11 Murtopotenssi 15

12 Irrationaaliluvut 16

13 Reaaliluvut 17

14 Kompleksiluvut 18

15 Kertaustiivistelmä 19

II Yhtälöt

20

16 Yhtälöiden teoriaa 21

17 Yleinen potenssi ja potenssiyhtälö 23

18 Kertaustiivistelmä 24

III Funktiot

25

19 **Funktio 26**

20 **Erilaisia funktioita 27**

IV Lukualueet

28

21 **Luonnolliset luvut 29**

22 **Joukko-oppia 30**

23 **Logiikkaa 31**

24 **Kokonaisluvut 32**

25 **Kokonaislukujen aritmetiikkaa 33**

26 **Jaollisuus & tekijät 34**

27 **Rationaaliluvut ja laskusäännöt 35**

28 **Potenssisäännöt & murtolausekkeiden
sieventämistä 36**

29 **Juuret 37**

30 **Murtopotenssi 38**

31 **Irrationaaliluvut 39**

32 **Reaaliluvut 40**

33 **Kompleksiluvut 41**

34 **Kertaustiivistelmä 42**

V Sovelluksia

43

35 **Verrannollisuus 44**

36 **Verrannollisuus: sovelluksia 45**

37 **Prosenttilaskentaa - perustilanteet 46**

38 **Prosenttiyhtälöitä ja sovelluksia 47**

39 **Kertaustiivistelmä 48**

VI Kertaus ja harjoituskokeita

49

40 **Verrannollisuus 50**

Luku 1 Esipuhe

Lorem ipsum...

Teoreema 1 (Residue Theorem). *Let f be analytic in the region G except for the isolated singularities a_1, a_2, \dots, a_m . If γ is a closed rectifiable curve in G which does not pass through any of the points a_k and if $\gamma \approx 0$ in G then*

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^m n(\gamma; a_k) \operatorname{Res}(f; a_k).$$

Another nice theorem from complex analysis is

Teoreema 2 (Maximum Modulus). *Let G be a bounded open set in \mathbb{C} and suppose that f is a continuous function on G^- which is analytic in G . Then*

$$\max\{|f(z)| : z \in G^-\} = \max\{|f(z)| : z \in \partial G\}.$$

Osa I Lukualueet

Luku 2 Luonnolliset luvut

Luku 3 Joukko-oppia

Luku 4 Logiikkaa

Luku 5 Kokonaisluvut

Luku 6 Kokonaislukujen aritmetiikkaa

Luku 7 Jaollisuus & tekijät

Luku 8 Rationaaliluvut ja laskusäännöt

Luku 9 Potenssisäännöt & murtolausekkeiden sieventämistä

Luku 10 Juuret

Luku 11 Murtopotenssi

Luku 12 Irrationaaliluvut

Luku 13 Reaaliluvut

Luku 14 Kompleksiluvut

Luku 15 Kertaustiivistelmä

Osa II Yhtälöt

Luku 16 Yhtälöiden teoriaa

Monissa käytännön tilanteissa saamme samalle asialle kaksi erilaista esitystapaa.

Esimerkki: Meillä on orsivaaka, joka on tasapainossa. (kuva!) Toisessa vaakakupissa on kahden kilon siika ja toisessa puolen kilon ahven sekä tuntematon määrä lakritsia. Kuinka paljon vaakakupissa on lakritsia? (Ratkaistaan...) (Muita esimerkkejä, vähitellen vaikeutuvia (1. asteen) yhtälöitä)

Määritelmä: Yhtälöksi kutsutaan kahden lausekkeen merkittyä yhtäsuuruutta. Siis mielivaltaisille lausekkeille A ja B merkitään $A=B$. (Esim. $A=3x+5$ ja $B=7x+7$). Yhtälö on tosi, jos sen molemmat puolet todella ovat yhtäsuuret. Jos yhtälö ei ole tosi, se on epätosi. Tosi ja epätosi ovat totuusarvoja.

Yhtälöitä voidaan muokata siten, että niiden totuusarvo ei muutu. Tällaisia sallittuja muunnoksia ovat: (A) Yhtälön molemmat puolet voidaan kertoa samalla luvulla $a \neq 0$. (B) Yhtälön molemmille puolille voidaan lisätä tai molemmilta puolilta vähentää luku b .

Muuttujaksi kutsutaan symbolia, jonka arvoa ei ole kiinnitetty. Muuttujia merkitään usein kirjaimilla x , y ja z . Yhtälöissä muuttujaa voidaan käyttää kuvaamaan tuntematonta määrää, jolloin yhtälöä muokkaamalla ("ratkaisemalla yhtälö") saadaan selville tuntematon.

Yhtälöitä on oleellisesti kolmenlaisia: (1) Yhtälö, joka on aina tosi. Esimerkiksi yhtälöt $8=8$ ja $x=x$. (2) Yhtälö, joka on joskus tosi. Esimerkiksi yhtälö $x=1$ on tosi jos ja vain jos $x=1$. Muuttujan arvoja, joilla tällainen yhtälö toteutuu, kutsutaan yhtälön ratkaisuiksi tai juuriksi. (3) Yhtälö, joka ei ole koskaan tosi. Esimerkiksi yhtälö $0=1$. Tämän kurssin ja ylipäätään matematiikan kannalta selvästi tärkein yhtälötyyppi on (2).

Teoreema 3. Yleinen lähemistymistapa muotoa $Ax + B = Cx + D$ olevien yhtälöiden ratkaisuun on:

(1) Vähennä molemmilta puolilta Cx . Saat yhtälön $(A - C)x + B = D$.

(2) Vähennä molemmilta puolilta B . Saat yhtälön $(A - C)x = D - B$.

(3) Jaa $(A - C)$:llä. Saat yhtälön ratkaistuun muotoon $x = \frac{D-B}{A-C}$.

Esimerkki Yhtälön $7x + 4 = 4x + 7$ ratkaisu saadaan seuraavasti:

$7x + 4 = 4x + 7$ |Vähennetään molemmilta puolilta $4x$.

$3x + 4 = 7$ |Vähennetään molemmilta puolilta 4 .

$3x = 3$ |Jaetaan molemmat puolet kolmella eli kerrotaan $\frac{1}{3}$:lla.

$x = 1$ |Saimme yhtälön ratkaistuun muotoon. $x = 1$ on siis yhtälön rat

Luku 17 Yleinen potenssi ja potenssiyhtälö

Luku 18 Kertaustiivistelmä

Osa III Funktiot

Luku 19 Funktio

Luku 20 Erilaisia funktioita

Osa IV Lukualueet

Luku 21 Luonnolliset luvut

Luku 22 Joukko-oppia

Luku 23 Logiikkaa

Luku 24 Kokonaisluvut

Luku 25 Kokonaislukujen aritmetiikkaa

Luku 26 Jaollisuus & tekijät

Luku 27 Rationaaliluvut ja laskusäännöt

Luku 28 Potenssisäännöt & murtolausekkeiden sieventämistä

Luku 29 Juuret

Luku 30 Murtopotenssi

Luku 31 Irrationaaliluvut

Luku 32 Reaaliluvut

Luku 33 Kompleksiluvut

Luku 34 Kertaustiivistelmä

Osa V Sovelluksia

Luku 35 Verrannollisuus

Luku 36 Verrannollisuus: sovelluksia

Luku 37 Prosenttilaskentaa - perustilanteet

Luku 38 Prosenttiyhtälöitä ja sovelluksia

Luku 39 Kertaustiivistelmä

Osa VI Kertaus ja harjoituskokeita

Luku 40 Verrannollisuus

Kertausosio (teoria ja esimerkit) Kertaustehtäväsarjoja Harjoituskokeita “Näihin pystyt jo” -yo-tehtäviä (myös lyhyestä) “Näihin pystyt jo” -pääsykoetehtäviä (mooonilta eri aloilta! kauppatieteellinen, tradenomi (jos löytyy), kansantaloustiede, arkkitehtuuri, DI-haku, AMK tekniikan alat, fysiikka, tilastotiede, ...) Vastauksia ja ratkaisuja Suomi-ruotsi-englanti-sanasto ja hakemisto symbolitaulukko