


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ

ПУСТЬ ФУНКЦИЯ $y = f(x)$ ИМЕЕТ ПРОИЗВОДНУЮ
В ТОЧКЕ x_0 .

ТОГДА СУЩЕСТВУЕТ КАСАТЕЛЬНАЯ К ГРАФИКУ
ЭТОЙ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ x_0 . ТОГДА
СУЩЕСТВУЕТ КАСАТЕЛЬНАЯ К ГРАФИКУ
ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ $M_0(x_0; y_0)$, УРАВНЕНИЕ
КОТОРОЙ ИМЕЕТ ВИД
 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

ПРИ ЭТОМ $f'(x_0) = \tan \alpha$, ГДЕ α –
УГОЛ НАКЛОНА ЭТОЙ КАСАТЕЛЬНОЙ К ОСИ OX



УРАВНЕНИЕ НОРМАЛИ ИМЕЕТ ВИД:

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0).$$

ПУСТЬ ДАНЫ 2 ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ
В ТОЧКЕ $M(x_0, y_0)$ КРИВЫЕ $y = f_1(x)$ И $y = f_2(x)$, ПРИЧЁМ
ОБЕ ФУНКЦИИ ИМЕЮТ ПРОИЗВОДНЫЕ В ТОЧКЕ x_0 .
ТОГДА УГЛОМ МЕЖДУ ЭТИМИ
КРИВЫМИ НАЗЫВАЕТСЯ УГОЛ МЕЖДУ
КАСАТЕЛЬНЫМИ К НИМ, ПРИВЕДЁННЫМИ В ТОЧКЕ
 M_0 .

Этот угол φ можно найти из формулы

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{f_2'(x_0) - f_1'(x_0)}{1 + f_1'(x_0) \cdot f_2'(x_0)}.$$

АВТОР

Чалапко Егор Витальевич

Почта: egorchalapko@gmail.com

ПРОИЗВОДНАЯ

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

ГДЕ x_0 – НЕКОТОРАЯ ТОЧКА; $f(x)$ –
ФУНКЦИЯ, ОПРЕДЕЛЁННАЯ В
НЕКОТОРОЙ
ОКРЕСТНОСТИ ТОЧКИ; Δx –
ПРИРАЩЕНИЕ АРГУМЕНТА; Δy –
ПРИРАЩЕНИЕ ФУНКЦИИ.
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ
НАЗЫВАЕТСЯ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕМ
ФУНКЦИИ.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

1. $(U \pm V)' = U' \pm V'$

2. $(U \cdot V)' = U'V + UV'$

3. $(C \cdot U)' = C \cdot U'$

4. $(U/V)' = (U'V - UV')/U^2$

5. $U = H(x)$ – ИМЕЕТ

ПРОИЗВОДНУЮ В ТОЧКЕ x_0

$y = f(u)$ – ИМЕЕТ ПРОИЗВОДНУЮ В
ТОЧКЕ $u_0 = H(x_0)$ ТОГДА СЛОЖНАЯ
ФУНКЦИЯ $y = f(H(x))$ ТАКЖЕ ИМЕЕТ
ПРОИЗВОДНУЮ В ТОЧКЕ x_0 :

$$y'(x_0) = y'(u_0) \cdot u'(x_0)$$

ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 . Тогда если существует такое число A , что приращение Δy этой функции в точке x_0 , соответствующее приращению Δx аргумента, представимо в виде:

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x,$$

где $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0$, то функция $f(x)$ называется *дифференцируемой в точке x_0* . При этом главная, линейная относительно Δx , часть этого приращения, т. е. $A \cdot \Delta x$, называется *дифференциалом функции* в точке x_0 и обозначается dy или $df(x_0)$.

Нетрудно показать (положив $y = x$ в формуле (2.1)), что $dx = \Delta x$.

Функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 тогда и только тогда, когда в этой точке существует конечная производная $f'(x_0)$; при этом $A = f'(x_0)$. Поэтому $df(x_0) = f'(x_0) dx$, или, если $f'(x)$ существует на данном интервале $(a; b)$, то

$$dy = f'(x) dx, \quad x \in (a; b).$$

Отсюда $f'(x) = \frac{dy}{dx}$, т. е. производная функции $y = f(x)$ в точке x равна отношению дифференциала этой функции в данной точке к дифференциалу независимой переменной.

Если приращение Δx аргумента x близко к нулю (т. е. достаточно мало), то приращение Δy функции приближенно равно ее дифференциалу, т. е. $\Delta y \approx dy$, откуда

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{df(x_0)}.$$

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДНАЯ

$$(\ln y)' = \frac{y'}{y}.$$

$$(u^v)' = u^v \cdot v' \cdot \ln u + u^{v-1} \cdot u' \cdot v.$$

ПРОИЗВОДНЫЕ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ

$$F''(X) = (F'(X))'$$

$$F'''(X) = (F''(X))'$$

$$F^{(4)}(X) = F'''(X)'$$


ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ, ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРИЧЕСКИ

$$y'(x_0) = \frac{y'_t(t_0)}{x'_t(t_0)} \quad \text{или} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

ДИФФЕРЕНЦИАЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Геометрический смысл и свойства дифференциала

Геометрически (рис. 82) приращение Δy функции $f(x)$ в точке x — есть приращение ординаты точки на кривой ($\Delta y = AC$), а дифференциал dy функции в этой точке — приращение ординаты соответствующей точки на касательной ($dy = AB$).



Пусть $u(x)$ и $v(x)$ — некоторые функции, дифференцируемые в точке x . Тогда:

1. $dC = 0$, где C — константа.
2. $d(\alpha u) = \alpha \cdot du$, где α — константа.
3. $d(u \pm v) = du \pm dv$.
4. $d(u \cdot v) = u dv + v du$.
5. $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}$, где $v(x) \neq 0$.

6. **Инвариантность формы дифференциала.** Если $y = f(u(x))$ — сложная функция, то

$$df(u) = f'(u) du, \quad \text{или} \quad dy = y'_u \cdot du,$$

т. е. форма дифференциала не меняется (инвариантна) независимо от того, рассматривается y как функция независимой переменной x или зависимой переменной u .

Дифференциалом второго порядка (или вторым дифференциалом) от функции $y = f(x)$ в точке $x \in (a, b)$ называется дифференциал от дифференциала первого порядка функции $f(x)$ в этой точке.

Дифференциал второго порядка обозначается $d^2 y$ или $d^2 f(x)$. Таким образом, $d^2 y = d(dy)$. Учитывая, что $dy = f'(x) dx$, где dx — не зависящая от x константа, получим

$$d^2 y = f''(x)(dx)^2, \quad \text{или, более кратко,} \quad d^2 y = f''(x)dx^2.$$

Аналогично определяются дифференциалы третьего и более высоких порядков: $d^3 y = d(d^2 y)$, $d^4 y = d(d^3 y)$, ... В общем случае, *дифференциалом n -го порядка* от функции $f(x)$ в точке x называется дифференциал от дифференциала $(n - 1)$ -го порядка функции $f(x)$ в этой точке:

$$d^n y = d(d^{n-1} y),$$

ТЕОРЕМЫ О СРЕДНЕМ

Теорема 7.1 (Ролля). Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a; b]$, дифференцируема на интервале $(a; b)$ и принимает на концах отрезка равные значения (т. е. $f(a) = f(b)$). Тогда существует по крайней мере одна точка c на интервале $(a; b)$, для которой $f'(c) = 0$.

Теорема 7.2 (Лагранжа). Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a; b]$ и дифференцируема на интервале $(a; b)$. Тогда на интервале $(a; b)$ найдется такая точка c , что

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Теорема 7.3 (Коши). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны на отрезке $[a; b]$ и дифференцируемы на интервале $(a; b)$, причем $g'(x) \neq 0$ для всех $x \in (a; b)$. Тогда найдется такая точка c на этом интервале, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

ЧАСТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Частными приращениями функции $z = f(x; y)$ по независимым переменным x и y называются разности $\Delta_x z = f(x + \Delta x; y) - f(x; y)$, $\Delta_y z = f(x; y + \Delta y) - f(x; y)$.

Полным приращением функции $z = f(x; y)$, соответствующим приращениям аргументов Δx и Δy , называется разность $\Delta z = f(x + \Delta x; y + \Delta y) - f(x; y)$.

Частной производной функции $z = f(x; y)$ по переменным x и y называется предел отношения соответствующего частного приращения $\Delta_x z$ или $\Delta_y z$ к приращению данной переменной, при условии, что приращение переменной стремится к нулю:

$$z'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x}, \quad z'_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y}.$$

ПРАВИЛА ЛОПИТАЛЯ

- 1) ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ ПРЕДЕЛ ОТНОШЕНИЯ НУЛЕЙ В ТОЧКЕ К ФУНКЦИЙ, ТО В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ МОЖНО ВЗЯТЬ ДВЕ ПРОИЗВОДНЫЕ – ОТДЕЛЬНО ОТ ЧИСЛИТЕЛЯ И ОТДЕЛЬНО ОТ ЗНАМЕНАТЕЛЯ. ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИИ ЧИСЛИТЕЛЯ И ЗНАМЕНАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЕЛА НЕ МЕНЯЕТСЯ.
- 2) ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ ПРЕДЕЛ ОТНОШЕНИЯ БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШИХ В ТОЧКЕ К ФУНКЦИЙ, ТО В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ МОЖНО ВЗЯТЬ ДВЕ ПРОИЗВОДНЫЕ – ОТДЕЛЬНО ОТ ЧИСЛИТЕЛЯ И ОТДЕЛЬНО ОТ ЗНАМЕНАТЕЛЯ. ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИИ ЧИСЛИТЕЛЯ И ЗНАМЕНАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЕЛА НЕ МЕНЯЕТСЯ.

ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(a) \frac{(x-a)^n}{n!} = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + R_n$$

ФОРМУЛА МАКЛОРЕНА

$$P(x) = P(0) + \frac{P'(0)}{1!}x + \frac{P''(0)}{2!}x^2 + \frac{P'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{P^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

Полученное выражение называется **формулой Маклорена** для многочлена $P(x)$ степени n .