

Доклад на тему

Научные статистические расчеты.

**Программное обеспечение для реализации статистических
расчётов.**

Докладчик

- Смирнов-Мальцев Егор Дмитриевич
- студент группы НКНбд-01-21
- Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбу
- <https://github.com/EgorSmM>

Вводная часть

Цель работы

- Выделить задачи научной статистики,
- Выполнить подсчет основных статистических метрик.
- Проверить гипотезу о принадлежности выборки к распределению

Теоретическое введение

Статистика --- совокупность числовых показателей, характеризующих те или иные явления и процессы.

Основные элементы статистического исследования

- Разработка программы статистического наблюдения,
- Создание статистической выборки,
- Обработка данных,
- Анализ полученной информации.

Задачи статистического исследования

- Выявление взаимосвязей между величинами,
- Проверка гипотез на основе практических результатов.

Комплекс используемых программ

Для подсчета статистических метрик в данной работе был использован `Octave` с пакетом `statistics`. Эта программная система была выбрана, поскольку:

1. Имеет совместимый с `Matlab` язык.
2. Бесплатная.


Подсчет основных статистических метрик

Создание случайной выборки

В качестве статистической выборки X возьмем 1000 нормально распределенных случайных чисел. Построим гистограмму полученной выборки. Также создадим выборку Y с выбросом. Ей будет выборка X к которой добавлено число 100.

```
> X = randn(1, 1000);  
> hist(X, 30, 'FaceColor', 'yellow', 'EdgeColor', 'red', 'LineWidth', 2);  
> Y = X;  
> Y(1, 1001) = 100;
```

Гистограмма случайной выборки



Подсчет среднего значения и медианы

Среднее значение и медиану можно посчитать с помощью встроенных функций

`mean` и `median` :

```
> mean(X)
ans = 0.0427
> median(X)
ans = 0.058198
> mean(Y)
ans = 0.14256
> median(Y)
ans = 0.059815
```

Как видно из эксперимента, медиана более устойчива к выбросам, чем среднее значение. Поэтому в случае если в выборке возможны выбросы, лучше использовать ее.

Подсчет стандартного отклонения

Стандартное отклонение можно посчитать с помощью встроенной функции `std(x, f)`. Если параметр `f` равен 0, то считается несмещенное отклонение. Если он равен 1, то смещенное.

```
> std(X, 0)
ans = 1.0165
> std(X, 1)
ans = 1.0160
> std(Y, 0)
ans = 3.3187
> std(Y, 1)
ans = 3.3170
```

Проверка статистических гипотез

Важной частью статистических расчетов является проверка статистических гипотез. В качестве примера, проверим является ли случайная величина Y нормально распределенной с найденным нами средним и стандартным отклонением равным 1.

```
> kolmogorov_smirnov_test(Y, "norm", mean(Y), 1)
pval: 0.00655609
```

`pval` --- вероятность получить такую же или более экстремальную выборку, при условии, что гипотеза верна. Если `pval` меньше критического уровня, то мы можем отвергнуть гипотезу. Обычно критический уровень берут равным 0.05.

Проверим является ли случайная величина Y нормально распределенной со средним значением 0 и стандартным отклонением 1.

```
> kolmogorov_smirnov_test(Y, "norm", mean(Y), 1)
pval: 0.47823
```

Эту гипотезу мы отвергнуть не можем.

Выводы

Мы научились считать основные статистические метрики и проводить проверку статистических гипотез.

Список литературы

1. Полякова В.В. Основы теоретической статистики. УрФУ. Екатеринбург, 2015.
2. GNU Octave Documentation [Электронный ресурс]. Free Software Foundation, 2023. URL: <https://docs.octave.org/latest/>.
3. Sharma N., Gobbert M.K. A comparative evaluation of Matlab, Octave, Freemat, and Scilab for research and teaching. Department of Mathematics; Statistics University of Maryland, Baltimore County, 2010. 37 с.