

Механико-математический факультет

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ, 1 СЕМЕСТР, 2 ПОТОК**

**БИЛЕТЫ**

Москва  
2024

# Содержание

<b>1</b>	<b>Векторные пространства и множества</b>	<b>3</b>
1.1	Векторные пространства . . . . .	3
1.2	Линейная комбинация векторов . . . . .	4
1.3	Линейно зависимые и линейно независимые множества и системы векторов . .	4
1.4	Полные множества и системы векторов . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Базис и размерность векторного пространства</b>	<b>5</b>
2.1	Базис векторного пространства. Конечномерное векторное пространство. . . .	5
2.2	Лемма о количестве векторов в ЛНЗ системе (аналог ОЛЛЗ) . . . . .	5
2.3	Теорема о количестве векторов в базисе. Размерность векторного пространства.	6
<b>3</b>	<b>Координаты в базисе</b>	<b>6</b>
3.1	Однозначность выражения вектора в конечномерном в. п. через базис . . . . .	6
3.2	Координаты вектора в базисе . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Аффинные пространства</b>	<b>7</b>
4.1	Аффинное пространство . . . . .	7
4.2	Радиус-векторы и репер . . . . .	7
4.3	Конечномерные аффинные пространства и их размерность . . . . .	8
<b>5</b>	<b>Подпространства</b>	<b>8</b>
5.1	Векторное подпространство . . . . .	8
5.2	Аффинное подпространство . . . . .	9
5.3	Прямая в аффинном пространстве . . . . .	9
<b>6</b>	<b>Скалярное произведение</b>	<b>10</b>
6.1	Скалярное произведение . . . . .	10
6.2	Евклидово векторное и точечно-евклидово аффинное пространство . . . . .	10
6.3	Длина вектора и расстояния между точками . . . . .	10
6.4	Выражение скалярного произведения через длины . . . . .	10
<b>7</b>	<b>Неравенство Коши-Буняковского</b>	<b>11</b>
7.1	Неравенство Коши-Буняковского . . . . .	11
7.2	Величина угла и ортогональные векторы . . . . .	11
<b>8</b>	<b>Прямоугольная система координат</b>	<b>11</b>
8.1	Ортонормированный базис и прямоугольная система координат . . . . .	11
8.2	Выражение скалярного произведения через координаты векторов . . . . .	11
8.3	Выражение для прямоугольной системы координат . . . . .	12
<b>9</b>	<b>Проектирование</b>	<b>12</b>
<b>10</b>	<b>Ортонормированный базис</b>	<b>13</b>
10.1	Линейная независимость ортогональных векторов . . . . .	13
10.2	Теорема о существовании ортонормированного базиса . . . . .	13

<b>11 Прямые и их уравнения</b>	<b>14</b>
11.1 Определения прямой и направляющего вектора . . . . .	14
11.2 Уравнения прямой . . . . .	14
11.3 Критерий уравнения прямой (нет в билете, важно) . . . . .	15
<b>12 Взаимное расположение прямых</b>	<b>15</b>
12.1 Случай общих уравнений . . . . .	15
12.2 Случай параметрических уравнений . . . . .	16
<b>13 Пучки прямых</b>	<b>16</b>
13.1 Определение пучка прямых . . . . .	16
13.2 Уравнение собственного пучка прямых . . . . .	16
13.3 Уравнение несобственного пучка прямых . . . . .	17
<b>14 Отрезки</b>	<b>17</b>
14.1 Отрезки на плоскости . . . . .	17
<b>15 Полуплоскости</b>	<b>18</b>
15.1 Выпуклые множества . . . . .	18
15.2 Полуплоскости как выпуклые множества . . . . .	18
<b>16 Углы между прямыми</b>	<b>19</b>
16.1 Определение угла . . . . .	19
16.2 Определение угла между двумя прямыми . . . . .	19
16.3 Угол между прямыми в прямоугольной системе координат . . . . .	20
16.4 Условие перпендикулярности. Нормаль . . . . .	20
<b>17 Расстояние от точки до прямой</b>	<b>20</b>
17.1 Определение расстояния между множествами точек . . . . .	20
17.2 Расстояние от точки до прямой . . . . .	21

# Билет 1. Векторные пространства и множества

## 1.1 Векторные пространства

Геометрические векторы в математике являются **свободными векторами** - классами эквивалентности направленных отрезков по уже известному нам отношению эквивалентности векторов.

**Определение.** Векторным (линейным) пространством (над полем  $\mathbb{R}$ ) называется множество  $V$  с введенными на нем бинарными операциями "+" :  $V \times V \rightarrow V$  и "\*" :  $\mathbb{R} \times V \rightarrow V$ , отвечающие следующим свойствам (аксиомам):

$$\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V; \lambda, \mu \in \mathbb{R} :$$

1.  $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$  (коммутативность сложения);
2.  $(\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c})$  (ассоциативность сложения);
3.  $\exists \bar{0} \in V : \bar{a} + \bar{0} = \bar{0} + \bar{a} = \bar{a}$  (существует нейтральный элемент по сложению - нулевой вектор);
4.  $\exists (-\bar{a}) \in V : \bar{a} + (-\bar{a}) = (-\bar{a}) + \bar{a} = \bar{0}$  (существует противоположный элемент по сложению);
5.  $\lambda(\mu\bar{a}) = (\lambda\mu)\bar{a}$  (ассоциативность умножения на числа);
6.  $(\lambda + \mu)\bar{a} = \lambda\bar{a} + \mu\bar{a}$  (дистрибутивность по умножению);
7.  $\lambda(\bar{a} + \bar{b}) = \lambda\bar{a} + \lambda\bar{b}$  (дистрибутивность по сложению);
8.  $1 * \bar{a} = \bar{a}$ .

**Примеры.** Векторные пр-ва:

- $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$ ;
- Функции;
- Многочлены;
- Многочлены степени  $\leq n$ .

**Замечание.** Св-ва векторных пространств:

1.  $\bar{0}$  единственный.

Пусть  $\bar{0}_1, \bar{0}_2$  - нулевые векторы.

Тогда  $\bar{0}_1 = \bar{0}_1 + \bar{0}_2 = \bar{0}_2$ , ч.т.д.

2.  $-\bar{a}$  единственный.

Пусть  $-\bar{a}_1, -\bar{a}_2$  - противоположные к  $\bar{a}$  векторы.

Тогда  $-\bar{a}_1 = -\bar{a}_1 + \bar{0} = -\bar{a}_1 + (\bar{a} + -\bar{a}_2) = (-\bar{a}_1 + \bar{a}) + (-\bar{a}_2) = \bar{0} + (-\bar{a}_2) = -\bar{a}_2$ , ч.т.д.

3.  $\lambda * \bar{0} = \bar{0}$ .

$$\lambda * \bar{0} = \lambda * (\bar{0} + \bar{0}) = \lambda * \bar{0} + \lambda * \bar{0}$$

Прибавив к обеим частям вектор, противоположный к  $\lambda * \bar{0}$ , получим  $\lambda * \bar{0} = \bar{0}$ , ч.т.д.

4.  $-(\lambda \bar{a}) = (-\lambda) \bar{a} = \lambda(-\bar{a})$ .

Нетрудно видеть, что все три вектора противоположны  $\lambda \bar{a}$ , а далее из п.2.

5.  $-\bar{a} = -1 * \bar{a}$

Следует из п.4.

6.  $\lambda \bar{a} = \bar{0} \Leftrightarrow$  либо  $\lambda = 0$ , либо  $\bar{a} = \bar{0}$ .

Либо  $\lambda = 0$ , либо  $\lambda \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{\lambda} * \lambda * \bar{a} = \frac{1}{\lambda} \bar{0} = \bar{0} \Rightarrow \bar{a} = \bar{0}$ , ч.т.д.

## 1.2 Линейная комбинация векторов

**Определение.** Сумма вида  $\lambda_1 \bar{x}_1 + \dots + \lambda_n \bar{x}_n$  называется линейной комбинацией векторов  $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_n$ .

**Определение.** Если в линейной комбинации  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ , то она называется тривиальной, а иначе - нетривиальной.

**Определение.** Если вектор  $\bar{x}$  равен линейной комбинации  $\lambda_1 \bar{x}_1 + \dots + \lambda_n \bar{x}_n$ , то говорят, что он линейно выражается (раскладывается) через векторы  $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_n$ . (Сама линейная комбинация  $\lambda_1 \bar{x}_1 + \dots + \lambda_n \bar{x}_n$  называется выражением (разложением) вектора  $\bar{x}$  через  $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_n$ )

## 1.3 Линейно зависимые и линейно независимые множества и системы векторов

**Определение.** Упорядоченное множество векторов называется системой векторов. (В системе векторов элементы могут повторяться)

**Определение.** Множество векторов называется линейно зависимым, если существует равная нулю нетривиальная линейная комбинация векторов из этого множества. В противном случае оно называется линейно независимым.

**Пример.** Система из двух векторов  $\bar{a}, \bar{b}$  линейно зависима  $\Leftrightarrow \bar{a} = \lambda \bar{b}$ .

**Замечание.** Множество векторов линейно зависимо  $\Leftrightarrow$  один из векторов этого множества линейно выражается через некоторые другие векторы этого множества.

## 1.4 Полные множества и системы векторов

**Определение.** Множество (система) векторов из векторного пространства  $V$  называется полным (полной) в  $V$ , если любой вектор  $\bar{x} \in V$  линейно выражается через векторы этого множества.

**Замечание.**  $X \subset V$  полно в  $V \Rightarrow \forall Y : X \subset Y$  полно в  $V$ .

**Замечание.**  $X \subset V$  линейно независимо в  $V \Rightarrow \forall Y \subset X$  линейно независимо в  $V$ .

## Билет 2. Базис и размерность векторного пространства

### 2.1 Базис векторного пространства. Конечномерное векторное пространство.

**Определение.** Множество векторов  $E$  в векторном пространстве  $V$  называется базисом  $V$ , если  $E$  линейно независимо и полно в  $V$ .

**Определение.** Векторное пространство, в котором существует конечный (состоящий из конечного числа векторов) базис, называется конечномерным. В противном случае оно называется бесконечномерным.

### 2.2 Лемма о количестве векторов в ЛНЗ системе (аналог ОЛЛЗ)

**Лемма.** Если  $X$  - конечное полное множество из  $n$  векторов в векторном пространстве  $V$  и  $Y$  - линейно независимое множество векторов в  $V$ , то  $Y$  конечно и число векторов в  $Y \leq n$ .

*Доказательство.* (пер.) Произвольно занумеруем векторы в  $X : (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ . Будем по одному добавлять в эту систему векторы из  $Y$  и одновременно выкидывать векторы из  $X$  так, чтобы система оставалась полной.

Пусть за  $k$  шагов ( $0 \leq k \leq n$ ) мы добавили некоторые  $\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_k$  и выкинули какие-то  $k$  векторов из  $X$  - осталась система  $(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_k, \bar{x}_{i_1}, \dots, \bar{x}_{i_{n-k}})$ . Возьмём  $\bar{y}_{k+1}$  из  $Y$  (если такого нет, то в  $Y \leq n$  векторов, что нам и нужно), и добавим его в систему. Так как до этого система оставалась полной,  $\bar{y}_{k+1}$  выражается через  $(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_k, \bar{x}_{i_1}, \dots, \bar{x}_{i_{n-k}})$ , причём какой-то  $\bar{x}_{i_j}$  входит в это разложение с коэффициентом, не равным нулю (иначе противоречие с линейной независимостью  $Y$  -  $\bar{y}_{k+1}$  выразился через  $\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_k$ ).

Тогда  $\bar{x}_{i_j}$  выражается через другие векторы системы и  $\bar{y}_{k+1}$  (в выражении  $\bar{y}_{k+1}$  перенесём всё, кроме  $\bar{x}_{i_j}$  в другую часть и разделим на коэффициент перед ним). А так как  $(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_{k+1}, \bar{x}_{i_1}, \dots, \bar{x}_{i_{n-k}})$  - полная, эта же система без  $\bar{x}_{i_j}$  очевидно, останется полной.

Пусть смогли проделать  $n$  таких шагов. Тогда имеем систему  $(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)$ . Если в  $Y$  есть ещё векторы, то они с одной стороны выражаются через векторы системы из её полноты, а с другой - не выражаются через них из линейной независимости  $Y$ . Противоречие, т.е. в  $Y$  не может оказаться больше  $n$  векторов, ч.т.д.  $\square$

## 2.3 Теорема о количестве векторов в базисе. Размерность векторного пространства.

**Теорема.** Если в векторном пространстве есть конечный базис. то все базисы в нём конечны и содержат одинаковое количество векторов.

*Доказательство.* Пусть  $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$  - конечный базис в  $V$ . Любой другой базис  $V$  линейно независим, т.е. по лемме содержит  $k \leq n$  векторов, а с другой стороны полон, т.е. первый базис по лемме содержит  $n \leq k$  векторов. Отсюда  $n = k$ , ч.т.д.  $\square$

**Определение.** Количество векторов в любом базисе векторного пространства  $V$  называется размерностью  $V$  и обозначается  $\dim V$ .

**Примеры.**  $\dim \bar{0} = 0, \dim \pi (= \dim \mathbb{R}^2) = 2, \dim \mathbb{R}^3 = 3$ .

## Билет 3. Координаты в базисе

### 3.1 Однозначность выражения вектора в конечномерном в. п. через базис

**Теорема.** В конечномерном векторном пространстве выражение любого вектора через базис определяется однозначно.

## 3.2 Координаты вектора в базисе

*Доказательство.* Если  $\bar{x} = \lambda_1 \bar{e}_1 + \dots + \lambda_n \bar{e}_n = \lambda'_1 \bar{e}_1 + \dots + \lambda'_n \bar{e}_n$ , то  $\bar{x} - \bar{x} = \bar{0} = (\lambda_1 - \lambda'_1) \bar{e}_1 + \dots + (\lambda_n - \lambda'_n) \bar{e}_n$ . Если эти два разложения различны, то равная нулю линейная комбинация базисных векторов нетривиальна, что противоречит линейной независимости базиса. То есть двух различных разложений быть не может, ч.т.д.  $\square$

**Определение.** Пусть  $V$  - конечномерное векторное пространство и  $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$  - базис в нём. Коэффициенты  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  в выражении любого вектора  $x \in V$  через эти базисные векторы называются координатами вектора  $x$  в базисе  $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$ . ( $\lambda_k$  называется  $k$ -й координатой)

**Замечание.** Векторы в  $n$ -мерном векторном пространстве находятся во взаимно однозначном соответствии с упорядоченной строкой из  $n$  чисел из  $\mathbb{R}$  (например, векторы ассоциированного с евклидовой плоскостью векторного пространства соответствуют парам чисел) Таким образом можно задать операции сложения и умножения на число векторов плоскости через операции над числами, проводимыми по координатам.

## Билет 4. Аффинные пространства

### 4.1 Аффинное пространство

Элементы плоскости (как множества) - точки, а не векторы, поэтому для работы непосредственно с плоскостью необходимо ввести данное определение.

**Определение.** Аффинное пространство - тройка  $(X, V, +)$  (обычно обозначается  $\mathbb{A}$ ), где  $X$  - множество (точек),  $V$  - векторное пространство, а  $+$  операция:  $X \times V \rightarrow X$ , для которых выполнены аксиомы:

1.  $\forall A \in X, \forall \bar{a}, \bar{b} \in V : A + (\bar{a} + \bar{b}) = (A + \bar{a}) + \bar{b}$ ;
2.  $\forall A \in X : A + \bar{0} = A$ ;
3.  $\forall A, B \in X \exists! \bar{a} \in V : A + \bar{a} = B$ . Обозначается  $\bar{a} = \overrightarrow{AB}$ .

### 4.2 Радиус-векторы и репер

Если зафиксировать какую-нибудь точку  $O \in X$ , возникает взаимно однозначное соответствие между точками  $A$  и их радиус-векторами  $\overrightarrow{OA}$ .



**Определение.** Репер (система координат) в аффинном пространстве  $(X, V, +)$  - пара  $(O, E)$ , где  $O \in X$  и  $E$  - базис в  $V$ . Точка  $O$  называется началом координат (отсчёта). Координаты точки  $A$  в  $(O, E)$  - координаты её радиус-вектора  $\overrightarrow{OA}$  в базисе  $E$ .

**Замечание.** Для аффинного пространства верно:

1. Если  $A = (x_1, \dots, x_n), \bar{a} = (y_1, \dots, y_n)$ , то  $A + \bar{a} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$ .
2. Если  $A = (a_1, \dots, a_n), B = (b_1, \dots, b_n)$ , то  $\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, \dots, b_n - a_n)$ .

(Следует из сложения векторов)

### 4.3 Конечномерные аффинные пространства и их размерность

**Определение.** Если  $\mathbb{A} = (X, V, +)$  - аффинное пространство, то говорят, что  $V$  - векторное пространство, ассоциированное с  $\mathbb{A}$ .

**Определение.**  $\mathbb{A}$  называется конечномерным, если ассоциированное с ним  $V$  конечномерно. В этом случае  $\dim \mathbb{A}$  (размерность  $\mathbb{A}$ ) равна  $\dim V$ .

Теперь точки аффинного пространства аналогично векторам можно ассоциировать с наборами чисел. Однако для ассоциирования евклидовой плоскости и её аксиом с двумерным аффинным пространством, необходимы отвечающие аксиомам понятия прямой и расстояния.

## Билет 5. Подпространства

### 5.1 Векторное подпространство

**Определение.** Векторным подпространством векторного пространства  $V$  называется непустое множество  $V_1 \subset V$  такое, что  $\forall \bar{x}, \bar{y} \in V_1 : \bar{x} + \bar{y} \in V_1, \lambda \bar{x} \in V_1 (\forall \lambda \in \mathbb{R})$ .

**Замечание.** Определение эквивалентно следующему: множество  $V_1 \subset V$  - векторное подпространство  $V$ , если  $V_1$  является векторным пространством относительно операций  $+$  и  $*$ , определённых для  $V$ . (Доказательство осуществляется путём прямой проверки аксиом векторного пространства для  $V_1$ )

## 5.2 Аффинное подпространство

Введём несколько определений аффинного подпространства и докажем их эквивалентность.

**Определение.** Аффинным подпространством аффинного пространства  $\mathbb{A} = (X, V, +)$  называется

1. его непустое подмножество вида  $A + V_1 = A + \bar{a} : \bar{a} \in V_1$ , где  $V_1$  - векторное подпространство  $V$  и  $A \in X$  - точка;
2. тройка  $(X_1 \subset X, V_1 \subset V, +_1)$ , где  $V_1$  - векторное подпространство  $V$  и операция  $+_1 = +$ , для которой  $\forall A, B \in X_1, \forall \bar{a} \in V_1 : A + \bar{a} \in X_1, \overrightarrow{AB} \in V_1$ ;
3. тройка  $(X_1 \subset X, V_1 \subset V, +_1)$ , где  $V_1$  - векторное подпространство  $V$  и операция  $+_1 = +$ , которая сама является аффинным пространством.

**Утверждение.** Приведённые определения эквивалентны.

*Доказательство.* Докажем следующие следствия:

①  $\Rightarrow$  ② Пусть  $P = A + \bar{a}, Q = A + \bar{b}$ . Тогда  $\overrightarrow{PQ} = \bar{b} - \bar{a}$  (в силу единственности такого вектора), т.е.  $\overrightarrow{PQ} \in V_1$ . Второе необходимое свойство ② очевидно выполнено.

②  $\Rightarrow$  ① Пусть  $X_1, V_1$  удовлетворяют ②. Зафиксируем произвольную  $A \in X_1$ .  $\forall B \in X_1$  имеем  $B = A + \overrightarrow{AB}$ , причём  $A \in X_1, \overrightarrow{AB} \in V_1 \Rightarrow B \in X_1$ .

Эквивалентность ②  $\Leftrightarrow$  ③ очевидна из определения аффинного пространства.  $\square$

## 5.3 Прямая в аффинном пространстве

**Определение.** Прямая в аффинном пространстве - его одномерное аффинное подпространство.

Плоскость (двумерная) в аффинном пространстве - его двумерное аффинное подпространство.

**Определение.** Единственный вектор в любом базисе векторного пространства, ассоциированного с одномерным аффинным пространством, называется направляющим вектором этого аффинного пространства.

## Билет 6. Скалярное произведение

### 6.1 Скалярное произведение

**Определение.** Пусть  $V$  - векторное пространство. Скалярным произведением в  $V$  называется функция  $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  со свойствами:

1.  $(\bar{x}, \bar{x}) \geq 0 \ \forall \bar{x} \in V$ , причём  $(\bar{x}, \bar{x}) = 0 \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{0}$  (положительная определённость);
2.  $(\bar{x}, \bar{y}) = (\bar{y}, \bar{x}) \ \forall \bar{x}, \bar{y} \in V$  (коммутативность);
3.  $(\alpha\bar{x} + \beta\bar{y}, \bar{z}) = \alpha(\bar{x}, \bar{z}) + \beta(\bar{y}, \bar{z}) \ \forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$  (линейность по первому аргументу)

Из коммутативности выполнена и линейность по второму аргументу, т.е. скалярное произведение - билинейная функция.

### 6.2 Евклидово векторное и точечно-евклидово аффинное пространство

**Определение.** Конечномерное аффинное (векторное) пространство вместе со скалярным произведением называется точечно-евклидовым (евклидовым) пространством. Двумерное точечно-евклидово пространство называется евклидовой плоскостью.

### 6.3 Длина вектора и расстояния между точками

**Определение.** Длиной вектора называется величина  $\sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}$ .

**Определение.** Расстоянием (евклидовым) между точками  $A, B \in \mathbb{A}$  называется длина вектора  $\overrightarrow{AB}$ . Будем обозначать  $d(A, B)$  как  $|\overrightarrow{AB}|$ .

### 6.4 Выражение скалярного произведения через длины

**Замечание.** Зная длины всех векторов, скалярное произведение можно восстановить по формуле  $(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{1}{2}(|\bar{x} + \bar{y}|^2 - |\bar{x}|^2 - |\bar{y}|^2)$ . Это несложно проверить:  $\frac{1}{2}(|\bar{x} + \bar{y}|^2 - |\bar{x}|^2 - |\bar{y}|^2) = \frac{1}{2}((\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y}) - (\bar{x}, \bar{x}) - (\bar{y}, \bar{y})) = \frac{1}{2}(2(\bar{x}, \bar{y})) = (\bar{x}, \bar{y})$ .

## Билет 7. Неравенство Коши-Буняковского

### 7.1 Неравенство Коши-Буняковского

**Теорема** (Неравенство Коши-Буняковского).  $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V \quad (\bar{a}, \bar{b}) \leq \sqrt{(\bar{a}, \bar{a})(\bar{b}, \bar{b})}$ , причём равенство достигается только при  $\bar{a} = \lambda \bar{b}$ .

*Доказательство.* Рассмотрим выражение  $(\bar{a} + t\bar{b}, \bar{a} + t\bar{b})$ . Оно равно нулю  $\Leftrightarrow \bar{a} = -t\bar{b}$ , т.е. может быть равно нулю не более чем при одном  $t$ . С другой стороны  $(\bar{a} + t\bar{b}, \bar{a} + t\bar{b}) = (\bar{a}, \bar{a}) + 2(\bar{a}, \bar{b})t + (\bar{b}, \bar{b})t^2$  - квадратный трёхчлен относительно  $t$ . Его дискриминант равен  $4(\bar{a}, \bar{b})^2 - 4(\bar{a}, \bar{a})(\bar{b}, \bar{b})$ , а из первого рассуждения знаем, что дискриминант  $\leq 0$ , причём равенство достигается только в случае коллинеарности  $\bar{a}$  и  $\bar{b}$ . Отсюда  $(\bar{a}, \bar{b}) \leq \sqrt{(\bar{a}, \bar{a})(\bar{b}, \bar{b})}$ , ч.т.д.  $\square$

### 7.2 Величина угла и ортогональные векторы

**Определение.** Величиной угла между ненулевыми векторами  $\bar{a}, \bar{b}$  называется число  $\arccos \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}||\bar{b}|}$  (из н. Коши-Буняковского  $|\frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}||\bar{b}|}| \leq 1$ ).

**Определение.** Векторы  $\bar{a}, \bar{b}$  называются ортогональными (перпендикулярными), если  $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$ .

## Билет 8. Прямоугольная система координат

### 8.1 Ортонормированный базис и прямоугольная система координат

**Определение.** Базис векторного пространства  $V$  со скалярным произведением называется ортонормированным, если все его векторы попарно ортогональны и имеют длину 1.

**Определение.** Система координат в точечно-евклидовом пространстве называется прямоугольной, если её базис ортонормированный.

### 8.2 Выражение скалярного произведения через координаты векторов

**Утверждение.** В точечно-евклидовом пространстве верно следующее выражение скалярного произведения через координаты векторов: если в некотором

базисе  $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$   $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ,  $\bar{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ , то  $(\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{j=1}^n y_j (\bar{e}_i, \bar{e}_j)$ .

*Доказательство.*  $(\bar{x}, \bar{y}) = (x_1 \bar{e}_1 + \dots + x_n \bar{e}_n, y_1 \bar{e}_1 + \dots + y_n \bar{e}_n) = \sum_{i=1}^n (x_i \bar{e}_i, y_1 \bar{e}_1 + \dots + y_n \bar{e}_n) = \sum_{i=1}^n x_i (\bar{e}_i, y_1 \bar{e}_1 + \dots + y_n \bar{e}_n) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{j=1}^n y_j (\bar{e}_i, \bar{e}_j)$   $\square$

### 8.3 Выражение для прямоугольной системы координат

**Замечание.** В случае, когда базис ортонормированный, имеем  $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$ , т.е.  $(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$ . То есть в прямоугольной системе координат длина вектора вычисляется по формуле  $|\bar{x}| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ , а расстояние между точками  $P = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $Q = (y_1, \dots, y_n)$  выражается как  $|PQ| = |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2}$ .

## Билет 9. Проектирование

**Определение.** Пусть задано два векторных подпространства  $V_1, V_2$  векторного пространства  $V$  такие, что  $V_1 \cap V_2 = \{0\}$  и  $V_1 + V_2 = V$  (обозначается  $V = V_1 \oplus V_2$ ). Тогда сумма  $\bar{x} = \bar{x}_1 + \bar{x}_2$ , где  $\bar{x} \in V, \bar{x}_1 \in V_1, \bar{x}_2 \in V_2$ , определена единственно. (Следует, например, из того, что в любом базисе  $V$  каждый его вектор лежит либо в  $V_1$ , либо в  $V_2$ , тогда разложение в эту сумму соответствует единственному разложению по базису). Проекцией вектора  $\bar{x} \in V$  на  $V_1$  параллельно  $V_2$  называется слагаемое  $\bar{x}_1$  этой суммы.

**Определение.** Пусть задано два аффинных подпространства  $\mathbb{A}_1 = (X_1, V_1, +)$ ,  $\mathbb{A}_2 = (X_2, V_2, +)$  аффинного пространства  $\mathbb{A} = (X, V, +)$  такие, что  $V = V_1 \oplus V_2$ . Проекцией точки  $P \in \mathbb{A}$  на  $\mathbb{A}_1$  параллельно  $\mathbb{A}_2$  - точка  $P_1 = A_1 + \bar{v}$ , где  $A_1$  - произвольная точка из  $X_1$ , а  $\bar{v}$  - проекция  $\overrightarrow{A_1 P}$  на  $V_1$  параллельно  $V_2$ . (Очевидно, что от выбора  $A_1$  расположение проекции не зависит)

**Пример.** Рассмотрим координаты точки евклидовой плоскости относительно прямоугольной системы координат.

Найдём проекцию точки  $A = (x, y)$  на прямую  $Oy$  параллельно прямой  $Ox$ . По определению это точка (назовём её  $A_y$ ), равная  $O + \bar{v}$ , где  $\bar{v}$  - проекция  $\overrightarrow{OP}$  на векторное пространство прямой  $Oy$  параллельно  $Ox$ .  $\overrightarrow{OP} = \{x, y\} = x\bar{e}_1 + y\bar{e}_2$ . Отсюда  $\bar{v} = y\bar{e}_2 = \{0, y\}$ , то есть  $A_y = (0, y)$ . Аналогично  $A_x = (x, 0)$ .

## Билет 10. Ортонормированный базис

Определение смотри в пункте 8.1 Пусть  $\mathbb{A}^n = (X, V^n, +)$  -  $n$ -мерное точечно-евклидово пространство.

### 10.1 Линейная независимость ортогональных векторов

**Утверждение.** В  $V^n$  любая линейно независимая система из  $n$  векторов образует базис.

*Доказательство.* Предположим, что в  $V^n$  существует неполная линейно независимая система из  $n$  векторов. Т.к. система не полная, существует вектор из  $V^n$ , не выражающийся через векторы этой системы, т.е. этот вектор можно добавить в систему без потери линейной независимости. Но по лемме-аналогу ОЛЛЗ линейно независимая система в  $V^n$  не может иметь  $> n$  векторов. Противоречие, т.е. любая линейно независимая система из  $n$  векторов является полной, а значит и базисом, ч.т.д.  $\square$

**Утверждение.** Если  $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$  - попарно ортогональные ненулевые векторы в евклидовом пространстве, то  $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$  линейно независимы.

*Доказательство.* Предположим противное. Пусть один из векторов (без ограничения общности  $\bar{e}_n$ ) линейно выражается через остальные:  $\bar{e}_n = \lambda_1 \bar{e}_1 + \dots + \lambda_{n-1} \bar{e}_{n-1}$ . Тогда запишем квадрат его длины:  $|\bar{e}_n|^2 = (\bar{e}_n, \bar{e}_n) = (\bar{e}_n, \lambda_1 \bar{e}_1 + \dots + \lambda_{n-1} \bar{e}_{n-1}) = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i (\bar{e}_n, \bar{e}_i) = 0$  (т.к.  $\bar{e}_n$  ортогонален всем остальным векторам). Отсюда  $|\bar{e}_n| = 0$ , и притом  $\bar{e}_n$  ненулевой. Противоречие, т.е. никакой вектор системы не выражается через остальные, а значит система линейно независима. ч.т.д.  $\square$

### 10.2 Теорема о существовании ортонормированного базиса

**Теорема.** В любом евклидовом пространстве существует ортонормированный базис.

*Доказательство.* (пер.) Индукция по  $n$  - размерности пространства:

База:  $n = 1$  - очевидно, что существует вектор длины 1, который составляет ортонормированный базис одномерного пространства;

Шаг: Пусть в любом  $n$ -мерном пространстве существует ортонормированный базис. Рассмотрим пространство  $V$  размерности  $n + 1$  и выберем базис

какого-то  $n$ -мерного подпространства  $W$  (пусть  $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ ). Найдём вектор, ортогональный всем выбранным векторам. Так как базис  $W$  не полон в  $V$ , к нему можно добавить ещё один вектор  $\bar{x} \in V$  без потери линейной независимости  $\Rightarrow (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n, \bar{x})$  - базис в  $V$  (ЛНЗ система из  $n + 1$  векторов).

Теперь необходимо представить  $\bar{x}$  как следующую сумму:  $\bar{x} = \lambda_1 \bar{e}_1 + \dots + \lambda_n \bar{e}_n + \bar{e}_{n+1}$ , где  $\bar{e}_{n+1}$  ортогонален  $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$ . Тогда  $\bar{e}_{n+1} = \bar{x} - \lambda_1 \bar{e}_1 - \dots - \lambda_n \bar{e}_n$ . Рассмотрим  $(\bar{e}_{n+1}, \bar{e}_k) = (\bar{x} - \lambda_1 \bar{e}_1 - \dots - \lambda_n \bar{e}_n, \bar{e}_k) = (\bar{x}, \bar{e}_k) - \lambda_1 (\bar{e}_1, \bar{e}_k) - \dots - \lambda_n (\bar{e}_n, \bar{e}_k)$ . Так как  $\bar{e}_k$  ортогонально всем этим векторам, кроме  $\bar{e}_k$  и  $\bar{x}$ , это выражение равно  $(\bar{x}, \bar{e}_k) - \lambda_k (\bar{e}_k, \bar{e}_k)$ . Отсюда при  $\lambda_k = \frac{(\bar{x}, \bar{e}_k)}{(\bar{e}_k, \bar{e}_k)}$  векторы  $\bar{e}_{n+1}$  и  $\bar{e}_k$  ортогональны (зависит только от  $\lambda_k$ ). Составив таким образом все  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , получим выражение вектора  $\bar{e}_{n+1}$ , ортогонального всем векторам базиса  $W$ . Таким образом, векторы полученной системы  $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{n+1}$  попарно ортогональны (по предположению индукции)  $\Rightarrow$  линейно независимы  $\Rightarrow$  образуют базис в  $V$ . Разделив  $\bar{e}_{n+1}$  на его длину, получим, что все векторы базиса попарно ортогональны и имеют длину 1  $\Rightarrow V$  имеет ортонормированный базис, ч.т.д.  $\square$

**Следствие.** Любую систему ортогональных векторов длины 1 в векторном пространстве можно дополнить до ортонормированного базиса.

## Билет 11. Прямые и их уравнения

### 11.1 Определения прямой и направляющего вектора

Смотри пункт 5.3

### 11.2 Уравнения прямой

**Вывод формул (уравнения прямой).** Пусть  $l$  - прямая на плоскости:  $l = \{X : \overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OM} + t\bar{v}\}$ , где  $M$  - точка прямой,  $\bar{v}$  - её направляющий вектор. Если  $M = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ ,  $\bar{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ , то из совпадения координат совпадающих векторов  $\overrightarrow{OX}$

и  $(\overrightarrow{OM} + t\bar{v})$  верно следующее:  $X \in l : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$  (**параметрические уравнения прямой**).

Выразим  $t$  из первого уравнения и подставим во второе - получим:  $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b}$  (**каноническое уравнение прямой**). (Заметим, что данное выражение не определено при нулевых  $a$  или  $b$ , но очевидно, что они не равны нулю одновременно, а запись, где одна из дробей имеет знаменатель 0, иногда используется,

поэтому здесь и далее случай равенства нулю знаменателя может не рассматриваться как отдельный и будет означать, что числитель должен равняться 0)

Если известно, что прямой принадлежат  $M = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ , то  $\overrightarrow{MN} =$

$\begin{pmatrix} x_1 - x_0 \\ y_1 - y_0 \end{pmatrix}$  - направляющий вектор, т.е. каноническое уравнение прямых принимает вид  $\boxed{\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0}}$  (**уравнение прямой по двум точкам**).

Домножим каноническое уравнение прямой на знаменатели:  $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} \Rightarrow bx - bx_0 = ay - ay_0 \Rightarrow bx - ay + (ay_0 - bx_0) = 0$ . Такое уравнение обычно называют **общим уравнением прямой** и записывают как  $\boxed{Ax + By + C = 0}$ .

**Замечание.** Для прямых в пространстве подобным образом выводятся параметрические и каноническое уравнения.

**Замечание.** Заметим также, что из итоговой формулы вывода общего уравнения ( $bx - ay + (ay_0 - bx_0) = 0 \Rightarrow Ax + By + C = 0$ ) следует, что для прямой  $Ax + By + C = 0$  вектор  $(B, -A)$  (а соответственно и  $(-B, A)$ ) является направляющим.

## 11.3 Критерий уравнения прямой (нет в билете, важно)

**Утверждение.**  $Ax + By + C = 0$  является уравнением прямой  $\Leftrightarrow A$  и  $B$  не равны нулю одновременно.

*Доказательство.*

$\Rightarrow$  Если  $Ax + By + C = 0$ , то её направляющий вектор ненулевой, а значит вектор  $(-B, A)$  ненулевой, то есть одна из его координат  $\neq 0$ .

$\Leftarrow$  Пусть без ограничения общности  $A \neq 0$ . Тогда этому уравнению удовлетворяет точка  $(x_0, y_0) = (-\frac{C}{A}, 0)$ , а значит (нетрудно проверить) все удовлетворяющие ему точки имеют вид  $(x_0 + Bt, y_0 - At)$ , что соответствует прямой с такими параметрическими уравнениями.  $\square$

## Билет 12. Взаимное расположение прямых

### 12.1 Случай общих уравнений

**Теорема.** Прямые на плоскости параллельны (или совпадают)  $\Leftrightarrow$  их направляющие векторы пропорциональны.



*Доказательство.* Пусть  $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ ;  $l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$  - данные прямые. Рассмотрим систему уравнений, которой удовлетворяют координаты точек, принадлежащих обоим прямым: 
$$\begin{cases} A_1x + B_1y = -C_1 \\ A_2x + B_2y = -C_2 \end{cases}$$

Из курса алгебры (формула Крамера) известно, что система не является определённой  $\Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix} = 0$ . Таким образом, прямые параллельны или совпадают  $\Leftrightarrow$  имеют 0 или бесконечно много общих точек  $\Leftrightarrow A_1B_2 - A_2B_1 = 0 \Leftrightarrow (A_1 \ B_1)$  пропорционален  $(A_2 \ B_2)$ , ч.т.д.  $\square$

**Замечание.** Из этого также видно, что прямые совпадают  $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ .

## 12.2 Случай параметрических уравнений

**Следствие.** Прямые  $l_1 : \begin{cases} x = x_1 + a_1t \\ y = y_1 + b_1t \end{cases}$ ;  $l_2 : \begin{cases} x = x_2 + a_2t \\ y = y_2 + b_2t \end{cases}$  пересекаются

$\Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ . Условие совпадения прямых также можно записать через параметрические уравнения (вектор  $(x_2 - x_1 \ y_2 - y_1) = \lambda(a, b)$ ).

Из этого также следует, что через две различные точки проходит ровно одна прямая (все такие прямые совпадают).

## Билет 13. Пучки прямых

### 13.1 Определение пучка прямых

**Определение.** Собственным пучком прямых называется множество всех прямых, проходящих через данную точку, называемую центром пучка.

Несобственным пучком прямых называется множество всех прямых, параллельных данной прямой.

### 13.2 Уравнение собственного пучка прямых

**Теорема.** Пусть прямые  $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$  и  $l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$  задают собственный пучок (т.е. содержатся в нём и не совпадают). Тогда прямая  $l$  принадлежит пучку  $\Leftrightarrow l$  задаётся уравнением  $\lambda(A_1x + B_1y + C_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2) = 0$  (\*) для некоторых  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

*Доказательство.*

$\Leftarrow$  Пусть  $l$  задаётся уравнением (\*). Тогда, подставив в уравнение  $l$  центр пучка

$(x_0, y_0)$ , получим  $\lambda(0) + \mu(0) = 0$  (т.к. центр удовлетворяет уравнениям  $l_1, l_2$ ).  
 $\Rightarrow$  Пусть  $(x_0, y_0) \in l$ . Возьмём произвольную точку  $(x_1, y_1) \in l, (x_1, y_1) \neq (x_0, y_0)$ . Рассмотрим прямую вида (\*) с  $\lambda = -(A_2x_1 + B_2y_1 + C_2)$ ,  $\mu = (A_1x_1 + B_1y_1 + C_1) : -(A_2x_1 + B_2y_1 + C_2)(A_1x + B_1y + C_1) + (A_1x_1 + B_1y_1 + C_1)(A_2x + B_2y + C_2) = 0$ . Заметим, что это уравнение действительно задаёт прямую: в противном случае необходимы условия  $\lambda A_1 + \mu A_2 = \lambda B_1 + \mu B_2 = 0$ , но тогда  $(A_1, B_1)$  и  $(A_2, B_2)$  пропорциональны, а исходные прямые непараллельны. Такой прямой, очевидно, принадлежат точки  $(x_0, y_0)$  и  $(x_1, y_1)$ . Так как через две различные точки проходит ровно одна прямая, любая прямая из собственного пучка имеет вид (\*), ч.т.д.  $\square$

### 13.3 Уравнение несобственного пучка прямых

**Теорема.** Пусть прямые  $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$  и  $l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$  задают несобственный пучок (т.е. содержатся в нём и не совпадают). Тогда прямая  $l$  принадлежит пучку  $\Leftrightarrow l$  задаётся уравнением  $\lambda(A_1x + B_1y + C_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2) = 0$  (\*) для некоторых  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

*Доказательство.*

$\Leftarrow$  Так как  $l_1 \parallel l_2$ ,  $\frac{A_1}{B_1} = \frac{A_2}{B_2}$ . Тогда если  $l$  имеет вид (\*), то  $\frac{\lambda A_1 + \mu A_2}{A_1} = \lambda + \frac{\mu A_2}{A_1} = \lambda + \frac{\mu B_2}{B_1} = \frac{\lambda B_1 + \mu B_2}{B_1} \Rightarrow l \parallel l_1$ .

$\Rightarrow$  Пусть  $l$  принадлежит пучку. Так как направляющие векторы  $l, l_1$  и  $l_2$ ; пропорциональны, можем домножить уравнения на числа так, что коэффициенты перед переменными станут равны: пусть  $l_1 : Ax + By + C_1 = 0$ ;  $l_2 : Ax + By + C_2 = 0$ ;  $l : Ax + By + C_3 = 0$ . Тогда возьмём  $\lambda, \mu$  из следующей системы:

$$\begin{cases} C_1\lambda + C_2\mu = C_3 \\ \lambda + \mu = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{C_3 - C_2}{C_1 - C_2} \\ \mu = \frac{C_1 - C_3}{C_1 - C_2} \end{cases} \quad (C_1 \neq C_2, \text{ иначе } l_1 \text{ и } l_2 \text{ совпадают}).$$

Очевидно, что для таких  $\lambda, \mu$  уравнение  $l$  имеет вид (\*) (проверяется несложной подстановкой), ч.т.д.  $\square$

## Билет 14. Отрезки

### 14.1 Отрезки на плоскости

**Определение.** Пусть  $l$  - прямая,  $X_1(x_1, y_1), X_2(x_2, y_2) \in l$  и  $X_1 \neq X_2$ . Отрезком с концами  $X_1, X_2$  на плоскости называется множество всех точек, лежащих между  $X_1$  и  $X_2$  (на прямой  $l$ ). Обозначается  $[X_1, X_2]$ .

**Вывод формулы** (Уравнение отрезка). Пусть  $X \in [X_1, X_2]$ . Тогда знаем, что

$$\begin{cases} x = x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y = y_1 + t(y_2 - y_1) \end{cases} \quad (X \in l) \Rightarrow \begin{pmatrix} x - x_1 \\ y - y_1 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$t\overrightarrow{X_1X_2} = \overrightarrow{X_1X} \Rightarrow \overrightarrow{XX_2} = (1-t)\overrightarrow{X_1X_2}. \text{ Отсюда видно, что } |\overrightarrow{X_1X}| \text{ и } |\overrightarrow{XX_2}| <$$

$|\overrightarrow{X_1X_2}| \Leftrightarrow t \in [0, 1]$ . Отсюда

$$X \in [X_1, X_2] \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y = y_1 + t(y_2 - y_1) \\ t \in [0, 1] \end{cases}$$

**Определение.** Отрезком в произвольном аффинном пространстве называется множество точек  $[X_1, X_2] = \{X_1 + t\overrightarrow{X_1X_2}, t \in [0, 1]\}$

## Билет 15. Полуплоскости

### 15.1 Выпуклые множества

**Определение.** Множество  $X$  в произвольном аффинном пространстве называется выпуклым, если  $\forall X_1, X_2 \in X \quad [X_1, X_2] \subset X$ .

### 15.2 Полуплоскости как выпуклые множества

**Определение.** Пусть в аффинной системе координат  $l : Ax + By + C = 0$ . Множества  $\Pi_0^+ = \{X(x, y) : Ax + By + C \geq 0\}$  и  $\Pi_0^- = \{X(x, y) : Ax + By + C \leq 0\}$  называются замкнутыми полуплоскостями, а множества  $\Pi^+ = \{X(x, y) : Ax + By + C > 0\}$  и  $\Pi^- = \{X(x, y) : Ax + By + C < 0\}$  - открытыми полуплоскостями.

**Теорема.** Для любой прямой  $l : Ax + By + C = 0$  множества  $\Pi_0^+, \Pi_0^-, \Pi^+, \Pi^-$  выпуклы.

*Доказательство.* Рассмотрим  $\Pi_0^+$  (остальные аналогично).

Пусть  $X_1(x_1, y_1), X_2(x_2, y_2) \in \Pi_0^+$ . Знаем, что любая точка  $X \in [X_1, X_2]$  имеет координаты  $(tx_1 + (1-t)x_2, ty_1 + (1-t)y_2), 0 \leq t \leq 1$ . Тогда:

$$\begin{cases} Ax_1 + By_1 + C \geq 0 \\ Ax_2 + By_2 + C \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} tAx_1 + tBy_1 + tC \geq 0 \\ (1-t)Ax_2 + (1-t)By_2 + (1-t)C \geq 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A(tx_1 + (1-t)x_2) + B(ty_1 + (1-t)y_2) + C = 0 \Rightarrow X \in \Pi_0^+, \text{ ч.т.д.} \quad \square$$

## Билет 16. Углы между прямыми

### 16.1 Определение угла

**Определение.** Пусть  $l$  - прямая,  $O \in l$ ,  $\bar{v}$  - любой направляющий вектор  $l$ . Множества  $l^+ = \{O + \lambda\bar{v}, \lambda \geq 0\}$  и  $l^- = \{O + \lambda\bar{v}, \lambda \leq 0\}$  называются лучами, на которые  $O$  делит  $l$ .

**Замечание.** Если даны два луча с общим началом (обозначим их  $l_1^+, l_2^+$ ), то они являются подмножествами однозначно определённых прямых  $l_1, l_2$ , для которых можно выбрать направляющие векторы так, чтобы лучи соответствовали формуле из определения (назовём эти векторы  $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ ).

**Определение.** Углом на плоскости называется объединение двух лучей с общим началом. Величиной угла  $l_1^+ \cap l_2^+$  называется величина угла между векторами  $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ , определёнными как в замечании. Говорят, что один угол меньше другого, если величина первого угла меньше величины второго.

**Определение.** Угол называется прямым, если его величина равна  $\frac{\pi}{2}$  ( $\Leftrightarrow$  направляющие векторы лучей ортогональны). Угол называется развёрнутым, если его величина равна  $\pi$  ( $\Leftrightarrow$  образующие угол лучи дополняют друг друга до прямой).

**Замечание.** В дальнейшем будем иногда называть углом величину угла. Также аналогичным образом можно говорить о величине угла между вектором и прямой

### 16.2 Определение угла между двумя прямыми

**Определение.** Углом между двумя прямыми называется наименьший из углов, образованных лучами с началом в их точке пересечения этих прямых и лежащих на этих прямых, если прямые пересекаются. Если прямые параллельны или совпадают, то угол между ними равен нулю. Обозначается  $\angle(l_1 l_2)$ .

**Определение.** Прямые называются перпендикулярными, если угол между ними равен  $\frac{\pi}{2}$ .

**Определение.** Перпендикуляром, опущенным из данной точки на данную прямую, называется прямая, проходящая через точку и перпендикулярная прямой, либо отрезок этой прямой с концами в данной точке и точке пересечения прямой с данной.

## 16.3 Угол между прямыми в прямоугольной системе координат

**Вывод формулы** (Угол между прямыми в прямоугольной с.к.). Пусть  $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0, l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$  - прямые в прямоугольной системе координат. Тогда их направляющие векторы равны  $\begin{pmatrix} -B_1 \\ A_1 \end{pmatrix} = \bar{v}_1, \begin{pmatrix} -B_2 \\ A_2 \end{pmatrix} = \bar{v}_2$ . Отсюда (из выражения скалярного произведения):  $\cos \angle(l_1, l_2) = |\cos \angle(\bar{v}_1, \bar{v}_2)| = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$  (модуль в косинусе, а соответственно и в числителе формулы, позволяет сразу взять меньший угол).

## 16.4 Условие перпендикулярности. Нормаль

**Следствие.** Прямые  $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$  и  $l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$  перпендикулярны  $\Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ .

**Определение.** Нетрудно проверить, что в прямоугольной системе координат вектор  $\bar{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$  перпендикулярен вектору  $\begin{pmatrix} -B \\ A \end{pmatrix}$ , а значит и прямой  $l : Ax + By + C = 0$ . Вектор  $\bar{n}$  называется нормалью (нормальным вектором) прямой  $l$  (в прямоугольной с.к.)

**Замечание.** Любой вектор, коллинеарный нормали, также является нормалью, так как уравнения  $Ax + By + C = 0$  и  $\lambda Ax + \lambda By + \lambda C = 0$  задают одну и ту же прямую.

## Билет 17. Расстояние от точки до прямой

### 17.1 Определение расстояния между множествами точек

**Определение.** Пусть  $A, B$  - множества в точечно-евклидовом пространстве. Расстоянием от  $A$  до  $B$  называется число  $\inf\{|XY|, X \in A, Y \in B\}$ . Расстояние от точки до прямой определяется аналогично, когда  $A = \{X\}$  (его часто обозначают  $d(X, l)$ ).

**Замечание.** У множества из определения существует верхняя грань, т.к. оно является ограниченным снизу подмножеством действительных чисел (принцип полноты Вейерштрасса из курса математического анализа).

## 17.2 Расстояние от точки до прямой

**Теорема.** Расстояние от точки до прямой равно длине перпендикуляра, опущенного из этой точки на прямую.

*Доказательство.* Пусть заданы  $l : Ax + By + C = 0$  и  $X_0$  - произвольные прямая и точка. Выберем на  $l$  произвольную точку  $X_1$ . Проведём через  $X_0$  прямую  $l'$  с направляющим вектором  $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$  - она будет перпендикулярна  $l$ , а значит имеет с ней единственную общую точку - назовём её  $X_2$ . Имеем:  $|\overrightarrow{X_1 X_0}|^2 = (\overrightarrow{X_1 X_0}, \overrightarrow{X_1 X_0}) = (\overrightarrow{X_1 X_2} + \overrightarrow{X_2 X_0}, \overrightarrow{X_1 X_2} + \overrightarrow{X_2 X_0}) = |\overrightarrow{X_1 X_2}|^2 + |\overrightarrow{X_2 X_0}|^2 \geq |\overrightarrow{X_2 X_0}|^2$ . Отсюда  $|\overrightarrow{X_2 X_0}|^2$  - минимум всех расстояний между  $X$  и точкой прямой, т.е. он достигается в точке пересечения  $l$  и  $l'$ , ч.т.д.  $\square$

**Замечание.** Расстояние между двумя прямыми на плоскости  $\neq 0 \Leftrightarrow$  они параллельны и не совпадают (у них нет общих точек). В этом случае расстояние между ними равно расстоянию от любой точки одной прямой до другой.

**Вывод формулы** (Расстояние от точки до прямой в прямоугольной с.к.). Пусть  $X_0 = (x_0, y_0)$ ,  $l : Ax + By + C = 0$ . Посчитаем  $d(X_0, l)$ . Проведём через  $X_0$  перпендикуляр  $l'$  к прямой  $l$ . Направляющий вектор  $l'$  -  $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ , то есть его пара-

метрические уравнения -  $\begin{cases} x = x_0 + At \\ y = y_0 + Bt \end{cases}$ . Найдём  $t_1$ , удовлетворяющее точке

пересечения: имеем  $A(x_0 + At_1) + B(y_0 + Bt_1) + C = 0 \Rightarrow t_1 = -\frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}$ .

Отсюда точка пересечения  $X_1$  имеет координаты  $(x_0 + At_1, y_0 + Bt_1)$ . Тогда

$\overrightarrow{X_0 X_1} = \begin{pmatrix} At_1 \\ Bt_1 \end{pmatrix} \Rightarrow |\overrightarrow{X_0 X_1}|^2 = A^2 t_1^2 + B^2 t_1^2 = (A^2 + B^2) t_1^2 = \frac{(Ax_0 + By_0 + C)^2}{A^2 + B^2}$ , а значит

$$d(X, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Мораль в том, что дальше очев...

(по КТО, разумеется, идите читать тч от yakovlevki))