

BREF RESUME HEBDOMADAIRE DU PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DU PAYS (S14)

1. Grandes tendances à la S14/2026

Tableau résumé des maladies à potentiel épidémique. S14/2026

MALADIE	CAS	DÉCÈS	LÉTALITÉ (%)	OBSERVATION
Choléra	23	0	0%	En baisse (-98.26%) par rapport à la S13
Fièvre jaune	9	0	0%	En baisse (-80.85%) par rapport à la S13
Méningite	2	0	0%	En baisse (-98.11%) par rapport à la S13
Monkeypox	18	0	0%	En baisse (-97.67%) par rapport à la S13
FHA	0	0	0%	En baisse (-100.0%) par rapport à la S13
Rougeole	17	2	11.76%	En baisse (-99.55%) par rapport à la S13
Tétanos néonatal	1	1	100%	En baisse (-92.31%) par rapport à la S13
TOTAL	70	3	4.29%	—

2. Commentaires

a. Choléra




Figure. Répartition des cas et létalité de Choléra en RDC, S14/2026.

Commentaires : Au cours de la semaine épidémiologique S14 de l'année 2026, 23 cas de choléra ont été notifiés, marquant une diminution significative par rapport à la semaine précédente (S13/2026) où 1324 cas avaient été enregistrés, soit une variation de -98.3%. En comparaison avec la même période en 2025, les données cumulées montrent une augmentation des cas cumulés, passant de 16435 à 19015, représentant une variation inter-annuelle de +15.7%. La province touchée cette semaine est l'Équateur. Il est essentiel de maintenir une surveillance rigoureuse et de renforcer les mesures de riposte pour prévenir toute résurgence de la maladie.

b. Fièvre jaune




Figure. Répartition des cas et létalité de Fièvre jaune en RDC, S14/2026.

Commentaires : Au cours de la semaine S14 de l'année 2026, un total de 9 cas de fièvre jaune a été notifié, marquant une diminution significative de 38 cas par rapport à la semaine précédente (S13/2026), soit une baisse de 80.8%. En comparaison avec la période cumulée de l'année 2025, où 495 cas avaient été enregistrés, l'année 2026 présente une légère augmentation avec 502 cas cumulés à ce jour. La province de BAS-UELE reste la seule province touchée. Il est essentiel de maintenir les mesures de surveillance et de riposte pour prévenir toute résurgence de la maladie.

c. Méningite




Figure. Répartition des cas et létalité de Méningite en RDC, S14/2026.

Commentaires : Au cours de la semaine épidémiologique S14 de l'année 2026, deux cas de méningite ont été notifiés, marquant une diminution significative de 98,1 % par rapport à la semaine précédente (S13/2026) où 106 cas avaient été enregistrés. En comparaison avec la même période de l'année précédente, les données cumulatives montrent une baisse des cas, avec 1559 cas cumulés en 2026 contre 1678 en 2025, représentant une variation de -7,1 %. La province touchée cette semaine est l'Équateur. Il est essentiel de maintenir les mesures de surveillance et de riposte pour prévenir toute résurgence de la maladie.

d. Monkeypox




Figure. Répartition des cas et létalité de Monkeypox en RDC, S14/2026.

Commentaires : La semaine S14 de l'année 2026 a enregistré 18 cas notifiés de Monkeypox, marquant une diminution significative de 753 cas par rapport à la semaine précédente (S13/2026), soit une baisse de 97.7%. En comparaison avec la même période en 2025, le total cumulé des cas pour S1-S14/2026 s'élève à 11,747, contre 32,118 cas pour l'année précédente, représentant une variation inter-annuelle de -63.4%. Les provinces les plus touchées cette semaine sont le Bas-Uele et l'Équateur. Aucune mesure de surveillance ou de riposte spécifique n'est mentionnée, mais la situation actuelle nécessite une attention continue pour maintenir cette tendance à la baisse.

e. FHA




Figure. Répartition des cas et létalité de FHA en RDC, S14/2026.

Commentaires : Aucun cas de FHA n'a été notifié au cours de la semaine épidémiologique S14. Cumulativement depuis la S1/2026, 19 cas ont été enregistrés contre 330 cas pour la même période en 2025. La surveillance reste active.

f. Rougeole




Figure. Répartition des cas et létalité de Rougeole en RDC, S14/2026.

Commentaires : Au cours de la semaine S14 de l'année 2026, 17 cas de rougeole ont été notifiés, avec 2 décès, entraînant une létalité de 11.76%. Cette situation représente une diminution significative par rapport à la semaine précédente (S13/2026) où 3778 cas avaient été enregistrés, soit une baisse de 99.5%. En comparaison avec la même période de l'année 2025, les données cumulatives montrent une augmentation de 180.2% des cas, passant de 15844 à 44388 cas cumulés. Les provinces les plus touchées cette semaine sont l'Équateur et le Bas-Uele. Il est essentiel de maintenir des mesures de surveillance renforcées pour prévenir toute résurgence de la maladie.

g. Tétanos néonatal




Figure. Répartition des cas et létalité de Tétanos néonatal en RDC, S14/2026.

Commentaires : Au cours de la semaine S14 de l'année 2026, un cas de tétanos néonatal a été notifié, entraînant un décès, ce qui correspond à une létalité de 100%. Cette situation marque une diminution significative par rapport à la semaine précédente (S13/2026) où 13 cas avaient été enregistrés, soit une baisse de 92,3%. En comparaison avec la même période en 2025, les données cumulatives montrent une légère augmentation des cas cumulés (123 en 2026 contre 121 en 2025) et une létalité cumulée plus élevée (55,28% en 2026 contre 49,59% en 2025). La province de Bas-Uele est la seule touchée cette semaine. Il est essentiel de maintenir une surveillance renforcée et d'intensifier les mesures de riposte pour prévenir de nouveaux cas.

3. Tableau comparatif 2025 — 2026

Tableau comparatif des cas et décès S1-S14 (2025 vs 2026)

	Cumul S1-S14 / 2025		Cumul S1-S14 / 2026		Semaine 11		Semaine 12		Semaine 13		Semaine 14	
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Déc.	Cas	Déc.	Cas	Déc.	Cas	Déc.
Choléra	16 435	353	19 015	522	1360	33	1208	30	1324	64	23	0
Fièvre jaune	495	22	502	13	50	0	31	0	47	0	9	0
Méningite	1678	117	1559	94	119	12	130	5	106	4	2	0
Monkeypox	32 118	394	11 747	133	899	9	730	12	771	8	18	0
FHA	330	1	19	6	3	2	1	0	4	1	0	0
Rougeole	15 844	262	44 388	429	3 789	38	3 955	25	3 778	33	17	2
Tétanos néonatal	121	60	123	68	19	13	14	9	13	9	1	1
TOTAL	67 021	1 209	77 353	1 265	6 239	107	6 069	81	6 043	119	70	3

Autres informations

RAS.

II. RECOMMANDATIONS

- Renforcer la surveillance épidémiologique des maladies notifiées, en particulier pour la rougeole, qui a enregistré une augmentation significative des cas en 2026 (44388 cas) par rapport à 2025 (15844 cas).
- Mettre en place des campagnes de sensibilisation ciblées sur la vaccination contre la rougeole, afin d'augmenter la couverture vaccinale et de prévenir de futurs cas.
- Continuer à surveiller les cas de choléra, fièvre jaune, méningite, monkeypox et tétanos néonatal, qui montrent une tendance à la baisse, tout en maintenant des mesures de prévention et de contrôle.
- Évaluer les protocoles de prise en charge des cas de tétanos néonatal, en raison de la létalité observée (1 décès sur 1 cas) et de la nécessité d'améliorer les soins néonataux.
- Promouvoir des initiatives de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement pour prévenir les épidémies de choléra, malgré la baisse des cas observée en 2026 (19015 cas) par rapport à 2025 (16435 cas).
- Renforcer la formation des agents de santé sur la gestion des cas de monkeypox, en raison de la persistance de cas (11747 cumulés en 2026) et de la nécessité d'une réponse rapide.
- Établir des partenariats avec des organisations locales pour améliorer la sensibilisation et la prévention des maladies, en particulier dans les provinces touchées par la rougeole et le monkeypox.
- Suivre de près l'évolution des cas de méningite, malgré la baisse observée (1559 cas en 2026 contre 1678 en 2025), afin de garantir une réponse rapide en cas de résurgence.
- Maintenir une communication régulière avec les communautés pour informer sur l'absence de cas de FHA et encourager la vigilance face aux symptômes des maladies transmissibles.