

Обработка данных:

Размеры тел

	a_k	a	b	c	$h_{\text{ц}}$	$r_{\text{ц}}$	$h_{\text{д}}$	$r_{\text{д}}$
значение, см	9.2	9.9	4.9	14.9	9.6	4.3	1.6	6.15
ε	0.0005	0.0005	0.001	0.0003	0.0005	0.0012	0.0031	0.0008

Таблица 1: Размеры исследуемых тел и их погрешности

Абсолютная погрешность измерения размеров линейкой составляет 0.005 см.

Периоды колебаний

T	T_{1z}	T_{1x}	T_{1y}	T_{1d}	T_{1e}	T_{1p}	T_{1m}	T_{2x}	T_{2y}	T_{2z}
$T_{\text{ср}}, \text{с}$	3.053	3.058	3.061	3.06	3.064	3.063	3.064	3.8	4.102	3.255
$\sigma_{\text{случ}}, \text{с}$	0.01	0.004	0.008	0.007	0.008	0.005	0.007	0.026	0.009	0.01
$\sigma_{\text{полн}}, \text{с}$	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.133	0.13	0.13
$\varepsilon_{\text{полн}}$	0.0427	0.0425	0.0425	0.0426	0.0425	0.0425	0.0425	0.0349	0.0318	0.0401

T	T_{2d}	T_{2e}	T_{2m}	T_{2p}	T_p	T_{3x}	T_{3y}	T_{4x}	T_{4y}
$T_{\text{ср}}, \text{с}$	3.492	3.358	3.878	3.446	2.557	3.506	4.506	3.266	3.247
$\sigma_{\text{случ}}, \text{с}$	0.009	0.011	0.017	0.008	0.007	0.398	0.453	0.457	0.366
$\sigma_{\text{полн}}, \text{с}$	0.13	0.13	0.131	0.13	0.13	0.419	0.472	0.475	0.388
$\varepsilon_{\text{полн}}$	0.0373	0.0389	0.0338	0.0378	0.0509	0.1195	0.1046	0.1455	0.1196

Таблица 2: Средние значения периодов колебаний ($T_{\text{ср}}$) и их погрешности

Систематическая погрешность для всех измерений одинакова и складывается из погрешности секундомера и скорости реакции экспериментатора, которая определяется с помощью измерения временного промежутка между двумя нажатиями на кнопку. В моем случае скорость реакции составляет 0.13 с, а погрешность секундомера - 0.001 с, следовательно ей можно пренебречь и принять систематическую погрешность равной 0.13 с.

Проверка соотношений периодов

- Параллелепипед

$$\frac{a^2 T_{2x}^2 + b^2 T_{2y}^2 + c^2 T_{2z}^2}{a^2 + b^2 + c^2} = T_{2d}^2, \quad \frac{a^2 T_{2x}^2 + b^2 T_{2y}^2 + c^2 T_{2z}^2}{a^2 + b^2 + c^2} = (12.125 \pm 0.6219)c^2, \quad T_{2d}^2 = (12.194 \pm 0.26)c^2$$

$$\frac{b^2 T_{2y}^2 + c^2 T_{2z}^2}{c^2 + b^2} = T_{2e}^2, \quad \frac{b^2 T_{2y}^2 + c^2 T_{2z}^2}{c^2 + b^2} = (11.203 \pm 0.7708)c^2, \quad T_{2e}^2 = (11.276 \pm 0.26)c^2$$

$$\frac{a^2 T_{2x}^2 + c^2 T_{2z}^2}{c^2 + a^2} = T_{2p}^2, \quad \frac{a^2 T_{2x}^2 + c^2 T_{2z}^2}{c^2 + a^2} = (11.773 \pm 0.6637)c^2, \quad T_{2p}^2 = (11.875 \pm 0.26)c^2$$

$$\frac{b^2 T_{2y}^2 + a^2 T_{2x}^2}{a^2 + b^2} = T_{2m}^2, \quad \frac{b^2 T_{2y}^2 + a^2 T_{2x}^2}{a^2 + b^2} = (14.91 \pm 0.8386)c^2, \quad T_{2m}^2 = (15.039 \pm 0.262)c^2$$

- Куб

В справедливости соотношения: $T_{1z} = T_{1x} = T_{1y} = T_{1d} = T_{1e} = T_{1p} = T_{1m}$ можно убедиться, исходя из таблицы 2.

$$\frac{T_{1x}^2 + T_{1y}^2 + T_{1z}^2}{3} = T_{1d}^2, \quad \frac{T_{1x}^2 + T_{1y}^2 + T_{1z}^2}{3} = (9.347 \pm 0.4587)c^2, \quad T_{1d}^2 = (9.364 \pm 0.26)c^2$$

$$\frac{T_{1y}^2 + T_{1z}^2}{2} = T_{1e}^2, \quad \frac{T_{1y}^2 + T_{1z}^2}{2} = (9.982 \pm 0.562)c^2, \quad T_{1e}^2 = (9.388 \pm 0.26)c^2$$

$$\frac{T_{1x}^2 + T_{1z}^2}{2} = T_{1p}^2, \quad \frac{T_{1x}^2 + T_{1z}^2}{2} = (9.973 \pm 0.5617)c^2, \quad T_{1p}^2 = (9.382 \pm 0.26)c^2$$

$$\frac{T_{1y}^2 + T_{1x}^2}{2} = T_{1m}^2, \quad \frac{T_{1y}^2 + T_{1x}^2}{2} = (11.905 \pm 0.5625)c^2, \quad T_{1m}^2 = (9.388 \pm 0.26)c^2$$

- Цилиндр

$$\frac{T_{3y}^2}{T_{3x}^2} = 1 + \frac{h_{\text{ц}}^2}{3r_{\text{ц}}^2}, \quad \frac{T_{3y}^2}{T_{3x}^2} = (1.652 \pm 0.525), \quad 1 + \frac{h_{\text{ц}}^2}{3r_{\text{ц}}^2} = (2.661 \pm 0.0042)$$

- Диск

$$\frac{T_{4y}^2}{T_{4x}^2} = 1 + \frac{h_{\text{д}}^2}{3r_{\text{д}}^2}, \quad \frac{T_{4y}^2}{T_{4x}^2} = (0.988 \pm 0.3721), \quad 1 + \frac{h_{\text{д}}^2}{3r_{\text{д}}^2} = (1.023 \pm 0.0001)$$

Эллипсоиды инерции

Поскольку мы не знаем сами моменты инерции, но знаем их соотношения и пропорциональность квадратам периодов, построим эллипсоиды в произвольном масштабе.

- Параллелепипед

$$A = \frac{1}{\sqrt{T_{2x}^2 + T_p^2}} = 0.356, \quad B = \frac{1}{\sqrt{T_{2y}^2 + T_p^2}} = 0.312, \quad C = \frac{1}{\sqrt{T_{2z}^2 + T_p^2}} = 0.496$$