



Софийски университет „Св. Климент Охридски“  
Факултет по математика и информатика

# ТЕМА ЗА ПРОЕКТ

към курс „Функционално програмиране“  
за специалности Информатика, Компютърни науки (2 поток)  
и избираема дисциплина  
зимен семестър 2024/25 г.

## Извод на типове

Synopsis: Имплементирайте система за извеждане на типове в ламбда смятането.

Ламбда смятането (lambda calculus) е формална система в математическата логика, която описва изчисленията само на базата на абстракция (построяване) на функции и апликация (прилагане) на функции върху променливи и/или други функции чрез замяна на свързани променливи. Термовете (изразите) в ламбда смятането се построяват по следните правила:

- ако  $x$  е променлива, то  $x$  е терм. Приемаме, че разполагаме с изброимо безкраен списък с променливи. +
- 
- ако  $M$  и  $N$  са термове, то  $(MN)$  е терм, получен от прилагането на терма  $M$  над  $N$ . Прилагането е ляво асоциативна операция и когато пишем  $MNP$ , ще подразбираме  $((MN)P)$ .
- ако  $M$  е терм, а  $x$  е променлива, то  $\lambda x.M$  е терм, получен като построяване на функция с аргумент  $x$  и тяло  $M$ . За удобство вместо  $\lambda x.\lambda y....$  можем да пишем  $\lambda xy.$

Примери за ламбда термове:  $\lambda x.x$ ,  $\lambda x.y$ ,  $\lambda xy.x$ ,  $\lambda fx.f(fx)$ ,  $\lambda xyz.xz(yz)$

Едно от свойствата, които даден терм може да има, е тип. Типовете се построяват по следните правила:

- ако  $\alpha$  е типова променлива, то  $\alpha$  е тип

- ако  $\sigma$  и  $\tau$  са типове, то  $\sigma \rightarrow \tau$  е тип на функция, приемаща аргумент от тип  $\sigma$  и връщаща резултат от тип  $\tau$ . Операцията  $\rightarrow$  е дясноасоциативна и когато пишем  $\rho \rightarrow \sigma \rightarrow \tau$ , ще подразбираме  $(\rho \rightarrow (\sigma \rightarrow \tau))$ .

Примери за типове:  $\alpha \rightarrow \alpha$ ,  $\alpha \rightarrow \beta$ ,  $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha$ ,  $(\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha$

Важно свойство на типовете, които разглеждаме е, че те са *крайни*, правещи невъзможно съществуването на безкраен тип от рода на  $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \dots$ . За целите на този проект можем да считаме, че няма и безкрайни ламбда термове.

Ще обозначаваме твърдението “термът  $M$  има тип  $\tau$ ” с  $M:\tau$ . За да определим типа на даден терм, първо е необходимо да направим някакви допускания за типовете на променливите, които участват в него. При различни допускания за променливите е възможно да се получи различен тип на терма. Затова ще разглеждаме твърдения от вида “при допускания  $\Gamma$  термът  $M$  има тип  $\tau$ ”, където  $\Gamma$  е множество от допускания от вида  $M:\tau$ . Така можем да определим типа на произволен термов чрез следните правила

- ако  $M:\sigma \rightarrow \tau$  и  $N:\sigma$  при едни и същи допускания  $\Gamma$ , то  $(MN):\tau$  при същите допускания  $\Gamma$
- ако  $M:\tau$  при допускания  $\Gamma$ , сред които присъства и  $x:\sigma$ , то  $(\lambda x.M):\sigma \rightarrow \tau$  при допускания  $\Gamma$  с премахнато вече използваното допускане  $x:\sigma$ .

Примери:  $xu:\tau$  при допускания  $x:\sigma \rightarrow \tau$  и  $y:\sigma$ ,  $\lambda x.xu:(\sigma \rightarrow \tau) \rightarrow \tau$  при допускане  $y:\sigma$ ,  $\lambda ux.xu:\sigma \rightarrow (\sigma \rightarrow \tau) \rightarrow \tau$  без използването на допускания.

Целта на този проект е по даден ламбда терм, например  $\lambda xy.x(xy)$  или  $\lambda xyz.xz(yz)$ , да се изведе негов тип (ако има такъв) чрез типов извод. Извеждането на тип се получава по следната стратегия:

- за да намерим типа  $\tau$  на терм от вида  $(MN)$ , трябва първо да намерим такъв тип  $\sigma$ , такъв че  $M:\sigma \rightarrow \tau$  и  $N:\sigma$
- за да намерим типа на терм от вида  $(\lambda x.M)$ , можем да допуснем, че  $x:\sigma$  за някой неизползван до момент тип  $\sigma$  и след това да потърсим типа на тялото  $M$  с добавеното ново допускане, че  $x:\sigma$ . Ако в процеса на търсене определим, че  $M:\tau$ , то ще знаем, че  $(\lambda x.M):\sigma \rightarrow \tau$ .
- в дъното на рекурсивното търсене ще ни се наложи да потърсим типа на променлива  $x$ ; този тип можем да определим като погледнем в натрупаните допускания за предположение от вида  $x:\sigma$ .

Пример: За да намерим типа на терма  $\lambda ux.xu$ :

- допускаме, че  $y:\sigma$

- за да намерим типа на терма  $\lambda x. xy$ :
  - допускаме, че  $x : \rho$
  - за да намерим типа на терма  $xy$ :
    - търсим типа на терма  $y$ 
      - но по допускане имаме  $y : \sigma$
    - търсим типа на терма  $x$  от вида  $\sigma \rightarrow \tau$ 
      - но по допускане имаме  $x : \rho$
      - полагаме  $\rho := \sigma \rightarrow \tau$
      - така получаваме  $x : \sigma \rightarrow \tau$
    - така получаваме  $xy : \tau$
  - така получаваме  $\lambda x. xy : \rho \rightarrow \tau$
  - но  $\rho = \sigma \rightarrow \tau$
  - затова получаваме  $\lambda x. xy : (\sigma \rightarrow \tau) \rightarrow \tau$
- така получаваме, че  $\lambda x. xy : \sigma \rightarrow (\sigma \rightarrow \tau) \rightarrow \tau$

Примерно описание на идеята за типов извод и основните дефиниции в ламбда смятане можете да намерите [тук](#).