



APRENDE CON ELI

ESTADÍSTICA

Intervalos de Confianza

2 parámetros desconocidos

Se toman dos m.a.s. independientes de dos v.a. X e Y . El tamaño de las muestras son n y m , las medias muestrales \bar{x} e \bar{y} , varianzas σ_X^2 y σ_Y^2 (en caso de que se conozcan) y cuasidesviaciones típicas muestrales s_{1X} y s_{1Y} , respectivamente.

IC PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE DOS POBLACIONES NORMALES CON VARIANZAS CONOCIDAS

Función pivote:

$$\frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} \sim N(0,1)$$

Intervalo:

$$IC(\mu_X - \mu_Y) = (\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}$$

IC PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE DOS POBLACIONES NORMALES CON VARIANZAS DESCONOCIDAS PERO IGUALES

Función pivote:

$$\frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{s^* \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t_{n+m-2} \quad \text{donde } s^* = \sqrt{\frac{(n-1)s_{1X}^2 + (m-1)s_{1Y}^2}{n+m-2}}$$

Intervalo:

$$IC(\mu_X - \mu_Y) = (\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{n+m-2; \frac{\alpha}{2}} \cdot s^* \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}$$

IC PARA EL COCIENTE DE VARIANZAS DE DOS POBLACIONES NORMALES

Función pivote:

$$\frac{s_1^2/\sigma_X^2}{s_1^2/\sigma_Y^2} \sim F_{(n-1);(m-1)}$$

Intervalo:

$$IC(\sigma_X^2/\sigma_Y^2) = \left[\frac{s_1^2}{\lambda_2 s_1^2}; \frac{s_1^2}{\lambda_1 s_1^2} \right]$$

IC PARA LA DIFERENCIA DE PROPORCIONES DE DOS POBLACIONES NO NORMALES PERO EN MUESTRAS GRANDES ($n \geq 30$).

Sean X e Y dos v.a. no Normales, con p_X y p_Y las proporciones poblacionales desconocidas. Las proporciones muestrales son \hat{p}_X y \hat{p}_Y , y los tamaños muestrales n y m son como mínimo 30.

Función pivote:

$$\frac{(\hat{p}_X - \hat{p}_Y) - (p_X - p_Y)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_X(1-\hat{p}_X)}{n} + \frac{\hat{p}_Y(1-\hat{p}_Y)}{m}}} \sim N(0,1)$$

Intervalo:

$$IC(p_X - p_Y) = (\hat{p}_X - \hat{p}_Y) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_X(1-\hat{p}_X)}{n} + \frac{\hat{p}_Y(1-\hat{p}_Y)}{m}}$$