

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS

1. Definición y ejemplos.
2. Caminos más cortos.
3. Grafos acíclicos. Método del camino crítico.
4. Algoritmo de Dijkstra.
5. Caminos más cortos entre todos los pares de vértices. Método de Floyd-Warshall.
6. Árboles generadores de mínimo peso.

1. DEFINICIÓN Y EJEMPLOS

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.


DEFINICIÓN:

Un grafo simple $G = (V, A)$ (grafo simple dirigido, respectivamente) diremos que es un grafo ponderado si tiene asociada una función **$W: A \longrightarrow R$** , llamada **función de ponderación**.

La imagen de cada arista (arco, respectivamente) determinada por los vértices v_i y v_j la llamaremos peso de la arista (arco) y lo denotaremos por w_{ij} .

EJEMPLO: $G=(V,A)$, $V=\{1,2,3,4\}$, $A=\{\{1,3\},\{2,4\},\{3,4\},\{1,4\}\}$.
Asociando la función W

$$W: A \longrightarrow R \begin{cases} W(\{1,3\}) = 0.5 \\ W(\{2,4\}) = 0.4 \\ W(\{3,4\}) = 1.2 \\ W(\{1,4\}) = 2.7 \end{cases}$$



1. DEFINICIÓN Y EJEMPLOS


Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

DEFINICIÓN:

Sea $G = (V, A)$ un grafo ponderado finito tal que $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Llamaremos **matriz de peso** del grafo G a la siguiente matriz de orden $n \times n$:

$$\Omega = [a_{ij}] / a_{ij} = \begin{cases} \omega_{ij} & \text{si } \{v_i, v_j\} \in A \text{ (si } (v_i, v_j) \in A, \text{ en el caso dirigido)} \\ \infty & \text{si } \{v_i, v_j\} \notin A \text{ (si } (v_i, v_j) \notin A, \text{ en el caso dirigido)} \end{cases}$$

EJEMPLO:



$$\begin{bmatrix} \infty & \infty & 0.5 & 2.7 \\ \infty & \infty & \infty & 0.4 \\ 0.5 & \infty & \infty & 1.2 \\ 2.7 & 0.4 & 1.2 & \infty \end{bmatrix}$$

1. DEFINICIÓN Y EJEMPLOS

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

DEFINICIÓN:

En un grafo ponderado llamamos **peso de un camino** a la suma de los pesos de las aristas (arcos respectivamente) que lo forman.


EJEMPLO: Los únicos caminos del vértice 1 al 2 son:

$$C_1 \equiv 1 \ 3 \ 4 \ 2$$

$$\omega(C_1) = \omega(\{1, 3\}) + \omega(\{3, 4\}) + \omega(\{4, 2\}) = 0.5 + 1.2 + 0.4 = 2.1$$

$$C_2 \equiv 1 \ 4 \ 2$$

$$\omega(C_2) = \omega(\{1, 4\}) + \omega(\{4, 2\}) = 2.7 + 0.4 = 3.1$$



1. DEFINICIÓN Y EJEMPLOS

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

DEFINICIÓN:

- En un grafo ponderado llamamos **camino más corto** entre dos vértices dados al camino de peso mínimo entre dichos vértices.
- En un grafo ponderado llamaremos **camino más largo** o **camino crítico** entre dos vértices dados al camino de peso máximo entre dichos vértices.

EJEMPLO:

$$C_1 \equiv 1 \ 3 \ 4 \ 2$$


Camino más corto

$$\omega(C_1) = \omega(\{1, 3\}) + \omega(\{3, 4\}) + \omega(\{4, 2\}) = 0.5 + 1.2 + 0.4 = 2.1$$

$$C_2 \equiv 1 \ 4 \ 2$$

Camino más largo – Camino crítico

$$\omega(C_2) = \omega(\{1, 4\}) + \omega(\{4, 2\}) = 2.7 + 0.4 = 3.1$$



2. CAMINOS MÁS CORTOS

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

Supondremos que los pesos asociados a los arcos son todos no negativos y que el grafo es dirigido.

Supondremos además que los vértices del grafo están numerados de **1** a **n**, de forma que w_{ij} representa el peso del arco (i,j) y que el vértice **1** es el origen del camino.

Además u_j denotará el peso del c.m.c. (camino más corto) de **1** a **j**.

TEOREMA

Sea **1**,...,**k**,...,**j** un c.m.c. entre los vértices **1** y **j** de un grafo ponderado G . Entonces las secciones de este camino **1**,...,**k** y **k**,...,**j** son los caminos más cortos entre los vértices respectivos.

2. CAMINOS MÁS CORTOS

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

COROLARIO:

Supongamos que en un grafo ponderado tenemos un camino más corto entre los vértices **1** y **j**. Sea **k** el vértice inmediatamente anterior a **j** en este camino. Entonces la sección de este camino desde **1** a **k** es el camino más corto entre estos dos vértices. Además:

$$u_j = u_k + w_{kj}$$

ECUACIONES DE BELLMAN

$$u_1 = 0$$

$$u_j = \min_{k \neq j} \{u_k + w_{kj}\} \quad j = 2, \dots, n$$

2. CAMINOS MÁS CORTOS

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO:

Consideremos el grafo ponderado con 4 vértices, definido por la siguiente matriz de pesos:

$$\Omega = \begin{bmatrix} \infty & 5 & 3 & 2 \\ \infty & \infty & 2 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 4 \\ \infty & 2 & \infty & \infty \end{bmatrix}$$

Si aplicamos las ecuaciones de Bellman a este grafo, para calcular los pesos de los caminos más cortos del vértice \mathbf{v}_1 al resto:

$$u_1 = 0,$$

$$\begin{aligned} u_2 &= \min\{u_1 + \omega_{12}, u_3 + \omega_{32}, u_4 + \omega_{42}\} \\ &= \min\{5, \infty, u_4 + 2\} = \min\{5, \underline{u_4 + 2}\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= \min\{u_1 + \omega_{13}, u_2 + \omega_{23}, u_4 + \omega_{43}\} \\ &= \min\{3, u_2 + 2, \infty\} = \min\{3, \underline{u_2 + 2}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_4 &= \min\{u_1 + \omega_{14}, u_2 + \omega_{24}, u_3 + \omega_{34}\} \\ &= \min\{2, \infty, u_3 + 4\} = \min\{2, \underline{u_3 + 4}\} \end{aligned}$$

Vemos que obtenemos unas relaciones de precedencia cíclicas que impiden el cálculo de los valores u_j . Es debida a la existencia de un circuito: $\mathbf{v}_2\mathbf{v}_3\mathbf{v}_4\mathbf{v}_2$

2. CAMINOS MÁS CORTOS

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO:

Consideremos el grafo ponderado con 4 vértices, definido por la siguiente matriz de pesos:

$$\Omega = \begin{bmatrix} \infty & 5 & 3 & 2 \\ \infty & \infty & 2 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 4 \\ \infty & \infty & \infty & \infty \end{bmatrix}$$

Si aplicamos las ecuaciones de Bellman a este grafo, para calcular los pesos de los caminos más cortos del vértice \mathbf{v}_1 al resto:

$$u_1 = 0,$$

$$u_2 = \min\{u_1 + \omega_{12}, u_3 + \omega_{32}, u_4 + \omega_{42}\}$$

$$= \min\{5, \infty, \infty\} = 5,$$

$$u_3 = \min\{u_1 + \omega_{13}, u_2 + \omega_{23}, u_4 + \omega_{43}\}$$

$$= \min\{3, u_2 + 2, \infty\} = \min\{3, 5 + 2\} = 3,$$

$$u_4 = \min\{u_1 + \omega_{14}, u_2 + \omega_{24}, u_3 + \omega_{34}\}$$

$$= \min\{2, \infty, u_3 + 4\} = \min\{2, 3 + 4\} = 2.$$

Si eliminamos el arco
($\mathbf{v}_4, \mathbf{v}_2$)

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

TEOREMA:

Un grafo dirigido no tiene circuitos si y sólo si existe una numeración de los vértices para la que se cumple que si (i, j) es un arco del grafo entonces $i < j$.

Con esta numeración, las ecuaciones de Bellman pueden ser reemplazadas por:

$$u_1 = 0$$

$$u_j = \min_{k < j} \{u_k + w_{kj}\} \quad j = 2, \dots, n$$

$$u_j = \min_{k < j, v_k \in \Gamma^{-1}(v_j)} \{u_k + \omega_{kj}\}, \quad j = 2, \dots, n$$

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

ALGORITMO DE NUMERACIÓN

Etapa 1. Inicializar $i \leftarrow 1$, $V^{(1)} = V$.

Etapa 2. Tomar $v \in V^{(i)}$ tal que $d_e(v) = 0$ en $G[V_i]$.

Etapa 3. Numerar el vértice v como vértice i .

Hacer $V^{(i+1)} = V^{(i)} \sim \{v\}$.

Hacer $i \leftarrow i + 1$.

Etapa 4. Si $V^{(i)} = \emptyset$, entonces PARAR.

En otro caso, volver a la etapa 2.

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

ALG. DE NUMERACIÓN: EJEMPLO


$i = 1$.

$V^{(1)} = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$.

Tomamos $v_1 \in V^{(1)} / d_e(v_1) = 0$.

Vértice: v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8


Numer.: **1**



Numeramos v_1 con 1.

Eliminamos v_1 de $V^{(1)}$, es decir,

$V^{(2)} = V^{(1)} \sim \{v_1\}$.



3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.



ALG. DE NUMERACIÓN: EJEMPLO

$i = 2$.

$V^{(2)} = \{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$.

Tomamos $v_4 \in V^{(2)} / d_e(v_4) = 0$.

Vértice:	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8
Numer.:		1		2				



Numeramos v_4 con 2.

Eliminamos v_4 de $V^{(2)}$, es decir,

$V^{(3)} = V^{(2)} \sim \{v_4\}$.

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.



ALG. DE NUMERACIÓN: EJEMPLO

$i = 3$.

$V^{(3)} = \{v_2, v_3, v_5, v_6, v_7, v_8\}$.

Tomamos $v_2 \in V^{(3)} / d_e(v_2) = 0$.

Vértice:	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8
Numer.:		1	3		2			



Numeramos v_2 con 3.

Eliminamos v_2 de $V^{(3)}$, es decir,

$V^{(4)} = V^{(3)} \sim \{v_2\}$.

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.



ALG. DE NUMERACIÓN: EJEMPLO

$i = 4$.

$V^{(4)} = \{v_3, v_5, v_6, v_7, v_8\}$.

Tomamos $v_7 \in V^{(4)} / d_e(v_7) = 0$.

Vértice:	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8
Numer.:		1	3		2		4	



Numeramos v_7 con 4.

Eliminamos v_7 de $V^{(4)}$, es decir,

$V^{(5)} = V^{(4)} \sim \{v_7\}$.

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.



ALG. DE NUMERACIÓN: EJEMPLO

Vértice:	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8
Numer.:		1	3		2	5		4

$i = 5$.

$V^{(5)} = \{v_3, v_5, v_6, v_8\}$.

Tomamos $v_5 \in V^{(5)} / d_e(v_5) = 0$.



Numeramos v_5 con 5.

Eliminamos v_5 de $V^{(5)}$, es decir,
 $V^{(6)} = V^{(5)} \sim \{v_5\}$.

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.



ALG. DE NUMERACIÓN: EJEMPLO

Vértice:	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8
Numer.:	1	3	6	2	5	4		

$i = 6$.

$V^{(6)} = \{v_3, v_6, v_8\}$.

Tomamos $v_3 \in V^{(6)}$ / $d_e(v_3) = 0$.



Numeramos v_3 con 6.

Eliminamos v_3 de $V^{(6)}$, es decir,

$V^{(7)} = V^{(6)} \sim \{v_3\}$.

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.


ALG. DE NUMERACIÓN: EJEMPLO

Vértice:	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8
Numer.:	1	3	6	2	5	4	7	

$i = 7$.

$V^{(7)} = \{v_6, v_8\}$.

Tomamos $v_8 \in V^{(7)} / d_e(v_8) = 0$.



Numeramos v_8 con 7.

Eliminamos v_8 de $V^{(7)}$, es decir,

$V^{(8)} = V^{(7)} \sim \{v_8\}$.

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

ALG. DE NUMERACIÓN: EJEMPLO

Vértice:	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8
Numer.:	1	3	6	2	5	8	4	7

$i = 8$.



$V^{(8)} = \{v_6\}$.

Tomamos $v_6 \in V^{(8)} / d_e(v_6) = 0$.



Numeramos v_6 con 8.

Eliminamos v_6 de $V^{(8)}$, es decir,
 $V^{(9)} = V^{(8)} \sim \{v_6\} = \emptyset$.




3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO:

Consideremos el grafo dirigido de la siguiente figura:



Con la nueva numeración que acabamos de calcular, ya podemos aplicar las ecuaciones de Bellman

$$u_j = \min_{k < j, v_k \in \Gamma^{-1}(v_j)} \{u_k + \omega_{kj}\}, \quad j = 2, \dots, n$$

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO:

$$u_1 = 0,$$

$$u_2 = \min\{u_1 + \omega_{12}\} = 2,$$

$$u_3 = \min\{u_1 + \omega_{13}, \underline{u_2 + \omega_{23}}\} = \min\{6, 2 + 3\} = 5,$$


$$u_4 = \min\{u_1 + \omega_{14}, \underline{u_2 + \omega_{24}}\} = \min\{4, 2 + 1\} = 3,$$

$$u_5 = \min\{u_2 + \omega_{25}, u_3 + \omega_{35}, \underline{u_4 + \omega_{45}}\} = \min\{2 + 5, 5 + 4, 3 + 3\} = 6,$$

$$u_6 = \min\{u_3 + \omega_{36}, \underline{u_5 + \omega_{56}}\} = \min\{5 + 4, 6 + 2\} = 8,$$

$$u_7 = \min\{u_4 + \omega_{47}, \underline{u_5 + \omega_{57}}\} = \min\{3 + 6, 6 + 2\} = 8,$$

$$u_8 = \min\{u_5 + \omega_{58}, u_6 + \omega_{68}, \underline{u_7 + \omega_{78}}\} = \min\{6 + 5, 8 + 3, 8 + 1\} = 9.$$



3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO: IDENTIFICACIÓN DE CAMINOS

$$u_1 = 0,$$

$$u_2 = \min\{u_1 + \omega_{12}\} = 2,$$

$$u_3 = \min\{u_1 + \omega_{13}, \underline{u_2 + \omega_{23}}\} = \min\{6, 2 + 3\} = 5,$$


$$u_4 = \min\{u_1 + \omega_{14}, \underline{u_2 + \omega_{24}}\} = \min\{4, 2 + 1\} = 3,$$

$$u_5 = \min\{u_2 + \omega_{25}, u_3 + \omega_{35}, \underline{u_4 + \omega_{45}}\} = \min\{2 + 5, 5 + 4, 3 + 3\} = 6,$$

$$u_6 = \min\{u_3 + \omega_{36}, \underline{u_5 + \omega_{56}}\} = \min\{5 + 4, 6 + 2\} = 8,$$

$$u_7 = \min\{u_4 + \omega_{47}, \underline{u_5 + \omega_{57}}\} = \min\{3 + 6, 6 + 2\} = 8,$$

$$u_8 = \min\{u_5 + \omega_{58}, u_6 + \omega_{68}, \underline{u_7 + \omega_{78}}\} = \min\{6 + 5, 8 + 3, 8 + 1\} = 9.$$



3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

APLICACIÓN: PERT (Project Evaluation Research Task)

Existen proyectos de gran envergadura que incluyen la realización de un gran número de subtareas o actividades que están mutuamente relacionadas de diversas formas.

Por ejemplo, para realizar una determinada actividad es necesario que ciertas actividades hayan sido ya realizadas.

La realización de este tipo de proyectos hace necesaria una planificación racional de la actividad a desarrollar que se designa por el nombre genérico de PERT.

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

APLICACIÓN: PERT (Project Evaluation Research Task)

Uno de los métodos utilizados en el contexto PERT pasa por representar el proyecto mediante un grafo dirigido.

Cada actividad de la que se compone el proyecto se representa por un vértice \mathbf{v}_j .

Si para realizar la actividad \mathbf{v}_j es necesario haber realizado inmediatamente antes la actividad \mathbf{v}_i , incluimos un arco $(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j)$.

A este arco le asignaremos un peso \mathbf{w}_{ij} , que represente el tiempo entre el inicio de la act. \mathbf{v}_i y el inicio de la act. \mathbf{v}_j .

El grafo así construido es acíclico ya que la existencia de un circuito implicaría que el proyecto es irrealizable.



3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

APLICACIÓN: PERT (Project Evaluation Research Task)

Añadiremos un vértice ficticio que una los vértices con grado de entrada cero. Indicará el inicio del proyecto.

Añadiremos un vértice ficticio que una los vértices con grado de salida cero. Indicará el final del proyecto.



3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

APLICACIÓN: PERT (Project Evaluation Research Task)

Mínimo tiempo necesario para completar el proyecto en su totalidad:

Este camino se denomina **camino crítico** ya que las actividades que incluye determinan el tiempo total de realización del proyecto y cualquier retraso en la ejecución de una de ellas implica un retraso en la terminación del proyecto.

Es por ello que a estas actividades se las denomina **actividades críticas**.

¿Cómo calcularlo?


$$\begin{aligned}u_1 &= 0, \\ u_j &= \max_{k < j, v_k \in \Gamma^{-1}(v_j)} \{u_k + \omega_{kj}\}, \quad j = 2, \dots, n,\end{aligned}$$

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO


Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO 1: PERT

Calculemos el mínimo número de días en que puede completarse el siguiente proyecto.



Primero: calcular nueva numeración



3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO 1: PERT

Segundo: Aplicar ec. de Bellman

$$u_1 = 0,$$

$$u_2 = \max \{u_1 + \omega_{12}\} = 5,$$

$$u_3 = \max \{u_1 + \omega_{13}, \underline{u_2 + \omega_{23}}\} = \max\{5, 5 + 7\} = 12,$$

$$u_4 = \max \{u_1 + \omega_{14}, \underline{u_2 + \omega_{24}}\} = \max\{5, 5 + 7\} = 12,$$

$$u_5 = \max \{\underline{u_3 + \omega_{35}}, u_4 + \omega_{45}\} = \max\{12 + 10, 12 + 4\} = 22,$$

$$u_6 = \max \{u_3 + \omega_{36}, \underline{u_5 + \omega_{56}}\} = \max\{12 + 10, 22 + 6\} = 28,$$


$$u_7 = \max \{u_4 + \omega_{47}, \underline{u_5 + \omega_{57}}\} = \max\{12 + 4, 22 + 6\} = 28,$$

$$u_8 = \max \{u_6 + \omega_{68}\} = 28 + 3 = 31,$$

$$u_9 = \max \{u_6 + \omega_{69}, \underline{u_7 + \omega_{79}}, u_8 + \omega_{89}\} = \max\{28 + 3, 28 + 9, 31 + 1\} = 37,$$

$$u_{10} = \max \{u_7 + \omega_{7,10}, \underline{u_9 + \omega_{9,10}}\} = \max\{28 + 9, 37 + 8\} = 45,$$

$$u_{11} = \max \{u_8 + \omega_{8,11}, u_9 + \omega_{9,11}, \underline{u_{10} + \omega_{10,11}}\} = \max\{31 + 2, 37 + 8, 45 + 4\} = 49.$$



Mínimo número de días en que puede completarse el proyecto: 49

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO 1: PERT

Tercero: Identificar el camino crítico

$$u_1 = 0,$$

$$u_2 = \max\{u_1 + \omega_{12}\} = 5,$$

$$u_3 = \max\{u_1 + \omega_{13}, u_2 + \omega_{23}\} = \max\{5, 5 + 7\} = 12,$$

$$u_4 = \max \{u_1 + \omega_{14}, u_2 + \omega_{24}\} = \max\{5, 5 + 7\} = 12,$$

$$u_5 = \max \{u_3 + \omega_{35}, u_4 + \omega_{45}\} = \max\{12 + 10, 12 + 4\} = 22,$$

$$u_6 = \max\{u_2 + \omega_{36}, u_5 + \omega_{56}\} = \max\{12 + 10, 22 + 6\} = 28,$$


$$u_7 = \max\{u_4 + \omega_{47}, u_5 + \omega_{57}\} = \max\{12 + 4, 22 + 6\} = 28,$$

$$u_8 = \max \{u_6 + \omega_{68}\} = 28 + 3 = 31,$$

$$u_9 = \max \{u_6 + \omega_{69}, \underline{u_7 + \omega_{79}}, u_8 + \omega_{89}\} = \max \{28 + 3, 28 + 9, 31 + 1\} = 37,$$

$$u_{10} = \max \{u_7 + \omega_{7,10}, \underline{u_9 + \omega_{9,10}}\} = \max\{28 + 9, 37 + 8\} = 45,$$

$$u_{11} = \max \{u_8 + \omega_{8,11}, u_9 + \omega_{9,11}, \underline{u_{10} + \omega_{10,11}}\} = \max \{31 + 2, 37 + 8, 45 + 4\} = 49.$$



Mínimo número de días en que puede completarse el proyecto: 49


3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO 1: PERT

Pregunta: calcular el máximo retraso permitido para la actividad a_5 (correspondiente al vértice renumerado con un 6) de manera que no afecte a la duración del proyecto en su totalidad

Solución: consideraremos los distintos caminos que enlazan la actividad a_5 con el camino crítico




3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO 1: PERT

- Camino $P_{6,9}^{(1)}$: 6 9, con peso $\omega(P_{6,9}^{(1)}) = 3$.
- Camino $P_{6,9}^{(2)}$: 6 8 9, con peso $\omega(P_{6,9}^{(2)}) = 4$.
- Camino $P_{6,11}$: 6 8 11, con peso $\omega(P_{6,11}) = 5$.



Supongamos que la actividad a_5 se retrasa x días. Para que los tres caminos anteriores no retrasen el camino crítico se debe cumplir:

$$\left. \begin{array}{l} P_{6,9}^{(1)} : u_6 + \omega(P_{6,9}^{(1)}) + x \leq u_9 \\ P_{6,9}^{(2)} : u_6 + \omega(P_{6,9}^{(2)}) + x \leq u_9 \\ P_{6,11} : u_6 + \omega(P_{6,11}) + x \leq u_{11} \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 28 + 3 + x \leq 37 \\ 28 + 4 + x \leq 37 \\ 28 + 5 + x \leq 49 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x \leq 6 \\ x \leq 5 \\ x \leq 16 \end{array} \right\} \Rightarrow x \leq 5$$

Máximo retraso permitido de la actividad a_5 : 5 días

3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO


Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO 2: PERT

¿Cómo representar el grafo a partir de una tabla de prerequisites?

Actividad	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	a_{11}
Tiempo necesario	6	2	10	1	4	2	4	7	9	2	4
Prerrequisitos	–	–	a_1	a_1	a_1	a_5 a_{10}	a_2 a_4	a_3 a_6	a_2 a_4	a_7	a_8 a_{10}

Primero: Representamos cada actividad mediante un vértice



3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO


Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO 2: PERT

¿Cómo representar el grafo a partir de una tabla de prerequisites?

Actividad	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	a_{11}
Tiempo necesario	6	2	10	1	4	2	4	7	9	2	4
Prerrequisitos	–	–	a_1	a_1	a_1	a_5 a_{10}	a_2 a_4	a_3 a_6	a_2 a_4	a_7	a_8 a_{10}

Segundo: Incorporamos los arcos en función de los prerrequisitos



3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO


Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO 2: PERT

¿Cómo representar el grafo a partir de una tabla de prerequisites?

Actividad	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	a_{11}
Tiempo necesario	6	2	10	1	4	2	4	7	9	2	4
Prerrequisitos	–	–	a_1	a_1	a_1	a_5 a_{10}	a_2 a_4	a_3 a_6	a_2 a_4	a_7	a_8 a_{10}

Tercero: Añadimos los vértices ficticios



3. GRAFOS ACÍCLICOS. MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO

Lección 4. GRAFOS PONDERADOS.

EJEMPLO 2: PERT

¿Cómo representar el grafo a partir de una tabla de prerequisites?

Actividad	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	a_{11}
Tiempo necesario	6	2	10	1	4	2	4	7	9	2	4
Prerrequisitos	—	—	a_1	a_1	a_1	a_5 a_{10}	a_2 a_4	a_3 a_6	a_2 a_4	a_7	a_8 a_{10}

Cuarto: Añadimos los pesos

