



Tema 4: Esperanza y Momentos.

- 4.4. Covarianza y Correlación.
- 4.5. Esperanza Condicional.
- 4.6. Desigualdad de Chebychev.
- 4.7. Media muestral.




Relaciones entre variables (I).

• *Vamos a estudiar a continuación el grado de relación que existe entre dos variables aleatorias.*

• *Para ello, vamos a introducir dos expresiones que miden la relación que existe entre dos variables: **la covarianza y la correlación.***



Relaciones entre variables (II).



Relaciones entre variables (III).

- Las relaciones entre v.a. pueden ser de muy distinto tipo: positivas o negativas (si cuando crece la una la otra también lo hace y viceversa), lineales o no lineales, etc.
- También puede ocurrir que no exista ninguna relación entre dos v.a.: cuando esto ocurre diremos que **dos v.a. son independientes**.
- Vamos a estudiar ahora cómo de 'lineal' es la relación que existe entre dos variables: para ello definimos la **covarianza** y la **correlación**.



Covarianza y Correlación (I).

Definición: Dadas dos variables X e Y , llamaremos covarianza a:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

- $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E[XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y)] = E(XY) - E(XE(Y)) - E(YE(X)) + E(E(X)E(Y)) = E(XY) - E(Y)E(X) - E(X)E(Y) + E(X)E(Y) = \mathbf{E(XY) - E(X)E(Y)}$
- La covarianza puede ser positiva, negativa o nula.
- Si las variables X e Y son independientes:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(X)E(Y) - E(X)E(Y) = 0$$
- Si $\text{Cov}(X, Y) = 0$ **NO significa** que las variables sean independientes.
- $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$



Covarianza y Correlación (II).

Definición: Dadas dos variables X e Y , llamaremos Coeficiente de Correlación a:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

- Su valor está entre $-1 \leq \rho \leq 1$
- Si $\rho = 1$ ó $\rho = -1$, la relación lineal es perfecta $Y = aX + b$



ESTADÍSTICA

Covarianza y Correlación (III).

Interpretación


$\rho(X,Y)=1$. Existe una relación lineal exacta entre X e Y y la pendiente de la recta es positiva. →

$0<\rho(X,Y)<1$, relación lineal (+) entre X e Y , más intensa cuanto más cercana a 1. →

$\rho(X,Y)=0$, ausencia de relación lineal. →

$-1<\rho(X,Y)<0$, relación lineal (-) entre X e Y , más intensa cuanto más cercana a -1. →

$\rho(X,Y)=-1$. Existe una relación lineal (-) exacta entre X e Y . →



Mar Duñal

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

ESTADÍSTICA

Esperanza condicional (I).

Definición: Dada una v.a. bidimensional (X,Y) , se define la esperanza condicional de X (de Y) dado $Y=y$ (dado $X=x$) como:

Caso discreto

$$E(X / y) = \sum_x x g_1(x / y)$$

$$E(Y / x) = \sum_y y g_2(y / x)$$

Caso continuo

$$E(X / y) = \int_{-\infty}^{\infty} x g_1(x / y) dx$$

$$E(Y / x) = \int_{-\infty}^{\infty} y g_2(y / x) dy$$

Mar Duñal

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

4

Esperanza condicional (II).

Ejemplo: Dada una v.a. (X, Y) , con función de probabilidad:

Y				
2	0	2/4	1/4	
1	1/4	0	0	
	2	3	4	X

Calcular $E(Y/X=2)$

$$E(Y/X=2) = \sum_y y g_2(y/x=2) = 1g_2(Y=1/X=2) + 2g_2(Y=2/X=2) =$$

$$= 1 \frac{f(2,1)}{f_1(2)} + 2 \frac{f(2,2)}{f_1(2)} = 1 \frac{P(X=2, Y=1)}{P(X=2)} + 2 \frac{P(X=2, Y=2)}{P(X=2)}$$

$$f_1(2) = P(X=2) = \sum_j P(X=2, Y=y_j) = P(X=2, Y=1) + P(X=2, Y=2) = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$$

$$E(Y/X=2) = 1 \frac{P(X=2, Y=1)}{P(X=2)} + 2 \frac{P(X=2, Y=2)}{P(X=2)} = 1 \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} + 2 \frac{0}{\frac{1}{4}} = 1$$



Mar Duñal



9

Desigualdad de Chebychev.

Desigualdad de Markov. Sea X una v.a. con esperanza $E(X)$, tal que $P(X \geq 0) = 1$. Entonces, dado $t > 0$

$$P(X \geq t) \leq \frac{E(X)}{t}$$

Desigualdad de Chebychev. Sea X una v.a. con varianza finita y sea $t > 0$. Entonces:

$$P(|X - E(X)| \geq t) \leq \frac{Var(X)}{t^2}$$



Mar Duñal



10

Media Muestral.

Definición: Supongamos que X_1, X_2, \dots, X_n es una muestra aleatoria simple de una variable X con $E(X) = \mu$ y $Var(X) = \sigma^2$. Se define la **media muestral** como:

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Las variables X_i son independientes y todas tienen la misma distribución que X , es decir, $E(X_i) = \mu$ y $Var(X_i) = \sigma^2$

$$E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \frac{1}{n} [E(X_1) + \dots + E(X_n)] = \frac{1}{n} (\mu + \dots + \mu) = \frac{1}{n} n\mu = \mu$$

$$Var(\bar{X}_n) = Var\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} Var(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \frac{1}{n^2} [Var(X_1) + \dots + Var(X_n)] = \frac{1}{n^2} (\sigma^2 + \dots + \sigma^2) = \frac{1}{n^2} n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$



Mar Duñal

11

Problema 4.47

Sea X una v.a. que toma valores no negativos y tal que $P(X \geq 6) = 1/2$. Probar que $E(X) \geq 3$. Usar la desigualdad de Markov.

La desigualdad de Markov dice:

$$P(X \geq t) \leq \frac{E(X)}{t}$$

Sabemos que $P(X \geq 6) = 1/2$, luego $t = 6$

$$P(X \geq 6) \leq \frac{E(X)}{6}$$

$$\frac{1}{2} \leq \frac{E(X)}{6} \Rightarrow \frac{6}{2} \leq E(X) \Rightarrow 3 \leq E(X)$$



Mar Duñal

12