

Análisis Complejo.

Lo que entiendo de lo que vimos en el segundo parcial

natetas

13 de marzo de 2025

Índice general

1. Diferenciación en el Plano Complejo	5
1.1. La Derivada de una Función Compleja	5
1.1.1. Derivadas complejas	5
1.1.2. Funciones analíticas	5
1.1.3. Diferenciabilidad en \mathbb{R} vs. \mathbb{C}	5
1.1.4. Diferenciales Complejas	6
1.2. Las Ecuaciones de Cauchy-Riemann	7
1.2.1. Diferenciabilidad de una función real	7
1.2.2. Diferenciabilidad en el plano complejo y las ecuaciones de Cauchy-Riemann	7
1.2.3. Consecuencias del Teorema	7

Capítulo 1

Diferenciación en el Plano Complejo

1.1. La Derivada de una Función Compleja

1.1.1. Derivadas complejas

Decimos que una función compleja $f(z)$ definida en un dominio G es *diferenciable* en un punto $z \in G$ si el límite

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}, \quad \text{con } (z, z + \Delta z) \in G \quad (1.1)$$

existe y es finito. Este límite, denotado como $f'(z)$, se llama la *derivada* de $f(z)$ en z .

1.1.2. Funciones analíticas

Una función $f(z)$ se dice que es *analítica en un dominio* G si $f(z)$ es *diferenciable* en cada punto de G .

Se dice que es *analítica en un punto* z si $f(z)$ es analítica en algún vecindario de z .

Observación

Cualquier función analítica en un dominio G es automáticamente analítica en cada punto de G . Sin embargo, diferenciabilidad en un punto no implica analiticidad en ese punto.¹

1.1.3. Diferenciabilidad en \mathbb{R} vs. \mathbb{C}

La diferenciabilidad en el plano complejo es un concepto mucho más fuerte que en el caso real debido a la naturaleza bidimensional de los números complejos. En el caso real, la diferenciabilidad de una función $f(x)$ en un punto x significa que existe el límite:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (1.2)$$

aquí, Δx solo puede tender a cero por dos direcciones posibles: desde la derecha ($\Delta x > 0$) o desde la izquierda ($\Delta x < 0$).

En el caso complejo, como trabajamos en el *plano complejo*, Δz es un número complejo y puede tender a cero desde **infinitas direcciones**. El límite:

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \quad (1.3)$$

debe existir **independientemente de la dirección** en la que Δz se aproxime a cero.

El hecho de que el cociente de diferencias deba tener el mismo valor para cualquier dirección en la que nos acerquemos a z significa que la función $f(z)$ debe cumplir con una condición mucho más estricta que en el caso real.²

¹Me gusta pensar que, cuando una función es *diferenciable*, tanto en un punto z como en puntos cercanos al rededor (una vecindad centrada en z), entonces podemos *analizar* la función en ese punto z , y es por eso que es *analítica en ese punto*. De la misma manera, cuando la función es *diferenciable en todos los puntos de un conjunto*, entonces podemos *analizarla* en todo el conjunto y es por eso que es *analítica en ese dominio*.

²En términos matemáticos, esto se traduce en las **ecuaciones de Cauchy-Riemann**.

1.1.4. Diferenciales Complejas

El concepto de la diferencial de una función compleja es formalmente idéntico al de la diferencial de una función real. Supongamos que $w = f(z)$ es *diferenciable* en el punto z y definimos:

$$\Delta w = f(z + \Delta z) - f(z), \quad (1.4)$$

de modo que:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = f'(z). \quad (1.5)$$

Entonces:

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = f'(z) + \epsilon, \quad (1.6)$$

donde ϵ tiende a cero cuando $\Delta z \rightarrow 0$, o equivalentemente:

$$\Delta w = f'(z)\Delta z + \epsilon\Delta z. \quad (1.7)$$

El primer término en la ecuación anterior se denomina la **diferencial** de la función w (o la *parte lineal principal* del incremento Δw) y se denota por:

$$dw = f'(z)dz. \quad (1.8)$$

En particular, al elegir $w = z$, obtenemos:

$$dz = 1 \cdot \Delta z = \Delta z, \quad (1.9)$$

es decir, el incremento y la diferencial de la variable independiente coinciden. Sustituyendo Δz en la ecuación anterior, obtenemos:

$$dw = f'(z)dz. \quad (1.10)$$

Esto conduce a la fórmula:

$$f'(z) = \frac{dw}{dz} = \frac{df(z)}{dz}. \quad (1.11)$$

Las dos expresiones en el lado derecho pueden considerarse como notaciones alternativas para la derivada $f'(z)$, así como cocientes de diferenciales.

1.2. Las Ecuaciones de Cauchy-Riemann

1.2.1. Diferenciabilidad de una función real

Se dice que una función real $u(x, y)$ es **diferenciable** en el punto (x, y) si el incremento

$$\Delta u = u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y) \quad (1.12)$$

puede escribirse en la forma:

$$\Delta u = A\Delta x + B\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y, \quad (1.13)$$

donde A y B son independientes de $\Delta x, \Delta y$, y los términos ϵ_1, ϵ_2 tienden a cero cuando $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$.

Es fácil ver que los coeficientes A y B son simplemente las derivadas parciales $\partial u / \partial x$ y $\partial u / \partial y$ de la función u en el punto (x, y) . De hecho, eligiendo primero $\Delta y = 0$ y luego $\Delta x = 0$, obtenemos:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{A\Delta x + \epsilon_1\Delta x}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \epsilon_1 = A. \quad (1.14)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x, y + \Delta y) - u(x, y)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{B\Delta y + \epsilon_2\Delta y}{\Delta y} = B + \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \epsilon_2 = B. \quad (1.15)$$

1.2.2. Diferenciabilidad en el plano complejo y las ecuaciones de Cauchy-Riemann

Como se mencionó en la Sección 3.12, especificar una función $w = f(z) = u + iv$ de una variable compleja $z = x + iy$ es equivalente a especificar dos funciones reales u y v en términos de las variables reales x e y .

La continuidad de u y v implica obviamente la continuidad de w , pero la diferenciabilidad de u y v **no implica** la diferenciabilidad de w .

Por lo tanto, las partes real e imaginaria de una función diferenciable $w = u + iv$ **no pueden elegirse de manera independiente**. En su lugar, deben satisfacer ciertas condiciones conocidas como las **ecuaciones de Cauchy-Riemann**.

Teorema 1.2.1. *La función $w = f(z) = u + iv$ es diferenciable en el punto $z = x + iy$ si y solo si las funciones u y v son diferenciables en el punto (x, y) y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann:*

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (1.16)$$

en el punto (x, y) .

1.2.3. Consecuencias del teorema anterior

Del teorema anterior se sigue que una función $w = f(z) = u + iv$ es **analítica** en un dominio G si y solo si sus partes real e imaginaria u y v son diferenciables y satisfacen las **ecuaciones de Cauchy-Riemann** en cada punto de G . La derivada $f'(z)$ se puede escribir en cualquiera de las siguientes formas:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}. \quad (1.17)$$

Como sabemos del cálculo, una **condición suficiente** (pero **no necesaria**) para la diferenciabilidad de u y v en un punto (x, y) es que u y v tengan derivadas parciales **continuas** en (x, y) .