

Report Übung 01

Bernhard Fürst
k0442418

Sebastian Ortner
kxxxxxxxxx

November 10, 2019

3

Der Durchschnitt unserer Dreiecksfunktion ist 0 was leicht anhand der Symmetrie bezüglich der x-Achse gesehen werden kann. Damit ist auch der DC-Anteil der Fourierreihe, a_0 , 0. Dies kann auch folgendermassen gezeigt werden :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

Aufgrund der Symmetrie in der Funktion erkennen wir dass das Integral von 0 nach $\frac{T_0}{2}$ gleich dem Integral von $\frac{T_0}{2}$ nach T_0 sein muss. Daher können wir sagen dass :

$$a_0 = \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) dt \quad (1)$$

Da wir uns nun auf einen Teil der 2 teiligen Funktion beschränken können gilt :

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} A - \frac{4A}{T_0} t dt \\ &= \frac{2}{T_0} \left(At - \frac{4A}{T_0} \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^{\frac{T_0}{2}} \\ &= \frac{2}{T_0} \left(A \frac{T_0}{2} - \frac{2A}{T_0} \frac{T_0^2}{4} - A0 - \frac{2A}{T_0} \cdot 0 \right) \\ &= \frac{2}{T_0} \left(A \frac{T_0}{2} - \frac{AT_0^2}{2T_0} - 0 - 0 \right) \\ &= \frac{2}{T_0} \left(A \frac{T_0}{2} - A \frac{T_0}{2} - 0 \right) \\ &= \underline{0} \end{aligned}$$