

Что важно знать женщине о своем здоровье?

Каждой женщине, особенно после 30 лет, необходимо регулярно проводить цитологическое исследование мазков с шейки матки. По данным онкоцентра РАМН, рак шейки матки (РШМ) является одним из самых опасных заболеваний. Ежегодно в России регистрируется более 520 тыс. больных раком шейки матки. Каждый второй случай из вновь выявленных заканчивается смертельным исходом. **Предупредить развитие опасного для жизни заболевания проще, чем его лечить.**

К факторам риска развития РШМ относятся:

Раннее начало половой жизни (до 15 лет)

Ранняя беременность и роды (до 16 лет)

Частая смена половых партнеров

Многочисленные аборты

Венерические и воспалительные заболевания

Курение

Гормональные контрацептивы

Слабый иммунитет

(«Комплексная борьба с раком шейки матки» , краткое практическое руководство, © ВОЗ 2010)

Для диагностики РШМ в лаборатории КДЦ применяется современное оборудование для приготовления и окраски мазков на онкоцитологию методом жидкостной цитологии **BD SurePath™ Liquid-based Pap Test**, рекомендованный ведущими гинекологами и одобренный **FDA**, что гарантирует:



1. **100% собранного материала пациента попадает на исследование. (При традиционном мазке на онкоцитологию часть клеток утилизируется вместе с инструментом для забора материала).**
2. Запатентованный Метод Клеточного Обогащения BD SurePath™ Liquid-based Pap Test позволяет улучшить качество цитологического препарата за счет отделения клеток крови и слизи, сохраняя фон для интерпретации и обеспечивая хорошую визуализацию клеток.
3. Жидкостная цитология демонстрирует **существенное уменьшение неудовлетворительных результатов (43% - 81%)**, сокращая потребность в ненужном повторении цитологического исследования и увеличивает **выявление HSIL(предраковую стадию)+ на на 64.4%.**



Как подготовиться к сдаче анализа на РШМ методом жидкостной цитологии:

- **Идеальное время для забора материала с 10 по 20 день менструального цикла; исключен забор во время менструации и воспалительных гинекологических заболеваний.**
- **За 2 дня до исследования необходимо прекратить спринцевания, занятия сексом; использование влагалищных контрацептивов или лекарственных средств, тампонов.**

Работаем для Вас, с заботой о Вашем здоровье!