#### Aufgabe 1.

Betrachten Sie den Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathbb{P})$  mit der Zufallsvariable X gegeben durch:

$$\Omega = \{0, 1\}^3$$

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \to [0, 1],$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{8}$$

$$X : \Omega \to \mathbb{R},$$

$$X ((a_i)_{i=1}^3) = \sum_{i=1}^3 a_i$$

Bestimmen Sie Folgendes:

- $\mathbb{P}(X=0)$
- $\mathbb{E}[X]$
- Var[X]

### Lösung.

Erstens gilt:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = 0\}) 
= \mathbb{P}(\{(a_i)_{i=1}^3 \in \{0, 1\}^3 \mid X((a_i)_{i=1}^3) = 0\}) 
= \mathbb{P}\left(\{(a_i)_{i=1}^3 \in \{0, 1\}^3 \mid \sum_{i=1}^3 a_i = 0\}\right) 
= \mathbb{P}(\{(a_i)_{i=1}^3 \in \{0, 1\}^3 \mid \forall i \in \{1, 2, 3\} : a_i = 0\}) 
= \mathbb{P}(\{(0, 0, 0)\}) 
= \frac{|\{(0, 0, 0)\}|}{8} 
= \frac{1}{8}$$

Zweitens gilt:

$$\begin{split} \mathbb{E}[X] &= \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) X(\omega) \\ &= \sum_{(a_i)_{i=1}^3 \in \{0,1\}^3} p\left((a_i)_{i=1}^3\right) X\left((a_i)_{i=1}^3\right) \\ &= \sum_{(a_i)_{i=1}^3 \in \{0,1\}^3} \frac{1}{8} X\left((a_i)_{i=1}^3\right) \\ &= \frac{1}{8} \sum_{(a_i)_{i=1}^3 \in \{0,1\}^3} X\left((a_i)_{i=1}^3\right) \\ &= \frac{1}{8} \sum_{(a_i)_{i=1}^3 \in \{0,1\}^3} \sum_{i=1}^3 a_i \\ &= \frac{1}{8} \sum_{(a_i)_{i=1}^3 \in \{0,1\}^3} (a_1 + a_2 + a_3) \\ &= \frac{1}{8} \sum_{(a_i)_{i=1}^3 \in \{(0,0,0),(0,0,1),(0,1,0),(0,1,1),(1,0,0),(1,0,1),(1,1,0),(1,1,1)\}} (a_1 + a_2 + a_3) \\ &= \frac{1}{8} (0 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 3) \\ &= \frac{1}{8} 12 \\ &= \frac{12}{8} \\ &= \frac{3}{2} \end{split}$$

Weiterhin haben wir:

$$X^{2}: \Omega \to \mathbb{R},$$
  
 $X^{2}\left((a_{i})_{i=1}^{3}\right) = \left(X\left((a_{i})_{i=1}^{3}\right)\right)^{2} = \left(\sum_{i=1}^{3} a_{i}\right)^{2}$ 

Also haben wir:

$$\mathbb{E}\left[X^{2}\right] = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega)X^{2}(\omega)$$

$$= \sum_{(a_{i})_{i=1}^{3} \in \{0,1\}^{3}} p\left((a_{i})_{i=1}^{3}\right)X^{2}\left((a_{i})_{i=1}^{3}\right)$$

$$= \sum_{(a_{i})_{i=1}^{3} \in \{0,1\}^{3}} \frac{1}{8}X^{2}\left((a_{i})_{i=1}^{3}\right)$$

$$= \frac{1}{8} \sum_{(a_{i})_{i=1}^{3} \in \{0,1\}^{3}} \left(\sum_{i=1}^{3} a_{i}\right)^{2}$$

$$= \frac{1}{8} \sum_{(a_{i})_{i=1}^{3} \in \{0,1\}^{3}} \left(\sum_{i=1}^{3} a_{i}\right)^{2}$$

$$= \frac{1}{8} \sum_{(a_{i})_{i=1}^{3} \in \{0,1\}^{3}} (a_{1} + a_{2} + a_{3})^{2}$$

$$= \frac{1}{8} (a_{i})_{i=1}^{3} \in \{(0,0,0),(0,0,1),(0,1,0),(0,1,1),(1,0,0),(1,0,1),(1,1,0),(1,1,1)\}}$$

$$= \frac{1}{8}(0 + 1 + 1 + 4 + 1 + 4 + 4 + 9)$$

$$= \frac{1}{8}24$$

$$= \frac{24}{8}$$

$$= 3$$

Damit gilt drittens:

$$Var[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = 3 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 3 - \frac{9}{4} = \frac{12}{4} - \frac{9}{4} = \frac{3}{4}$$

### Aufgabe 2.

Betrachten Sie den Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathbb{P})$  mit der Zufallsvariable X gegeben durch:

$$\Omega = \{0, 2\}^3$$

$$\mathbb{P}: \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1],$$

$$\mathbb{P}: \mathcal{P}(\Omega) \to [0, 1],$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{8}$$

$$X: \Omega \to \mathbb{R},$$

$$X:\Omega\to\mathbb{R}$$

$$X\left((a_i)_{i=1}^3\right) = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2}a_i$$

Bestimmen Sie Folgendes:

- $\mathbb{P}(X=0)$
- $\mathbb{E}[X]$
- Var[X]

### Lösung.

### Aufgabe 3.

Betrachten Sie den Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathbb{P})$  mit der Zufallsvariable X gegeben durch:

$$\Omega = \{1, 2\}^3$$

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \to [0, 1],$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{8}$$

$$X : \Omega \to \mathbb{R},$$

$$X ((a_i)_{i=1}^3) = \sum_{i=1}^3 (a_i - 1)$$

Bestimmen Sie Folgendes:

- $\mathbb{P}(X=0)$
- $\mathbb{E}[X]$
- Var[X]

### Lösung.

### Aufgabe 4.

Betrachten Sie den Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathbb{P})$  mit der Zufallsvariable X gegeben durch:

$$\Omega = \{x_1, x_2\}^3$$

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \to [0, 1],$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{8}$$

$$X : \Omega \to \mathbb{R},$$

$$X ((a_i)_{i=1}^3) = \sum_{i=1}^3 \begin{cases} 0, & a_i = x_1 \\ 1, & a_i = x_2 \end{cases}$$

Bestimmen Sie Folgendes:

- $\mathbb{P}(X=0)$
- $\mathbb{E}[X]$
- Var[X]

### Lösung.

### Aufgabe 5.

Betrachten Sie den Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathbb{P})$  mit der Zufallsvariable X gegeben durch:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \to [0, 1],$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{8}$$

$$X : \Omega \to \mathbb{R},$$

$$\begin{cases}
0, & \omega = 1 \\
1, & \omega = 2 \\
1, & \omega = 3 \\
2, & \omega = 4 \\
1, & \omega = 5 \\
2, & \omega = 6 \\
2, & \omega = 7 \\
3, & \omega = 8
\end{cases}$$

Bestimmen Sie Folgendes:

- $\mathbb{P}(X=0)$
- $\mathbb{E}[X]$
- Var[X]

### Lösung.

### Aufgabe 6.

Eine Münze wird dreimal unabhängig voneinander geworfen. Modellieren Sie dieses Experiment in einem geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathbb{P})$ . Geben Sie eine Zufallsvariable  $X : \Omega \to \mathbb{R}$  an, die angibt, wie oft "Kopf" geworfen wurde.

Bestimmen Sie Folgendes:

- $\mathbb{P}(X=0)$
- $\mathbb{E}[X]$
- Var[X]

### Lösung.

# Aufgabe 7.

Sei  $(\Omega, \mathbb{P})$  ein Wahrscheinlichkeitsraum und  $X : \Omega \to \mathbb{R}$  eine Zufallsvariable mit  $X \sim \text{Bin}\left(3, \frac{1}{2}\right)$ . Bestimmen Sie Folgendes:

- $\mathbb{P}(X=0)$
- $\mathbb{E}[X]$
- Var[X]

# Lösung.