




Croissance : Anatomie

Erodium malacoides



Croissance : Anatomie

Erodium malacoides

zone âgée

Entre-noeud renflé

Epiderme cutinisé
Parenchyme
Sclérenchyme (formé de petites cellules)
Sclérenchyme (formé de grosses cellules)

700 µm

Phloème primaire
Liber
Cambium
Bois
Xylème primaire

Entre-noeud non renflé

Trichomes
Epiderme cutinisé
Sclérenchyme
Parenchyme

500 µm

Sclérenchyme (formé de petites cellules)
Sclérenchyme (formé de grosses cellules)
Phloème primaire
Liber
Cambium
Bois
Xylème primaire

zone jeune

Epiderme cutinisé
Parenchyme cortical
Sclérenchyme
Parenchyme médullaire

500 µm

Sclérenchyme (petites cellules)
Sclérenchyme (grosses cellules)
Phloème primaire
Liber
Cambium
Bois
Xylème primaire

Epiderme cutinisé
Parenchyme cortical
Parenchyme médullaire

250 µm

Sclérenchyme (petites cellules)
Sclérenchyme (grosses cellules)
Phloème primaire
Liber
Cambium
Bois
Xylème primaire

Racine jeune

150 µm

Hypothèse : parenchyme cortical, endoderme et épiderme éliminé
Liber
Cambium
Phloème primaire
Xylème primaire
Bois
Parenchyme

Racine jeune

300 µm

Suber (avec phellogène en dessous)
Liber
Cambium
Phloème primaire
Xylème primaire
Bois
Parenchyme

Racine mature

600 µm

Suber (avec phellogène en dessous)
Liber
Cambium
Xylème primaire
Bois
Parenchyme
Phloème primaire

Racine mature

800 µm

Suber (avec phellogène en dessous)
Liber
Cambium
Phloème primaire
Xylème primaire
Bois
Parenchyme