

Maths – MP2I

Eliott Paquet

30 août 2025

# Introduction

Ce document réunit l'ensemble de mes cours de Mathématiques de MP2I. J'ai adapté certaines formulations me paraissant floues ou ne me plaisant pas mais le contenu pur des cours est strictement équivalent. Le document est organisé selon la hiérarchie suivante : chapitre, I), 1), a).

Les éléments des tables des matières initiales et présentes au début de chaque chapitre sont cliquables (amenant directement à la partie cliquée). C'est également le cas des références à des éléments antérieurs de la forme, par exemple, « Démonstration 5.22 ».

Le nombre total de lignes de latex utilisé pour générer tout ce document est : 21940.

# Table des matières

<b>I</b>	<b>Cours</b>	<b>21</b>
<b>1</b>	<b>Trigonométrie (Rappels et compléments)</b>	<b>22</b>
I	Cercle trigonométrique . . . . .	22
I.1	Relation de congruence modulo $2\pi$ sur $\mathbb{R}$ . . . . .	22
II	Cosinus et sinus . . . . .	23
II.1	Formules et valeurs remarquables . . . . .	23
III	La fonction tangente . . . . .	25
<b>2</b>	<b>Inégalité et fonction (rappels et compléments)</b>	<b>27</b>
I	Inégalité . . . . .	27
I.1	Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$ . . . . .	27
II	Valeur absolue d'un réel. . . . .	32
III	Partie entière d'un réel . . . . .	33
IV	Généralité sur les fonctions . . . . .	34
V	Fonction et relation d'ordre . . . . .	37
VI	Dérivation des fonctions d'une variable réelle. . . . .	38
<b>3</b>	<b>Calcul algébrique (rappels et compléments)</b>	<b>45</b>
I	Sommes et produits finis . . . . .	45
II	Cas des sommes doubles finies . . . . .	50
III	Système linéaire de deux équations à deux inconnues . . . . .	51
IV	Système linéaire de trois équations à trois inconnues . . . . .	52
V	Algorithme du Pivot . . . . .	53

<b>4</b>	<b>Nombres complexes</b>	<b>55</b>
I	Généralité . . . . .	55
II	Conjugué d'un nombre complexe . . . . .	57
III	Module d'un nombre complexe. . . . .	57
IV	Nombre complexe de module 1 et trigonométrie . . . . .	58
V	Forme trigonométrique pour les nombres complexes non nuls . . . . .	61
VI	Fonctions d'une variable réelle à valeurs complexes . . . . .	62
<b>5</b>	<b>Fonctions usuelles : Rappels et compléments</b>	<b>64</b>
I	Fonction exponentielle . . . . .	64
II	Fonctions logarithmes . . . . .	65
III	Fonctions hyperboliques. . . . .	65
IV	Tangente hyperbolique . . . . .	67
V	Arccos . . . . .	68
VI	Arcsin . . . . .	68
VII	Arctan . . . . .	69
VIII	Fonctions puissances réelles . . . . .	69
IX	Croissances comparées . . . . .	70
<b>6</b>	<b>Nombres complexes (2)</b>	<b>72</b>
I	Équations algébriques . . . . .	72
I.1	Preliminaires . . . . .	72
I.2	Résolution des équations du second degré dans $\mathbb{C}$ . . . . .	73
I.3	Résolution des équations du type $z^n = z_0$ dans $\mathbb{C}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ . . . . .	74
II	Exponentielle complexe . . . . .	76
III	Interprétations géométriques. . . . .	77
<b>7</b>	<b>Calcul de primitives</b>	<b>80</b>
I	Primitives . . . . .	80
II	Primitives usuelles . . . . .	81

III	Calculs de primitives . . . . .	82
III.1	Deux théorèmes importants . . . . .	84
III.2	Primitives de $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ ou $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$ . . . . .	85
III.3	Primitives de $x \mapsto \frac{1}{ax^2 + bx + c}$ avec $a, b$ et $c$ des réels et $a$ non nul . . . . .	85
<b>8</b>	<b>Compléments sur les nombres réels</b>	<b>87</b>
I	Parties denses de $\mathbb{R}$ . . . . .	87
II	Approximation décimale d'un réel . . . . .	89
III	Borne inférieure et supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$ . . . . .	90
<b>9</b>	<b>Ensemble, application et relation</b>	<b>93</b>
I	Ensemble . . . . .	93
I.1	Généralité . . . . .	93
I.2	Inclusion entre ensembles et parties . . . . .	94
I.3	Egalité entre ensembles . . . . .	94
I.4	Opérations sur les parties d'un ensemble . . . . .	95
I.5	Produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles . . . . .	96
II	Application . . . . .	96
II.1	Définition de base . . . . .	96
II.2	Fonctions particulières . . . . .	98
II.3	Image directe et image réciproque . . . . .	98
II.4	Composition d'applications . . . . .	98
II.5	Injection, surjection . . . . .	99
II.6	Bijection . . . . .	99
III	Relation Binaire sur un ensemble. . . . .	100
III.1	Généralité . . . . .	100
III.2	Relations d'équivalence . . . . .	100
III.3	Relation d'ordre . . . . .	101
<b>10</b>	<b>Suites numériques particulières</b>	<b>102</b>

I	Suite arithmétique . . . . .	102
II	Suites géométriques . . . . .	103
III	Suites arithmético-géométriques . . . . .	104
IV	Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 à coefficients constants . . . . .	105
V	Cas simples de suites récurrentes du type $u_{n+1} = f(u_n)$ . . . . .	110
<b>11 Suites numériques</b>		<b>111</b>
I	Généralité sur les suites réelles . . . . .	111
I.1	Définition . . . . .	111
I.2	Suites majorées, minorées, bornées . . . . .	112
I.3	Suites stationnaires, monotones, strictement monotones . . . . .	113
II	Limite d'une suite réelle . . . . .	113
II.1	Généralités sur les limites . . . . .	113
II.2	Cas particulier des limites finies : retour en 0 . . . . .	114
II.3	Suites convergentes et divergentes . . . . .	114
II.4	Opérations sur les limites . . . . .	114
II.5	Limite et relation d'ordre . . . . .	115
II.6	Existence d'une limite finie . . . . .	116
II.7	Existence d'une limite infinie . . . . .	116
II.8	Cas des suites monotones . . . . .	117
III	Suites extraites . . . . .	118
III.1	Définition . . . . .	118
III.2	Suites extraites et limites . . . . .	118
IV	Suites complexes. . . . .	120
IV.1	Suite complexe bornée et limite d'une suite complexe . . . . .	121
<b>12 Limite et continuité</b>		<b>122</b>
I	Etude locale des fonctions à valeurs réelles. . . . .	123
I.1	Limite en un point $a$ de $\overline{\mathbb{R}}$ appartenant à $I$ ou extrémité de $I$ . . . . .	123
I.2	Limite à gauche et à droite en un réel appartenant à $I$ ou extrémité de $I$ . . . . .	124

I.3	Caractérisation séquentielle de la limite . . . . .	124
I.4	Opérations sur les limites . . . . .	124
I.5	Limites et relation d'ordre . . . . .	126
I.6	Existence d'une limite finie . . . . .	126
I.7	Existence d'une limite infinie . . . . .	127
I.8	Théorèmes de limite monotone . . . . .	127
II	Continuité des fonctions à valeurs réelles en un point . . . . .	128
II.1	Définition . . . . .	128
II.2	Condition nécessaire et suffisante de continuité en un point . . . . .	128
II.3	Caractérisation séquentielle de la continuité en un point . . . . .	128
II.4	Opérations sur les fonctions continues en un point . . . . .	128
II.5	Composition de fonctions continues en un point . . . . .	129
II.6	Prolongement par continuité . . . . .	129
III	Continuité des fonctions sur un intervalle . . . . .	129
III.1	Définition . . . . .	129
III.2	Théorèmes généraux : combinaison linéaire, produit, quotient, composée . . . .	130
III.3	Théorème des valeurs intermédiaires et corollaires . . . . .	130
III.4	Théorème des bornes atteintes et corollaire . . . . .	132
III.5	Théorème de la bijection . . . . .	133
IV	Cas des fonctions à valeurs complexes . . . . .	134
IV.1	Ce qui s'étend aux fonctions complexes . . . . .	134
IV.2	Ce qui ne s'étend pas aux fonctions à valeurs complexes . . . . .	134
IV.3	Limite d'une fonction à valeurs complexes . . . . .	135

## **13 Calcul matriciel et systèmes linéaires 136**

I	Matrices rectangles . . . . .	136
I.1	Généralités . . . . .	136
I.2	Produit . . . . .	137
I.3	Transposition . . . . .	139

II	Opérations élémentaires, systèmes linéaires . . . . .	139
II.1	Définitions . . . . .	139
II.2	Traduction en termes de produit matriciel . . . . .	140
II.3	Système d'équation linéaires . . . . .	141
III	Matrices carrées . . . . .	142
III.1	Ensemble des matrices carrées . . . . .	142
III.2	Matrices carrées de formes particulières . . . . .	142
III.3	Deux formules usuelles . . . . .	142
III.4	Matrices inversibles . . . . .	143
III.5	Calculs de matrices inverses en pratique . . . . .	143
III.6	Cas particulier . . . . .	144
<b>14 Équations différentielles linéaires</b>		<b>146</b>
I	Équations différentielles linéaires d'ordre 1. . . . .	146
I.1	Définition . . . . .	146
I.2	Forme générale des solutions . . . . .	147
I.3	Solutions de l'équation différentielle homogène $y' + a(t)y = 0$ . . . . .	147
I.4	Solution particulière de l'équation différentielle $y' + a(t)y = b(t)$ . . . . .	148
I.5	Théorème de Cauchy : existence et unicité . . . . .	149
II	Equations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants. . . . .	149
II.1	Définition . . . . .	149
II.2	Forme générale des solutions . . . . .	150
II.3	Solutions de l'équation différentielle linéaire homogène $y'' + ay' + by = 0$ . . . .	150
II.4	Solution particulière de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = g(t)$ . . . . .	151
II.5	Théorème de Cauchy : existence et unicité (preuve hors programme) . . . . .	152
<b>15 Arithmétique dans <math>\mathbb{Z}</math></b>		<b>153</b>
I	Division euclidienne . . . . .	153
I.1	Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ . . . . .	153
I.2	Division euclidienne . . . . .	155



II	PGCD et PPCM. . . . .	155
II.1	Cas de deux entiers naturels . . . . .	155
II.2	Cas de deux entiers relatifs . . . . .	158
II.3	PPCM . . . . .	159
III	Entiers premiers entre eux. . . . .	160
III.1	Cas de couples d'entiers . . . . .	160
III.2	Cas de $n$ -uplet d'entiers avec $n \geq 2$ . . . . .	161
IV	Nombres premiers . . . . .	162
IV.1	Généralités . . . . .	162
IV.2	Décomposition en produit de nombres premiers . . . . .	163
IV.3	Valuation $p$ -adique . . . . .	163
IV.4	Congruences . . . . .	165
IV.5	Caractérisation . . . . .	165
IV.6	Propriétés . . . . .	166
IV.7	Opération . . . . .	166
IV.8	Inverse modulo $n$ . . . . .	166
IV.9	Petit Théorème de Fermat . . . . .	167

## 16 Dérivation 168

I	Dérivation des fonctions à valeurs réelles . . . . .	168
I.1	Dérivée en un point . . . . .	168
I.2	Dérivabilité à droite et à gauche . . . . .	170
I.3	Condition nécessaire d'extremum local en un point intérieur . . . . .	170
I.4	Dérivée sur un intervalle . . . . .	171
II	Théorèmes de Rolle et des accroissements finis . . . . .	174
II.1	Théorème de Rolle . . . . .	174
II.2	Accroissements finis . . . . .	175
II.3	Applications des théorèmes des accroissements finis . . . . .	176
III	Classe $C^k$ . . . . .	179
III.1	Notations . . . . .	179

III.2	Définitions . . . . .	179
III.3	Opérations sur les fonctions de classe $C^k$ avec $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ . . . . .	180
III.4	Composition de fonctions de classe $C^k$ avec $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ . . . . .	180
III.5	Réciproque d'une fonction de classe $C^k$ avec $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ . . . . .	181
IV	Cas des fonctions à valeurs complexes . . . . .	181
IV.1	Ce qui s'étend aux fonctions complexes . . . . .	181
IV.2	Ce qui ne s'étend pas aux fonctions complexes . . . . .	181
IV.3	Quelques résultats qui s'étendent détaillés . . . . .	182

## 17 Structures algébriques usuelles 184

I	Généralité . . . . .	184
I.1	Loi de composition interne . . . . .	184
I.2	Définitions - Propriétés . . . . .	185
I.3	Partie stable . . . . .	187
II	Groupes, sous-groupes . . . . .	187
II.1	Groupes . . . . .	187
II.2	Sous-groupes . . . . .	189
III	Morphisme de groupes . . . . .	189
III.1	Morphisme . . . . .	189
III.2	Isomorphisme . . . . .	192
IV	Anneaux, corps . . . . .	192
IV.1	Anneaux . . . . .	192
IV.2	Sous-anneaux . . . . .	193
IV.3	Morphisme d'anneaux . . . . .	193
IV.4	Isomorphisme d'anneaux . . . . .	194
IV.5	Anneau intègre . . . . .	194
IV.6	Corps commutatif . . . . .	195

## 18 Polynômes 196

I	Anneau des polynômes à une indéterminée. . . . .	196
I.1	L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ . . . . .	196
I.2	L'anneau intègre $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ . . . . .	197
I.3	L'ensemble $\mathbb{K}_n[X]$ . . . . .	199
I.4	Composition de polynômes . . . . .	199
II	Divisibilité et division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$ . . . . .	200
II.1	Divisibilité . . . . .	200
II.2	Division euclidienne . . . . .	201
III	Fonctions polynomiales et racines . . . . .	202
III.1	Fonction polynomiale associée à un polynôme . . . . .	202
III.2	Racine (ou zéro) d'un polynôme . . . . .	202
III.3	Polynômes scindés . . . . .	204
IV	Polynômes dérivés . . . . .	205
IV.1	Dérivée formelle d'un polynôme . . . . .	205
IV.2	Polynômes dérivés successifs . . . . .	206
V	Trois classiques incontournables . . . . .	208
V.1	Méthode de Horner pour l'évaluation polynomiale . . . . .	208
V.2	Formule d'interpolation de Lagrange . . . . .	209
V.3	Relations entre coefficients et racines (formules de Viète) . . . . .	210

## 19 Analyse Asymptotique (1) 211

I	Relations de comparaison pour les fonctions . . . . .	211
I.1	Définition . . . . .	211
I.2	Caractérisations pratiques . . . . .	212
I.3	Lien entre les relations de comparaison . . . . .	213
I.4	Traduction des croissances comparées à l'aide des " $\mathcal{O}$ " . . . . .	213
I.5	Obtention et utilisation des équivalents . . . . .	213
I.6	Règles usuelles de manipulation des relations de comparaison . . . . .	214
II	Développements limités . . . . .	214
II.1	Généralités . . . . .	214

II.2	Premiers résultats importants . . . . .	216
II.3	Opérations sur les développements limités . . . . .	217
II.4	Primitivation d'un développement limité . . . . .	218
II.5	Développements limités usuels . . . . .	220
II.6	Application des développements limités à l'étude locale d'une fonction . . . . .	221
<b>20</b>	<b>Espaces Vectoriels</b>	<b>223</b>
I	Espaces vectoriels . . . . .	223
I.1	Définition . . . . .	223
I.2	Propriétés immédiates (règles de calcul) . . . . .	224
I.3	Produit fini d'espaces vectoriels . . . . .	225
I.4	Espaces vectoriels de référence déjà rencontrés . . . . .	225
I.5	Combinaison linéaire d'une famille de vecteurs . . . . .	225
II	Sous-espaces vectoriels . . . . .	226
II.1	Définition . . . . .	226
II.2	Caractérisation . . . . .	226
II.3	Quelques exemples de sous-espaces vectoriels déjà rencontrés . . . . .	227
II.4	Intersection de sous-espaces vectoriels . . . . .	227
II.5	Sous-espace vectoriel engendré par une partie . . . . .	228
III	Familles génératrices, libres ou bases d'un espace vectoriel . . . . .	229
III.1	Famille (partie) génératrice . . . . .	229
III.2	Famille (partie) libre . . . . .	229
III.3	Famille (partie) liée . . . . .	230
III.4	Base . . . . .	230
IV	Somme et somme directe de deux sous-espaces vectoriels. . . . .	231
IV.1	Somme de deux sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel . . . . .	231
IV.2	Somme directe . . . . .	232
IV.3	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	232
<b>21</b>	<b>Espaces vectoriels de dimension finie</b>	<b>233</b>

I	Existence de bases . . . . .	233
I.1	Définition . . . . .	233
I.2	Algorithme de construction de bases . . . . .	233
I.3	Théorèmes . . . . .	234
II	Dimension d'un espace vectoriel . . . . .	235
II.1	Propriétés préliminaires . . . . .	235
II.2	Dimension . . . . .	237
II.3	Caractérisation des bases en dimension finie . . . . .	238
II.4	Rang d'une famille finie de vecteurs . . . . .	238
II.5	Dimension d'un produit fini d'espaces vectoriels . . . . .	238
III	Sous-espaces vectoriels en dimension finie . . . . .	239
III.1	Propriétés . . . . .	239
III.2	Dimension d'une somme (formule de Grassmann) . . . . .	240
III.3	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	241

## 22 Application Linéaire (1) 243

I	Généralités . . . . .	243
I.1	Définitions - Notations . . . . .	243
I.2	Opérations . . . . .	244
I.3	Structures algébriques des ensembles d'applications linéaires . . . . .	244
I.4	Image directe et image réciproque d'un sous-espace vectoriel . . . . .	244
I.5	Image et noyau d'une application linéaire . . . . .	245
I.6	Rang d'une application linéaire . . . . .	245
II	Des applications linéaires usuelles . . . . .	247
II.1	Homothéties . . . . .	247
II.2	Projections/projecteurs . . . . .	247
II.3	Symétries . . . . .	248
III	Isomorphismes. . . . .	249
III.1	Détermination d'une application linéaire . . . . .	249
III.2	Caractérisations de l'injectivité, la surjectivité ou la bijectivité . . . . .	250

III.3	Applications linéaires entre espaces de même dimension finie . . . . .	250
III.4	Espaces vectoriels isomorphes . . . . .	251
IV	Théorème du rang . . . . .	251
IV.1	Théorème du rang (version géométrique) . . . . .	251
V	Formes linéaires et hyperplans . . . . .	252
V.1	Formes linéaires . . . . .	252
V.2	Hyperplans . . . . .	252
V.3	Hyperplans en dimension finie . . . . .	253
V.4	Intersection d'hyperplans en dimension finie . . . . .	255

## 23 Matrice et Application Linéaire (2) 257

I	Matrice d'une application linéaire en dimension finie . . . . .	257
I.1	Matrice d'un vecteur et d'une famille de vecteurs . . . . .	257
I.2	Matrice d'une application linéaire dans un couple de bases . . . . .	258
I.3	Matrice d'un endomorphisme dans une base . . . . .	260
II	Application linéaire canoniquement associée à une matrice . . . . .	261
II.1	Définition . . . . .	261
II.2	Identification usuelle de $\mathbb{K}^m$ et $\mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{K})$ . . . . .	261
II.3	Noyau, Image, rang d'une matrice . . . . .	261
II.4	Retour sur les systèmes linéaires . . . . .	262
III	Changement de bases. . . . .	263
III.1	Matrice de passage entre deux bases . . . . .	263
III.2	Effet des changements de bases. . . . .	264
IV	Matrices semblables et trace . . . . .	265
IV.1	Matrices (carrées) semblables . . . . .	265
IV.2	Trace d'une matrice (carrée) . . . . .	265
IV.3	Trace d'un endomorphisme en dimension finie . . . . .	265
V	Matrices (rectangles) équivalentes et rang . . . . .	266
V.1	Définition . . . . .	266
V.2	Invariance du rang par multiplication par une matrice inversible . . . . .	266

V.3	Caractérisation des matrices de rang $r$ . . . . .	267
V.4	Rang et transposition . . . . .	268
V.5	Rang et opérations élémentaires . . . . .	268
V.6	Rang et matrices extraites . . . . .	268
<b>24</b>	<b>Arithmétique des Polynômes</b>	<b>270</b>
I	Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$ . . . . .	270
I.1	PGCD de deux polynômes . . . . .	270
I.2	PPCM de deux polynômes . . . . .	272
I.3	Couple de polynômes premiers entre eux . . . . .	272
I.4	PGCD d'un nombre fini de polynômes . . . . .	273
II	Polynômes irréductibles . . . . .	274
II.1	Théorème de D'Alembert-Gauss . . . . .	274
II.2	Polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ . . . . .	274
II.3	Décomposition en facteurs irréductibles . . . . .	274
<b>25</b>	<b>Fractions Rationnelles</b>	<b>276</b>
I	Généralités . . . . .	276
I.1	Le corps $\mathbb{K}(X)$ . . . . .	276
I.2	Degré d'une fraction rationnelle . . . . .	277
I.3	Partie entière d'une fraction rationnelle . . . . .	278
I.4	Zéros et pôles d'une fraction rationnelle . . . . .	278
I.5	Fonction rationnelle . . . . .	278
II	Décomposition en éléments simples . . . . .	278
II.1	Théorème de décomposition sur $\mathbb{C}$ (preuve hors programme) . . . . .	278
II.2	Théorème de décomposition sur $\mathbb{R}$ (preuve hors programme) . . . . .	279
II.3	Quelques applications des décompositions en éléments simples . . . . .	279
II.4	Deux cas particuliers . . . . .	280
<b>26</b>	<b>Analyse Asymptotique (2)</b>	<b>282</b>
I	Relations de comparaison pour les fonctions . . . . .	282

II	Relation de comparaison pour les suites . . . . .	282
II.1	Définitions . . . . .	282
II.2	Caractérisations pratiques . . . . .	283
II.3	Lien entre les relations de comparaison . . . . .	283
II.4	Croissances comparées de suites usuelles . . . . .	284
II.5	Règles usuelles de manipulation des relations de comparaison . . . . .	284
II.6	Obtention et utilisation des équivalents . . . . .	285
II.7	Formule de Stirling (à connaître) . . . . .	285
II.8	Utilisation des développements limités et équivalents usuels . . . . .	285
<b>27 Fonction Convexe</b>		<b>286</b>
I	Généralités . . . . .	286
I.1	Définition . . . . .	286
I.2	Inégalité de Jensen . . . . .	287
I.3	Caractérisation de la convexité par la croissance des pentes . . . . .	287
I.4	Inégalité des trois pentes . . . . .	287
I.5	Position de la courbe représentative par rapport aux sécantes . . . . .	287
II	Convexité et fonctions dérivables ou deux fois dérivables . . . . .	288
II.1	Fonctions convexes dérivables . . . . .	288
II.2	Fonctions convexes deux fois dérivables . . . . .	288
III	Quelques exemples d'inégalités de convexité (à retrouver) . . . . .	288
III.1	Inégalités usuelles . . . . .	288
III.2	Moyennes arithmétique, géométrique et harmonique (HP mais classique) . . .	289
<b>28 Séries numériques</b>		<b>290</b>
I	Généralités . . . . .	290
I.1	Définition et notation d'une série . . . . .	290
I.2	Nature d'une série . . . . .	291
I.3	Condition nécessaire de convergence . . . . .	291
I.4	Somme et reste d'une série convergente . . . . .	291



I.5	Lien suite-série . . . . .	292
I.6	Opérations algébriques sur les séries convergentes . . . . .	292
I.7	Cas des séries à termes complexes . . . . .	292
I.8	Premières séries de référence : les séries géométriques de raison $a \in \mathbb{K}$ . . . . .	293
II	Séries à termes réels positifs . . . . .	293
II.1	Condition nécessaire et suffisante de convergence . . . . .	293
II.2	Théorèmes de comparaison . . . . .	293
II.3	Encadrement des sommes partielles par la méthode des rectangles . . . . .	294
II.4	Autres séries de références importantes : les séries de Riemann . . . . .	294
III	Convergence absolue d'une série . . . . .	295
III.1	Définition . . . . .	295
III.2	Propriété importante . . . . .	296
III.3	Théorème de domination . . . . .	296
III.4	Dernières séries de référence à connaître : les séries exponentielles . . . . .	296
IV	Séries alternées . . . . .	296
IV.1	Définition . . . . .	296
IV.2	Théorème spécial pour certaines séries alternées (règle de Leibniz) . . . . .	297

## 29 Intégration sur un segment 298

I	Continuité uniforme . . . . .	298
I.1	Définition . . . . .	298
I.2	Propriétés . . . . .	299
I.3	Théorème de Heine (preuve non exigible) . . . . .	299
II	Continuité par morceaux sur un segment . . . . .	300
II.1	Subdivision d'un segment . . . . .	300
II.2	Fonctions en escalier sur un segment . . . . .	301
II.3	Fonctions continues par morceaux sur un segment . . . . .	301
II.4	Approximation uniforme des fonctions continues par morceaux . . . . .	301
III	Intégrale sur un segment d'une fonction continue par morceaux . . . . .	303
III.1	Cas particulier des fonctions en escalier sur un segment . . . . .	303

III.2	Cas général des fonctions continues par morceaux sur un segment . . . . .	305
III.3	Valeur moyenne . . . . .	306
III.4	Propriétés . . . . .	306
III.5	Sommes de Riemann à pas constant . . . . .	308
IV	Lien entre intégrale et primitive d'une fonction continue . . . . .	309
IV.1	Théorème fondamental . . . . .	309
V	Formules de Taylor globales . . . . .	311
V.1	Formule de Taylor avec reste intégral . . . . .	311
V.2	Inégalité de Taylor-Lagrange . . . . .	312

## **30 Groupe Symétrique 313**

I	Généralités . . . . .	313
I.1	Groupe symétrique . . . . .	313
I.2	Cycles, transposition . . . . .	314
I.3	Décomposition des permutations en produit de cycles disjoints . . . . .	314
II	Signature d'une permutation . . . . .	315
II.1	Décomposition d'une permutation en produit de transpositions . . . . .	315
II.2	Théorème d'existence et unicité de la signature (ADMIS) . . . . .	315

## **31 Déterminants 318**

I	Formes $n$ -linéaires alternées . . . . .	318
I.1	Définition . . . . .	318
I.2	Propriétés . . . . .	319
II	Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base . . . . .	319
II.1	Théorème . . . . .	319
II.2	Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base . . . . .	320
II.3	Formule de changement de bases . . . . .	321
II.4	Caractérisation des bases par le déterminant . . . . .	322
III	Déterminant d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée . . . . .	322
III.1	Cas d'un endomorphisme en dimension finie . . . . .	322

III.2	Déterminant d'une matrice carrée . . . . .	324
III.3	Calcul de déterminants en pratique . . . . .	326
III.4	Comatrice . . . . .	329
<b>32</b>	<b>Espaces préhilbertiens réels</b>	<b>330</b>
I	Généralités . . . . .	330
I.1	Produit scalaire . . . . .	330
I.2	Quatre exemples usuels à connaître . . . . .	331
I.3	Inégalités remarquables . . . . .	331
I.4	Norme associée à un produit scalaire . . . . .	333
II	Orthogonalité . . . . .	333
II.1	Vecteurs orthogonaux et vecteurs unitaires . . . . .	334
II.2	Orthogonal d'une partie . . . . .	334
II.3	Familles orthogonales et familles orthonormales . . . . .	334
III	Bases orthonormales . . . . .	335
III.1	Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt . . . . .	335
III.2	Existence de bases orthonormales . . . . .	336
III.3	Calculs dans une base orthonormale . . . . .	336
IV	Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie . . . . .	337
IV.1	Supplémentaire orthogonal d'un sous-espace de dimension finie . . . . .	337
IV.2	Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie . . . . .	338
IV.3	Détermination pratique du projeté orthogonal d'un vecteur . . . . .	338
IV.4	Caractérisation du projeté orthogonal d'un vecteur . . . . .	339
IV.5	Cas particulier des hyperplans . . . . .	339
<b>33</b>	<b>Dénombrement - Probabilité sur un univers fini</b>	<b>340</b>
I	Dénombrement . . . . .	340
I.1	Cardinal d'un ensemble fin . . . . .	340
I.2	Listes et combinaisons . . . . .	341

II	Probabilités sur un univers fini . . . . .	342
II.1	Expérience aléatoire et univers . . . . .	342
II.2	Espaces probabilisés finis . . . . .	343
II.3	Probabilités conditionnelles . . . . .	344
II.4	Événements indépendants . . . . .	345
<b>34</b>	<b>Variables aléatoires sur un univers fini</b>	<b>347</b>
I	Loi d'une variable aléatoire . . . . .	347
I.1	Définitions, propriétés et notations . . . . .	347
I.2	Image d'une variable aléatoire par une fonction . . . . .	348
I.3	Lois usuelles . . . . .	349
I.4	Loi conditionnelle d'une variable aléatoire . . . . .	350
I.5	Couple de variables aléatoires . . . . .	350
I.6	Extension . . . . .	351
II	Variables aléatoires indépendantes . . . . .	351
II.1	Cas de deux variables aléatoires . . . . .	351
II.2	Cas des $n$ -uplets de variables aléatoires avec $n \geq 2$ . . . . .	352
III	Espérance d'une variable aléatoire réelle ou complexe . . . . .	353
III.1	Définition . . . . .	353
III.2	Propriétés . . . . .	353
III.3	Espérance de variables aléatoires usuelles . . . . .	353
III.4	Formule de transfert . . . . .	354
III.5	Produit de variables aléatoires indépendantes . . . . .	354
IV	Variance, écart type, covariance . . . . .	355
IV.1	Variance et écart-type d'une variable aléatoire réelle . . . . .	355
IV.2	Covariance de deux variables aléatoires réelles . . . . .	355
IV.3	Inégalités probabilistes . . . . .	357
<b>35</b>	<b>fonctions de deux variables réelles</b>	<b>358</b>

I	Ouverts et boules de l'espace euclidien usuel $\mathbb{R}^2$	358
I.1	Boules pour la norme euclidienne	358
I.2	Ouverts pour la norme euclidienne	359
I.3	Continuité des fonctions de deux variables réelles à valeurs réelles	359
II	Dérivées partielles d'ordre 1	360
II.1	Dérivées partielles d'ordre 1	360
III	Existence de dérivées partielles et continuité : point de vigilance!	361
III.1	Classe $\mathcal{C}^1$	361
III.2	Classe $\mathcal{C}^1$ et continuité	363
III.3	Gradient d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$	363
IV	Extremums	364
IV.1	Définitions	364
IV.2	Condition NECESSAIRE d'existence d'un extremum local	364
V	Règle de la chaîne	365
V.1	Dérivée selon un vecteur	365
V.2	Expression des dérivées directionnelles avec le gradient	365
V.3	Règle de la chaîne	365
V.4	Propriétés	366

## **36 Familles sommables de réels ou complexes 368**

I	Familles sommables de réels positifs	368
I.1	Rappel : relation d'ordre dans la demi-droite achevée $[0 ; +\infty]$	368
I.2	Somme d'une famille de réels positifs	369
I.3	Sommabilité d'une famille de réels positifs	370
I.4	Opérations	370
I.5	Théorème de sommation par paquets positifs (ADMIS)	371
I.6	Théorème de Fubini positif	371
II	Familles sommables d'éléments de $\mathbb{K}$	371
II.1	Généralités	372

II.2	Cas particulier important des familles d'éléments de $\mathbb{K}$ indexées par $\mathbb{N}$ . . . . .	373
II.3	Théorème de majoration . . . . .	373
II.4	Linéarité de la somme . . . . .	373
II.5	Théorème de sommation par paquets (ADMIS) . . . . .	373
II.6	Théorème de Fubini . . . . .	374
II.7	Cas particulier . . . . .	374
II.8	Produit de Cauchy . . . . .	374

# Première partie

## Cours

# Chapitre 1

## Trigonométrie (Rappels et compléments)

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Cercle trigonométrique . . . . .</b>	<b>22</b>
I.1	Relation de congruence modulo $2\pi$ sur $\mathbb{R}$ . . . . .	22
<b>II</b>	<b>Cosinus et sinus . . . . .</b>	<b>23</b>
II.1	Formules et valeurs remarquables . . . . .	23
<b>III</b>	<b>La fonction tangente . . . . .</b>	<b>25</b>

Dans ce chapitre, on rappelle ce qui a été vu en trigonométrie au lycée et on complète avec les formules d'addition et de duplication ainsi que l'étude de la fonction tangente.

### I Cercle trigonométrique

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

---

#### Définition I.0.1 (Cercle trigonométrique)

On appelle cercle trigonométrique le cercle de centre  $O$  et de rayon 1

---

#### Propriétés I.0.2 (enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique)

Soit  $M$  un point du plan.

Le point  $M$  appartient au cercle trigonométrique si, et seulement si, il existe un réel  $t$  tel que les coordonnées de  $M$  dans le repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  sont  $(\cos t ; \sin t)$

#### I.1 Relation de congruence modulo $2\pi$ sur $\mathbb{R}$

---

##### Définition I.1.1

Deux réels  $a$  et  $b$  sont dits congrus modulo  $2\pi$  s'il existe un entier relatif  $k$  tel que  $a - b = 2k\pi$

Notation :  $a \equiv b [2\pi]$



---

**Définition/Propriétés I.1.2**

On dit que la relation  $\equiv$  est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{R}$  car elle vérifie les propriétés suivantes :

- (1) Pour tout réel  $x$ , on a :  $x \equiv x [2\pi]$ . (réflexivité)
- (2) Pour tout couple de réels  $(x, y)$  tel que  $x \equiv y [2\pi]$ , on a :  $y \equiv x [2\pi]$  (symétrie)
- (3) Pour tout triplet de réels  $(x, y, z)$  tel que  $x \equiv y [2\pi]$  et  $y \equiv z [2\pi]$ , on a :  $x \equiv z [2\pi]$  (transitivité)

## II Cosinus et sinus

### II.1 Formules et valeurs remarquables

---

**Formule II.1.1 (Formule de base)**

Pour tout réel  $t$ , on a :

- (1)  $\cos(\pi - t) = -\cos t$  et  $\sin(\pi - t) = \sin t$
- (2)  $\cos(\pi + t) = -\cos t$  et  $\sin(\pi + t) = -\sin t$
- (3)  $\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \sin t$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cos t$
- (4)  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = -\sin t$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = \cos t$

$t$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

---

*Remarque II.1.2*

Soient  $a$  et  $b$  des réels :

$$\begin{aligned} \bullet \cos a = \cos b &\iff \begin{cases} a \equiv b [2\pi] \\ \text{ou} \\ a \equiv -b [2\pi] \end{cases} \iff \begin{cases} \exists k \in \mathbb{Z}, a = b + 2k\pi \\ \text{ou} \\ \exists k' \in \mathbb{Z}, a = -b + 2k'\pi \end{cases} \\ \bullet \sin a = \sin b &\iff \begin{cases} a \equiv b [2\pi] \\ \text{ou} \\ a \equiv \pi - b [2\pi] \end{cases} \iff \begin{cases} \exists k \in \mathbb{Z}, a = b + 2k\pi \\ \text{ou} \\ \exists k' \in \mathbb{Z}, a = \pi - b + 2k'\pi \end{cases} \end{aligned}$$

---

**Formule II.1.3 (Formule d'addition)**

Pour tout couple de réels  $(a, b)$  on a :

$$(1) \cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$$

$$(2) \cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b)$$

$$(3) \sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b)$$

$$(4) \sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \cos(a) \sin(b)$$

---

**Formule II.1.4 (Formule de simpson)**

Pour tout couple de réels  $(a, b)$  on a :

$$(1) \sin(a + b) + \sin(a - b) = 2 \sin(a) \cos(b) \iff \frac{1}{2} (\sin(a + b) + \sin(a - b)) = \sin(a) \cos(b)$$

$$(2) \cos(a + b) + \cos(a - b) = 2 \cos(a) \cos(b) \iff \frac{1}{2} (\cos(a + b) + \cos(a - b)) = \cos(a) \cos(b)$$

---

**Application II.1.5**

Calcul :

$$\int_0^\pi \sin(x) \cos(3x) dx = \int_0^\pi \frac{1}{2} (\sin(4x) + \sin(2x)) dx = 0$$

---

**Formule II.1.6 (Formule de duplication)**

Pour tout réel  $a$ , on a :

$$(1) \cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2 \cos^2(a) - 1 = 1 - 2 \sin^2(a)$$

$$(2) \sin(2a) = 2 \cos(a) \sin(a)$$

---

**Propriétés II.1.7 (Sinus et Cosinus)**

- La fonction  $\cos$  est définie sur  $\mathbb{R}$ , paire et périodique de période  $2\pi$ . Elle est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et sa dérivée vérifie  $\cos' = -\sin$
- La fonction  $\sin$  est définie sur  $\mathbb{R}$ , impaire et périodique de période  $2\pi$ . Elle est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et sa dérivée vérifie  $\sin' = \cos$

---

**Propriétés II.1.8 (Inégalité remarquable)**

Pour tout réel  $t$ , on a :  $|\sin(t)| \leq |t|$

---

**Définition/Propriétés II.1.9 (Relation fondamentale de la trigonométrie)**

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

---

*Démonstration*

Soit  $f : x \mapsto \cos^2(x) + \sin^2(x)$

alors on a :  $f'(x) = -2\sin(x)\cos(x) + 2\sin(x)\cos(x) = 0$

Donc  $f$  est constante ainsi  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(0) = \cos^2(0) + \sin^2(0) = 1^2 + 0^2 = 1$  ■

### III La fonction tangente

---

**Définition III.0.1**

La fonction  $\frac{\sin}{\cos}$  est appelée la fonction tangente et notée  $\tan$

---

**Propriétés III.0.2**

La fonction  $\tan$  est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ , impaire et périodique de période  $\pi$ . Elle est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$  et sa dérivée vérifie  $\tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\tan^2}$

---

**Formule III.0.3**

Pour tout réel  $t$ , on a :

(1)  $\tan(\pi - t) = -\tan(t)$

(2)  $\tan(\pi + t) = \tan(t)$

(3)

$t$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan t$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	NULL

---

**Formule III.0.4 (addition et duplication)**

Pour tout couple de réels  $(a, b)$  n'appartenant pas à l'ensemble  $\left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ , on a :

(1) Si  $a + b$  n'appartient pas à l'ensemble  $\left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$  alors  $\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$

(2) Si  $a - b$  n'appartient pas à l'ensemble  $\left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$  alors  $\tan(a - b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}$

(3) Si  $2a$  n'appartient pas à l'ensemble  $\left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$  alors  $\tan(2a) = \frac{2\tan(a)}{1 - \tan^2(a)}$

---

**Exercice/Exemple III.0.5**

Soit  $t$  réel n'appartenant pas à  $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$  :

$$\begin{aligned}\sin(t) &= 2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) \cos\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= \frac{2 \sin\left(\frac{t}{2}\right)}{\cos\left(\frac{t}{2}\right)} \cos^2\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= \frac{1}{1 + \tan^2\left(\frac{t}{2}\right)} \times 2 \tan\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= \frac{2 \tan\left(\frac{t}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{t}{2}\right)}\end{aligned}$$

# Chapitre 2

## Inégalité et fonction (rappels et compléments)

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Inégalité. . . . .</b>	<b>27</b>
I.1	Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$ . . . . .	27
<b>II</b>	<b>Valeur absolue d'un réel . . . . .</b>	<b>32</b>
<b>III</b>	<b>Partie entière d'un réel . . . . .</b>	<b>33</b>
<b>IV</b>	<b>Généralité sur les fonctions . . . . .</b>	<b>34</b>
<b>V</b>	<b>Fonction et relation d'ordre . . . . .</b>	<b>37</b>
<b>VI</b>	<b>Dérivation des fonctions d'une variable réelle . . . . .</b>	<b>38</b>

Dans ce chapitre, sont rassemblés des rappels ou compléments sur les inégalités ainsi que des fondamentaux sur les fonctions de variable réelle à valeurs réelles (sans preuve ni évocation de continuité).

## I Inégalité

### I.1 Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$

#### Définition I.1.1

On dit que la relation  $\leq$  est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{R}$  car elle vérifie les propriétés suivantes :

- (1) Pour tout réel  $x$ , on a :  $x \leq x$ . (réflexivité)
- (2) Pour tout couple de réels  $(x, y)$  tel que  $x \leq y$  et  $y \leq x$ , on a :  $y = x$  (antisymétrie)
- (3) Pour tout triplet de réels  $(x, y, z)$  tel que  $x \leq y$  et  $y \leq z$ , on a :  $x \leq z$  (transitivité)

#### Propriétés I.1.2 (Compatibilité avec les opérations)

Soit  $x, y, z, t$  et  $a$  des réels.

- (1) Si  $x \leq y$  et  $z \leq t$  alors  $x + z \leq y + t$
- (2) Si  $x \leq y$  et  $0 \leq a$  alors  $ax \leq ay$

- (3) Si  $x \leq y$  et  $a \leq 0$  alors  $ay \leq ax$   
 (4) Si  $0 \leq x \leq y$  et  $0 \leq z \leq t$  alors  $0 \leq xz \leq yt$

---

### Notation I.1.3 (Intervalles de $\mathbb{R}$ )

Les parties  $I$  de  $\mathbb{R}$  pouvant s'écrire sous l'une des formes suivantes sont dites intervalles de  $\mathbb{R}$  :

- $I = \emptyset$
- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \underset{\text{notation}}{=} [a ; b]$  avec  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et  $a \leq b$
- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \underset{\text{notation}}{=} [a ; b[$  avec  $(a, b) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \cup \{+\infty\})$  et  $a < b$
- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} \underset{\text{notation}}{=} ]a ; b]$  avec  $(a, b) \in (\mathbb{R} \cup \{-\infty\}) \times \mathbb{R}$  et  $a < b$
- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \underset{\text{notation}}{=} ]a ; b[$  avec  $(a, b) \in (\mathbb{R} \cup \{-\infty\}) \times (\mathbb{R} \cup \{+\infty\})$  et  $a < b$

---

### Propriétés I.1.4

- (1) Passage à l'inverse dans une inégalité

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall y \in \mathbb{R}_+^*, x \leq y \iff \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_-^*, \forall y \in \mathbb{R}_-^*, x \leq y \iff \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}$$

- (2) Passage au carré dans une inégalité

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall y \in \mathbb{R}_+^*, x \leq y \iff x^2 \leq y^2$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_-^*, \forall y \in \mathbb{R}_-^*, x \leq y \iff y^2 \leq x^2$$

- (3) Passage à la racine carrée dans une inégalité

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \forall y \in \mathbb{R}_+, x \leq y \iff \sqrt{x} \leq \sqrt{y}$$

- (4) Passage à l'exponentielle ou au logarithme népérien dans une inégalité

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \leq y \iff e^x \leq e^y$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall y \in \mathbb{R}_+^*, x \leq y \iff \ln x \leq \ln y$$

---

**Exercice/Exemple I.1.5**

Montrer  $\forall x \in [0 ; 1], x(1-x) \leq \frac{1}{4}$ .

---

*Correction I.1.6 (2 Méthode)*

Soit  $x \in [0 ; 1]$

(1) Raisonnement par équivalence

$$\begin{aligned}x(1-x) \leq \frac{1}{4} &\iff 0 \leq \frac{1}{4} - x(1-x) \\&\iff 0 \leq x^2 - x + \frac{1}{4} \\&\iff 0 \leq \left(x - \frac{1}{2}\right)^2\end{aligned}$$

Ceci étant vrai  $\forall x \in [0 ; 1]$ , car  $\Delta = 0$  et  $x_0 = \frac{1}{2}$ , on conclut  $\forall x \in [0 ; 1], x(1-x) \leq \frac{1}{4}$ .

(2) étude de la fonction  $f : [0 ; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \frac{1}{4} - x(1-x)$$

---

**Exercice/Exemple I.1.7**

Montrer  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, x + \frac{1}{x} \geq 2$ .

---

*Correction I.1.8*

Soit  $x \in \mathbb{R}_+^*$

$$\begin{aligned}x + \frac{1}{x} \geq 2 &\iff \frac{x^2 + 1}{x} \geq 2 \\&\iff x^2 - 2x + 1 \geq 0 \\&\iff (x - 1)^2 \geq 0\end{aligned}$$

Ceci étant vrai  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ , on conclut  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, x + \frac{1}{x} \geq 2$ .

---

**Exercice/Exemple I.1.9**

Encadrer  $\frac{2x^2 - x + 1}{x^2 + \sqrt{x+2} + 3}$  pour  $x \in [-1 ; 1]$ .

---

*Correction I.1.10*

Soit  $x \in [-1 ; 1]$

(1) numérateur :

$$\begin{aligned} -1 \leq x \leq 1 &\iff 0 \leq x^2 \leq 1 \\ &\iff 0 \leq 2x^2 \leq 2 \\ &\iff 0 \leq 2x^2 - x + 1 \leq 4 \end{aligned}$$

(2) denominateur :

$$\begin{aligned} -1 \leq x \leq 1 &\iff 0 \leq x^2 \leq 1 \\ &\iff 4 \leq x^2 + \sqrt{x+2} + 3 \leq 4 + \sqrt{3} \\ &\iff \frac{1}{4 + \sqrt{3}} \leq \frac{1}{x^2 + \sqrt{x+2} + 3} \leq \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Ainsi par produit des deux inégalités on a  $0 \leq \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 + \sqrt{x+2} + 3} \leq 1$  pour  $x \in [-1 ; 1]$ .

---

**Exercice/Exemple I.1.11**

Encadrer  $\frac{x - y^2 + 3}{x^2 + y^2 - y}$  pour  $\forall (x, y) \in [1 ; 2]^2$ .

---

*Correction I.1.12*

Soit  $x \in [-1 ; 1]$

(1) numérateur :

$$1 - 4 + 3 \leq x - y^2 + 3 \leq 2 - 1 + 4 \iff 0 \leq x - y^2 + 3 \leq 5$$

(2) denominateur :

$$\begin{aligned} 0 \leq y - 1 \leq 1 &\iff 0 \leq y^2 - y \leq y \\ &\iff 0 \leq y^2 - y \leq 2 \\ &\iff 1 \leq x^2 + y^2 - y \leq 6 \\ &\iff \frac{1}{6} \leq \frac{1}{x^2 + y^2 - y} \leq 1 \end{aligned}$$

Ainsi par produit des deux inégalités on a  $0 \leq \frac{x - y^2 + 3}{x^2 + y^2 - y} \leq 5$  pour  $\forall (x, y) \in [1 ; 2]^2$ .



---

**Définition I.1.13 (Parties majorées, majorants, maximum)**

Une partie  $A$  de  $\mathbb{R}$  est dite majorée s'il existe un réel  $M$  tel que, pour tout réel  $x$  de  $A$ , on a :  $x \leq M$ . Un tel réel  $M$  est alors dit :

- majorant de  $A$  dans le cas général.
- maximum de  $A$  dans le cas particulier où  $M$  appartient à  $A$ .

---

**Définition I.1.14 (Parties minorées, minorants, minimum)**

Une partie  $A$  de  $\mathbb{R}$  est dite minorée s'il existe un réel  $m$  tel que, pour tout réel  $x$  de  $A$ , on a :  $m \leq x$ . Un tel réel  $m$  est alors dit :

- minorant de  $A$  dans le cas général.
- minimum de  $A$  dans le cas particulier où  $m$  appartient à  $A$ .

---

**Exercice/Exemple I.1.15**

Que dire de  $B = \left\{ \frac{n}{n^2 + 1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$  ?

---

*Correction I.1.16*

- $B$  est minorée car  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $0 \leq \frac{n}{n^2 + 1}$  par ailleurs  $0 \in B$  donc 0 est un minimum.
- $B$  est majorée par  $\frac{1}{2}$ . En effet en notant  $U_n = \frac{n}{n^2 + 1}$ , On voit que  $(U_n)$  est strictement décroissante

---

**Exercice/Exemple I.1.17**

Que dire de  $C = \left\{ \frac{e^x}{x} \mid x \in \mathbb{R}_+^* \right\}$  ?

---

*Correction I.1.18*

- $C$  est minorée car  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $0 \leq \frac{e^x}{x}$  donc 0 est un minorant mais pas un minimum
- Supposons que  $C$  est majorée alors  $\exists M \in \mathbb{R}$ ,  $\forall c \in C$ ,  $c \leq M$  ainsi  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $\frac{e^x}{x} \leq M$  donc par passage à la limite en  $+\infty$  on trouve  $+\infty \leq M$  ce qui est absurde donc  $C$  n'est pas majorée.

---

**Définition I.1.19 (Parties bornées)**

Une partie  $A$  de  $\mathbb{R}$  est dite bornée si elle est majorée et minorée autrement dit s'il existe deux réels  $m$  et  $M$  tel que, pour tout réel  $x$  de  $A$ , on a :  $m \leq x \leq M$ .

## II Valeur absolue d'un réel

---

### Définition II.0.1

Pour tout  $x$  réel, la valeur absolue de  $x$ , notée  $|x|$ , est définie par :  $|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

---

### Propriétés II.0.2

- (1) Pour tout  $x$  réel, on a :  $0 \leq |x|$  et  $x \leq |x|$
  - (2) Pour tout couple  $(x, y)$  de réels, on a :  $|xy| = |x| |y|$
  - (3) Pour tout couple  $(x, y)$  de réels tel que  $y$  est non nul, on a :  $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$
- 

### Définition/Propriétés II.0.3 (Deux inéquations élémentaires)

Pour tout réel  $x$  et tout réel positif  $\alpha$ , on a :

- (1)  $|x| \leq \alpha \iff -\alpha \leq x \leq \alpha \iff x \in [-\alpha ; \alpha]$
  - (2)  $|x| \geq \alpha \iff x \leq -\alpha \text{ ou } \alpha \leq x \iff x \in ]+\infty ; -\alpha] \cup [\alpha ; +\infty[$
- 

### Définition/Propriétés II.0.4 (Interprétation sur la droite des réels)

Soit  $a$  un réel et  $b$  un réel positif.

L'ensemble des réels  $x$  vérifiant  $|x - a| \leq b$  (resp.  $|x - a| \geq b$ ) est l'ensemble des points de la droite des réels situés à une distance du point  $a$  inférieure ou égale (resp. supérieure ou égale) à  $b$ .

---

### Propriétés II.0.5 (Inégalité triangulaire)

Pour tout couple  $(x, y)$  de réels, on a :

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

---

#### *Démonstration (inégalité triangulaire)*

Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} |x + y| \leq |x| + |y| &\iff |x + y|^2 \leq (|x| + |y|)^2 \\ &\iff x^2 + 2xy + y^2 \leq x^2 + y^2 + 2|x||y| \\ &\iff xy \leq |xy| \end{aligned}$$

Ce qui est vrai donc l'inégalité est bien démontrée

■

---

### Exercice/Exemple II.0.6

Encadrer  $\frac{x \cos(x) + 1}{\sin(x) + 3}$  pour  $x \in [-\pi ; 2\pi]$

---

*Correction II.0.7*

Soit  $x \in [-\pi ; 2\pi]$

- numérateur :  $|x \cos(x) + 1| \leq |x| |\cos(x)| + 1 \leq 2\pi + 1 = 2\pi + 1$
- dénominateur :  $2 \leq |\sin(x) + 3| \leq 4$

Ainsi par produit des deux inégalités on a :  $0 \leq \frac{|x \cos(x) + 1|}{|\sin(x) + 3|} \leq \frac{2\pi + 1}{2}$

donc  $-\frac{2\pi + 1}{2} \leq \frac{x \cos(x) + 1}{\sin(x) + 3} \leq \frac{2\pi + 1}{2}$  pour  $x \in [-\pi ; 2\pi]$ .

---

### Propriétés II.0.8

Soit un couple  $(x, y)$  de réels.

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

---

*Démonstration*

Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$   $x = (x - y) + y$  donc  $|x| \underset{\text{inég. triang.}}{\leq} |x - y| + |y|$  d'où  $|x| - |y| \leq |x - y|$

De même,  $y = (x - y) + x$  donc  $|y| \underset{\text{inég. triang.}}{\leq} |x - y| + |x|$  d'où  $-|x - y| \leq |x| - |y|$

ainsi on a  $-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|$  donc  $||x| - |y|| \leq |x - y|$ . ■

---

## III Partie entière d'un réel

---

### Propriétés III.0.1

Pour tout réel  $x$ , il existe un unique entier  $n$  tel que :

$$n \leq x < n + 1$$

---

### Définition III.0.2

On appelle partie entière de  $x$ , notée  $\lfloor x \rfloor$ , l'unique entier  $n$  vérifiant la propriété précédente.

---

*Exemple III.0.3*

$\lfloor 3.14 \rfloor = 3$ ,  $\lfloor -2.7 \rfloor = -3$  et  $\lfloor 5 \rfloor = 5$ .

## IV Généralité sur les fonctions

---

### Définition IV.0.1 (Fonction)

Une fonction de variable réelle à valeurs réelles notée  $f$  est un objet mathématique qui, à tout élément  $x$  d'une partie non vide de  $\mathbb{R}$ , associe un et un seul nombre réel noté  $f(x)$ .

Notation Fonctionnelle :

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

---

### Définition IV.0.2

Soit  $f$  une fonction de variable réelle à valeurs réelles.

- (1) L'ensemble des réels  $x$  pour lesquels  $f(x)$  existe est appelé ensemble/domaine de définition de  $f$  et souvent noté  $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \text{ existe}\}$
  - (2) Soit  $x \in D_f$   
La valeur réelle  $f(x)$  est appelée image de  $x$  par  $f$ .
  - (3) soit  $y \in \mathbb{R}$   
S'il existe  $x$  dans  $D_f$  tel que  $f(x) = y$  alors  $x$  est dit antécédent de  $y$  par  $f$
- 

### Définition/Propriétés IV.0.3 (égalité entre fonction)

Deux fonctions  $f$  et  $g$  de variable réelle à valeurs réelles sont dites égales si les deux conditions suivantes sont réunies :

- les fonctions  $f$  et  $g$  ont le même ensemble de définition  $D$  ;
- pour tout  $x$  de  $D$ ,  $f(x) = g(x)$ .

dans ce cas, on note  $f = g$ .

---

### Exercice/Exemple IV.0.4

est-ce que les fonctions  $f$  et  $g$  définies par :

$$f : x \longmapsto \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} \text{ et } g : x \longmapsto \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$$

Sont égales ?

---

*Correction IV.0.5*

Tout d'abord  $\forall x \in D_f \cap D_g$ ,  $f(x) = g(x)$  car :

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} \\ &= \frac{(\sqrt{1+x} - 1)(\sqrt{1+x} + 1)}{x(\sqrt{1+x} + 1)} \\ &= \frac{1+x-1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} \\ &= \frac{x}{x(\sqrt{1+x} + 1)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} = f(x) \end{aligned}$$

Donc  $f = g$  sur  $D_f \cap D_g$  mais  $D_f = ]-1 ; +\infty]$  or  $D_g = [-1 ; +\infty[ \setminus \{0\}$  donc  $D_f \neq D_g$  donc  $f \neq g$ .

---

**Définition IV.0.6 (représentation graphique d'une fonction)**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , l'ensemble de points  $C_f$  défini par

$$C_f = \{M(x ; f(x)) \mid x \in D_f\}$$

est appelé représentation graphique de  $f$  (ou courbe représentative de  $f$ ).

---

**Définition IV.0.7 (Parité,imparité et périodicité d'une fonction)**

- Une fonction  $f$  est dite paire si, pour tout  $x$  de son domaine de définition, on a :  $f(-x) = f(x)$ .
- Une fonction  $f$  est dite impaire si, pour tout  $x$  de son domaine de définition, on a :  $f(-x) = -f(x)$ .
- Une fonction  $f$  est dite périodique de période  $T$  si, pour tout  $x$  de son domaine de définition, on a :  $f(x+T) = f(x)$ .

---

**Exercice IV.0.8**

Montrer que toute fonction de  $\mathbb{R}$  peut s'écrire de manière unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

---

*Correction IV.0.9 (Analyse-synthèse)*

Soit  $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  une fonction quelconque

- **analyse** : Supposons qu'il existe  $\begin{cases} p : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R} \text{ paire} \\ i : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R} \text{ impaire} \end{cases}$  telles que  $f = p + i$

$$\text{Ainsi } \forall x \in \mathbb{R} \begin{cases} f(x) = p(x) + i(x) & (1) \\ f(-x) = p(-x) + i(-x) = p(x) - i(x) & (2) \end{cases}$$

$$— \frac{1}{2} ((1)+(2)) \text{ donne } p : x \mapsto \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

$$— \frac{1}{2} ((1)-(2)) \text{ donne } i : x \mapsto \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

- **synthèse** : vérifions que le seul couple trouvé convient :
  - $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = p(x) + i(x)$
  - $p(-x) = p(x)$  et  $i(-x) = -i(x)$

Ainsi  $f$  s'écrit de manière unique comme la somme d'une fonction paire et impaire

---

**Définition IV.0.10 (opération et composition)**

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions de variable réelle à valeurs réelles de domaines de définition  $D_f$  et  $D_g$ .

- La somme de  $f$  et  $g$  est la fonction, notée  $f + g$ , définie par  $f + g : x \mapsto f(x) + g(x)$ .  
Son domaine de définition  $D_{f+g}$  vérifie :  $D_{f+g} = D_f \cap D_g$ .
- La multiplication de  $f$  par le réel  $\alpha$  est la fonction, notée  $\alpha f$ , définie par  $\alpha f : x \mapsto \alpha f(x)$ .  
Son domaine de définition  $D_{\alpha f}$  vérifie :  $D_{\alpha f} = D_f$  si  $\alpha \neq 0$ .
- Le produit de  $f$  et  $g$  est la fonction, notée  $fg$ , définie par  $fg : x \mapsto f(x)g(x)$ .  
Son domaine de définition  $D_{fg}$  vérifie :  $D_{fg} = D_f \cap D_g$ .
- Le quotient de  $f$  par  $g$  est la fonction, notée  $\text{frac}fg$ , définie par  $\text{frac}fg : x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$ .  
Son domaine de définition  $D_{\text{frac}fg}$  vérifie :  $D_{\text{frac}fg} = D_f \cap \{x \in D_g | g(x) \neq 0\}$ .
- La composée de  $g$  et  $f$  est la fonction, notée  $g \circ f$ , définie par  $g \circ f : x \mapsto g(f(x))$ .  
Son domaine de définition  $D_{g \circ f}$  vérifie :  $D_{g \circ f} = \{x \in D_f | f(x) \in D_g\}$ .

---

**Exercice/Exemple IV.0.11**

Domaine de définition de :  $f : D_f \longrightarrow \mathbb{R}$   
$$x \longmapsto \sqrt{x - \frac{1}{x}}$$

Correction IV.0.12

Soit  $x \in D_f$  alors  $x - \frac{1}{x} \geq 0 \iff x \neq 0$  et  $\frac{x^2 - 1}{x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x} \geq 0$

$x$	$-\infty$	$-1$	$0$	$1$	$+\infty$	
$(x-1)(x+1)$	$+$	$0$	$-$	$-$	$0$	$+$
$x$	$-$	$-$	$0$	$+$	$+$	$+$
$f$	$-$	$0$	$+$	$-$	$0$	$+$

ainsi on voit bien que  $D_f = [-1 ; 0[ \cup ]1 ; +\infty[$

## V Fonction et relation d'ordre

### Définition V.0.1 (Monotonie)

Soit  $f$  une fonction de variable réelle à valeurs réelles et  $D$  une partie de son domaine de définition  $D_f$ .

- (1)  $f$  est dite **croissante** sur  $D$  si, pour tout  $(x, y) \in D^2$  tel que  $x \leq y$ , on a  $f(x) \leq f(y)$ .
- (2)  $f$  est dite **décroissante** sur  $D$  si, pour tout  $(x, y) \in D^2$  tel que  $x \leq y$ , on a  $f(x) \geq f(y)$ .
- (3)  $f$  est dite **strictement croissante** sur  $D$  si, pour tout  $(x, y) \in D^2$  tel que  $x < y$ , on a  $f(x) < f(y)$ .
- (4)  $f$  est dite **strictement décroissante** sur  $D$  si, pour tout  $(x, y) \in D^2$  tel que  $x < y$ , on a  $f(x) > f(y)$ .

**Remarque :**  $f$  est dite **monotone** (resp. **strictement monotone**) sur  $D$  si elle est croissante ou décroissante (resp. strictement croissante ou strictement décroissante) sur  $D$ .

### Remarque V.0.2 (Application de la définition)

Sous réserve que cela ait du sens :

- La somme de deux fonctions croissantes (resp. décroissantes) est croissante (resp. décroissante).
- La composée de deux fonctions croissantes (resp. décroissantes) est croissante (resp. décroissante).
- La composée d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante est décroissante
- Le produit de deux fonctions positives croissantes (resp. décroissantes) est croissante (resp. décroissante).

### Définition V.0.3

Soit  $f$  une fonction de variable réelle à valeurs réelles de domaine de définition  $D_f$ .

Soit  $D$  une partie non vide de  $D_f$ .

- (1)  $f$  est dite **majorée** sur  $D$  si l'ensemble  $\{f(x) \mid x \in D\}$  est majoré, c'est-à-dire s'il existe un réel  $M$  tel que, pour tout réel  $x$  de  $D$ , on a :  $f(x) \leq M$ .  
Un tel réel  $M$  est alors dit :

- **majorant** de  $f$  sur  $D$  dans le cas général.
  - **maximum** de  $f$  sur  $D$  dans le cas particulier où il existe  $x_0$  dans  $D$  tel que  $M = f(x_0)$ .
- (2)  $f$  est dite **minorée** sur  $D$  si l'ensemble  $\{f(x) \mid x \in D\}$  est minoré, c'est-à-dire s'il existe un réel  $m$  tel que, pour tout réel  $x$  de  $D$ , on a :  $m \leq f(x)$ .  
Un tel réel  $m$  est alors dit :
- **minorant** de  $f$  sur  $D$  dans le cas général.
  - **minimum** de  $f$  sur  $D$  dans le cas particulier où il existe  $x_0$  dans  $D$  tel que  $m = f(x_0)$ .
- (3)  $f$  est dite **bornée** sur  $D$  si  $f$  est majorée et minorée sur  $D$ , c'est-à-dire s'il existe deux réels  $m$  et  $M$  tels que, pour tout réel  $x$  de  $D$ , on a :  $m \leq f(x) \leq M$ .

### Propriétés V.0.4

Soit  $f$  une fonction de variable réelle à valeurs réelles de domaine de définition  $D_f$ .

Alors  $f$  est bornée sur  $D$  si, et seulement si, la fonction  $|f|$  est majorée sur  $D$ .

## VI Dérivation des fonctions d'une variable réelle

### Définition VI.0.1 (dérivée en un point)

Soit  $f$  une fonction de variable réelle à valeurs réelles de domaine de définition  $D_f$  et  $x_0$  un point de  $D_f$ .

$f$  est dite dérivable en  $x_0$  si la fonction  $x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  admet une limite finie en  $x_0$ .

Dans ce cas, on note  $f'(x_0)$  la valeur de cette limite et on l'appelle la dérivée de  $f$  en  $x_0$ .

Cela revient à déterminer si la fonction  $h \mapsto \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$  admet une limite finie en 0.

### Définition VI.0.2

fonction dérivée  $f$  est dite dérivable sur  $D_f$  si elle est dérivable en tout point de  $D_f$ .

Dans ce cas, la fonction  $x \mapsto f'(x)$  est appelée fonction dérivée de  $f$  et notée  $f'$ .

### Définition/Propriétés VI.0.3 (équation de la tangente)

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Soit  $f$  une fonction de variable réelle à valeurs réelles et  $C_f$  la courbe représentative de  $f$ .

Soit  $x_0$  un point de  $D_f$ .

Si  $f$  est dérivable en  $x_0$ , alors la tangente à la courbe  $C_f$  au point  $M(x_0, f(x_0))$  est la droite d'équation :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$



---

**Définition/Propriétés VI.0.4 (opération sur les fonctions dérivables)**

Soit  $I$  et  $J$  des intervalles de  $\mathbb{R}$  non vides et non réduits à un point.

(1) Combinaison linéaire :

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $I$  et à valeurs réelles et  $(\alpha, \beta)$  deux réels.

Si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $I$ , alors  $\alpha f + \beta g$  est dérivable sur  $I$  et sa dérivée vérifie :

$$\alpha f + \beta g' = \alpha f' + \beta g'$$

(2) Produit :

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $I$  et à valeurs réelles.

Si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $I$ , alors  $fg$  est dérivable sur  $I$  et sa dérivée vérifie :

$$(fg)' = f'g + fg'$$

(3) quotient :

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $I$  et à valeurs réelles tel que  $g$  est non nulle sur  $I$ .

Si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $I$ , alors  $\frac{f}{g}$  est dérivable et sa dérivée vérifie :

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

(4) Composition :

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs réelles tel que, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f(x)$  appartient à  $J$

Soit  $g$  une fonction définie sur  $J$  et à valeurs réelles.

Si  $f$  est dérivable sur  $I$  et  $g$  dérivable sur  $J$ , alors la composée  $g \circ f$  est dérivable sur  $I$  et sa dérivée vérifie :

$$(g \circ f)' = g' \circ f \times f'$$

---

**Définition/Propriétés VI.0.5 (Caractérisation des fonctions constantes ou monotones)**

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et à valeurs réelles.

(1)  $f$  est constante sur  $I$  si, et seulement si, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) = 0$ .

(2)  $f$  est croissante sur  $I$  si, et seulement si, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \geq 0$ .

(3)  $f$  est décroissante sur  $I$  si, et seulement si, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \leq 0$ .

(4)  $f$  est strictement croissante sur  $I$  si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont réunies :

(a) pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \geq 0$  ;

(b) il n'existe pas de réels  $a$  et  $b$  dans  $I$  avec  $a < b$  tels que pour tout  $x$  de  $[a ; b]$ , on a  $f'(x) = 0$ .

(5)  $f$  est strictement décroissante sur  $I$  si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont réunies :

(a) pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \leq 0$  ;

(b) il n'existe pas de réels  $a$  et  $b$  dans  $I$  avec  $a < b$  tels que pour tout  $x$  de  $[a ; b]$ , on a  $f'(x) = 0$ .

---

**Définition/Propriétés VI.0.6 (dérivées usuelles)**

Fonction	Domaine de dérivabilité	Fonction dérivée
$x \mapsto a$ avec $a \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto 0$
$x \mapsto x^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto nx^{n-1}$
$x \mapsto x^{-n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}^*$	$x \mapsto -nx^{-n-1}$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto e^x$
$x \mapsto \ln(x)$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$	$x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)}$ ou $x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)}$

---

**Exercice/Exemple VI.0.7**

Calculer  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3(x)}{\cos^5(x)} dx$

---

**Correction VI.0.8**

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3(x)}{\cos^5(x)} dx &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \tan^3(x) \times \frac{1}{\cos^2(x)} dx \\
 &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \tan^3(x) \times (\tan^2(x) + 1) dx \\
 &= \left[ \frac{1}{4} (\tan^4(x)) \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \\
 &= \frac{1}{4} \left( \tan^4\left(\frac{\pi}{3}\right) - \tan^4\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left( (\sqrt{3})^4 - 1^4 \right) \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

---

**Définition/Propriétés VI.0.9 (étude pratique d'une fonction)**

Le plan d'étude d'une fonction  $f$  est en général le suivant :

- Détermination du domaine de définition de  $f$
- Réductions éventuelles du domaine d'étude selon les propriétés de  $f$  (parité, périodicité, etc.)
- Limites aux bornes du domaine d'étude
- Etude de la monotonie (le plus souvent, mais pas uniquement, après calcul de la dérivée de  $f$  et détermination du signe de celle-ci)
- Construction du tableau de variation de  $f$  (limites aux bornes, valeurs remarquables, variations)
- Tracé de la courbe représentative de  $f$

---

**Définition/Propriétés VI.0.10 (dérivées d'ordre supérieur)**

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et à valeurs réelles.

On note

$$f^{(0)} = f$$

puis, pour tout entier naturel  $k$  tel que la fonction  $f^{(k)}$  existe et est dérivable sur  $I$ , on pose :

$$f^{(k+1)} = \left(f^{(k)}\right)'$$

Si  $n$  est un entier naturel, tel que la fonction  $f^{(n)}$  existe alors on dit que  $f$  est  $n$ -fois dérivable sur  $I$  et que  $f^{(n)}$  est la dérivée d'ordre  $n$  (ou dérivée  $n$ -ième) de  $f$ .

---

**Définition VI.0.11 (Fonction réciproque)**

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  à valeurs dans  $J$ . Si, pour tout  $y$  de  $J$ , l'équation  $y = f(x)$  admet une unique solution  $x$  dans  $I$  notée  $x = f^{-1}(y)$  alors :

- la fonction  $f$  est dite bijection de  $I$  sur  $J$
- la fonction  $f^{-1}$  ainsi définie sur  $J$  et à valeurs dans  $I$ , est dite bijection réciproque de  $f$ .

Exemples :

- $\sqrt{\cdot}$  est une bijection de  $\mathbb{R}_+$  sur  $\mathbb{R}_+$  de bijection réciproque  $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$  définie par  $f(x) = x^2$ .
- $\exp$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  de bijection réciproque la fonction  $\ln$

---

**Propriétés VI.0.12 (Propriétés de la bijection réciproque)**

Si  $f$  est une bijection de  $I$  sur  $J$  de bijection réciproque notée  $f^{-1}$  alors on a :

- (1) pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f(f^{-1}(x)) = x$  ;
- (2) pour tout  $y$  de  $J$ ,  $f^{-1}(f(y)) = y$ .

---

**Définition/Propriétés VI.0.13 (représentation graphique)**

on se place dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Si  $f$  est une bijection de  $I$  sur  $J$  alors la courbe représentative de  $f$  et de sa bijection réciproque  $f^{-1}$  sont symétriques par rapport à la droite d'équation  $y = x$ .

---

**Définition/Propriétés VI.0.14 (dérivée de la bijection réciproque)**

Soit  $f$  une bijection de  $I$  sur  $J$  et si  $f$  est dérivable sur  $I$  alors sa bijection réciproque  $f^{-1}$  est dérivable en tout point  $y$  de  $J$  tel que  $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$  avec, dans ce cas :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

---

*Démonstration*

Soit  $f$  une bijection de  $I$  sur  $J$ , soit  $y$  in  $J$  tel que  $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$ .

on sait que  $f(f^{-1}(y)) = y$  donc en appliquant la définition de la dérivée de fonction composée on a :

$$(f(f^{-1}(y)))' = (y)' \iff f'(f^{-1}(y)) \times (f^{-1}(y))' = 1 \iff (f^{-1}(y))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} \quad \blacksquare$$

---

**Définition/Propriétés VI.0.15 (Trois fonctions usuelles trigonométriques)**

- Fonction Arccos :

La fonction Arccos est la réciproque de la fonction  $c : [0 ; \pi] \longrightarrow [-1 ; 1]$  et est donc  
$$x \longmapsto \cos(x)$$
  
définie sur  $[-1 ; 1]$  à valeurs dans  $[0 ; \pi]$  et dérivable sur  $] -1 ; 1[$  de dérivée :

$$\arccos' : x \longmapsto \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

- Fonction Arcsin :

La fonction Arccos est la réciproque de la fonction  $\left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1 ; 1]$  et est donc définie  
$$x \longmapsto \sin(x)$$
  
sur  $[-1 ; 1]$  à valeurs dans  $\left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$  et dérivable sur  $] -1 ; 1[$  de dérivée :

$$\arcsin' : x \longmapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

- Fonction Arctan :

La fonction Arccos est la réciproque de la fonction  $\left] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[ \xrightarrow{x} \mathbb{R}$  et est donc définie sur  $\mathbb{R}$  à valeurs dans  $\left] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[$  et dérivable sur  $\mathbb{R}$  de dérivée :

$$\arctan' : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$$

*Démonstration (démonstration de la dérivée de la fonction Arccos)*

Soit  $y \in [-1 ; 1]$ , on note  $c : [0 ; \pi] \xrightarrow{x} [-1 ; 1]$   
 $x \mapsto \cos(x)$

$$\begin{aligned} c'(c^{-1}(y)) &= -\sin(c^{-1}(y)) \\ &= -\sqrt{\sin^2(c^{-1}(y))} \quad \text{car } c^{-1}(y) \in [0 ; \pi] \text{ donc } \sin(c^{-1}(y)) \geq 0 \\ &= -\sqrt{1 - \cos^2(c^{-1}(y))} \\ &= -\sqrt{1 - y^2} \end{aligned}$$

Ainsi d'après la définition de la dérivée de la bijection réciproque on a :  $\text{Arccos}'(y) = \frac{-1}{\sqrt{1-y^2}}$  ■

*Remarque VI.0.16 (démonstration d'une relation intéressante entre Arctan(x) et Arctan( $\frac{1}{x}$ ))*

Soit  $f : x \mapsto \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right)$ , on a  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  et  $f$  dérivable sur  $D_f$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \text{Arctan}'\left(\frac{1}{x}\right) \times \left(\frac{1}{x}\right)' \\ &= \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \times \left(\frac{-1}{x^2}\right) \\ &= \frac{-1}{x^2 + 1} \end{aligned}$$

On remarque que  $\forall x \in \mathbb{R}^*$ ,  $f'(x) = -\text{Arctan}'(x)$  ainsi  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $f'(x) + \text{Arctan}'(x) = 0$  donc  $\forall x \in \mathbb{R}^*$ ,  $(f(x) + \text{Arctan}(x))' = 0$

Ainsi il existe  $c$  un réel tel que  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $f(x) + \text{Arctan}(x) = c$

Pour  $x = 1$ ,  $f(1) + \text{Arctan}(1) = c$

$$f(1) + \frac{\pi}{4} = c$$

$$c = \frac{\pi}{2}$$

Ainsi  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $\text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) + \text{Arctan}(x) = \frac{\pi}{2}$

De manière analogue on trouve  $\forall x \in \mathbb{R}_-^*$ ,  $\text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) + \text{Arctan}(x) = -\frac{\pi}{2}$

# Chapitre 3

## Calcul algébrique (rappels et compléments)

### Sommaire

I	Sommes et produits finis . . . . .	45
II	Cas des sommes doubles finies. . . . .	50
III	Système linéaire de deux équations à deux inconnues . . . . .	51
IV	Système linéaire de trois équations à trois inconnues. . . . .	52
V	Algorithme du Pivot . . . . .	53

### I Sommes et produits finis

#### Notation I.0.1

Soit  $(a_i)_{i \in I}$  une famille de réels indexée par un ensemble  $I$  fini.

La somme (resp. le produit) de tous les réels de la famille est notée  $\sum_{i \in I} a_i$  (resp.  $\prod_{i \in I} a_i$ ).

- Si  $I$  est l'ensemble vide, on convient que :  $\sum_{i \in I} a_i = 0$  et  $\prod_{i \in I} a_i = 1$ .
- Si  $I = \{1, 2, \dots, n\}$  avec  $n$  un entier naturel non nul, on note  $\sum_{i=1}^n a_i$  ou  $\sum_{1 \leq i \leq n} a_i$  au lieu de  $\sum_{i \in I} a_i$  (resp.  $\prod_{i=1}^n a_i$  ou  $\prod_{1 \leq i \leq n} a_i$  au lieu de  $\prod_{i \in I} a_i$ ).

#### Propriétés I.0.2 (opération et calcul par paquets)

- Pour toutes familles  $(a_i)_{i \in I}$  et  $(b_i)_{i \in I}$  de réels indexées par  $I$  et pour tout couple  $(\alpha, \beta)$  de réels, on a :

$$\sum_{i \in I} (\alpha a_i + \beta b_i) = \alpha \sum_{i \in I} a_i + \beta \sum_{i \in I} b_i \quad \text{et} \quad \prod_{i \in I} (a_i b_i) = \left( \prod_{i \in I} a_i \right) \left( \prod_{i \in I} b_i \right)$$

- Pour toute famille  $(a_i)_{i \in I}$  de réels indexée par  $I$  avec  $I = I_1 \cup I_2$  et  $I_1 \cap I_2 = \emptyset$ , on a :

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in I_1} a_i + \sum_{i \in I_2} a_i \quad \text{et} \quad \prod_{i \in I} a_i = \prod_{i \in I_1} a_i \prod_{i \in I_2} a_i$$

---

**Exercice/Exemple I.0.3**

Calculer :  $\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k$  avec  $n \in \mathbb{N}$

---

*Correction I.0.4*

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{2k+1} (2k+1) + \sum_{k=1}^n (-1)^{2k} (2k) \\ &= - \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) + \sum_{k=1}^n 2k \\ &= - \left( 2 \sum_{k=0}^{n-1} k + n \right) + 2 \sum_{k=1}^n k \\ &= - \left( 2 \frac{(n-1)n}{2} + n \right) + 2 \frac{n(n+1)}{2} \\ &= n(n+1 - n + 1 - 1) \\ &= n\end{aligned}$$

---

**Définition/Propriétés I.0.5 (téléscopage)**

Soit  $(b_i)_{1 \leq i \leq n}$  une famille finie de réels avec  $n$  supérieur ou égal à 2.

(1) La somme  $\sum_{i=1}^n b_{i+1} - b_i$  est dite somme télescopique et vaut  $b_{n+1} - b_1$ .

(2) Si tous les  $b_i$  sont non nuls, le produit  $\prod_{i=1}^n \frac{b_{i+1}}{b_i}$  est dit produit télescopique et vaut  $\frac{b_{n+1}}{b_1}$ .

---

**Définition/Propriétés I.0.6 (Sommes usuelles)**

Pour tout entier naturel  $n$  et tout réel  $x$  différent de 1, on a :

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$



---

*Démonstration*

Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$  :

- Démonstration de  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$  :

$$\sum_{k=1}^n (k^2 - (k-1)^2) = n^2 \quad (*) \quad (\text{télescopage})$$

donc via (\*) on a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (k^2 - (k-1)^2) = n^2 &\iff \sum_{k=1}^n (k^2 - k^2 + 2k - 1) = n^2 \\ &\iff 2 \left( \sum_{k=1}^n k \right) - n = n^2 \\ &\iff \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

- Démonstration, via un raisonnement similaire, de  $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(2n+1)(n+1)}{6}$ , on a :

$$\sum_{k=1}^n (k^3 - (k-1)^3) = n^3 \quad (*) \quad (\text{télescopage})$$

donc via (\*) on a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (k^3 - (k-1)^3) = n^3 &\iff \sum_{k=1}^n (k^3 - k^3 + 3k^2 - 3k + 1) = n^3 \\ &\iff \sum_{k=1}^n (3k^2 - 3k + 1) = n^3 \\ &\iff 3 \left( \sum_{k=1}^n k^2 \right) - 3 \left( \sum_{k=1}^n k \right) + n = n^3 \\ &\iff 3 \left( \sum_{k=1}^n k^2 \right) = 3 \left( \sum_{k=1}^n k \right) - n + n^3 \\ &\iff 3 \left( \sum_{k=1}^n k^2 \right) = \frac{3n(n+1) - 2n + 2n^3}{2} \\ &\iff 3 \left( \sum_{k=1}^n k^2 \right) = \frac{n(2n+1)(n+1)}{2} \\ &\iff \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(2n+1)(n+1)}{6} \end{aligned}$$

- Démonstration, via un raisonnement similaire, de  $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ , on a :

$$\sum_{k=0}^n x^k - x^{k+1} = 1 - x^{n+1} \quad (*) \quad (\text{télescopage})$$

■

donc via (\*) on a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n x^k - x^{k+1} = 1 - x^{n+1} &\iff \left( \sum_{k=0}^n x^k \right) - \left( \sum_{k=0}^n x^{k+1} \right) = 1 - x^{n+1} \\ &\iff \left( \sum_{k=0}^n x^k \right) - x \left( \sum_{k=0}^n x^k \right) = 1 - x^{n+1} \\ &\iff (1-x) \left( \sum_{k=0}^n x^k \right) = 1 - x^{n+1} \\ &\iff \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \end{aligned}$$

---

### Définition/Propriétés I.0.7 (Factorisation de $a^n - b^n$ )

Pour tout  $n$  entier naturel non nul et tout couple  $(a, b)$  de réels, on a :

$$\begin{aligned} a^n - b^n &= (a-b) \left( a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1} \right) \\ &= (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k \\ &= (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} \end{aligned}$$

---

*Démonstration (preuve par télescopage)*

Pour tout  $n$  entier naturel non nul et tout couple  $(a, b)$  de réels, on a :

$$\begin{aligned}(a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} &= (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k \\&= \sum_{k=0}^{n-1} (a-b) a^{n-1-k} b^k \\&= \sum_{k=0}^{n-1} (a^{n-(k)} b^k - a^{n-(k+1)} b^{k+1}) \\&= a^n b^0 - a^0 b^n \quad (\text{télescopage}) \\&= a^n - b^n\end{aligned}$$

---

**Définition/Propriétés I.0.8 (coefficients binomiaux)**

Soit  $n$  un entier naturel non et  $k$  entière relatif, on a :

- (1)  $\binom{k}{n} = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!k!} & \text{si } k \in \{0, 1, 2, \dots, n\} \\ 0 & \text{si } k < 0 \text{ ou } k > n \end{cases}$
- (2)  $\binom{k}{n} = \binom{n-k}{n}$  (symétrie)
- (3)  $\binom{k}{n} + \binom{k+1}{n} = \binom{k+1}{n+1}$  (relation de Pascal)
- (4)  $\binom{k}{n}$  est un entier naturel

---

**Définition/Propriétés I.0.9 (Formule du binôme de Newton)**

Pour tout couple  $(a, b)$  de réels et tout entier naturel  $n$ , on a :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^k b^{n-k}$$

---

*Démonstration (Formule du binôme par récurrence)*

Soit  $a$  et  $b$  des réels

Montrons que  $\forall n \in \mathbb{N}, (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^k b^{n-k}$

On note  $P(n)$  la Propriété «  $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^k b^{n-k}$  »

- Initialisation :  $P(0)$  est vrai car  $\begin{cases} (a+b)^0 &= 1 \\ \sum_{k=0}^0 \binom{k}{0} a^k b^{-k} = \binom{0}{0} a^0 b^0 &= 1 \end{cases}$
- Hérédité Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $P(n)$  est vrai, Montrons que  $P(n+1)$  est vrai :

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\
&= (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^k b^{n-k} \quad (\text{Hérédité}) \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{k}{n} (a^{k+1} b^{n-k} + a^k b^{n+1-k}) \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^k b^{n+1-k} \\
&= \sum_{k=1}^n \binom{k-1}{n} a^{k+1} b^{n-(k-1)} + \binom{n}{n} a^{n+1} b^0 \sum_{k=1}^n \binom{k}{n} a^k b^{n+1-k} + \binom{0}{n} a^0 b^{n+1} \\
&= \sum_{k=1}^n \binom{k}{n+1} a^k b^{n-k+1} + a^{n+1} + b^{n+1} \\
&= \sum_{k=1}^n \binom{k}{n+1} a^k b^{n-k+1} + \binom{n+1}{n+1} a^{n+1} + \binom{n+1}{n+1} b^{n+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{k}{n+1} a^k b^{n-k+1}
\end{aligned}$$

Donc  $P(n+1)$  vrai ■

## II Cas des sommes doubles finies

### Définition II.0.1

Soit  $A$  un ensemble fini de couples et  $(a_{i,j})_{(i,j) \in A}$  une famille de réels indexée par  $A$ . La somme de tous les réels de la famille  $(a_{i,j})_{(i,j) \in A}$  est notée  $\sum_{(i,j) \in A} a_{i,j}$  et appelée somme double.

Remarque : Si  $A$  est l'ensemble vide, on convient que  $\sum_{(i,j) \in A} a_{i,j} = 0$

### Définition/Propriétés II.0.2 (Sommes doubles rectangulaires)

Dans le cas où  $A = \{1, 2, \dots, n\} \times \{1, 2, \dots, m\}$  avec  $n$  et  $m$  des entiers naturels non nuls,

- la somme double  $\sum_{(i,j) \in A} a_{i,j}$  est rectangulaire

- le somme double  $\sum_{(i,j) \in A} a_{i,j}$  s'écrit aussi  $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} a_{i,j}$
- la somme double  $\sum_{(i,j) \in A} a_{i,j}$  vaut :

$$\sum_{(i,j) \in A} a_{i,j} = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^m a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^m \left( \sum_{i=1}^n a_{i,j} \right)$$

- si  $(b_i)_{1 \leq i \leq n}$  et  $(c_j)_{1 \leq j \leq m}$  sont des familles finies de réels, alors :

$$\left( \sum_{i=1}^n b_i \right) \left( \sum_{j=1}^m c_j \right) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} b_i c_j$$

### Définition/Propriétés II.0.3 (somme double triangulaire)

Dans le cas où  $A = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq i \leq j \leq n\}$  avec  $n$  un entier naturel non nul,

- La somme double  $\sum_{(i,j) \in A} a_{i,j}$  est dite triangulaire.
- La somme double  $\sum_{(i,j) \in A} a_{i,j}$  s'écrit aussi  $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}$  et vaut :

$$\sum_{(i,j) \in A} a_{i,j} = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=i}^n a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^n \left( \sum_{i=1}^j a_{i,j} \right)$$

## III Système linéaire de deux équations à deux inconnues

### Définition/Propriétés III.0.1 (rappel de première)

Dans le plan  $\mathbb{R}^2$  muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , toute droite  $D$  admet une équation de la forme

$$ax + by = c$$

où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont des réels tels que  $(a, b) \neq (0, 0)$ .

Avec ces notations,

- le vecteur  $\vec{n}$  de coordonnées  $(a, b)$  est un vecteur normal à  $D$  ;
- le vecteur  $\vec{u}$  de coordonnées  $(-b, a)$  est un vecteur directeur de  $D$ .

---

**Définition/Propriétés III.0.2 (Système linéaire de deux équations à deux inconnues)**

Soit  $a, b, c, a', b'$  et  $c'$  des réels. Le système d'équations

$$(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

d'inconnues les réels  $x$  et  $y$  est dit système linéaire de deux équations à deux inconnues.

---

**Définition/Propriétés III.0.3 (Interprétation géométrique)**

Dans le cas où  $(a, b) \neq (0, 0)$  et  $(a', b') \neq (0, 0)$ , résoudre le système  $(S)$  revient à déterminer l'intersection entre deux droites  $D$  et  $D'$  du plan. Trois cas se présentent :

- Les droites sont confondues donc  $(S)$  a une infinité de solutions qui forment une droite ;
- Les droites sont sécantes donc  $(S)$  a une unique solution ;
- Les droites sont parallèles non confondues donc  $(S)$  n'a pas de solutions.

## IV Système linéaire de trois équations à trois inconnues

---

**Définition/Propriétés IV.0.1 (rappel de terminale)**

Dans l'espace  $\mathbb{R}^3$  muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , tout plan  $P$  admet une équation de la forme

$$ax + by + cz = d$$

où  $a, b, c$  et  $d$  sont des réels tels que  $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$

- le vecteur  $\vec{n}$  de coordonnées  $(a, b, c)$  est un vecteur normal à  $P$  ;
- deux vecteurs non colinéaires pris parmi les vecteurs de coordonnées  $(-b, a, 0)$ ,  $(0, -c, b)$  et  $(-c, 0, a)$  donnent la direction de  $P$ .

---

**Définition/Propriétés IV.0.2 (Système linéaire de deux équations à trois inconnues)**

Soit  $a, b, c, d, a', b', c'$  et  $d'$  des réels. Le système d'équations

$$(S) : \begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \end{cases}$$

d'inconnues les réels  $x, y$  et  $z$  est dit système linéaire de deux équations à trois inconnues.

---

**Définition/Propriétés IV.0.3 (Interprétation géométrique)**

Dans le cas où  $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$  et  $(a', b', c') \neq (0, 0, 0)$ , résoudre le système  $(S)$  revient à déterminer l'intersection entre deux plans  $P$  et  $P'$  de l'espace. Trois cas se présentent :

- Les plans sont confondus donc  $(S)$  a une infinité de solutions qui forment un plan ;
- Les plans sont sécants donc  $(S)$  a une infinité de solutions qui forment une droite ;
- Les plans sont parallèles non confondus donc  $(S)$  n'a pas de solution.

---

**Définition/Propriétés IV.0.4 (Système linéaire de trois équations à trois inconnues)**

Soit  $a, b, c, d, a', b', c', d', a'', b'', c''$  et  $d''$  des réels. Le système d'équations

$$(S) : \begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \\ a''x + b''y + c''z = d'' \end{cases}$$

d'inconnues les réels  $x, y$  et  $z$  est dit système linéaire de trois équations à trois inconnues.

---

**Définition/Propriétés IV.0.5 (Interprétation géométrique)**

Dans le cas où  $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ ,  $(a', b', c') \neq (0, 0, 0)$  et  $(a'', b'', c'') \neq (0, 0, 0)$ , résoudre le système  $(S)$  revient à déterminer l'intersection entre trois plans  $P, P'$  et  $P''$  de l'espace. Cela conduit à distinguer huit cas de figures qui donnent quatre types d'ensemble-solution pour  $(S)$  :

- Le système  $(S)$  a une infinité de solutions qui forment un plan ;
- Le système  $(S)$  a une infinité de solutions qui forment une droite ;
- Le système  $(S)$  a une unique solution ;
- Le système  $(S)$  n'a pas de solution.

## V Algorithme du Pivot

---

**Remarque V.0.1 (Remarque préliminaire)**

En cycle terminal, de petits systèmes linéaires ont été rencontrés et résolus dans des cas simples, le plus souvent par "substitution".

En MP2I, nous utiliserons en priorité la méthode de résolution par "pivot". Plus efficace et élégante, cette technique sera reprise au semestre 2 dans le chapitre "Matrices" pour résoudre plus généralement des systèmes linéaires de  $n$  équations à  $p$  inconnues.

---

**Définition/Propriétés V.0.2 (Opérations élémentaires)**

On reprend les notations des paragraphes III. et IV. et on note  $L_i$  la  $i$ -ème ligne du système  $(S)$ .

On appelle opérations élémentaires sur les lignes du système linéaire  $(S)$  :

- (1) l'échange de deux lignes distinctes :  $L_i \leftrightarrow L_j$  avec  $i \neq j$  ;
- (2) la multiplication d'une ligne par un réel non nul :  $L_i \leftarrow \lambda L_i$  avec  $\lambda \neq 0$  ;
- (3) l'addition à une ligne du produit d'une autre ligne par un réel non nul :  $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$  avec  $i \neq j$  et  $\lambda \neq 0$ .

---

**Propriétés V.0.3 (Propriété importante)**

Toute opération élémentaire sur les lignes d'un système linéaire le transforme en un système linéaire équivalent c'est-à-dire un système ayant le même ensemble de solutions.

---

**Définition/Propriétés V.0.4 (résolution d'un système linéaire par la méthode du pivot)**

La résolution d'un système linéaire par la méthode du pivot se déroule en deux phases :

- phase de descente : en effectuant des opérations élémentaires sur les lignes du système, on transforme le système en un système de forme "triangulaire" ou "trapézoïdale" comme, par exemple,

$$(S1) : \begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ b'_1y = c'_1 \end{cases}$$

$$(S2) : \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ b'_1y + c'_1z = d'_1 \end{cases}$$

$$(S3) : \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ b'_1y + c'_1z = d'_1 \\ c''_1z = d''_1 \end{cases}$$

- phase de remontée : Le système obtenu est équivalent au système initial ; il est facile à résoudre ce qui permet d'obtenir l'ensemble des solutions du système initial. Dans cette phase de remontée, on peut au choix :
  - effectuer des substitutions successives (moins élégant) ;
  - utiliser à nouveau des opérations élémentaires sur les lignes pour réduire le système sous forme "diagonale" (plus élégant et facile à coder).

---

*Remarque V.0.5*

Les opérations élémentaires effectuées lors de la résolution d'un système linéaire par la méthode du pivot (phases de descente et de remontée) doivent systématiquement être indiquées en marge du système étudié pour faciliter la lecture des correcteurs et permettre de retrouver les éventuelles erreurs de calcul.

---

*Remarque V.0.6 (Pour aller plus loin (pour ceux qui ont suivi l'option maths expertes))*

- Les petits systèmes linéaires décrits au III. et IV. peuvent se traduire matriciellement par une équation matricielle du type  $AX = B$  avec  $A$  et  $B$  des matrices à préciser et  $X$  une matrice colonne inconnue.
- L'effet des opérations élémentaires sur les lignes de ces systèmes peut se traduire matriciellement par des multiplications de la matrice  $A$  à gauche par des matrices inversibles bien choisies.



# Chapitre 4

## Nombres complexes

### Sommaire

I	Généralité . . . . .	55
II	Conjugué d'un nombre complexe . . . . .	57
III	Module d'un nombre complexe . . . . .	57
IV	Nombre complexe de module 1 et trigonométrie. . . . .	58
V	Forme trigonométrique pour les nombres complexes non nuls. . . . .	61
VI	Fonctions d'une variable réelle à valeurs complexes . . . . .	62

### I Généralité

#### Définition I.0.1 (Propriété de $\mathbb{C}$ )

On ADMET l'existence d'un ensemble noté  $\mathbb{C}$ , dont les éléments sont appelés nombres complexes, tel que :

- (1)  $\mathbb{C}$  contient  $\mathbb{R}$
- (2)  $\mathbb{C}$  est muni de deux opérations  $+$  et  $\times$  sur  $\mathbb{C}$  qui étendent les opérations  $+$  et  $\times$  connues sur  $\mathbb{R}$  et suivent les mêmes règles de calcul que celles-ci
- (3)  $\mathbb{C}$  contient un élément noté  $i$  vérifiant  $i^2 = -1$
- (4) Tout élément  $z$  de  $\mathbb{C}$  s'écrit de manière unique sous la forme  $z = a + ib$  avec  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

#### Remarque I.0.2

- La forme  $z = a + ib$  avec  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  est dite forme algébrique du nombre complexe  $z$ 
  - le réel  $a$  est dit partie réelle du nombre complexe  $z$  et noté  $a = \operatorname{Re}(z)$
  - le réel  $b$  est dit partie imaginaire du nombre complexe  $z$  et noté  $b = \operatorname{Im}(z)$
- L'unicité d'écriture d'un nombre complexe sous forme algébrique se traduit par :  
Pour tout réels  $a, b, a'$  et  $b'$ , on a :

$$a + ib = a' + ib' \text{ si, et seulement si, } a = a' \text{ et } b = b'$$

---

**Définition/Propriétés I.0.3 (Opération sur  $\mathbb{C}$ )**

L'ensemble  $\mathbb{C} = \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$  est muni deux opérations  $+$  et  $\times$  définies par, pour tout nombre complexe  $z$  de forme algébrique  $a + ib$  et tout nombre complexe  $z'$  de forme algébrique  $a' + ib'$  :

$$\begin{cases} z + z' = (a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b') \\ z \times z' = (a + ib) \times (a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + a'b) \end{cases}$$

---

**Définition/Propriétés I.0.4 (Extension des résultats vus dans  $\mathbb{R}$ )**

(1) Pour tout  $n$  entier naturel et tout nombre complexe  $z$  différent de 1, on a :

$$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$$

(2) Pour tout  $n$  entier naturel et tout couple  $(z, z')$  nombres complexes , on a :

$$(z + z')^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k (z')^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n-k} (z')^k$$

(3) Pour tout  $n$  entier naturel et tout couple  $(z, z')$  nombres complexes , on a :

$$z^n + (z')^n = (z - z') \left( z^{n-1} + z^{n-2} z' + \cdots + z(z')^{n-2} + (z')^{n-1} \right) = (z - z') \sum_{k=0}^{n-1} z^{n-1-k} (z')^k = (z - z') \sum_{k=0}^{n-1} z^k (z')^{n-1-k}$$

---

**Définition/Propriétés I.0.5 (Plan complexe : affixe d'un point, d'un vecteur)**

Dans toute la suite, on considère le plan usuel muni d'un repère orthonormé direct.

- A tout complexe  $z$ , on peut associer le point  $M$  de coordonnées  $(\text{Re}(z), \text{Im}(z))$  dit image de  $z$ .
- A tout point  $M$  de coordonnées  $(x, y)$ , on peut associer le complexe  $z = x + iy$  dit affixe de  $M$ .

On identifie donc  $\mathbb{C}$  au plan usuel muni d'un repère orthonormé direct et on parle de "plan complexe".

A tout complexe  $z$ , on peut aussi associer le vecteur  $\vec{u}$  de coordonnées  $(\text{Re}(z), \text{Im}(z))$  dit image de  $z$  et à tout vecteur  $\vec{u}$  de coordonnées  $(x, y)$ , on peut associer le complexe  $z = x + iy$  dit affixe de  $\vec{u}$ . Ainsi :

- Pour tout vecteur  $\vec{u}$  d'affixe  $z$  et tout réel  $\alpha$ , le vecteur  $\alpha \vec{u}$  a pour affixe  $\alpha z$ .
- Pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{u}'$  d'affixes respectives  $z$  et  $z'$ , le vecteur  $\vec{u} + \vec{u}'$  a pour affixe  $z + z'$ .
- Pour tous points  $M$  et  $M'$  d'affixes respectives  $z$  et  $z'$ , le vecteur  $\vec{MM'}$  a pour affixe  $z' - z$ .

## II Conugué d'un nombre complexe

---

### Définition II.0.1

On appelle conjugué d'un nombre complexe  $z$  et on note  $\bar{z}$  le nombre complexe défini par :

$$\bar{z} = \operatorname{Re}(z) - i \operatorname{Im}(z)$$

Pour tout nombre complexe  $z$ , le point d'affixe  $\bar{z}$  et le point d'affixe  $z$  sont symétriques par rapport à l'axe des réels dans le plan complexe.

---

### Définition/Propriétés II.0.2

Pour tous nombres complexes  $z$  et  $z'$ , on a les propriétés suivantes :

(1)  $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$

(2)  $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$

(3)  $\overline{\bar{z}} = z$

(4)  $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$

(5)  $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'}$

(6)  $\frac{\bar{z}}{\bar{z'}} = \frac{z}{z'}$

## III Module d'un nombre complexe

---

### Définition/Propriétés III.0.1

On appelle module d'un nombre complexe  $z$  et on note  $|z|$  le nombre réel positif défini par :

$$|z| = \sqrt{(\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2}$$

---

### Définition/Propriétés III.0.2 (interprétations géométriques)

- Pour tout nombre complexe  $z$ , le module  $|z|$  est :
  - la distance entre le point d'affixe 0 et le point d'affixe  $z$  ;
  - la norme de tout vecteur d'affixe  $z$
- Pour tous nombres complexes  $z$  et  $z'$  le module  $|z - z'|$  est :

- la distance entre les points d'affixe  $z$  et  $z'$  ;
- la norme du vecteur d'affixe  $z' - z$
- Soit  $r$  un réel positif,  $z_0$  un nombre complexe et  $M_0$  le point d'affixe  $z_0$ .
  - Les points du plan dont l'affixe  $z$  vérifie  $|z - z_0| = r$  forment le cercle de centre  $M_0$  et de rayon  $r$ .
  - Les points du plan dont l'affixe  $z$  vérifie  $|z - z_0| \leq r$  forment le disque de centre  $M_0$ , de rayon  $r$

### Propriétés III.0.3

Pour tous nombres complexes  $z$  et  $z'$ , on a les propriétés suivantes :

- $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$  et  $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$
- $|z|^2 = z\bar{z}$
- $|zz'| = |z| |z'|$
- $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$  Dans le cas où  $z'$  est non nul
- $\frac{z}{z'} = \frac{z |z'|}{|z'|^2}$
- $|z + z'| \leq |z| + |z'|$  avec égalité si, et seulement si il existe un réel positif  $\alpha$  tel que  $z' = \alpha z$

## IV Nombre complexe de module 1 et trigonométrie

### Définition IV.0.1 (Cercle trigonométrique)

On identifie le cercle trigonométrique et l'ensemble des nombres complexes de module 1 que l'on note :

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

### Définition/Propriétés IV.0.2

Pour tout nombre réel  $t$ , on appelle exponentielle imaginaire de  $t$  et on note  $e^{it}$  le nombre complexe défini par :

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

Pour tous nombres réels  $t$  et  $t'$ , on a l'égalité :

$$e^{i(t+t')} = e^{it} e^{it'}$$

---

**Définition/Propriétés IV.0.3 (Formule D'Euler)**

Pour tout nombre réel  $t$ , on a les égalités suivantes dites formules d'Euler

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \text{ et } \sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2}$$

---

**Propriétés IV.0.4 (Technique de l'angle moitié)**

La technique de l'angle moitié permet l'obtention de factorisations classiques à savoir retrouver :

- pour tout  $t$  réel,  $1 + e^{it} = e^{i\frac{t}{2}} \left( e^{-i\frac{t}{2}} + e^{i\frac{t}{2}} \right) = 2 \cos\left(-\frac{t}{2}\right) e^{i\frac{t}{2}} = 2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) e^{i\frac{t}{2}}$
- pour tout  $t$  réel,  $1 - e^{it} = e^{i\frac{t}{2}} \left( e^{-i\frac{t}{2}} - e^{i\frac{t}{2}} \right) = 2 \sin\left(-\frac{t}{2}\right) e^{i\frac{t}{2}} = -2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) e^{i\frac{t}{2}}$
- pour tout réel  $p$  et  $q$ ,  $e^{ip} + e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}} \left( e^{i\frac{p-q}{2}} + e^{-i\frac{p-q}{2}} \right) = 2 \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) e^{i\frac{p+q}{2}}$
- pour tout réel  $p$  et  $q$ ,  $e^{ip} - e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}} \left( e^{i\frac{p-q}{2}} - e^{-i\frac{p-q}{2}} \right) = -2 \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) e^{i\frac{p+q}{2}}$

Remarque :

En écrivant la partie réelle et la partie imaginaire de  $e^{ip} \pm e^{iq}$  à partir des deux dernières factorisations, on trouve des formules de factorisation pour  $\cos(p) \pm \cos(q)$  et  $\sin(p) \pm \sin(q)$

Linéarisation

A l'aide des formules d'Euler et du binôme de Newton, on peut transformer une expression du type  $\cos(t)^n$  ou  $\sin(t)^n$  avec  $t$  réel et  $n$  entier naturel en une combinaison linéaire de  $\cos(pt)$  ou de  $\sin(pt)$  avec  $p$  un entier naturel. Cela est notamment utile pour du calcul de primitives.

---

**Exercice/Exemple IV.0.5**

Soit  $f(x) = (\sin(x))^3$  avec  $x \in \mathbb{R}$ . Calculer la primitive de  $f$

---

*Correction IV.0.6*

$$\begin{aligned} (\sin(x))^3 &= \left( \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^3 \\ &= \frac{1}{-8i} \left( e^{3ix} + 3(e^{-ix}) - 3(e^{ix}) - e^{-3ix} \right) \\ &= \frac{1}{-4} \left( \frac{e^{3ix} - e^{-3ix}}{2i} - 3 \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right) \\ &= -\frac{1}{4} \sin(3x) + \frac{3}{4} \sin(x) \end{aligned}$$

Donc  $F_\lambda(x) = \frac{1}{12} \cos(3x) - \frac{3}{4} \cos(x) + \lambda$  pour  $\lambda \in \mathbb{R}$

---

**Définition/Propriétés IV.0.7 (Formule de Moivre)**

Pour tout nombre réel  $t$  et tout entier relatif  $n$ , on a  $e^{int} = (e^{it})^n$ , c'est-à-dire :

$$\cos(nt) + i \sin(nt) = (\cos(t) + i \sin(t))^n$$

---

*Démonstration (Moivre par récurrence)*

Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $t \in \mathbb{R}$  Montrons que  $\forall (n, t) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R}$ ,  $e^{int} = (e^{it})^n$

On note  $P(n)$  la Propriété «  $e^{int} = (e^{it})^n$  »

- Initialisation :  $P(0)$  est vrai car  $\begin{cases} (e^{it})^0 &= 1 \\ e^{i \cdot 0} &= 1 \end{cases}$
- Hérédité Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $P(n)$  est vrai, Montrons que  $P(n+1)$  est vrai :

$$\begin{aligned} e^{i(n+1)t} &= e^{i(n+1)t} \\ &= e^{int} \times e^{it} \\ &= (e^{it})^n \times e^{it} \\ &= (e^{it})^{n+1} \end{aligned}$$

Donc  $P(n+1)$  Vrai. ■

---

**Application IV.0.8 (Applications usuelles importantes)**

Soit  $C = \sum_{k=0}^n \cos(kt)$  et  $S = \sum_{k=0}^n \sin(kt)$  avec  $n \in \mathbb{N}$  et  $t \in \mathbb{R}$

On obtient des expressions simplifiées des sommes  $C$  et  $S$  par le calcul annexe suivant

$$C + iS = \sum_{k=0}^n e^{ikt} = \sum_{k=0}^n (e^{it})^k = \begin{cases} n+1 & \text{si } t \equiv 0 [2\pi] \\ \frac{1 - e^{i(n+1)t}}{1 - e^{it}} & \text{sinon} \end{cases}$$

qui donne

$$C + iS = \begin{cases} n+1 & \text{si } t \equiv 0 [2\pi] \\ \frac{(1 - e^{i(n+1)t})(1 - e^{it})}{2(1 - \cos(t))} & \text{sinon} \end{cases}$$

On conclut alors sur les valeurs de  $C$  et  $S$  en exhibant les parties réelles et imaginaires de  $C + iS$ .

## V Forme trigonométrique pour les nombres complexes non nuls

---

### Définition/Propriétés V.0.1

Tout nombre complexe non nul  $z$  peut s'écrire sous la forme

$$z = r e^{i\theta}$$

avec  $r$  un réel strictement positif et  $\theta$  un réel. Cette écriture est dite forme trigonométrique de  $z$ .

#### Attention

Dans cette écriture de  $z$ .

- le réel strictement positif  $r$  est unique car il est nécessairement égal à  $|z|$
- le réel  $\theta$  n'est pas unique car si le réel  $\theta$  convient alors les réels  $\theta' \equiv \theta [2\pi]$  conviennent.

---

#### *Démonstration*

Soit  $z \in \mathbb{C}^*$ , alors  $|z| \neq 0$  donc  $\frac{z}{|z|}$  existe avec  $\left| \frac{z}{|z|} \right| = \frac{|z|}{||z||} = \frac{|z|}{|z|} = 1$

Donc  $\frac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$  donc il existe  $\theta \in \mathbb{R}$  tel que  $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta} \iff z = |z| e^{i\theta}$

Ceci prouve l'existence de l'écriture.

$r$  est unique car :  $\begin{cases} z = r e^{i\theta} \\ z = r' e^{i\theta} \end{cases} \implies \begin{cases} |z| = r \\ |z| = r' \end{cases} \implies r = r'$  ■

---

### Définition/Propriétés V.0.2 (Arguments)

Soit  $z$  un nombre complexe non nul. Tous les nombres réels  $\theta$  tels que  $z$  peut s'écrire

$$z = r e^{i\theta}$$

avec  $r$  réel strictement positif sont dits arguments de  $z$

#### Remarque

Si  $\theta$  est un argument de  $z$  complexe non nul, on peut écrire  $\arg(z) \equiv \theta [2\pi]$

---

### Propriétés V.0.3

Pour tous nombres complexes non nuls  $z$  et  $z'$ , on a :

$$(1) \arg(z z') \equiv \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$$

$$(2) \arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') [2\pi]$$

---

**Définition/Propriétés V.0.4 (Transformation de  $a \cos(t) + b \sin(t)$  en  $A \cos(t - \varphi)$ )**

Soit  $a, b$  et  $t$  des nombres réels avec  $(a, b) \neq (0, 0)$ . On peut écrire

$$a \cos(t) + b \sin(t) = \operatorname{Re}((a - ib)(\cos(t) + i \sin(t))) = \operatorname{Re}((a - ib)e^{it})$$

puis  $a - ib = Ae^{-i\varphi}$  avec  $A$  réel strictement positif et  $\varphi$  un réel ce qui donne :

$$a \cos(t) + b \sin(t) = \operatorname{Re}((a - ib)e^{it}) = \operatorname{Re}(Ae^{i(t-\varphi)})$$

Donc  $a \cos(t) + b \sin(t) = A \cos(t - \varphi)$

## VI Fonctions d'une variable réelle à valeurs complexes

---

**Définition VI.0.1**

Une fonction de variable réelle à valeurs complexes notée  $f$  est un objet mathématique qui, tout élément  $x$  d'une partie non vide de  $\mathbb{R}$ , associe un et un seul nombre complexe noté  $f(x)$ .

---

**Définition/Propriétés VI.0.2 (Ce qui s'étend aux fonctions de variable réelle à valeurs complexes)**

- Notation fonctionnelle
- Domaine de définition
- Image d'un réel, antécédent d'un complexe
- Parité, imparité, périodicité
- Somme, produit, quotient de fonctions et multiplication d'une fonction par un complexe
- Dérivation

---

**Définition/Propriétés VI.0.3 (Ce qui ne s'étend pas aux fonctions de variable réelle à valeurs complexes)**

- Composition de fonctions
- Monotonie
- Fonction majorée, minorée ou bornée
- Fonction réciproque



---

**Définition/Propriétés VI.0.4 (Dérivation)**

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  non vide et non réduit à un point. Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  à valeurs complexes.

On note  $\operatorname{Re}(f) : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $\operatorname{Im}(f) : I \longrightarrow \mathbb{R}$  les fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles définies par :

$$\forall x \in I, (\operatorname{Re}(f))(x) = \operatorname{Re}(f(x)) \text{ et } (\operatorname{Im}(f))(x) = \operatorname{Im}(f(x))$$

On dit que :

- $f$  est dérivable en  $x_0$  si les fonctions  $\operatorname{Re}(f)$  et  $\operatorname{Im}(f)$  sont dérivables en  $x_0$
- $f$  est dérivable sur  $I$  si les fonctions  $\operatorname{Re}(f)$  et  $\operatorname{Im}(f)$  sont dérivables sur  $I$

Selon le cas de figure, on appelle :

- nombre dérivé de  $f$  en  $x_0$  et on note  $f'(x_0)$  le nombre complexe suivant :

$$f'(x_0) = (\operatorname{Re}(f))'(x_0) + i(\operatorname{Im}(f))'(x_0)$$

- fonction dérivée de  $f$  sur  $I$  et on note  $f'$  la fonction de variable réelle à valeurs complexes suivante :

$$f' = (\operatorname{Re}(f))' + i(\operatorname{Im}(f))'$$

---

**Propriétés VI.0.5**

(1) Combinaison linéaire

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $I$  et à valeurs complexes et  $(\alpha, \beta)$  un couple de complexes. Si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $I$  alors  $\alpha f + \beta g$  est dérivable sur  $I$  et sa dérivée vérifie :

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$$

(2) Produit

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $I$  et à valeurs complexes. Si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $I$  alors  $fg$  est dérivable sur  $I$  et sa dérivée vérifie :

$$(fg)' = f'g + fg'$$

(3) Quotient

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $I$  et à valeurs complexes tel que  $g$  ne s'annule pas sur  $I$ .

Si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $I$  alors  $\frac{f}{g}$  est dérivable sur  $I$  et sa dérivée vérifie :

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - g'f}{g^2}$$

---

**Application VI.0.6 (exemple important)**

Soit  $\varphi$  une fonction définie sur  $I$  à valeurs complexes. On note  $f : I \longrightarrow \mathbb{C}$  la fonction définie sur  $I$  par :

$$\forall t \in I, f(t) = e^{\operatorname{Re}(\varphi(t))} e^{i \operatorname{Im}(\varphi(t))}$$

Si  $\varphi$  est dérivable sur  $I$  alors  $f$  est dérivable sur  $I$  et sa dérivée vérifie :

$$\forall t \in I, f'(t) = \varphi'(t)f(t)$$

Remarque

La fonction  $f$  sera aussi notée  $f = \exp(\varphi)$  après étude de l'exponentielle complexe dans le chapitre « Nombres complexes (2) » ce qui permettra d'écrire  $(\exp(\varphi))' = \varphi' \exp(\varphi)$  et donc d'étendre une propriété déjà connue dans le cas où  $\varphi$  est à valeurs réelles.

# Chapitre 5

## Fonctions usuelles : Rappels et compléments

### Sommaire

I	Fonction exponentielle . . . . .	64
II	Fonctions logarithmes . . . . .	65
III	Fonctions hyperboliques . . . . .	65
IV	Tangente hyperbolique . . . . .	67
V	Arccos . . . . .	68
VI	Arcsin. . . . .	68
VII	Arctan . . . . .	69
VIII	Fonctions puissances réelles . . . . .	69
IX	Croissances comparées . . . . .	70

### I Fonction exponentielle

#### Définition/Propriétés I.0.1

Il existe une unique fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$ , dérivable sur  $\mathbb{R}$  à valeurs réelles vérifiant  $f' = f$  et  $f(0) = 1$

Cette fonction, appelée fonction exponentielle et notée  $x \mapsto \exp(x)$  ou  $x \mapsto e^x$  vérifie :

- Pour tout  $x$  et  $y$  des réels,  $e^{x+y} = e^x e^y$
- Pour tout  $x$  réel,  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
- Pour tout  $x$  réel et tout  $n$  entier relatif,  $e^{nx} = (e^x)^n$
- Pour tout  $x$  réel,  $e^x > 0$
- La fonction  $\exp$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ .
- La dérivée de  $\exp$  sur  $\mathbb{R}$  est  $\exp$ .
- La fonction  $\exp$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
- pour tout réel  $x$ ,  $e^x \geq 1 + x$

## II Fonctions logarithmes

---

### Définition/Propriétés II.0.1

La fonction réciproque de la fonction exponentielle est appelée fonction logarithme népérien et notée  $\ln$ .

Elle vérifie :

- pour tous  $x$  et  $y$  réels strictement positifs,  $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
- pour tout  $x$  réel strictement positif,  $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$
- $\ln(1) = 0$
- pour tout  $x$  réel strictement positif et tout  $n$  entier relatif,  $\ln(x^n) = n \ln(x)$
- la fonction  $\ln$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- la dérivée de  $\ln$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  est  $x \mapsto \frac{1}{x}$ .
- la fonction  $\ln$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$
- pour tout réel  $x > -1$ ,  $\ln(1+x) \geq x$

---

### Définition/Propriétés II.0.2 (logarithme en base 2 et en base 10)

Les fonctions logarithmes en base 2, notée  $\log_2$ , et logarithmes en base 10 notée  $\log_{10}$  sont définies sur  $\mathbb{R}_+^*$  par, pour tout réel  $x$  strictement positif :

$$\log_2(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(2)} \text{ et } \log_{10}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$$

On a aussi :

- $\log_2(2) = 1$  et  $\log_{10}(10) = 1$
- pour tout  $x$  entier relatif,  $\log_2(2^x) = x$  et  $\log_{10}(10^x) = x$
- $\log_2$  et  $\log_{10}$  ont même monotonie et même limite aux bornes de  $\mathbb{R}_+^*$  que la fonction  $\ln$

## III Fonctions hyperboliques

---

**Définition/Propriétés III.0.1**

- (1) On appelle cosinus hyperbolique la fonction, notée  $\text{ch}$  définie  $\mathbb{R}$  par, pour tout  $x$  réel,

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

- (2) On appelle sinus hyperbolique la fonction, notée  $\text{sh}$  définie  $\mathbb{R}$  par, pour tout  $x$  réel,

$$\text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

---

**Définition/Propriétés III.0.2 (Relation fondamentale de la trigonométrie hyperbolique)**

Pour tout réel  $x$ , on a :

$$\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1$$

---

*Démonstration*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = (\text{ch}(x) + \text{sh}(x)) (\text{ch}(x) - \text{sh}(x)) = (e^x) (e^{-x}) = e^0 = 1 \quad \blacksquare$$

---

**Définition/Propriétés III.0.3 (étude de la fonction  $\text{ch}$ )**

- (1) La fonction  $\text{ch}$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$
- (2) la dérivée de  $\text{ch}$  sur  $\mathbb{R}$  est la fonction  $\text{sh}$
- (3) la fonction  $\text{ch}$  est paire avec  $\text{ch}(0) = 1$
- (4) la fonction  $\text{ch}$  est :
  - (a) strictement décroissante sur  $\mathbb{R}_-^*$
  - (b) strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+^*$
- (5)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{ch}(x) = +\infty$
- (6)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{ch}(x) = +\infty$

---

**Définition/Propriétés III.0.4 (étude de la fonction  $\text{sh}$ )**

- (1) La fonction  $\text{sh}$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$
- (2) la dérivée de  $\text{sh}$  sur  $\mathbb{R}$  est la fonction  $\text{ch}$
- (3) la fonction  $\text{sh}$  est impaire avec  $\text{sh}(0) = 0$
- (4) la fonction  $\text{sh}$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$
- (5)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{sh}(x) = -\infty$
- (6)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{sh}(x) = +\infty$

## IV Tangente hyperbolique

---

### Définition/Propriétés IV.0.1

On appelle tangente hyperbolique la fonction, notée,  $\text{th}$ , définie sur  $\mathbb{R}$  par, pour tout  $x$  réel

$$\text{th}(x) = \frac{\text{ch}(x)}{\text{sh}(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

---

### Définition/Propriétés IV.0.2 (étude de la fonction $\text{th}$ )

- (1) La fonction  $\text{th}$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$
- (2) la dérivée de  $\text{th}$  sur  $\mathbb{R}$  est la fonction  $1 - \text{th}^2 = \frac{1}{\text{ch}^2}$
- (3) la fonction  $\text{th}$  est impaire avec donc  $\text{th}(0) = 0$
- (4) la fonction  $\text{th}$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$
- (5)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{th}(x) = -1$
- (6)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th}(x) = 1$

---

### Définition/Propriétés IV.0.3 (formule d'addition et de duplication)

Pour tout couple de réel  $(a, b)$ , on a :

- (1)  $\text{ch}(a + b) = \text{ch}(a) \text{ch}(b) + \text{sh}(a) \text{sh}(b)$
- (2)  $\text{ch}(a - b) = \text{ch}(a) \text{ch}(b) - \text{sh}(a) \text{sh}(b)$
- (3)  $\text{sh}(a + b) = \text{ch}(a) \text{sh}(b) + \text{sh}(a) \text{ch}(b)$
- (4)  $\text{sh}(a - b) = \text{ch}(a) \text{sh}(b) - \text{sh}(a) \text{ch}(b)$
- (5)  $\text{th}(a + b) = \frac{\text{th}(a) + \text{th}(b)}{1 + \text{th}(a) \text{th}(b)}$
- (6)  $\text{th}(a - b) = \frac{\text{th}(a) - \text{th}(b)}{1 - \text{th}(a) \text{th}(b)}$
- (7)  $\text{ch}(2a) = \text{ch}^2(a) - \text{sh}^2(a) = 2 \text{ch}^2(a) - 1 = 2 \text{sh}^2(a) + 1$
- (8)  $\text{sh}(2a) = 2 \text{sh}(a) \text{ch}(a)$
- (9)  $\text{th}(2a) = \frac{2 \text{th}(a)}{1 + \text{th}^2(a)}$

## V Arccos

---

### Définition/Propriétés V.0.1

La fonction  $c : [0 ; \pi] \longrightarrow [-1 ; 1]$  définie par :

$$\text{Pour tout } x \text{ dans } , c(x) = \cos(x)$$

est une bijection de  $[0 ; \pi]$  sur  $[-1 ; 1]$  de bijection réciproque  $c^{-1} : [-1 ; 1] \longrightarrow [0 ; \pi]$  notée Arccos  
Autrement dit :

- pour tout réel  $y$  dans  $[-1 ; 1]$ , l'équation  $y = \cos(x)$  admet une unique solution dans  $[0 ; \pi]$
- pour tout réel  $y$  dans  $[-1 ; 1]$ ,  $\text{Arccos}(y)$  est l'unique réel de  $[0 ; \pi]$  donc le cosinus est égal à  $y$

Par ailleurs la fonction Arccos possède ces propriétés :

- (1) la fonction Arccos est définie sur  $[-1 ; 1]$  et dérivable sur  $] -1 ; 1[$
- (2) la dérivée de Arccos sur  $] -1 ; 1[$  est la fonction  $\text{Arccos}' : x \longmapsto \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
- (3) la fonction Arccos est strictement décroissante sur  $[-1 ; 1]$

## VI Arcsin

---

### Définition/Propriétés VI.0.1

La fonction  $s : \left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1 ; 1]$  définie par :

$$\text{Pour tout } x \text{ dans } , s(x) = \sin(x)$$

est une bijection de  $\left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$  sur  $[-1 ; 1]$  de bijection réciproque  $s^{-1} : [-1 ; 1] \longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$  notée Arcsin

Autrement dit :

- pour tout réel  $y$  dans  $[-1 ; 1]$ , l'équation  $y = \sin(x)$  admet une unique solution dans  $\left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$
- pour tout réel  $y$  dans  $[-1 ; 1]$ ,  $\text{Arcsin}(y)$  est l'unique réel de  $\left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$  donc le sinus est égal à  $y$

Par ailleurs la fonction Arcsin possède ces propriétés :

- (1) la fonction Arcsin est définie sur  $[-1 ; 1]$  et dérivable sur  $] -1 ; 1[$
- (2) la dérivée de Arcsin sur  $] -1 ; 1[$  est la fonction  $\text{Arcsin}' : x \longmapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- (3) la fonction Arcsin est impaire sur  $] -1 ; 1[$
- (4) la fonction Arcsin est strictement croissante sur  $[-1 ; 1]$

## VII Arctan

---

### Définition/Propriétés VII.0.1

La fonction  $t : \left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[ \longrightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$\text{Pour tout } x \text{ dans } \left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[ , t(x) = \tan(x)$$

est une bijection de  $\left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[$  sur  $\mathbb{R}$  de bijection réciproque  $t^{-1} : \mathbb{R} \longrightarrow \left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[$  notée Arctan  
Autrement dit :

- pour tout réel  $y$  dans  $\mathbb{R}$ , l'équation  $y = \tan(x)$  admet une unique solution dans  $\left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[$
- pour tout réel  $y$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $\text{Arctan}(y)$  est l'unique réel de  $\left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[$  donc la tangente est égal à  $y$

Par ailleurs la fonction Arctan possède ces propriétés :

- (1) la fonction Arctan est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$
- (2) la dérivée de Arctan sur  $\mathbb{R}$  est la fonction  $\text{Arctan}' : x \longmapsto \frac{1}{1+x^2}$
- (3) la fonction Arctan est impaire sur  $\mathbb{R}$
- (4) la fonction Arctan est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$
- (5)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{Arctan}(x) = -\frac{\pi}{2}$
- (6)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Arctan}(x) = \frac{\pi}{2}$

## VIII Fonctions puissances réelles

---

### Définition VIII.0.1

Soit  $\alpha$  un réel.

La fonction  $f_\alpha$  définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  par

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f_\alpha(x) = e^{\alpha \ln(x)}$$

est notée  $f_\alpha : x \longmapsto x^\alpha$  et appelée fonction puissance (réelle). Elle respecte ces propriétés :

- la fonction  $x \longmapsto x^\alpha$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$
- la dérivée de  $x \longmapsto x^\alpha$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  est  $x \longmapsto \alpha x^{\alpha-1}$
- la fonction  $x \longmapsto x^\alpha$  est :
  - strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+^*$  pour  $\alpha > 0$
  - strictement décroissante sur  $\mathbb{R}_+^*$  pour  $\alpha < 0$

- $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha = \begin{cases} 0 & \text{pour } \alpha > 0 \\ +\infty & \text{pour } \alpha < 0 \end{cases}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{pour } \alpha > 0 \\ 0 & \text{pour } \alpha < 0 \end{cases}$

---

### Propriétés VIII.0.2

Pour tout couple de réels  $\alpha, \beta$  et tout couple de réels strictement positifs  $(x, y)$ , on a :

$$\ln(x^\alpha) = \alpha \ln(x) \quad (xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha \quad x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta \quad (x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$$

---

### Définition/Propriétés VIII.0.3 (cas particulier des puissances entières)

Les fonctions vues ci-dessus étendent les notions de puissances entières déjà connues sur  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{R}^*$  :

- pour tout entier naturel  $n$ , la fonction  $f_n : x \mapsto \prod_{k=1}^n x$  est notée  $x \mapsto x^n$   
elle est définie sur  $\mathbb{R}$ , dérivable sur  $\mathbb{R}$  et de dérivée  $x \mapsto nx^{n-1}$
- pour tout entier relatif strictement négatif  $n$ , la fonction  $f_n : x \mapsto \prod_{k=1}^{-n} x^{-1}$  est notée  $x \mapsto x^n$   
elle est définie sur  $\mathbb{R}^*$ , dérivable sur  $\mathbb{R}^*$  et de dérivée  $x \mapsto nx^{n-1}$

## IX Croissances comparées

---

### Définition/Propriétés IX.0.1 (Cas des fonctions $x \mapsto \ln(x)$ , $x \mapsto x^\alpha$ et $x \mapsto e^x$ avec $\alpha > 0$ )

Pour tout  $\alpha$  réel strictement positif, les croissances comparées des fonctions  $x \mapsto \ln(x)$ ,  $x \mapsto x^\alpha$  et  $x \mapsto e^x$  se résument à :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^\alpha} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \ln(x) = 0$$

Remarques : On en déduit les croissances comparées en  $+\infty$  des fonctions précédentes prises deux à deux :

- comparaison du logarithme népérien avec les puissances réelles ou l'exponentielle en  $+\infty$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^\alpha} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{e^x} = 0$$

- comparaison des puissances réelles avec le logarithme népérien ou l'exponentielle en  $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\ln(x)} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$$

- comparaison de l'exponentielle avec le logarithme népérien ou les puissances réelles en  $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln(x)} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty$$



---

**Définition/Propriétés IX.0.2 (Cas des fonctions  $x \rightarrow |\ln(x)|^\beta$ ,  $x \rightarrow x^\alpha$  et  $x \rightarrow e^{\gamma x}$ )**

Pour tous réels strictement positifs  $\alpha, \beta$  et  $\gamma$ , les croissances comparées des fonctions  $x \mapsto |\ln(x)|^\beta$ ,  $x \mapsto x^\alpha$  et  $x \mapsto e^{\gamma x}$  se résument à :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|\ln(x)|^\beta}{x^\alpha} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\gamma x}} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha |\ln(x)|^\beta = 0$$

# Chapitre 6

## Nombres complexes (2)

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Équations algébriques</b>	<b>72</b>
I.1	Préliminaires	72
I.2	Résolution des équations du second degré dans $\mathbb{C}$	73
I.3	Résolution des équations du type $z^n = z_0$ dans $\mathbb{C}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$	74
<b>II</b>	<b>Exponentielle complexe</b>	<b>76</b>
<b>III</b>	<b>Interprétations géométriques</b>	<b>77</b>

## I Équations algébriques

### I.1 Préliminaires

#### Définition I.1.1 (Définition d'une fonction polynomiale)

Une fonction  $P : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$  est dite fonction polynomiale à coefficients complexes s'il existe un entier naturel  $n$  et un  $n + 1$ -uplet de nombres complexes  $(b_0, b_1, \dots, b_n)$  tel que pour tout  $z$  de  $\mathbb{C}$ ,

$$P(z) = b_0 + b_1 z + \dots + b_n z^n = \sum_{k=0}^n b_k z^k$$

#### Propriétés I.1.2 (Propriétés de factorisation)

Soit  $P$  une fonction polynomiale à coefficients complexes et  $a$  un nombre complexe.

Si  $a$  est une racine de  $P$ , autrement dit si  $P(a) = 0$ , alors il existe une fonction polynomiale à coefficients complexes  $Q$  tel que, pour tout  $z$  de  $\mathbb{C}$ , on a :

$$P(z) = (z - a)Q(z)$$

## I.2 Résolution des équations du second degré dans $\mathbb{C}$

---

### Définition/Propriétés I.2.1 (cas particulier des équations du type $z^2 = z_0$ )

Soit  $z_0$  et  $z$  des nombres complexes de formes algébriques respectives  $x_0 + iy_0$  et  $x + iy$

$$z^2 = z_0 \text{ si et seulement si } \begin{cases} x^2 - y^2 &= x_0 \\ x^2 + y^2 &= \sqrt{x_0^2 + y_0^2} \\ 2xy &= y_0 \end{cases}$$

---

### Définition/Propriétés I.2.2 (Cas général)

soit  $a, b$  et  $c$  des nombres complexes avec  $a$  non nul.

- Racines

Les solutions de l'équation polynomiale  $az^2 + bz + c = 0$  d'inconnue le nombre complexe  $z$  sont :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$$

où  $\delta$  est une "racine carré" de  $\Delta = b^2 - 4ac$ , autrement dit où  $\delta$  est un nombre complexe vérifiant :

$$\delta^2 = \Delta$$

- Somme et produit des racines (formules de Viète)

Les racines  $z_1$  et  $z_2$  de la fonction polynomiale  $P : z \mapsto az^2 + bz + c$  vérifient :

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \text{ et } z_1 z_2 = \frac{c}{a}$$

---

*Démonstration (Formule des solutions du cas général)*

soit  $a, b$  et  $c$  des nombres complexes avec  $a$  non nul.

Soit  $z \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} az^2 + bz + c &= a \left( z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left( \left( z + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} \right) \\ &= a \left( \left( z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right) \\ &= a \left( \left( z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{(2a)^2} \right) && \text{on pose } \Delta = b^2 - 4ac \\ &= a \left( \left( z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left( \frac{\delta}{2a} \right)^2 \right) && \text{on pose } \delta \text{ comme étant la "racine carré" de } \Delta \\ &= a \left( z + \frac{b}{2a} - \frac{\delta}{2a} \right) \left( z + \frac{b}{2a} + \frac{\delta}{2a} \right) \\ &= a (z - z_1) (z - z_2) \text{ avec } \begin{cases} z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \\ z_2 = \frac{-b + \delta}{2a} \end{cases} \end{aligned}$$

---

*Démonstration (Formule de viète)*

soit  $a, b$  et  $c$  des nombres complexes avec  $a$  non nul.

Soit  $P : z \mapsto az^2 + bz + c$

$$P(z) = az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2) = a(z^2 - (z_1 + z_2)z + z_1z_2)$$

donc par identification :

$$\begin{cases} b &= -a(z_1 + z_2) \\ c &= az_1z_2 \end{cases} \iff \begin{cases} -\frac{b}{a} &= z_1 + z_2 \\ \frac{c}{a} &= z_1z_2 \end{cases}$$

■

### I.3 Résolution des équations du type $z^n = z_0$ dans $\mathbb{C}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$

---

#### Définition I.3.1

Soit  $n$  un entier naturel non nul et  $z_0$  un nombre complexe.

On appelle racine  $n$ -ième de  $z_0$  tout nombre complexe tel que  $z^n = z_0$

---

**Définition/Propriétés I.3.2 (Cas particulier où  $z_0 = 1$ )**

- Racines

Il y a  $n$  racine  $n$ -ième de l'unité qui sont les nombres complexes suivants :

$$\omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \text{ avec } k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$$

- L'ensemble des racines

— L'ensemble des racines  $n$ -ièmes de l'unité est noté

$$\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$$

— Les points dont les affixes sont les racines  $n$ -ièmes de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier à  $n$  côtés, de centre  $O$  et inscrit dans  $\mathbb{U}$ .

---

*Démonstration*

Soit  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $z^n = 1$

$z = 0$  n'est pas solution donc  $\exists(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ ,  $z = re^{i\theta}$

$$z^n = 1 \iff r^n e^{i\theta n} = 1e^{i \times 0}$$

$$\iff \begin{cases} r^n &= 1 \\ n\theta &\equiv 0[2\pi] \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} r &= 1 \\ \theta &\equiv 0 \left[ \frac{2\pi}{n} \right] \end{cases}$$

Ainsi  $S = \mathbb{U}_n = \left\{ e^{i\frac{k2\pi}{n}} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

On note  $f: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{C}$  alors on sait que  $f$  est  $n$  périodique car  $\forall k \in \mathbb{Z}$ ,  $\begin{cases} k+n \in \mathbb{Z} \\ k-n \in \mathbb{Z} \end{cases}$  et  $k \longmapsto e^{i\frac{k2\pi}{n}}$

$$\begin{aligned} f(k+n) &= e^{i\frac{2(k+n)\pi}{n}} \\ &= e^{i\frac{2k\pi}{n}} \times e^{i\frac{2n\pi}{n}} \\ &= e^{i\frac{2k\pi}{n}} \times 1 \\ &= f(k) \end{aligned}$$

Donc  $S = \mathbb{U}_n = \left\{ e^{i\frac{k2\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket \right\}$ .

Montrons que  $\mathbb{U}_n$  contient  $n$  élément autrement dit que :

$$\forall (k, k') \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket^2, \quad k < k', \implies e^{i\frac{k2\pi}{n}} \neq e^{i\frac{k'2\pi}{n}}$$

Par l'absurde :

Soit  $k$  et  $k'$  dans  $\llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$  avec  $k < k'$ , supposons que  $e^{i\frac{k2\pi}{n}} = e^{i\frac{k'2\pi}{n}}$

alors  $\frac{k2\pi}{n} \equiv \frac{k'2\pi}{n} [2\pi]$

donc il existe  $k'' \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\frac{k2\pi}{n} - \frac{k'2\pi}{n} = 2k''\pi$  car  $k' - k > 0$

Ainsi  $k' - k = nk''$  avec  $\begin{cases} k' - k \in \llbracket 1 ; n-1 \rrbracket & \text{car } 0 \leq k < k' \leq n-1 \\ nk'' \in \llbracket n ; +\infty \rrbracket & \text{car } k'' \in \mathbb{N}^* \end{cases}$

Ce qui est absurde et prouve que  $e^{i\frac{k2\pi}{n}} \neq e^{i\frac{k'2\pi}{n}}$

conclusion

Il y a exactement  $n$  racine  $n$ -ièmes de l'unité qui sont les  $\omega_k = e^{i\frac{k2\pi}{n}}$  pour  $k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$  ■

### Définition/Propriétés I.3.3 (Cas général)

Il y a  $n$  racines  $n$ -ièmes pour le nombre complexe non nul  $z_0$  de forme trigonométrique  $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$  qui sont les nombres complexes suivants :

$$\sqrt[n]{r_0} e^{i\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)} \text{ avec } k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$$

*Exemple I.3.4*

$$\mathbb{U}_3 = \left\{ 1, \exp\left(\frac{2i\pi}{3}\right), \exp\left(\frac{4i\pi}{3}\right) \right\}$$

$$\mathbb{U}_4 = \left\{ 1, \exp\left(\frac{2i\pi}{4}\right), \exp\left(\frac{4i\pi}{4}\right), \exp\left(\frac{6i\pi}{4}\right) \right\} = \{1, i, -1, -i\}$$

$$\mathbb{U}_5 = \left\{ 1, \exp\left(\frac{2i\pi}{5}\right), \exp\left(\frac{4i\pi}{5}\right), \exp\left(\frac{6i\pi}{5}\right), \exp\left(\frac{8i\pi}{5}\right) \right\}$$

## II Exponentielle complexe

### Définition II.0.1

Pour tout nombre complexe  $z$ , on appelle exponentielle de  $z$  le nombre complexe noté  $e^z$  le nombre complexe  $e^z$  défini par :

$$e^z = e^{\operatorname{Re}(z)} e^{i \operatorname{Im}(z)}$$

dont le module est  $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}$  et les arguments vérifient  $\arg(e^z) \equiv \operatorname{Im}(z) [2\pi]$

---

### Propriétés II.0.2

Soit un couple de nombres complexes  $(z, z')$

- on a l'égalité suivante :

$$e^{z+z'} = e^z e^{z'}$$

on en déduit les propriétés suivantes :

—  $\frac{1}{e^z} = e^{-z}$

— pour tout entier relatif  $n$ , on a :  $e^{nz} = (e^z)^n$

- $e^z = e^{z'}$  si et seulement si,  $z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$  en notant  $2i\pi\mathbb{Z} = \{2ik\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

---

### Définition/Propriétés II.0.3 (Résolution de l'équations $e^z = a$ avec $a$ un nombre complexe)

Soit  $a$  un nombre complexe.

- Si  $a$  est nul alors l'équation  $e^z = a$  n'a pas de solution dans  $\mathbb{C}$
- Si  $a$  est non nul alors l'équation  $e^z = a$  possède une infinité de solutions dans  $\mathbb{C}$  qui sont les nombres complexes

$$z = \ln(r) + i\theta$$

avec  $r$  le module de  $a$  et  $\theta$  un argument de  $a$ .

## III Interprétations géométriques

---

### Définition/Propriétés III.0.1 (Module et arguments de $\frac{z' - \omega}{z - \omega}$ )

Soit  $\omega, z$  et  $z'$  des nombres complexes tel que  $\omega \neq z$  et  $\omega \neq z'$  de points images notés  $\Omega, M$  et  $M'$ .

Alors :

$$\left| \frac{z' - \omega}{z - \omega} \right| = \frac{\Omega M'}{\Omega M} \text{ et } \arg \left( \frac{z' - \omega}{z - \omega} \right) = \left( \overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'} \right) [2\pi]$$

---

### Définition/Propriétés III.0.2 (Traduction de l'alignement et l'orthogonalité)

Soit  $\Omega, M$  et  $M'$  trois points du plan tels que  $\Omega \neq M$  et  $\Omega \neq M'$  d'affixes respectivement notées  $\omega, z$  et  $z'$

- Les points  $\Omega, M$  et  $M'$  sont alignés si, et seulement si,  $\frac{z' - \omega}{z - \omega}$  est un réel
- Les droites  $\Omega M$  et  $\Omega M'$  sont orthogonales si, et seulement si,  $\frac{z' - \omega}{z - \omega}$  est un imaginaire pur.

---

**Définition/Propriétés III.0.3 (Ecriture complexe de transformations du plan vues au collège)**

Dans ce paragraphe,  $M$  et  $M'$  sont deux points du plan complexe d'affixes respectives  $z$  et  $z'$ .

- Translation

Soit  $b$  un nombre complexe.

$M'$  est l'image par  $M$  par la translation de vecteur d'affixe  $b$  si, et seulement si

$$z' = z + b$$

- Homothétie

Soit  $\alpha$  un nombre réel et  $\Omega$  un point du plan d'affixe  $\omega$ .

$M'$  est l'image par  $M$  par l'Homothétie de centre  $\Omega$  et de rapport  $\alpha$  si, et seulement si

$$z' - \omega = \alpha(z - \omega)$$

- Rotation

Soit  $\theta$  un nombre réel et  $\Omega$  un point du plan d'affixe  $\omega$ .

$M'$  est l'image par  $M$  par la rotation de centre  $\Omega$  et d'angle  $\theta$  si, et seulement si

$$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$$

---

**Définition/Propriétés III.0.4 (Applications  $z \rightarrow az + b$  avec  $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$ )**

Soit  $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$ . L'application  $f$  de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{C}$  définie par

$$f(z) = az + b$$

est dite similitude directe.

Interprétation géométrique : Pour tout  $z \in \mathbb{C}$ , on note  $M$  le point d'affixe  $z$  et  $M'$  le point d'affixe  $z' = f(z)$

- Cas où  $a = 1$

On a alors l'équivalence suivante :  $z' = f(z)$  si et seulement si,  $z' - z = b$

L'application  $f$  est donc la translation de vecteur d'affixe  $b$ .

- Cas où  $a \neq 1$

$f$  admet alors un point fixe  $\omega$  donné par  $\omega = \frac{b}{1-a}$  dont le point image est noté  $\Omega$

On en déduit les équivalences suivantes :

$$z' = f(z) \text{ si, et seulement si, } z' - \omega = a'(z - \omega)$$

$$\text{si, et seulement si, } z' - \omega = |a| \left( e^{i \arg(a)} (z - \omega) \right)$$

$$\text{si, et seulement si, } z' - \omega = e^{i \arg(a)} (|a| (z - \omega))$$

L'application  $f$  est donc la composée commutative :

- de l'Homothétie de centre  $\Omega$  et de rapport  $|a|$
- de la rotation de centre  $\Omega$  et d'angle  $\arg(a)$



---

**Définition/Propriétés III.0.5 (Applications  $z \longrightarrow a\bar{z} + b$  avec  $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$ )**

Soit  $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$ .

L'application  $g$  de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{C}$  définie par

$$g(z) = a\bar{z} + b$$

est dite similitude indirect. Elle peut s'écrire sous la forme de la composée non commutative.

$$g = f \circ s$$

avec :

- $s : z \longmapsto \bar{z}$  qui est la symétrie axiale d'axe de la droite des réels
- $f : z \longmapsto az + b$  qui est une similitude directe.

# Chapitre 7

## Calcul de primitives

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Primitives . . . . .</b>	<b>80</b>
<b>II</b>	<b>Primitives usuelles . . . . .</b>	<b>81</b>
<b>III</b>	<b>Calculs de primitives . . . . .</b>	<b>82</b>
III.1	Deux théorèmes importants . . . . .	84
III.2	Primitives de $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ ou $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$ . . . . .	85
III.3	Primitives de $x \mapsto \frac{1}{ax^2 + bx + c}$ avec $a, b$ et $c$ des réels et $a$ non nul . . . . .	85

### Notation .0.1

- $I$  et  $J$  désignent des intervalles de  $\mathbb{R}$ , non vides et non réduits à un point
- $\mathbb{K}$  désigne l'ensemble  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$

## I Primitives

### Définition/Propriétés I.0.1

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  une fonction quelconque.

On dit qu'une fonction  $F : I \longrightarrow \mathbb{K}$  est une primitive de  $f$  sur  $I$  si  $F$  est dérivable sur  $I$  de dérivée  $f$ .

Si  $f$  admet une primitive  $F$  sur  $I$  alors l'ensemble des primitives de  $f$  sur  $I$  est  $\{x \mapsto F(x) + \lambda \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$ .

### Théorème I.0.2 (Théorème fondamental de l'analyse)

Si  $f$  **CONTINUE** sur  $I$  alors :

- pour tout  $x_0$  réel, la fonction  $F : \int_{x_0}^x f(t)dt$  est une primitive de  $f$  sur  $I$
- la fonction  $f$  admet des primitives sur  $I$

---

**Définition/Propriétés I.0.3 (Application au calcul d'intégrales sur un segment)**

Si  $f$  est **CONTINUE** sur  $I$  et  $F$  une primitive de  $f$  sur  $I$  alors, pour tous réels  $a$  et  $b$  dans  $I$ , on a :

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a) \underset{\text{notation}}{=} [F]_b^a$$

## II Primitives usuelles

---

**Définition/Propriétés II.0.1 (Puissances entières ou réelles)**

Si la fonction $f$ est ...	alors une primitive de $f$ est ...	sur tout intervalle $I$ inclus dans ...
$x \mapsto x^n$ avec $n \in \mathbb{N}$	$x \mapsto \frac{1}{n+1}x^{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n$ avec $n \in \mathbb{Z}_- \setminus \{-1\}$	$x \mapsto \frac{1}{n+1}x^{n+1}$	$\mathbb{R}^*$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto \ln( x )$	$\mathbb{R}^*$
$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x \mapsto \sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+^*$
$x \mapsto x^\alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$	$x \mapsto \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}$	$\mathbb{R}_+^*$

---

**Définition/Propriétés II.0.2 (Exponentielle à valeurs réelles ou complexes et logarithme népér)**

Si la fonction $f$ est ...	alors une primitive de $f$ est ...	sur tout intervalle $I$ inclus dans ...
$x \mapsto e^{\lambda x}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$	$x \mapsto \frac{1}{\lambda}e^{\lambda x}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto e^x$	$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \ln(x)$	$x \mapsto x \ln(x) - x$	$\mathbb{R}_+^*$

---

**Définition/Propriétés II.0.3 (Fonctions hyperboliques)**

Si la fonction $f$ est ...	alors une primitive de $f$ est ...	sur tout intervalle $I$ inclus dans ...
$x \mapsto \operatorname{ch}(x)$	$x \mapsto \operatorname{sh}(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \operatorname{sh}(x)$	$x \mapsto \operatorname{ch}(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto 1 - \operatorname{th}^2(x)$	$x \mapsto \operatorname{th}(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)}$	$x \mapsto \operatorname{th}(x)$	$\mathbb{R}$

---

**Définition/Propriétés II.0.4 (Fonctions circulaires et fonctions circulaires réciproques)**

Si la fonction $f$ est ...	alors une primitive de $f$ est ...	sur tout intervalle $I$ inclus dans ...
$x \mapsto \cos(x)$	$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(x)$	$x \mapsto -\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto 1 + \tan^2(x)$	$x \mapsto \tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$
$x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)}$	$x \mapsto \tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$
$x \mapsto \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \mapsto \operatorname{Arccos}(x)$	$] -1 ; 1[$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \mapsto \operatorname{Arcsin}(x)$	$] -1 ; 1[$
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$x \mapsto \operatorname{Arctan}(x)$	$\mathbb{R}$

### III Calculs de primitives

### Définition/Propriétés III.0.1

- Primitives d'une combinaison linéaire de fonctions

Si  $f : I \mapsto \mathbb{K}$  et  $g : I \mapsto \mathbb{K}$  sont des fonctions qui admettent des primitives sur  $I$  notées  $F$  et  $G$  alors, pour tous  $\alpha$  et  $\beta$  dans  $\mathbb{K}$ , la fonction  $\alpha f + \beta g : I \mapsto \mathbb{K}$  admet pour primitive sur  $I$  la fonction  $\alpha F + \beta G$

- Primitives d'une fonction dérivée de fonctions composées

Si  $u : I \mapsto \mathbb{R}$  est une fonction dérivable sur  $I$  tel que pour tout  $x$  de  $I$ ,  $u(x)$  appartient à  $J$  et si  $g : J \mapsto \mathbb{K}$  est une fonction dérivable sur  $J$  alors une primitive de la fonction  $f : x \mapsto u'(x)g'(u(x))$  sur  $I$  est la fonction  $F : x \mapsto g(u(x))$ .

Dans le tableau ci-dessous (à savoir retrouver à partir des primitives usuelles),  $I$  désigne un intervalle sur lequel  $u$  est dérivable et tel que, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $u(x)$  appartient au domaine de dérivabilité de  $F$ .

Si la fonction $f$ est ...	alors une primitive de $f$ est ...
$x \mapsto u'(x) (u(x))^\alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ $x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$	$x \mapsto \frac{1}{\alpha+1} (u(x))^{\alpha+1}$ $x \mapsto \ln( u(x) )$
$x \mapsto u'(x) e^{\lambda u(x)}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$ $x \mapsto u'(x) \ln(u(x))$	$x \mapsto \frac{1}{\lambda} e^{\lambda u(x)}$ $x \mapsto u(x) \ln(u(x)) - u(x)$
$x \mapsto u'(x) \operatorname{ch}(u(x))$ $x \mapsto u'(x) \operatorname{sh}(u(x))$ $x \mapsto u'(x) \left(1 + \operatorname{th}^2(u(x))\right)$	$x \mapsto \operatorname{sh}(u(x))$ $x \mapsto \operatorname{ch}(u(x))$ $x \mapsto \operatorname{th}(u(x))$
$x \mapsto u'(x) \cos(u(x))$ $x \mapsto u'(x) \sin(u(x))$ $x \mapsto u'(x) \left(1 + \tan^2(u(x))\right)$	$x \mapsto \sin(u(x))$ $x \mapsto -\cos(u(x))$ $x \mapsto \tan(u(x))$
$x \mapsto \frac{-u'(x)}{\sqrt{1-u^2(x)}}$ $x \mapsto \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u^2(x)}}$ $x \mapsto \frac{u'(x)}{1+u^2(x)}$	$x \mapsto \operatorname{Arccos}(u(x))$ $x \mapsto \operatorname{Arcsin}(u(x))$ $x \mapsto \operatorname{Arctan}(u(x))$

### III.1 Deux théorèmes importants

---

#### Définition III.1.1 (préliminaire)

Une fonction  $f : I \mapsto \mathbb{K}$  est dite de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  si  $f$  est dérivable sur  $I$  et de dérivée continue sur  $I$

---

#### Théorème III.1.2 (Intégration par parties)

Si  $u$  et  $v$  sont deux fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  alors, pour tous réels  $a$  et  $b$  dans  $I$ , on a :

$$\int_a^b u'(t)v(t)dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)dt$$

---

*Démonstration*

Soit  $u$  et  $v$  deux applications de  $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$  alors  $\forall (a, b) \in I^2$  :

$$\begin{aligned}\int_a^b (uv)'(t)dt &= \int_a^b (u'v + uv')(t)dt \\ [uv]_a^b &= \int_a^b (u'v)(t)dt + \int_a^b (uv')(t)dt \\ \int_a^b u'(t)v(t)dt &= [uv]_a^b - \int_a^b (uv')(t)dt\end{aligned}$$

■

---

#### Théorème III.1.3 (Changement de variable)

Si  $\varphi : J \mapsto \mathbb{R}$  est fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $J$  tel que, pour tout  $t$  de  $J$ ,  $\varphi(t)$  appartient à  $I$  et

Si  $f : I \mapsto \mathbb{K}$  est fonction continue sur  $I$  tel que, pour tous  $\alpha$  et  $\beta$  dans  $J$ , on a :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx$$

---

*Démonstration*

Soit  $\varphi : J \mapsto \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $J$  tel que, pour tout  $t$  de  $J$ ,  $\varphi(t)$  appartient à  $I$  et  $f : I \mapsto \mathbb{K}$  une fonction continue sur  $I$  tel que, pour tous  $\alpha$  et  $\beta$  dans  $J$ , alors :

$f$  possède une primitive sur  $I$  (car  $f$  est continue sur  $I$ ) que l'on note  $F$ .

On note aussi  $G : t \mapsto F(\varphi(t))$  qui est dérivable sur  $J$  par composition ainsi  $G' : t \mapsto F'(\varphi(t)) \times \varphi'(t)$ , alors :

$$\begin{aligned}\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt &= \int_{\min}^{\max} G'(t)dt \\ &= [G(t)]_{\alpha}^{\beta} \\ &= F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) \\ &= [F]_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} \\ &= \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx\end{aligned}$$

■

### III.2 Primitives de $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ ou $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$

---

#### Définition/Propriétés III.2.1 ()

- Preliminaire

Soit  $f$  et  $F$  des fonctions définies sur un intervalle  $I$  à valeurs complexes.

(1)  $f$  admet des primitives sur  $I$  si, et seulement si,  $\operatorname{Re}(f)$  et  $\operatorname{Im}(f)$  admettent des primitives sur  $I$ .

(2)  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $I$  si, et seulement si, 
$$\begin{cases} \operatorname{Re}(F) \text{ est une primitive de } \operatorname{Re}(f) \text{ sur } I \\ \operatorname{Im}(F) \text{ est une primitive de } \operatorname{Im}(f) \text{ sur } I \end{cases}.$$

- Une application usuelle du résultat précédent

Soit  $a$  et  $b$  des réels tels que  $(a, b) \neq (0, 0)$ .

On note  $\lambda = a + ib$  et  $f_\lambda$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par, pour tout  $x$  réel

$$f_\lambda(x) = e^{ax} \cos(bx) + i e^{ax} \sin(bx) = e^{ax} e^{ibx} \stackrel{\text{def}}{=} e^{(a+ib)x} = e^{\lambda x}$$

La fonction  $F_\lambda : x \mapsto \frac{1}{\lambda} e^{\lambda x}$  est une primitive de  $f_\lambda$  sur  $\mathbb{R}$  donc :

- la fonction  $\operatorname{Re}(F_\lambda)$  est une primitive de la fonction  $\operatorname{Re}(f_\lambda) : x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$  sur  $\mathbb{R}$
- la fonction  $\operatorname{Im}(F_\lambda)$  est une primitive de la fonction  $\operatorname{Im}(f_\lambda) : x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$  sur  $\mathbb{R}$

### III.3 Primitives de $x \mapsto \frac{1}{ax^2 + bx + c}$ avec $a, b$ et $c$ des réels et $a$ non nul

---

#### Application III.3.1

Soit  $a, b$  et  $c$  des réels avec  $a$  non nul et  $g$  la fonction  $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  définie par  $g(x) = ax^2 + bx + c$ . Trois cas se présentent :

(1) Si  $g$  admet deux racines réelles distinctes  $r_1$  et  $r_2$  alors il existe deux réels  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$  tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{r_1, r_2\}, \frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{\alpha_1}{x - r_1} + \frac{\alpha_2}{x - r_2}$$

Dans ce cas,

une primitive de  $x \mapsto \frac{1}{ax^2 + bx + c}$  sur tout intervalle  $I$  inclus dans  $\mathbb{R} \setminus \{r_1, r_2\}$  est :

$$x \mapsto \alpha_1 \ln |x - r_1| + \alpha_2 \ln |x - r_2|$$

(2) si  $g$  admet une racine réelle double  $r$  alors il existe un réel  $\alpha$  tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{r\}, \frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{\alpha}{(x - r)^2}$$

Dans ce cas,

une primitive de  $x \mapsto \frac{1}{ax^2 + bx + c}$  sur tout intervalle  $I$  inclus dans  $\mathbb{R} \setminus \{r\}$  est :

$$x \mapsto \frac{-\alpha}{x - r}$$

- (3) Si  $g$  n'admet pas de racines réelles alors, en écrivant  $g$  sous forme canonique, on peut trouver trois réels  $\alpha, \beta$  et  $\gamma$  tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{\alpha}{\left(\frac{x+\beta}{\gamma}\right)^2 + 1}$$

Dans ce cas,

une primitive de  $x \mapsto \frac{1}{ax^2 + bx + c}$  sur tout intervalle  $I$  inclus dans  $\mathbb{R}$  est :

$$x \mapsto \alpha\gamma \arctan\left(\frac{x+\beta}{\gamma}\right)$$



# Chapitre 8

## Compléments sur les nombres réels

### Sommaire

I	Parties denses de $\mathbb{R}$ . . . . .	87
II	Approximation décimale d'un réel . . . . .	89
III	Borne inférieure et supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$ . . . . .	90

### I Parties denses de $\mathbb{R}$

---

#### Définition/Propriétés I.0.1 (Généralité)

Une partie  $X$  de  $\mathbb{R}$  est dite dense dans  $\mathbb{R}$  si elle rencontre tout intervalle ouvert non vide de  $\mathbb{R}$ .

En pratique :

Pour établir qu'une partie  $X$  de  $\mathbb{R}$  est dense dans  $\mathbb{R}$  à l'aide de cette définition, on montre que tout intervalle du type  $]a ; b[$  avec  $a$  et  $b$  des réels tel que  $a < b$ , contient au moins un élément de  $X$ .

---

#### Exemple I.0.2

- Les ensembles  $\mathbb{N}$  et  $\mathbb{Z}$  sont des parties de  $\mathbb{R}$  qui ne sont pas denses dans  $\mathbb{R}$
- Les ensemble  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  sont des parties de  $\mathbb{R}$  qui sont denses dans  $\mathbb{R}$

---

#### Démonstration (Preuve de $\mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$ )

Soit  $a$  et  $b$  des réels avec  $a < b$ .

Montrons que  $]a ; b[$  contient un élément de  $\mathbb{Q}$ , c'est à dire  $\exists(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  tel que  $a < \frac{p}{q} < b$

autrement dit  $qa < p < qb$

Ainsi pour que  $p$  existe il faut que :

$$qa - qb > 1 \quad \text{car } p \in \mathbb{Z}$$

$$q(a - b) > 1$$

$$q > \frac{1}{b - a} \quad \text{car } b > a$$

$$\text{Prenons } q = \left\lfloor \frac{1}{b - a} \right\rfloor + 1 \quad \text{car } \frac{1}{b - a} > \left\lfloor \frac{1}{b - a} \right\rfloor + 1$$

Prenons  $p = \lfloor qa \rfloor + 1$ , donc  $p - 1 \leq qa < p$

or  $p < qb$  car  $q > \frac{1}{b - a} \iff qb - qa > 1 \iff qb > qa + 1 \geq \lfloor qa \rfloor + 1 = p$

Ainsi  $qa < p < qb \implies a < \frac{p}{q} < b$  avec  $q = \left\lfloor \frac{1}{b - a} \right\rfloor + 1$  et  $p = \lfloor qa \rfloor + 1$ .

conclusion

Tout intervalle réel de type  $]a ; b[$  avec  $a < b$  contient un rationnel donc par définition,  $\mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ . ■

*Démonstration (preuve que  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ )*

- Préliminaire : Démonstration que  $\sqrt{2}$  est irrationnel

On suppose qu'il existe  $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  avec  $p$  et  $q$  premier entre eux tel que  $\frac{p}{q} = \sqrt{2}$  alors :

$$\begin{aligned} \frac{p}{q} = \sqrt{2} &\iff \sqrt{2}q = p \\ &\implies 2q^2 = p^2 \quad \text{donc } p^2 \text{ est pair ce qui explique } p \text{ pair} \\ &\implies 2q^2 = (2k)^2 \quad \text{en posant } p = 2k \text{ avec } k \in \mathbb{Z} \\ &\implies 2q^2 = 4k^2 \\ &\implies 2k^2 = q^2 \quad \text{donc } q^2 \text{ est pair et donc } q \text{ aussi} \end{aligned}$$

Ce qui est absurde car  $p$  et  $q$  sont premier entre eux donc ils ne peuvent pas être tous les deux pair. conclusion  $\sqrt{2}$  est irrationnel.

- Preuve que  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$

Soit  $a$  et  $b$  des réels avec  $a < b$ .

Montrons que  $]a ; b[$  contient un irrationnel :

Par densité de  $\mathbb{Q}$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $\left] \frac{a}{\sqrt{2}} ; \frac{b}{\sqrt{2}} \right[$  contient un rationnel  $r$

on a donc  $\frac{a}{\sqrt{2}} < r < \frac{b}{\sqrt{2}} \implies a < \sqrt{2}r < b$

— Si  $r \neq 0$

$\sqrt{2}r \in ]a ; b[$  et  $\sqrt{2}r$  est irrationnel car sinon  $\sqrt{2}r$  serait rationnel et alors  $\sqrt{2}r \times \frac{1}{r} = \sqrt{2}$   
 $\in \mathbb{Q}$                        $\frac{1}{r} \in \mathbb{Q}$

donc  $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$  ce qui est faux.

Donc  $]a ; b[$  contient un irrationnel.

— Si  $r = 0$

On raisonne de même manière mais sur avec un intervalle  $]0 ; b[$  et  $\left]0 ; \frac{b}{\sqrt{2}}\right[$

Ainsi on trouve  $r' \in \left]0 ; \frac{b}{\sqrt{2}}\right[ \cap \mathbb{Q}$  puis  $r'\sqrt{2} \in ]0 ; b[ \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$

Donc  $]a ; b[$  contient un irrationnel.

**conclusion** Tout intervalle réel de type  $]a ; b[$  avec  $a < b$  contient un irrationnel donc par définition,  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ . ■

---

### **Théorème I.0.3 (Caractérisation séquentiel des parties denses dans $\mathbb{R}$ )**

*Une partie  $X$  de  $\mathbb{R}$  est dense dans  $\mathbb{R}$  si, et seulement si, tout réel est limite d'une suite d'élément de  $X$*

---

#### *Démonstration*

Soit  $X$  une partie de  $\mathbb{R}$  On procède par double implication.

**$\Rightarrow$**  On suppose que  $X$  est dense dans  $\mathbb{R}$ , soit  $x$  un réel et  $n \in \mathbb{N}$

alors  $\left]x - \frac{1}{n+1} ; x\right[$  contient un élément de  $(u_n)$  de  $X$  par densité de  $X$  dans  $\mathbb{R}$

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}, x - \frac{1}{n+1} < u_n < x$  or  $x - \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$  et  $x \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$  donc par théorème d'encadrement  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$

**conclusion**

tout réel  $x$  est limite d'une suite  $(u_n)$  d'élément de  $X$

**$\Leftarrow$**  On suppose que tout réel est limite d'une suite d'élément de  $X$

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  avec  $a < b$  et  $\ell \in ]a ; b[$

par hypothèse, il existe une suite  $(u_n)$  telle que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in X$  et  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$

par définition de la limite,  $]a ; b[$  qui contient  $\ell$  contient aussi tous les termes de la suite  $(u_n)$  à

partir d'un certain rang d'où l'existence de  $\begin{cases} u_{n_0} & \in X \\ u_{n_0} & \in ]a ; b[ \end{cases}$

**conclusion**

$X$  est dense car pour tout  $]a ; b[$  avec  $a < b$  il existe un élément (ici  $u_{n_0}$ ) de  $X$  dans  $]a ; b[$

**conclusion**

Par double implication le théorème est vérifié ■

---

## **II Approximation décimale d'un réel**

---

### **Définition/Propriétés II.0.1 (rappel)**

L'ensemble des nombres décimaux est notée  $\mathbb{D}$  et définie par  $\mathbb{D} = \left\{ \frac{p}{10^n} \mid (p, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \right\}$

---

**Propriétés II.0.2 (Approximation décimales d'un réel)**

Soit  $x$  un réel et  $n$  un entier naturel. Il existe un unique nombre décimal  $d_n$  tel que :

$$10^n d_n \in \mathbb{Z} \text{ et } d_n \leq x \leq d_n + 10^{-n}$$

Par ailleurs pour tout réel  $x$  les suites de nombres décimaux  $(d_n)$  et  $(d_n + 10^{-n})$  définie ci-dessus sont convergentes de limite égal à  $x$  donc, par caractérisation séquentielle, l'ensemble  $\mathbb{D}$  est dense dans  $\mathbb{R}$

---

**Définition/Propriétés II.0.3 (Développement décimal d'un réel)**

Soit  $x$  un réel et  $(d_n)$  la suite des valeurs décimales approchées de  $x$  à  $10^{-n}$  près par défaut.

Alors :

- Pour tout  $k$  dans  $\mathbb{N}$ , il existe un unique entier  $a_k$  dans  $\llbracket 0 ; 9 \rrbracket$  tel que  $d_k - d_{k-1} = \frac{a_k}{10^k}$
- Pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$ ,  $d_n = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{10^k}$  avec  $a_0 = \lfloor x \rfloor$

Puisque la suite  $(d_n)$  converge vers  $x$ , on peut donc écrire que :

$$x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{10^k} \right) \underset{\text{Notation}}{=} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{a_k}{10^k} = a_0, a_1 a_2 \dots$$

ce qu'on appelle un "développement décimal illimité de  $x$ ".

Par ailleurs :

L'existence et l'unicité d'un tel  $a_k$  résulte du fait que :  $\forall k \in \mathbb{N}^*, 10^k(d_k - d_{k-1}) \in \llbracket 0 ; 9 \rrbracket$ . L'expression de  $d_n$  sous forme de somme finie s'obtient alors par sommation des égalités  $d_k - d_{k-1} = \frac{a_k}{10^k}$  et télescopage

### III Borne inférieure et supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$

---

**Définition III.0.1**

Soit  $X$  une partie de  $\mathbb{R}$ . S'il existe :

- le plus petit des majorants de  $X$  est appelé borne supérieure de  $X$  et noté  $\sup X$
- le plus grand des minorants de  $X$  est appelé borne inférieure de  $X$  et noté  $\inf X$

Remarques :

- les bornes supérieure ou inférieure de  $X$  ne sont pas nécessairement dans  $X$ .
- En revanche,
  - si  $X$  admet un maximum alors  $X$  admet une borne supérieure, égale au maximum de  $X$  ;
  - si  $X$  admet un minimum alors  $X$  admet une borne inférieure, égale au minimum de  $X$ .

---

**Propriétés III.0.2 (Propriété dite de la borne supérieure/inférieure)**

- toute partie non vide et majorée de  $\mathbb{R}$  admet une borne supérieure.
- Toute partie non vide et minorée de  $\mathbb{R}$  admet une borne inférieure.

---

**Définition/Propriétés III.0.3 ( Traduction séquentielle de la borne supérieure/inférieure)**

Soit  $X$  une partie de  $\mathbb{R}$ .

- Si  $X$  est non vide et minorée alors il existe une suite d'éléments de  $X$  de limite  $\inf X$ .
- Si  $X$  est non vide et majorée alors il existe une suite d'éléments de  $X$  de limite  $\sup X$ .
- Si  $X$  est non vide et non minorée alors il existe une suite d'éléments de  $X$  de limite  $-\infty$ .
- Si  $X$  est non vide et non majorée alors il existe une suite d'éléments de  $X$  de limite  $+\infty$ .

---

**Définition/Propriétés III.0.4 (Droite achevée  $\overline{\mathbb{R}}$ )**

On appelle droite achevée l'ensemble noté  $\overline{\mathbb{R}}$  défini par :

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

On y étend la relation d'ordre  $\leq$ , l'addition et la multiplication connues sur  $\mathbb{R}$  avec les conventions :

$$(1) \quad \forall x \in \mathbb{R}, -\infty < x < +\infty$$

$$(2) \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

$$(3) \quad (+\infty) + (+\infty) = +\infty$$

$$(4) \quad \forall x \in \mathbb{R}, x + (-\infty) = (-\infty) + x = -\infty$$

$$(5) \quad \forall x \in \mathbb{R}, x + (+\infty) = (+\infty) + x = +\infty$$

$$(6) \quad \forall x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}, x \times (-\infty) = (-\infty) \times x = \begin{cases} +\infty & \text{si } x < 0 \\ -\infty & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$(7) \quad \forall x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}, x \times (+\infty) = (+\infty) \times x = \begin{cases} -\infty & \text{si } x < 0 \\ +\infty & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

---

**Définition/Propriétés III.0.5 (Caractérisation des intervalles de  $\mathbb{R}$ )**

Une partie  $X$  de  $\mathbb{R}$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  si, et seulement si, pour tous réels  $a$  et  $b$  dans  $X$  tels que  $a \leq b$  le segment  $[a ; b]$  est inclus dans  $X$

### Démonstration

On rappelle que  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  si  $I$  est de l'une des formes suivantes :

- $I = \emptyset$
- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \underset{\text{notation}}{=} [a ; b]$  avec  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et  $a \leq b$
- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \underset{\text{notation}}{=} [a ; b[$  avec  $(a, b) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \cup \{+\infty\})$  et  $a < b$
- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} \underset{\text{notation}}{=} ]a ; b]$  avec  $(a, b) \in (\mathbb{R} \cup \{-\infty\}) \times \mathbb{R}$  et  $a < b$
- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \underset{\text{notation}}{=} ]a ; b[$  avec  $(a, b) \in (\mathbb{R} \cup \{-\infty\}) \times (\mathbb{R} \cup \{+\infty\})$  et  $a < b$

Soit  $X$  une partie de  $\mathbb{R}$ . Dans le cas où  $X$  est l'ensemble vide, l'équivalence attendue est immédiate. On se place donc, dans la suite, dans le cas où  $X$  est une partie non vide de  $\mathbb{R}$  et on raisonne par double implication

$\Rightarrow$  On suppose que  $X$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$   
 $X$  est alors d'une des formes 2, 3, 4 ou 5 indiquées ci-dessus. Ainsi, pour tous réels  $\alpha$  et  $\beta$  dans  $X$  tels que  $\alpha \leq \beta$ , on a bien  $[\alpha ; \beta] \subset X$

$\Leftarrow$  On suppose que :  $\forall (\alpha, \beta) \in X^2, \alpha \leq \beta \implies [\alpha ; \beta] \subset X$   
 En considérant  $X$  comme partie de la droite achevée  $\overline{\mathbb{R}}$ , on peut noter  $m = \inf X$  et  $M = \sup X$   
 Montrons que  $]m ; M[ \subset X \subset [m ; M]$

— Soit  $t \in ]m ; M[$   
 Alors le réel  $t$  n'est pas un majorant de  $X$  (car  $t$  est strictement inférieur à  $M$  qui est le plus petit des majorants de  $X$ ) et le réel  $t$  n'est pas un minorant de  $X$  (car  $t$  est strictement supérieur à  $m$  qui est le plus grand des minorants de  $X$ ).

Il existe donc  $(\alpha, \beta) \in X^2$  tel que  $\alpha < t < \beta$  ce qui prouve que  $t$  appartient à l'intervalle  $]\alpha ; \beta[$  donc au segment  $[\alpha ; \beta]$ . Comme les réels  $\alpha$  et  $\beta$  appartiennent à  $X$ , l'hypothèse faite sur  $x$  donne  $[\alpha ; \beta] \subset X$  ce qui prouve, en particulier, que  $t$  appartient à  $X$

conclusion  $]m ; M[ \subset X$

— Soit  $t \in X$   
 Alors, par définition de  $m$  et  $M$ , on a :  $m \leq t \leq M$  c'est à dire  $t \in [m ; M]$   
conclusion  $X \subset [m ; M]$

On a donc montré que  $]m ; M[ \subset X \subset [m ; M]$ . Cela implique que  $X$ , vue comme partie de  $\overline{\mathbb{R}}$  est égale à l'une des parties suivantes  $]m ; M[$ ,  $]m ; M]$ ,  $[m ; M[$  ou  $[m ; M]$ .

Comme  $X$  est une partie de  $\mathbb{R}$ , on en déduit que  $X$  est bien de l'une des formes 2, 3, 4 ou 5 indiquées ci-dessus donc que  $X$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$

conclusion  $X$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  si, et seulement si,  $\forall (\alpha, \beta) \in X^2, \alpha \leq \beta \implies [\alpha ; \beta] \subset X$  ■

# Chapitre 9

## Ensemble, application et relation

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Ensemble</b>	<b>93</b>
I.1	Généralité	93
I.2	Inclusion entre ensembles et parties	94
I.3	Egalité entre ensembles	94
I.4	Opérations sur les parties d'un ensemble	95
I.5	Produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles	96
<b>II</b>	<b>Application</b>	<b>96</b>
II.1	Définition de base	96
II.2	Fonctions particulières	98
II.3	Image directe et image réciproque	98
II.4	Composition d'applications	98
II.5	Injection, surjection	99
II.6	Bijection	99
<b>III</b>	<b>Relation Binaire sur un ensemble</b>	<b>100</b>
III.1	Généralité	100
III.2	Relations d'équivalence	100
III.3	Relation d'ordre	101

## I Ensemble

### I.1 Généralité

#### Définition I.1.1

- Un ensemble est une collection d'objets, sans répétition et non ordonnée.
- Les objets de l'ensemble sont appelés les éléments de l'ensemble.
  - Si  $x$  est un élément de l'ensemble  $E$ , on dit que  $x$  appartient à  $E$  et on note  $x \in E$ .
  - Dans le cas contraire, on dit que  $x$  n'appartient pas à  $E$  et on note  $x \notin E$ .
- L'ensemble sans élément est appelé l'ensemble vide et noté  $\emptyset$ .
- Les ensembles avec un seul élément sont appelés des singletons.
- Les ensembles avec deux éléments sont appelés des paires.

---

**Définition/Propriétés I.1.2 (Modes de définition d'un ensemble)**

Un ensemble  $E$  peut être défini :

- en extension, c'est-à-dire en explicitant tous les éléments de l'ensemble  $E$ , dans le cas où il compte un nombre fini d'éléments appelé cardinal de l'ensemble. Les éléments de l'ensemble sont ainsi tous cités entre accolades. Par exemple :
  - $E = \{i\}$  singleton contenant le nombre complexe  $i$  ;
  - $E = \{\cos, \sin\}$  paire contenant les fonctions cosinus et sinus ;
  - $E = \{2, 3, 5, 7\}$  ensemble des nombres premiers inférieurs à 10 ;
  - $E = \{3, 4, \dots, 10\}$  ensemble des entiers compris entre 3 et 10 au sens large (noté aussi  $\llbracket 3 ; 10 \rrbracket$ ).
- en compréhension, c'est-à-dire en donnant des propriétés vérifiées par les éléments de l'ensemble et eux seuls. Là encore, on utilise des accolades. Par exemple :
  - $E = \{x \in \mathbb{R} \mid x \equiv 0 [2\pi]\}$  ensemble des réels congrus à 0 modulo  $2\pi$  ;
  - $E = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x)\}$  ensemble des fonctions paires de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  ;
  - $E = \left\{z \in \mathbb{C} \mid \exists k \in \mathbb{Z}, z = e^{\frac{2ik\pi}{5}}\right\}$  ensemble des racines 5-ièmes de l'unité.
  - $E = \{\alpha e \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$  ensemble des fonctions de la forme  $x \longmapsto \alpha e^x$  lorsque  $\alpha$  parcourt  $\mathbb{R}$ .

## I.2 Inclusion entre ensembles et parties

---

**Définition/Propriétés I.2.1**

Soit  $E$  un ensemble.

- Inclusion  
On dit qu'un ensemble  $F$  est inclus dans  $E$  et on note  $F \subset E$ , si tous les éléments de  $F$  appartiennent à  $E$ , c'est-à-dire :  $\forall x, (x \in F \implies x \in E)$  .
- Parties  
On dit qu'un ensemble  $F$  est une partie ou un sous-ensemble de  $E$  si  $F$  est inclus dans  $E$ .
- Ensemble des parties  
On note  $\mathcal{P}(E)$  l'ensemble des parties de  $E$ , c'est-à-dire  $\mathcal{P}(E) = \{A \mid A \subset E\}$  .

## I.3 Égalité entre ensembles

---

**Définition/Propriétés I.3.1**

- Définition  
On dit que deux ensembles  $E$  et  $F$  sont égaux, et on note  $E = F$  , s'ils ont les mêmes éléments, c'est-à-dire :  $\forall x, (x \in E \iff x \in F)$  .
- Caractérisation de l'égalité par double inclusion  
Deux ensembles  $E$  et  $F$  sont égaux si, et seulement si,  $E \subset F$  et  $F \subset E$ .



## I.4 Opérations sur les parties d'un ensemble

### Définition/Propriétés I.4.1

Soit  $E$  un ensemble et,  $A$  et  $B$  deux parties de  $E$ .

Soit  $I$  un ensemble et  $\{A_i \mid i \in I\}$  un ensemble de parties de  $E$ .

- Réunion

On appelle réunion de  $A$  et  $B$ , et on note  $A \cup B$ , la partie de  $E$  définie par

$$A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Plus généralement, on définit la réunion de parties  $A_i$  de  $E$ , avec  $i$  qui varie dans un ensemble  $I$  :

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i_0 \in I, x \in A_{i_0}\}$$

.

- Intersection

On appelle intersection de  $A$  et  $B$ , et on note  $A \cap B$ , la partie de  $E$  définie par  $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$ .

Plus généralement, on définit l'intersection de parties  $A_i$  de  $E$ , avec  $i$  qui varie dans un ensemble  $I$  :

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$$

.

- Différence

On appelle différence de  $B$  dans  $A$ , et on note  $A \setminus B$ , la partie de  $E$  définie par  $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$ .

- Complémentaire

On appelle complémentaire de  $A$  dans  $E$  la partie  $E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\}$  qui est encore notée  $\overline{A}$  ou  $A^c$  (en l'absence d'ambiguïté sur l'ensemble dans lequel le complémentaire est considéré).

- Quelques règles de calcul ou loi de Morgan

$$\text{--- } \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B) \text{ et } \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup B = \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B)$$

$$\text{--- } \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i} \text{ et } \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$$

- Recouvrement disjoint et partition d'un ensemble

L'ensemble  $\{A_i \mid i \in I\}$  de parties de  $E$  est dit partition de  $E$  si les conditions suivantes sont réunies :

$$\text{--- } E = \bigcup_{i \in I} A_i$$

$$\text{--- } \forall i \in I, A_i \neq \emptyset$$

$$\text{--- } \forall i \in I, \forall j \in I, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$$

---

*Démonstration (Loi de Morgan)*

Soit  $E$  un ensemble et  $A_j$  des parties de  $E$  où  $i \in I$  et  $B$  une partie de  $E$ .

- Distributivité de l'intersection sur l'union :

$$\begin{aligned}x \in \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B &\iff \left( x \in \bigcup_{i \in I} A_i \right) \text{ et } (x \in B) \\&\iff (\exists i_0 \in I, x \in A_{i_0}) \text{ et } (x \in B) \\&\iff \exists i_0 \in I, x \in A_{i_0} \cap B \\&\iff x \in \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)\end{aligned}$$

- $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$  :

$$\begin{aligned}x \in \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} &\iff x \notin \bigcap_{i \in I} A_i \\&\iff \exists A_{i_0}, x \notin A_{i_0} \\&\iff x \in \overline{A_{i_0}} \\&\iff x \in \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}\end{aligned}$$

## I.5 Produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles

---

### Définition/Propriétés I.5.1

Soit  $E_1, \dots, E_n$  des ensembles.

On appelle produit cartésien de  $E_1, \dots, E_n$  l'ensemble noté  $E_1 \times \dots \times E_n$  défini par :

$$E_1 \times \dots \times E_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid \forall i \llbracket 1 ; n \rrbracket, x_i \in E_i\}$$

## II Application

### II.1 Définition de base

---

**Définition/Propriétés II.1.1**

Une application  $f$  de  $E$  (ensemble de départ) dans  $F$  (ensemble d'arrivée) est un objet mathématique qui, à tout élément  $x$  de  $E$ , associe un unique élément de  $F$  noté  $f(x)$

Notation fonctionnelle :

$$\begin{array}{ccc} f : & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

---

**Définition/Propriétés II.1.2 (Image et antécédent)**

Soit  $f : E \mapsto F$  une application.

- Pour tout  $x$  élément de  $E$ ,  $f(x)$  est un élément de  $F$  appelé l'image de  $x$  par  $f$ .
- Soit  $y \in F$ . S'il existe  $x$  dans  $E$  tel que  $y = f(x)$  alors  $x$  est dit un antécédent de  $y$  par  $f$ .

---

**Définition/Propriétés II.1.3 (Ensemble des applications)**

L'ensemble des applications de  $E$  dans  $F$  est noté  $\mathcal{C}^{\mathcal{F}}(E, F)$  ou  $F^E$ .

---

**Définition/Propriétés II.1.4 (Egalité entre applications)**

On dit que deux applications  $f$  et  $g$  sont égales, et on note  $f = g$ , si les conditions suivantes sont réunies :

- $f$  et  $g$  ont le même ensemble de départ  $E$  et le même ensemble d'arrivée  $F$ ;
- pour tout  $x$  de  $E$ ,  $f(x) = g(x)$ .

---

**Définition/Propriétés II.1.5 (Graphe)**

Soit  $f : E \mapsto F$  une application.

On appelle graphe de  $f$  la partie  $G$  de  $E \times F$  définie par :

$$G = \{(x ; f(x)) \mid x \in E\}$$

## II.2 Fonctions particulières

---

### Définition/Propriétés II.2.1

- Fonction indicatrice d'une partie

Soit  $A$  une partie de  $E$ . L'application  $f$  de  $E$  dans  $\{0, 1\}$  définie par :

$$\forall x \in E, f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

est dite fonction indicatrice de  $A$  et notée  $\mathbb{1}_A$ .

- Restriction

Soit  $f : E \mapsto F$  une application et  $A$  une partie de  $E$ .

L'application  $g : A \mapsto F$  définie par  $\forall x \in A, g(x) = f(x)$  est dite restriction de  $f$  à  $A$  et notée  $f|_A$ .

- Prolongement

Soit  $A$  une partie de  $E$  et  $h : A \mapsto F$  une application.

Toute application  $f : E \mapsto F$  telle que  $f|_A = h$  est dite prolongement de  $h$  à  $E$ .

## II.3 Image directe et image réciproque

---

### Définition/Propriétés II.3.1

Soit  $f : E \mapsto F$  une application.

- Image :

Soit  $A$  une partie de  $E$ . On appelle image directe de  $A$  par  $f$  la partie de  $F$  définie par :

$$f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x)\} = \{f(x) \mid x \in A\}$$

C'est l'ensemble des images par  $f$  des éléments de  $A$ .

- Image réciproque : Soit  $B$  une partie de  $F$ . On appelle image réciproque de  $B$  par  $f$  la partie de  $E$  définie par :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$$

C'est l'ensemble des antécédents par  $f$  des éléments de  $B$ .

## II.4 Composition d'applications

---

### Définition/Propriétés II.4.1

Soit  $f : E \mapsto F$  et  $g : F \mapsto G$  deux applications. L'application  $h : E \mapsto G$  définie par :

$$\forall x \in E, h(x) = g(f(x))$$

est dite composée des applications  $f$  et  $g$  et notée  $h = g \circ f$ .

## II.5 Injection, surjection

---

### Définition/Propriétés II.5.1

Une application  $f : E \mapsto F$  est dite :

- Définitions :
  - injection si tout élément de  $F$  a au plus un antécédent par  $f$ .
  - surjection si tout élément de  $F$  a au moins un antécédent par  $f$ .
- Caractérisations pratiques :
  - $f$  est une injection si, et seulement si :  $\forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \implies x = x'$ .
  - $f$  est une surjection si, et seulement si :  $\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$ .
- Composition :

La composée de deux injections (resp. surjections) est une injection (resp. surjection).

---

*Démonstration (Composition)*

- injection :

Soit  $f : E \mapsto F$  et  $g : F \mapsto G$  deux fonctions injective  
 $\forall (x, x') \in E^2$  tel que  $g(f(x)) = g(f(x'))$   
On a  $f(x) = f(x')$  car  $g$  est une injection  
et donc  $x = x'$  car  $f$  est une injection  
conclusion  $\forall (x, x') \in E^2, g(f(x)) = g(f(x')) \implies x = x'$  donc  $g \circ f$  injective
- surjection :

Soit  $f : E \mapsto F$  et  $g : F \mapsto G$  deux fonctions surjectives  
Soit  $z \in G$  alors  $\exists y \in F, z = g(y)$  car  $g$  surjective  
Soit  $y \in F$  alors  $\exists x \in E, y = f(x)$  car  $f$  surjective  
conclusion  $\forall z \in G, \exists x \in E$  tel que  $z = g(f(x))$  donc  $g \circ f$  surjective ■

## II.6 Bijection

---

### Définition/Propriétés II.6.1

- Définitions :

Une application  $f : E \mapsto F$  est dite bijection si tout élément de  $F$  a un unique antécédent par  $f$ .  
Dans ce cas, l'application  $f^{-1} : F \mapsto E$  définie par :

$$\forall y \in F, f^{-1}(y) = x \text{ avec } x \text{ l'unique élément de } E \text{ tel que } y = f(x)$$

est dite bijection réciproque de  $f$  et vérifie :

$$f \circ f^{-1} = \text{Id}_F \text{ et } f^{-1} \circ f = \text{Id}_E$$

- Caractérisation pratique :  
Une application  $f : E \mapsto F$  est une bijection si, et seulement si,  $f$  est une injection et une surjection.
- Composition :
  - La composée de deux bijections est une bijection.
  - La bijection réciproque de la composée  $g \circ f$  où  $f$  et  $g$  sont des bijections est l'application

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

## III Relation Binaire sur un ensemble

### III.1 Généralité

---

#### Définition/Propriétés III.1.1

- Définitions :  
On appelle relation binaire sur un ensemble  $E$  toute partie  $\mathcal{R}$  de  $E \times E$ .  
Pour tout  $(x, y) \in \mathcal{R}$  :
  - on dit que  $x$  est en relation avec  $y$  par la relation  $\mathcal{R}$  ;
  - on note usuellement  $x\mathcal{R}y$
- Propriétés :  
On dit qu'une relation binaire  $\mathcal{R}$  sur un ensemble  $E$  est :
  - réflexive si :  $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$  ;
  - transitive si :  $\forall (x, y, z) \in E^3, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \implies x\mathcal{R}z$  ;
  - symétrique si :  $\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$  ;
  - antisymétrique si :  $\forall (x, y) \in E^2, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \implies x = y$ .
- Quelques exemples déjà rencontrés :
  - (1) Sur un ensemble  $E$  : la relation d'égalité.
  - (2) Sur l'ensemble  $\mathcal{P}(E)$  des parties d'un ensemble  $E$  : la relation d'inclusion.
  - (3) Sur l'ensemble  $\mathbb{R}$  : les relations  $\leq, <$  et la relation de congruence modulo un réel non nul.
  - (4) Sur l'ensemble  $\mathcal{C}^{\mathcal{F}}(D, \mathbb{R}) = \mathbb{R}^D$  des applications d'une partie  $D$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  : la relation  $\leq$ .
  - (5) Sur l'ensemble  $\mathbb{Z}$  : les relations de divisibilité  $|$  et de congruence modulo un entier non nul.

### III.2 Relations d'équivalence

---

### Définition/Propriétés III.2.1

- Définitions :

Toute relation binaire sur un ensemble  $E$  qui est réflexive, transitive et symétrique est dite relation d'équivalence sur  $E$ . Les relations d'équivalence sont souvent notées  $\sim$ ,  $\simeq$  ou *equiv*.

- Théorème :

Soit  $\sim$  une relation d'équivalence sur un ensemble  $E$ .

Alors la famille d'ensembles  $(\{y \in E \mid x \sim y\})_{x \in E}$  est une partition de  $E$ .

- Exemples des relations de congruence

- La relation de congruence modulo  $2\pi$  est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{R}$ .

Les classes d'équivalence sont les ensembles  $x + 2\pi\mathbb{Z} = \{x + 2n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$  avec  $x$  qui décrit  $[0 ; 2\pi[$ .

- La relation de congruence modulo  $n \in \mathbb{N}^*$  est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{Z}$ . Les classes d'équivalence sont les ensembles  $r + n\mathbb{Z} = \{r + nq \mid q \in \mathbb{Z}\}$  avec  $r$  qui décrit  $\llbracket 0 ; n - 1 \rrbracket$ .

## III.3 Relation d'ordre

---

### Définition/Propriétés III.3.1

- Définitions :

Toute relation binaire sur un ensemble  $E$  qui est réflexive, transitive et antisymétrique est dite relation d'ordre sur  $E$ . Les relations d'ordre sont souvent notées  $\leq$ ,  $\preceq$ ,  $\lesssim$  ou  $\preceq$ .

- Ordre partiel et ordre total :

Une relation d'ordre  $\leq$  sur un ensemble  $E$  est dite totale si :

$$\forall (x, y) \in E^2, x \leq y \text{ ou } y \leq x$$

Dans le cas contraire, la relation d'ordre  $\leq$  est dite partielle.

- Minorant, majorant, maximum, minimum, etc :

Les notions de partie minorée, majorée ou bornée ainsi que celles de minorant, majorant, minimum, maximum, borne inférieure ou borne supérieure vues pour les parties de  $\mathbb{R}$  peuvent être étendues aux parties d'un ensemble muni d'une relation d'ordre.

Par exemple, pour  $E$  un ensemble muni d'une relation d'ordre  $\leq$  et  $A$  une partie de  $E$  :

- $A$  est dite majorée pour  $\leq$  s'il existe  $M$  dans  $E$  tel que, pour tout élément  $x$  de  $A$ , on a  $x \leq M$ .

Dans ce cas, on dit que  $M$  est un majorant de  $A$  pour  $\leq$ .

- si  $A$  admet un majorant  $M$  pour  $\leq$  qui appartient à  $A$  alors celui-ci est unique et est appelé le maximum de  $A$  ou le plus grand élément de  $A$  pour  $\leq$ .

# Chapitre 10

## Suites numériques particulières

### Sommaire

I	Suite arithmétique . . . . .	.102
II	Suites géométriques . . . . .	.103
III	Suites arithmético-géométriques . . . . .	.104
IV	Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 à coefficients constants . . . .	.105
V	Cas simples de suites récurrentes du type $u_{n+1} = f(u_n)$ . . . . .	.110

### I Suite arithmétique

#### Définition I.0.1

Soit  $(u_n)$  une suite réelle (resp. complexe).

La suite  $(u_n)$  est dite arithmétique s'il existe un réel (resp. complexe)  $r$  tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$$

Le nombre  $r$  est unique et appelé raison de la suite  $(u_n)$ .

#### Définition/Propriétés I.0.2 (Expression du terme général)

Si  $(u_n)$  est une suite arithmétique réelle (resp. complexe) de raison  $r$  alors :

$$\forall p \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq p \implies u_n = u_p + (n - p)r$$

#### Définition/Propriétés I.0.3 (Limite)

Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique réelle (resp. complexe) de raison  $r$ .

- Si  $r = 0$  alors  $(u_n)$  converge vers  $u_0$ .
- Si  $r \neq 0$  alors  $(u_n)$  diverge avec, dans le cas où la suite est réelle,  $u_n \longrightarrow \begin{cases} +\infty & \text{si } r > 0 \\ -\infty & \text{si } r < 0 \end{cases}$



---

**Définition/Propriétés I.0.4 (Somme finie de termes consécutifs)**

Si  $(u_n)$  est une suite arithmétique réelle (resp. complexe) de raison  $r$  alors

$$\forall p \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq p \implies \sum_{k=p}^n u_k = \frac{(u_p + u_n)(n - p + 1)}{2}$$

## II Suites géométriques

---

**Définition II.0.1**

Soit  $(u_n)$  une suite réelle (resp. complexe).

La suite  $(u_n)$  est dite géométrique s'il existe un réel (resp. complexe)  $q$  tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = q \times u_n$$

Le nombre  $q$  est unique et appelé raison de la suite  $(u_n)$ .

---

**Définition/Propriétés II.0.2 (Expression du terme général)**

Si  $(u_n)$  est une suite géométrique réelle (resp. complexe) de raison  $q$  alors :

$$\forall p \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq p \implies u_n = q^{n-p} \times u_p$$

---

**Définition/Propriétés II.0.3 (Limite)**

Soit  $(u_n)$  une suite géométrique réelle (resp. complexe) de raison  $q$ .

- Si  $|q| < 1$  ou  $u_0 = 0$  alors  $(u_n)$  converge vers 0.
- Si  $|q| = 1$  et  $u_0 \neq 0$  alors  $(u_n)$  diverge sauf dans le cas particulier  $q = 1$  où elle converge vers  $u_0$ .
- Si  $|q| > 1$  et  $u_0 \neq 0$  alors  $(u_n)$  diverge avec, dans le cas où la suite est réelle et  $q > 1$ ,

$$u_n \longrightarrow \begin{cases} +\infty & \text{si } u_0 > 0 \\ -\infty & \text{si } u_0 < 0 \end{cases}$$

---

**Définition/Propriétés II.0.4 (Somme finie de termes consécutifs)**

Si  $(u_n)$  est une suite géométrique réelle (resp. complexe) de raison  $q$  alors

$$\forall p \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq p \implies \sum_{k=p}^n u_k = \begin{cases} u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} & \text{si } q \neq 1 \\ u_p \times (n - p + 1) & \text{si } q = 1 \end{cases}$$

### III Suites arithmético-géométriques

---

#### Définition III.0.1

Soit  $(u_n)$  une suite réelle (resp. complexe).

La suite  $(u_n)$  est dite arithmético-géométrique s'il existe des réels (resp. complexes)  $a$  et  $b$  tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = a \times u_n + b$$

Remarques :

- Si  $a = 1$ , on retrouve les suites arithmétiques de raison  $b$ .
- Si  $b = 0$ , on retrouve les suites géométriques de raison  $a$ .

---

#### Définition/Propriétés III.0.2 (Expression du terme général)

Soit  $(u_n)$  une suite arithmético-géométrique définie par la donnée de  $u_0$  réel (resp. complexe) et par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = a \times u_n + b$$

avec  $a$  et  $b$  des réels (resp. complexes) tel que  $a \neq 1$

Méthode d'obtention du terme général

On montre que :

- La seule suite  $(v_n)$  constante qui vérifie  $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = a \times v_n + b$  est donnée par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{b}{1-a}$$

- La suite  $w_n$  définie par  $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_n - v_n$  est alors une suite géométrique de raison  $a$  donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_n = w_0 \times a^n$$

on en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{b}{1-a} + \left(u_0 - \frac{b}{1-a}\right) a^n$$

---

#### Définition/Propriétés III.0.3 (Limite)

Soit  $(u_n)$  une suite arithmético-géométrique définie par la donnée de son premier terme  $(u_0)$  et par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = a \times u_n + b$$

avec  $a$  et  $b$  des réels (resp. complexes) tels que  $a \neq 1$

- Si  $|a| < 1$  ou  $u_0 = \frac{b}{1-a}$
- Si  $|a| \geq 1$  et  $u_0 \neq \frac{b}{1-a}$  alors  $(u_n)$  diverge avec, dans le cas où la suite est réelle et  $a > 1$ ,

$$u_n \longrightarrow \begin{cases} +\infty & \text{si } u_0 > \frac{b}{1-a} \\ -\infty & \text{si } u_0 < \frac{b}{1-a} \end{cases}$$

## IV Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

---

### Définition IV.0.1

Soit  $(u_n)$  une suite réelle (resp. complexe).

La suite  $(u_n)$  est dite récurrente linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants s'il existe des réels (resp. complexes)  $a$  et  $b$  tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + au_{n+1} + bu_n = 0$$

---

### Définition/Propriétés IV.0.2 (Equation caractéristique associée)

Soit  $a$  et  $b$  deux réels (resp. complexes).

La recherche de suites géométriques non nulles de raison  $q$  vérifiant la relation de récurrence

$$(E) : \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + au_{n+1} + bu_n = 0$$

conduit à l'équation dite "équation caractéristique" suivante :

$$(EC) : q^2 + aq + b = 0.$$

---

### Définition/Propriétés IV.0.3 (Expression du terme général)

(1) Cas où  $(u_n)$  est COMPLEXE et vérifie  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + au_{n+1} + bu_n = 0$  avec  $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ .

- Si  $EC$  a deux racines distinctes  $q_1$  et  $q_2$  alors il existe des complexes  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_1 q_1^n + \lambda_2 q_2^n$$

- Si  $EC$  a une racine double  $q$  alors il existe des complexes  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda_1 + \lambda_2 n) q^n$$

(2) Cas où  $(u_n)$  est RÉELLE et vérifie  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + au_{n+1} + bu_n = 0$  avec  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ .

- Si  $EC$  a deux racines distinctes  $q_1$  et  $q_2$  alors il existe des réels  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_1 q_1^n + \lambda_2 q_2^n$$

- Si  $EC$  a une racine double  $q$  alors il existe des réels  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda_1 + \lambda_2 n) q^n$$

- Si  $EC$  a deux racines complexes non réelles  $q$  et  $\bar{q}$  alors il existe des réels  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda_1 \cos(\theta n) + \lambda_2 \sin(n\theta)) r^n$$

avec  $re^{i\theta}$  forme trigonométrique de  $q$ .

---

*Démonstration (Suite complexes récurrentes linéaire d'ordre 2 à coefficients constants)*

Soit  $a$  et  $b$  des complexes avec  $b \neq 0$

On cherche à expliciter l'ensemble  $\mathcal{E}_{a,b}$  des suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de complexes qui vérifient :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + au_{n+1}bu_n = 0$$

Preliminaire :

(1) Combinaison linéaire d'éléments de  $\mathcal{E}_{a,b}$  :

Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont deux suites appartenant à  $\mathcal{E}_{a,b}$

alors pour tout couple  $(\lambda_1, \lambda_2)$  de complexes la suite  $(\lambda_1 u_n + \lambda_2 v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  appartient à  $\mathcal{E}_{a,b}$

autrement dit,  $\mathcal{E}_{a,b}$  est stable par combinaison linéaire,

Démonstration : On suppose les hypothèses réunies, en notant  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\lambda_1 u_n + \lambda_2 v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  on a :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, w_{n+2} + aw_{n+1} + bw_n &= (\lambda_1 u_{n+2} + \lambda_2 v_{n+2}) + a(\lambda_1 u_{n+1} + \lambda_2 v_{n+1}) + b(\lambda_1 u_n + \lambda_2 v_n) \\ &= \lambda_1 (u_{n+2} + au_{n+1} + bu_n) + \lambda_2 (v_{n+2} + av_{n+1} + bv_n) \\ &= \lambda_1 (0) + \lambda_2 (0) \text{ car } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ appartiennent à } \mathcal{E}_{a,b} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Par conséquent,  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  appartient à  $\mathcal{E}_{a,b}$ .

(2) Recherche de suites géométriques dans  $\mathcal{E}_{a,b}$  :

soit  $q$  un complexe non nul.

La suite  $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$  appartient à  $\mathcal{E}_{a,b}$  si, et seulement si,  $q$  est racine de l'équation suivante.

$$(EC) : q^2 + aq + b = 0$$

$(EC)$  est dite équation caractéristique associée à  $\mathcal{E}_{a,b}$

Démonstration :

La suite  $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$  appartient à  $\mathcal{E}_{a,b}$  si, et seulement si :  $\forall n \in \mathbb{N}, q^{n+2} + aq^{n+1} + bq^n = 0$

si, et seulement si :  $\forall n \in \mathbb{N}, q^n (q^2 + aq + b) = 0$

si, et seulement si :  $\forall n \in \mathbb{N}, q^2 + aq + b = 0$  car  $\forall n \in \mathbb{N}, q^n \neq 0$

si, et seulement si :  $q^2 + aq + b = 0$

Détermination des éléments de  $\mathcal{E}_{a,b}$  :

- Cas où l'équation  $(EC)$  a deux racines complexes distinctes  $q_1$  et  $q_2$ .

Dans ce cas,  $q_1$  et  $q_2$  sont tous deux non-nuls car  $q_1 q_2 = b$  (Formule de Viète) et  $b \neq 1$

Pour tout complexes  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$ , la suite  $(\lambda_1 q_1^n + \lambda_2 q_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$  appartient alors à  $\mathcal{E}_{a,b}$  par combinaison linéaire d'éléments de  $\mathcal{E}_{a,b}$

Montrons qu'il n'y a pas d'autres suites que celles trouvées ci-dessus dans  $\mathcal{E}_{a,b}$  :

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite appartenant à  $\mathcal{E}_{a,b}$

analyse on suppose qu'il existe  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  des complexes tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_1 q_1^n + \lambda_2 q_2^n$ .

on a alors en particulier, 
$$\begin{cases} u_0 &= \lambda_1 + \lambda_2 \\ u_1 &= \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 \end{cases}$$

Avec les opérations sur les lignes suivantes  $q_1 L_1 - L_2$  et  $q_2 L_1 - L_2$ , on en déduit que

$$q_1 u_0 - u_1 = \lambda_2 (q_1 - q_2) \quad q_2 u_0 - u_1 = \lambda_1 (q_2 - q_1)$$

Comme  $q_1$  et  $q_2$  sont distincts, on obtient finalement :

$$\lambda_1 = \frac{u_0 q_2 - u_1}{q_2 - q_1} \quad \lambda_2 = \frac{u_1 - u_0 q_1}{q_2 - q_1}$$

synthèse pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $w_n = u_n - \lambda_1 q_1^n - \lambda_2 q_2^n$  avec les nombres complexes  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  trouvées dans l'analyse

Un calcul simple donne alors

$$w_0 = w_1 = 0 \quad (1)$$

Par ailleurs la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  appartient à  $\mathcal{E}_{a,b}$  comme combinaison linéaire d'éléments de  $\mathcal{E}_{a,b}$  donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+2} + a w_{n+1} + b w_n = 0 \quad (2)$$

Par récurrence immédiate en utilisant (1) et (2), on trouve que  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est la suite nulle ce qui prouve que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_1 q_1^n + \lambda_2 q_2^n$$

Ainsi si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite de  $\mathcal{E}_{a,b}$  alors il existe des complexes  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  tel que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\lambda_1 q_1^n + \lambda_2 q_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$

conclusion si l'équation caractéristique (EC) a deux racines complexes distinctes  $q_1$   $q_2$  alors

$$\mathcal{E}_{a,b} = \{(\lambda_1 q_1^n + \lambda_2 q_2^n)_{n \in \mathbb{N}} \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2\}$$

- cas où l'équation caractéristique (EC) a une racine complexe double  $q$

Le discriminant de (EC) est alors nul (donc  $a^2 = 4b$ ) et  $q = -\frac{1}{2}a$  ce qui implique que  $q$  est non nul sinon on aurait  $a = b = 0$  ce qui est exclu par hypothèse sur  $b$ .

Pour tout complexes,  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$ , la suite  $(\lambda_1 q^n + \lambda_2 n q^n)_{n \in \mathbb{N}}$  appartient alors à  $\mathcal{E}_{a,b}$  par combinaison linéaire d'éléments de  $\mathcal{E}_{a,b}$

En, effet  $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$  appartient à  $\mathcal{E}_{a,b}$  (d'après le Préliminaire 2) et  $(n q^n)_{n \in \mathbb{N}}$  appartient à  $\mathcal{E}_{a,b}$  car

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, (n+2) q^{n+2} + a(n+1) q^{n+1} + b n q^n &= n q^n (q^2 + a q + b) + q^n (2q^2 + a q) \\ &= n q^n (0) + q^n (0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Montrons qu'il n'y a pas d'autres suites que celles trouvées ci-dessus dans  $\mathcal{E}_{a,b}$

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite appartenant à  $\mathcal{E}_{a,b}$

analyse on suppose qu'il existe  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  des complexes tels que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_1 q^n + \lambda_2 n q^n$

On a alors, en particulier,  $\begin{cases} u_0 = \lambda_1 \\ u_1 = \lambda_1 q + \lambda_2 q \end{cases}$

Comme  $q$  est non nul, on trouve :

$$\lambda_1 = u_0 \quad \lambda_2 = \frac{u_1 - u_0 q}{q}$$

synthèse pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $w_n = u_n - \lambda_1 q^n - \lambda_2 n q^n$  avec les nombres complexes  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  trouvées dans l'analyse.

Un calcul simple donne alors :

$$w_0 = w_1 = 0 \quad (1)$$

Par ailleurs, la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  appartient à  $\mathcal{E}_{a,b}$  comme combinaison linéaire d'éléments de  $\mathcal{E}_{a,b}$  donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+2} + a w_{n+1} + b w_n = 0 \quad (2)$$

Par récurrence immédiate en utilisant (1) et (2), on trouve que  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est la suite nulle ce qui provoque que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_1 q^n + \lambda_2 n q^n$$

Ainsi si  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite de  $\mathcal{E}_{a,b}$  alors il existe des complexes  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  tel que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\lambda_1 q^n + \lambda_2 n q^n)_{n \in \mathbb{N}}$

conclusion si l'équation caractéristique (EC) a une racine complexe double  $q$  alors

$$\mathcal{E}_{a,b} = \{(\lambda_1 q^n + \lambda_2 n q^n)_{n \in \mathbb{N}} \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2\}$$

■

*Démonstration (Suite réelles récurrentes linéaire d'ordre 2 à coefficients constants)*

Soit  $a$  et  $b$  des réels avec  $b \neq 0$

On cherche à expliciter l'ensemble  $\mathcal{E}_{a,b}$  des suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de réels qui vérifient :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + a u_{n+1} + b u_n = 0$$

on appelle toujours équation caractéristique associée à  $\mathcal{E}_{a,b}$  l'équation (EC) :  $q^2 + a q + b = 0$

Les deux cas suivants se traitent de la même manière que pour les suites complexes

- Cas où l'équation (EC) a deux racines réelles distinctes  $q_1$  et  $q_2$ .

conclusion si l'équation caractéristique (EC) a deux racines réelles distinctes  $q_1$   $q_2$  alors

$$\mathcal{E}_{a,b} = \{(\lambda_1 q_1^n + \lambda_2 q_2^n)_{n \in \mathbb{N}} \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2\}$$

- cas où l'équation caractéristique (EC) a une racine réelle double  $q$

conclusion si l'équation caractéristique (EC) a une racine réelle double  $q$  alors

$$\mathcal{E}_{a,b} = \{(\lambda_1 q^n + \lambda_2 n q^n)_{n \in \mathbb{N}} \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2\}$$

- Cas où l'équation (EC) a deux racines complexes conjuguées non réelles  $q$  et  $\bar{q}$ .

Comme  $q$  et  $\bar{q}$  sont distincts (car  $q$  n'est pas réel), on sait que les suites complexes vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + au_{n+1} + bu_n = 0$$

sont les suites  $(\lambda_1 q^n + \lambda_2 \bar{q}^n)_{n \in \mathbb{N}}$  avec  $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$

Déterminons parmi ces suites celles qui sont à valeurs réelles en utilisant les propriétés de la conjugaison.

$(\lambda_1 q^n + \lambda_2 \bar{q}^n)_{n \in \mathbb{N}}$  est à valeurs réelles si, et seulement si,  $\forall n \in \mathbb{N}, \lambda_1 q^n + \lambda_2 \bar{q}^n = \overline{\lambda_1 q^n + \lambda_2 \bar{q}^n}$

si, et seulement si,  $\forall n \in \mathbb{N}, \lambda_1 q^n + \lambda_2 \bar{q}^n = \overline{\lambda_1} \bar{q}^n + \overline{\lambda_2} q^n$

si, et seulement si,  $\forall n \in \mathbb{N}, (\lambda_1 - \bar{\lambda}_2) q^n - (\bar{\lambda}_1 - \lambda_2) \bar{q}^n = 0$

si, et seulement si,  $\forall n \in \mathbb{N}, (\lambda_1 - \bar{\lambda}_2) q^n - \overline{(\lambda_1 - \bar{\lambda}_2) q^n} = 0$

si, et seulement si,  $\forall n \in \mathbb{N}, 2 \operatorname{Im} \left( (\lambda_1 - \bar{\lambda}_2) q^n \right) = 0$

— Si  $(\lambda_1 q^n + \lambda_2 \bar{q}^n)_{n \in \mathbb{N}}$  est à valeurs réelles, on a donc  $\operatorname{Im} \left( (\lambda_1 - \bar{\lambda}_2) q^0 \right) = 0$  et  $\operatorname{Im} \left( (\lambda_1 - \bar{\lambda}_2) q \right) = 0$

La première égalité donne  $\lambda_1 - \bar{\lambda}_2 \in \mathbb{R}$ . La seconde égalité implique alors que  $(\lambda_1 - \bar{\lambda}_2) \operatorname{Im}(q) = 0$  puis que  $(\lambda_1 - \bar{\lambda}_2) = 0$  (car  $q$  n'est pas réel donc sa partie imaginaire est non nulle). Ainsi  $\lambda_1 = \lambda_2$ .

— Réciproquement, si  $\lambda_1 = \bar{\lambda}_2$  alors, pour tout  $n$  entier naturel, on a  $2i \operatorname{Im} \left( (\lambda_1 - \bar{\lambda}_2) q^n \right) = 0$  donc, avec les équivalences précédentes  $(\lambda_1 q^n + \lambda_2 \bar{q}^n)_{n \in \mathbb{N}}$  est à valeurs réelles.

En résumé : les suites de  $\mathcal{E}_{a,b}$  sont donc les suites  $(\lambda_1 q^n + \bar{\lambda}_1 \bar{q}^n)_{n \in \mathbb{N}}$  avec  $\lambda_1$  complexe quelconque.

Pour faire apparaître une forme de terme général plus explicite (sans nombres complexes), on écrit  $q$  sous forme trigonométrique  $q = r e^{i\theta}$  ( $r > 0$  et  $\theta$  réel) et  $\lambda_1$  sous forme algébrique  $\lambda_1 = \alpha_1 + i\beta_1$  ( $\alpha_1$  et  $\beta_1$  réels)

On a alors :

$$\lambda_1 q^n + \bar{\lambda}_1 \bar{q}^n = 2 \operatorname{Re}(\lambda_1 q^n) = 2 \operatorname{Re} \left( r^n (\alpha_1 + i\beta_1) e^{in\theta} \right) = 2r^n (\alpha_1 \cos(n\theta) - \beta_1 \sin(n\theta))$$

ce qui peut encore s'écrire sous la forme

$$u_n = r^n (\mu_1 \cos(n\theta) + \mu_2 \sin(n\theta))$$

avec  $(\mu_1, \mu_2) \in \mathbb{R}^2$  conclusion : Si l'équation (EC) a deux racines complexes conjuguées non réelles  $q$  et  $\bar{q}$  alors

$$\mathcal{E}_{a,b} = \{ r^n (\mu_1 \cos(n\theta) + \mu_2 \sin(n\theta)) \mid (\mu_1, \mu_2) \in \mathbb{R}^2 \}$$

où  $r = |q|$  et  $\theta$  est un argument de  $q$ . ■

## V Cas simples de suites récurrentes du type $u_{n+1} = f(u_n)$

---

### Définition V.0.1

On s'intéresse à la suite réelle  $(u_n)$  définie par récurrence par la donnée de :

$$u_0 \in I \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$$

avec  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ , non vide et non réduit à un point et  $f : I \longrightarrow I$  une fonction.

---

### Définition/Propriétés V.0.2 (Limite éventuelle)

Si  $(u_n)$  converge vers un réel  $\ell \in I$  en lequel  $f$  est continue alors  $f(\ell) = \ell$ .

Attention :

- La réciproque de la propriété précédente est FAUSSE.
- La recherche des réels  $\ell \in I$  tel que  $f(\ell) = \ell$  fournit uniquement les limites éventuelles de  $(u_n)$ .
- Une étude complémentaire permet de conclure si  $(u_n)$  converge vers une des valeurs trouvées.

Dans certains cas, l'étude de la fonction  $g : x \longmapsto f(x) - x$  peut être utile pour montrer l'existence de racines pour  $g$  qui sont les limites éventuelles de  $(u_n)$ .

---

### Définition/Propriétés V.0.3 (Monotonie éventuelle)

Pour montrer une monotonie éventuelle de  $(u_n)$ , on regarde si le signe de

$$u_{n+1} - u_n = \begin{cases} f(u_n) - u_n & (1) \\ f(u_n) - f(u_{n-1}) & (2) \end{cases}$$

est fixe lorsque  $n$  varie dans  $\mathbb{N}^*$  ou à partir d'un certain rang.

- Dans certains cas, l'étude de la fonction  $g : x \longmapsto f(x) - x$  peut aider à déterminer le signe de (1).
- Dans le cas où  $f$  est CROISSANTE sur  $I$ ,
  - une récurrence simple avec (2) montre que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} - u_n$  est du signe de  $u_1 - u_0$  :

$$\begin{cases} \text{Si } u_0 < u_1 \text{ alors } (u_n) \text{ est croissante} \\ \text{Si } u_0 > u_1 \text{ alors } (u_n) \text{ est décroissante} \end{cases}$$

- l'étude de la fonction  $g : x \longmapsto f(x) - x$  peut être utile pour déterminer le signe  $u_1 - u_0 = f(u_0) - u_0$ .



# Chapitre 11

## Suites numériques

### Sommaire

---

<b>I</b>	<b>Généralité sur les suites réelles</b>	<b>.111</b>
I.1	Définition	111
I.2	Suites majorées, minorées, bornées	112
I.3	Suites stationnaires, monotones, strictement monotones	113
<b>II</b>	<b>Limite d'une suite réelle</b>	<b>.113</b>
II.1	Généralités sur les limites	113
II.2	Cas particulier des limites finies : retour en 0	114
II.3	Suites convergentes et divergentes	114
II.4	Opérations sur les limites	114
II.5	Limite et relation d'ordre	115
II.6	Existence d'une limite finie	116
II.7	Existence d'une limite infinie	116
II.8	Cas des suites monotones	117
<b>III</b>	<b>Suites extraites</b>	<b>.118</b>
III.1	Définition	118
III.2	Suites extraites et limites	118
<b>IV</b>	<b>Suites complexes</b>	<b>.120</b>
IV.1	Suite complexe bornée et limite d'une suite complexe	121

---

## I Généralité sur les suites réelles

### I.1 Définition

---

#### Définition/Propriétés I.1.1

Toute fonction  $u$  définie sur  $\mathbb{N}$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}$  est dite suite réelle.

Notations usuelles

- Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  est noté  $u_n$  (terme général de la suite)
- La fonction  $u$  est notée  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ou  $(u_n)_{n \geq 0}$  ou encore  $(u_n)$

### Remarque

Plus généralement, on appelle suite réelle et on note  $(u_n)_{n \geq p}$  toutes fonctions  $u$  définie sur

$$\llbracket p ; +\infty \rrbracket = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq p\}$$

et à valeurs dans  $\mathbb{R}$  avec  $p$  un entier fixé.

---

### Définition/Propriétés I.1.2 (Modes de définition d'une suite)

Une suite réelle  $(u_n)$  peut être définie :

- (1) explicitement par la donnée, pour tout entier naturel  $n$ , de l'expression de  $u_n$  en fonctions de  $n$
- (2) implicitement par la donnée d'une propriété vérifiée par les termes de la suite
- (3) par récurrence

## I.2 Suites majorées, minorées, bornées

---

### Définition/Propriétés I.2.1

Soit  $(u_n)$  une suite réelle et  $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  la partie de  $\mathbb{R}$  contenant tous les termes de la suite.

- La suite  $(u_n)$  est dite majorée si  $A$  est majorée  
c'est-à-dire s'il existe un réel  $M$  tel que, pour tout entier naturel  $n$ , on a  $u_n \leq M$
- La suite  $(u_n)$  est dite minorée si  $A$  est minorée  
c'est-à-dire s'il existe un réel  $m$  tel que, pour tout entier naturel  $n$ , on a  $m \leq u_n$
- La suite  $(u_n)$  est dite bornée si  $A$  est bornée  
c'est-à-dire s'il existe des réels  $M$  et  $m$  tel que, pour tout entier naturel  $n$ , on a  $m \leq u_n \leq M$

---

### Définition/Propriétés I.2.2 (Caractérisation du caractère borné)

Une suite réelle  $(u_n)$  est bornée si, et seulement si, la suite  $(|u_n|)$  est majorée par un réel strictement positif.

## I.3 Suites stationnaires, monotones, strictement monotones

---

### Définition/Propriétés I.3.1

Une suite réelle  $(u_n)$  est dite :

- stationnaire s'il existe un entier naturel  $p$  tel que, pour tout entier  $n$  supérieur à  $p$ , on a  $u_n = u_p$
- croissante si, pour tout entier naturel  $n$ , on a  $u_n \leq u_{n+1}$
- décroissante si, pour tout entier naturel  $n$ , on a  $u_{n+1} \leq u_n$
- strictement croissante si, pour tout entier naturel  $n$ , on a  $u_n < u_{n+1}$
- strictement décroissante si, pour tout entier naturel  $n$ , on a  $u_{n+1} < u_n$
- monotone si elle est croissante ou décroissante.
- strictement décroissante si elle est strictement croissante ou strictement décroissante

## II Limite d'une suite réelle

### II.1 Généralités sur les limites

---

#### Définition/Propriétés II.1.1 (Définition d'une limite finie)

Soit  $(u_n)$  une suite réelle et  $\ell$  un réel.

On dit que la suite  $(u_n)$  a pour limite  $\ell$  si tout segment centrée en  $\ell$  contient tous les termes de la suite  $(u_n)$  à partir d'un certain rang, ce qui se traduit par

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, \implies |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

---

#### Définition/Propriétés II.1.2 (Définition d'une limite infinie)

Soit  $(u_n)$  une suite réelle.

- On dit que la suite  $(u_n)$  a pour limite  $+\infty$  si tout intervalle du type  $\llbracket A ; +\infty \llbracket$  contient tous les termes de la suite  $(u_n)$  à partir d'un certain rang, ce qui se traduit par :

$$\forall A \in \mathbb{R}^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, \implies u_n \geq A$$

- On dit que la suite  $(u_n)$  a pour limite  $-\infty$  si tout intervalle du type  $\llbracket -\infty ; A \rrbracket$  contient tous les termes de la suite  $(u_n)$  à partir d'un certain rang, ce qui se traduit par :

$$\forall A \in \mathbb{R}^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, \implies u_n \leq A$$

---

### Propriétés II.1.3 (Unicité de la limite d'une suite)

Si  $(u_n)$  est une suite réelle de limite  $\ell$  alors  $\ell$  est unique et notée  $\ell = \lim u_n$  ou  $u_n \longrightarrow \ell$

## II.2 Cas particulier des limites finies : retour en 0

---

### Définition/Propriétés II.2.1

Soit  $(u_n)$  une suite réelle et  $\ell$  un réel.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|u_n - \ell| = |(u_n - \ell) - 0| = ||u_n - \ell| - 0|$  donc :

- la suite  $(u_n)$  a pour limite  $(\ell)$  si, et seulement si, la suite  $(u_n - \ell)$  converge vers 0
- la suite  $(u_n)$  a pour limite  $(\ell)$  si, et seulement si, la suite  $|u_n - \ell|$  converge vers 0

## II.3 Suites convergentes et divergentes

---

### Définition II.3.1

Une suite réelle  $(u_n)$  est dite :

- convergente si elle admet une limite réelle  $\ell$  et, dans ce cas, on dit que  $(u_n)$  converge vers  $\ell$
- divergente sinon.

---

### Propriétés II.3.2

- (1) Toute suite réelle convergente est bornée.
- (2) Toute suite réelle non bornée est divergente.

## II.4 Opérations sur les limites

Soit  $(u_n)$  et  $u'_n$  deux suites réelles et  $\alpha$  un réel.

---

**Définition/Propriétés II.4.1****(1) Addition**

- (a) Si  $u_n \longrightarrow \ell$  avec  $\ell \in \mathbb{R}$  et  $u'_n \longrightarrow \ell'$  avec  $\ell' \in \mathbb{R}$  alors  $u_n + u'_n \longrightarrow \ell + \ell'$
- (b) Si  $u_n \longrightarrow +\infty$  et  $u'_n \longrightarrow \ell'$  avec  $\ell' \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  alors  $u_n + u'_n \longrightarrow +\infty$
- (c) Si  $u_n \longrightarrow -\infty$  et  $u'_n \longrightarrow \ell'$  avec  $\ell' \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  alors  $u_n + u'_n \longrightarrow -\infty$

**(2) Multiplication par un réel.**

- (a) Si  $u_n \longrightarrow \ell$  avec  $\ell \in \mathbb{R}$  alors  $\alpha u_n \longrightarrow \alpha \ell$
- (b) Si  $u_n \longrightarrow +\infty$  alors  $\alpha u_n \longrightarrow \begin{cases} +\infty & \text{si } \alpha > 0 \\ 0 & \text{si } \alpha = 0 \\ -\infty & \text{si } \alpha < 0 \end{cases}$
- (c) Si  $u_n \longrightarrow -\infty$  alors  $\alpha u_n \longrightarrow \begin{cases} +\infty & \text{si } \alpha < 0 \\ 0 & \text{si } \alpha = 0 \\ -\infty & \text{si } \alpha > 0 \end{cases}$

**(3) Produit**

- (a) Si  $u_n \longrightarrow \ell$  avec  $\ell \in \mathbb{R}$  et  $u'_n \longrightarrow \ell'$  avec  $\ell' \in \mathbb{R}$  alors  $u_n u'_n \longrightarrow \ell \ell'$
- (b) Si  $u_n \longrightarrow +\infty$  et  $u'_n \longrightarrow \ell'$  avec  $\ell' \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$  alors  $u_n u'_n \longrightarrow \begin{cases} +\infty & \text{si } \ell' > 0 \\ -\infty & \text{si } \ell' < 0 \end{cases}$
- (c) Si  $u_n \longrightarrow -\infty$  et  $u'_n \longrightarrow \ell'$  avec  $\ell' \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$  alors  $u_n u'_n \longrightarrow \begin{cases} -\infty & \text{si } \ell' > 0 \\ +\infty & \text{si } \ell' < 0 \end{cases}$

**(4) Inverse**

- (a) Si  $u_n \longrightarrow \ell$  avec  $\ell \in \mathbb{R}^*$  alors  $\frac{1}{u_n} \longrightarrow \frac{1}{\ell}$
- (b) Si  $u_n \longrightarrow \ell$  avec  $\ell \in \{+\infty, -\infty\}$  alors  $\frac{1}{u_n} \longrightarrow 0$
- (c) Si  $u_n \longrightarrow 0$  avec les termes  $u_n$  strictement positifs à partir d'un certain rang alors  $\frac{1}{u_n} \longrightarrow +\infty$
- (d) Si  $u_n \longrightarrow 0$  avec les termes  $u_n$  strictement négatifs à partir d'un certain rang alors  $\frac{1}{u_n} \longrightarrow -\infty$

## II.5 Limite et relation d'ordre

---

**Définition/Propriétés II.5.1 (Passage à la limite d'une inégalité large)**

Soit  $(u_n)$  et  $(u'_n)$  deux suites réelles convergentes respectivement vers des réels  $\ell$  et  $\ell'$

S'il existe un entier  $n_0$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies u_n \leq u'_n$  alors  $\ell \leq \ell'$

---

**Définition/Propriétés II.5.2 (Signes des termes d'une suite et signe de la limite)**

Soit  $(u_n)$  une suite réelle de limite  $\ell$  appartenant  $\overline{\mathbb{R}}$ .

- Si  $\ell > 0$  alors il existe un rang à partir duquel tous les termes  $u_n$  sont strictement positif
- Si  $\ell < 0$  alors il existe un rang à partir duquel tous les termes  $u_n$  sont strictement négatif

## II.6 Existence d'une limite finie

---

**Théorème II.6.1 (Théorème d'encadrement)**

Soit  $(u_n), (v_n)$  et  $(w_n)$  trois suites réelles et  $\ell$  un réel.

S'il existe un entier  $n_0$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies v_n \leq u_n \leq w_n$  et si  $(v_n)$  et  $(w_n)$  convergent vers  $\ell$  alors  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ .

---

**Propriétés II.6.2 (pratique)**

Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles et  $\ell$  un réel.

S'il existe un rang à partir duquel on a

$$|u_n - \ell| \leq v_n \text{ avec } (v_n) \text{ convergente vers } 0$$

alors  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ .

---

**Définition/Propriétés II.6.3 (Conséquence)**

Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles.

- (1) Si  $(u_n)$  converge vers un réel  $\ell$  alors  $(|u_n|)$  converge vers  $|\ell|$ .
- (2) Si  $(u_n)$  converge vers un réel 0 et  $v_n$  est bornée alors  $(u_n v_n)$  converge vers 0

## II.7 Existence d'une limite infinie

---

**Théorème II.7.1 (Théorème de minoration)**

Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles.

S'il existe un entier  $n_0$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, n \leq n_0 \implies v_n \leq u_n$  et si  $(v_n)$  a pour limite  $+\infty$  alors  $(u_n)$  a pour limite  $+\infty$

---

**Théorème II.7.2 (Théorème de majoration)**

Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles.

S'il existe un entier  $n_0$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, n \leq n_0 \implies v_n \geq u_n$  et si  $(v_n)$  a pour limite  $-\infty$  alors  $(u_n)$  a pour limite  $-\infty$

## II.8 Cas des suites monotones

---

### Théorème II.8.1 (Théorèmes de la limite monotone)

- Si  $(u_n)$  est une suite réelle croissante et majorée alors  $(u_n)$  converge vers  $\ell = \sup \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$
  - Si  $(u_n)$  est une suite réelle croissante et non majorée alors  $(u_n)$  a pour limite  $+\infty$
  - Si  $(u_n)$  est une suite réelle décroissante et minorée alors  $(u_n)$  converge vers  $\ell = \inf \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$
  - Si  $(u_n)$  est une suite réelle décroissante et non minorée alors  $(u_n)$  a pour limite  $-\infty$
- 

### Théorème II.8.2 (Théorème des suites adjacentes)

Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles.

Si  $(u_n)$  est croissante,  $(v_n)$  est décroissante et  $(v_n - u_n)$  converge vers 0 alors  $(u_n)$  et  $(v_n)$  convergent vers une même limite réelle  $\ell$  qui vérifie  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \ell \leq v_n$

---

*Démonstration (Théorème des suites adjacentes)*

On suppose les hypothèses réunies.

- Montrons tout d'abord que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$

Raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe un entier naturel  $n_0$  tel que  $v_{n_0} < u_{n_0}$ . Par monotonie des suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$ , on en déduit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies v_n \leq v_{n_0} < u_{n_0} \leq u_n$$

ce qui donne

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n_0} - v_{n_0} \leq u_n - v_n$$

La suite  $(u_n - v_n)$  étant convergente de limite nulle, par passage à la limite dans une inégalité large, on obtient alors :  $u_{n_0} - v_{n_0} \leq 0$  ce qui contredit l'hypothèse faite que  $v_{n_0} < u_{n_0}$

conclusion :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$

- Montrons alors que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  convergent.

Par décroissance de la suite  $(v_n)$  et le résultat trouvé ci-dessus, on a :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_0$ . La suite  $(u_n)$  est donc croissante et majorée. Par théorème de la limite monotone, on en déduit que la suite  $(u_n)$  converge

De même, la suite  $(v_n)$  est décroissante et minorée (par  $u_0$ ) donc elle converge.

On note  $\ell = \lim u_n$  et  $\ell' = \lim v_n$ . Par opération algébrique sur les limites, la suite  $(u_n - v_n)$  converge vers  $\ell - \ell'$ . Par unicité de la limite, l'hypothèse faite sur la suite  $(u_n - v_n)$  donne alors  $(\ell - \ell' = 0)$  donc  $\ell = \ell'$

conclusion : les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  convergent vers une même limite  $\ell$ .

- Montrons que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \ell \leq v_n$  Par théorème de la limite monotone,
    - comme  $u_n$  est croissante et convergente vers  $\ell$ , on a  $\ell = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$
    - comme  $v_n$  est décroissante et convergente vers  $\ell$ , on a  $\ell = \inf_{n \in \mathbb{N}} v_n$
- conclusion :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \ell \leq v_n$  ■

## III Suites extraites

### III.1 Définition

---

#### Définition III.1.1

Soit  $(u_n)$  une suite réelle.

On appelle suite extraite de  $(u_n)$  toute suite  $(v_k)$  telle que  $\forall k \in \mathbb{N}, v_k = u_{\varphi(k)}$  avec  $\varphi$  une fonction strictement croissante définie sur  $\mathbb{N}$  et à valeurs dans  $\mathbb{N}$ .

### III.2 Suites extraites et limites

---

#### Propriétés III.2.1

Si  $u_n$  est une suite réelle de limite  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$  alors toutes les suites extraites de  $(u_n)$  ont la même limite  $\ell$ .

---

*Démonstration (Suites extraites et limites)*

Résultat préliminaire

Soit  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  une fonction strictement croissante.

On a  $\varphi(0) \geq 0$ . Soit  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $\varphi(k) \geq k$  alors par stricte croissance de  $\varphi$ ,  $\varphi(k+1) > \varphi(k)$  donc, puisque  $\varphi$  est à valeurs dans  $\mathbb{N}$ , on a  $\varphi(k+1) \geq \varphi(k) + 1$  et enfin  $\varphi(k+1) \geq k+1$ .

Par principe de récurrence, on a donc :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \varphi(k) \geq k$$

- On suppose que  $u$  est une suite réelle de limite réelle  $\ell$  et  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  une fonction strictement croissante.

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ . Par hypothèse sur la suite  $u$  il existe un entier naturel  $n_0$  tel que pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à  $n_0$ , on a  $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$

Soit  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $k \geq n_0$ . Alors par stricte croissance de  $\varphi$  et avec le résultat préliminaire, on a  $\varphi(k) \geq \varphi(n_0) \geq n_0$  ce qui permet d'obtenir, avec ce qui précède,  $|u_{\varphi(k)} - \ell| \leq \varepsilon$

Autrement dit, la suite  $(u_{\varphi(k)})$  a pour limite  $\ell$ .



- On suppose que  $u$  est une suite réelle de limite  $+\infty$  et  $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  une fonction strictement croissante.

Soit  $A \in \mathbb{R}_+^*$ . Par hypothèse sur la suite  $u$ , il existe un entier naturel  $n_0$  tel que pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à  $n_0$ , on a  $u_n \geq A$

Soit  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $k \geq n_0$ . Comme ci-dessus obtient  $u_{\varphi(k)} \geq A$ .

En résumé :  $\forall A \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}, k \geq n_0 \implies u_{\varphi(k)} \geq A$

- Le cas où  $u$  est une suite réelle de limite  $-\infty$  se traite de la même façon.

Conclusion : Si  $u$  est une suite réelle de limite  $k \in \overline{\mathbb{R}}$  alors toute suite extraite de  $u$  a pour limite  $\ell$ . ■

### Définition/Propriétés III.2.2 (Utilisation de suites extraites pour prouver une divergence)

Soit  $(u_n)$  une suite réelle.

- S'il existe une suite extraite de  $(u_n)$  qui diverge alors la suite  $(u_n)$  diverge
- S'il existe deux suites extraites de  $(u_n)$  de limites réelles différentes alors la suite  $(u_n)$  diverge

### Définition/Propriétés III.2.3 (Utilisation des suites extraites pour prouver une convergence)

Soit  $(u_n)$  une suite réelle.

Si les suites  $u_{2n}$  et  $(u_{2n+1})$  ont pour limite  $\ell$  avec  $\ell$  appartenant à  $\overline{\mathbb{R}}$  alors  $(u_n)$  a pour limite  $\ell$

### Théorème III.2.4 (Théorème de Bolzano-Weierstrass)

*Toute suite réelle bornée admet une suite extraite convergente.*

*Démonstration (Théorème de Bolzano-Weierstrass)*

- Montrons le résultat annoncé dans le cas des suites réelles

On suppose que  $(u_n)$  est une suite réelle bornée.

$(u_n)$  admet donc une borne inférieure et une borne supérieure ; on note  $m = \inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$  et  $M = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$ .

— Construction d'une suite de segments par dichotomie

- (1) On note  $I_0$  le segment  $[m ; M]$  :  $I_0$  est de longueur de  $M - m$  et contient tous les termes de la suite  $u_n$ .

- (2) L'un des deux segments  $\left[ m ; \frac{m+M}{2} \right]$  ou  $\left[ \frac{m+M}{2} ; M \right]$  contient nécessairement une infinité de termes de la suite  $(u_n)$  ; on le note  $I_1$  :  $I_1$  est inclus dans  $I_0$ , est de longueur  $\frac{M-m}{2}$  et contient une infinité de termes de la suite  $(u_n)$
- (3) à partir de  $I_1$ , on construit un segment noté  $I_2$  inclus dans  $I_1$ , de longueur  $\frac{M-m}{2^2}$  et qui contient une infinité de termes de la suite  $(u_n)$

En répétant l'opération on construit ainsi une suite de segments  $(I_n)$  telle que :

- (1)  $\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} \subset I_n$
- (2) pour tout  $n \in \mathbb{N}, I_n$  est de longueur  $\frac{M-m}{2^n}$
- (3) pour tout  $n \in \mathbb{N}, I_n$  contient une infinité de termes de la suite.

Dans chaque segment  $I_n$ , il y a une infinité de termes de la suite  $(u_n)$ . Il existe donc une application  $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{\varphi(n)} \in I_n$$

- Montrons que la suite  $(u_{\varphi(n)})$  ainsi construite, qui est extraite de  $(u_n)$ , est une suite convergente.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $I_n = [\alpha_n ; \beta_n]$ . Par décroissance de la suite  $(I_n)$  pour l'inclusion, la suite  $\alpha_n$  est croissante et la suite  $(\beta_n)$  est décroissante. Par ailleurs, la suite  $(\beta_n - \alpha_n)$  est égale à la suite  $\frac{(M-m)}{2^n}$  donc elle converge vers 0.

Par théorème des suites adjacentes, on en déduit que les suites  $(\alpha_n)$  et  $(\beta_n)$  convergent vers une même limite  $\ell$ . Le théorème d'encadrement utilisé avec les inégalités  $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n \leq u_{\varphi(n)} \leq \beta_n$  permet alors de conclure que la suite  $(u_{\varphi(n)})$  converge vers  $\ell$ .

- Montrons le résultat annoncé dans le cas des suites complexes Soit  $u_n$  une suite bornée de  $\mathbb{C}$ .

Alors  $(x_n) = (\operatorname{Re}(u_n))$  et  $(y_n) = (\operatorname{Im}(u_n))$  sont deux suites bornées de  $\mathbb{R}$

On peut donc extraire de  $(x_n)$  une suite convergente  $x_{\varphi_1(n)}$  notée  $(a_n)$

La suite  $(y_{\varphi_1(n)})$ , notée  $(\beta_n)$ , est alors une suite bornée de  $\mathbb{R}$ , car elle est extraite de la suite bornée  $(y_n)$  de  $\mathbb{R}$ . On peut donc extraire de  $(\beta_n)$  une suite convergente  $(\beta_{\varphi_2(n)})$  notée  $(\beta_n)$

La suite  $(a_{\varphi_2(n)})$ , notée  $(\alpha_n)$ , est alors convergente puisqu'elle est extraite de la suite convergente  $(a_n)$

On en déduit que la suite  $(\alpha_n + i\beta_n)$  est une suite extraite de  $(u_n)$  qui converge. Conclusion de toute suite bornée de complexes, on peut extraire une suite convergente ■

## IV Suites complexes

---

**Définition IV.0.1**

Toute fonction  $u$  définie sur  $\mathbb{N}$  et à valeurs dans  $\mathbb{C}$  est dite suite complexe.

---

**Définition/Propriétés IV.0.2 (Ce qui s'étend aux suites complexes)**

- Notation séquentielle, modes de définition d'une suite, suite stationnaire
- Limite finie : définition et caractérisation (cf. infra), unicité, opérations sur les limites finies
- Convergence et divergence
- Suite bornée : définition (cf. infra), lien avec la convergence
- Suites extraites : définitions, propriétés, théorème de Bolzano-Weierstrass

---

**Définition/Propriétés IV.0.3 (Ce qui ne s'étend pas aux suites complexes)**

- Notation de limite infinie
- Résultats utilisant la relation d'ordre dont les théorèmes d'existence de limite.

---

**IV.1 Suite complexe bornée et limite d'une suite complexe**

---

**Définition IV.1.1**

Une suite complexe  $(u_n)$  est dite bornée s'il existe un réel strictement positif  $M$  tel que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $|u_n| \leq M$

---

**Définition IV.1.2 (Limite d'une suite complexe)**

Soit  $(u_n)$  une suite complexe et  $\ell$  un complexe.

On dit que la suite  $(u_n)$  a pour limite  $\ell$  si tout disque fermé centré en  $\ell$  contient tous les termes de la suite  $(u_n)$  à partir d'un certain rang, ce qui se traduit par

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

---

**Définition/Propriétés IV.1.3 (Caractérisation de la limite d'une suite complexe)**

Soit  $(u_n)$  une suite complexe et  $\ell$  un complexe.

La suite complexe  $(u_n)$  a pour limite  $\ell$  si et seulement si, les suites réelles  $(\operatorname{Re}(u_n))$  et  $(\operatorname{Im}(u_n))$  ont respectivement pour limites  $\operatorname{Re}(\ell)$  et  $\operatorname{Im}(\ell)$

# Chapitre 12

## Limite et continuité

### Sommaire

---

<b>I</b>	<b>Etude locale des fonctions à valeurs réelles . . . . .</b>	<b>123</b>
I.1	Limite en un point $a$ de $\overline{\mathbb{R}}$ appartenant à $I$ ou extrémité de $I$ . . . . .	123
I.2	Limite à gauche et à droite en un réel appartenant à $I$ ou extrémité de $I$ . . . . .	124
I.3	Caractérisation séquentielle de la limite . . . . .	124
I.4	Opérations sur les limites . . . . .	124
I.5	Limites et relation d'ordre . . . . .	126
I.6	Existence d'une limite finie . . . . .	126
I.7	Existence d'une limite infinie . . . . .	127
I.8	Théorèmes de limite monotone . . . . .	127
<b>II</b>	<b>Continuité des fonctions à valeurs réelles en un point . . . . .</b>	<b>128</b>
II.1	Définition . . . . .	128
II.2	Condition nécessaire et suffisante de continuité en un point . . . . .	128
II.3	Caractérisation séquentielle de la continuité en un point . . . . .	128
II.4	Opérations sur les fonctions continues en un point . . . . .	128
II.5	Composition de fonctions continues en un point . . . . .	129
II.6	Prolongement par continuité . . . . .	129
<b>III</b>	<b>Continuité des fonctions sur un intervalle. . . . .</b>	<b>129</b>
III.1	Définition . . . . .	129
III.2	Théorèmes généraux : combinaison linéaire, produit, quotient, composée . . . . .	130
III.3	Théorème des valeurs intermédiaires et corollaires . . . . .	130
III.4	Théorème des bornes atteintes et corollaire . . . . .	132
III.5	Théorème de la bijection . . . . .	133
<b>IV</b>	<b>Cas des fonctions à valeurs complexes . . . . .</b>	<b>134</b>
IV.1	Ce qui s'étend aux fonctions complexes . . . . .	134
IV.2	Ce qui ne s'étend pas aux fonctions à valeurs complexes . . . . .	134
IV.3	Limite d'une fonction à valeurs complexes . . . . .	135

---

### Notation .0.1

Dans ce chapitre,  $I$  et  $J$  désignent des intervalles de  $\mathbb{R}$ , non vides et non réduits à un point.

# I Etude locale des fonctions à valeurs réelles

## I.1 Limite en un point $a$ de $\overline{\mathbb{R}}$ appartenant à $I$ ou extrémité de $I$

### Définition I.1.1

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  à valeur dans  $\mathbb{R}$

- Cas où  $a$  est un réel, appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$ .  
On dit que  $f$  admet pour limite  $\ell$  en  $a$  si :  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I, |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$
- cas où  $a = +\infty$  est extrémité de  $I$   
On dit que  $f$  admet pour limite  $\ell$  en  $+\infty$  si :  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists B \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I, x \geq B \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$
- cas où  $a = -\infty$  est extrémité de  $I$   
On dit que  $f$  admet pour limite  $\ell$  en  $-\infty$  si :  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists B \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I, x \leq -B \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$

### Définition I.1.2 (Définitions d'une limite infinie)

- cas où  $a$  est un réel, appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$ .

On dit que  $f$  admet pour limite  $+\infty$  en  $a$  si :  $\forall A \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I, |x - a| \leq \delta \implies f(x) \geq A$

On dit que  $f$  admet pour limite  $-\infty$  en  $a$  si :  $\forall A \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I, |x - a| \leq \delta \implies f(x) \leq -A$

- cas où  $a = +\infty$  est extrémité de  $I$

On dit que  $f$  admet pour limite  $+\infty$  en  $+\infty$  si :  $\forall A \in \mathbb{R}_+^*, \exists B \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I, x \geq B \implies f(x) \geq A$

On dit que  $f$  admet pour limite  $-\infty$  en  $+\infty$  si :  $\forall A \in \mathbb{R}_+^*, \exists B \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I, x \geq B \implies f(x) \leq -A$

- cas où  $a = -\infty$  est extrémité de  $I$

On dit que  $f$  admet pour limite  $+\infty$  en  $-\infty$  si :  $\forall A \in \mathbb{R}_+^*, \exists B \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I, x \leq -B \implies f(x) \geq A$

On dit que  $f$  admet pour limite  $-\infty$  en  $-\infty$  si :  $\forall A \in \mathbb{R}_+^*, \exists B \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I, x \leq -B \implies f(x) \leq -A$

### Définition/Propriétés I.1.3 (Unicité)

Si  $f$  admet une limite  $\ell$  en  $a$  alors celle-ci est unique et on note  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$  ou  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ .

### Définition/Propriétés I.1.4 (Existence d'une limite en un point où la fonction est définie)

Si  $f$  est définie en  $a$  et possède une limite en  $a$  alors  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

### Définition/Propriétés I.1.5 (condition nécessaire d'existence de limite)

Si  $f$  possède une limite finie en  $a$  alors  $f$  est bornée au voisinage de  $a$ .

## I.2 Limite à gauche et à droite en un réel appartenant à $I$ ou extrémité de $I$ .

---

### Notation I.2.1

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

---

### Définition I.2.2

Soit  $a$  un point de  $\mathbb{R}$ , appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$ .

- (1) On dit que  $f$  admet une limite à gauche en  $a$  si la restriction  $f|_{I \cap ]-\infty; a[}$  admet une limite en  $a$ . Dans ce cas, on note  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  ou  $\lim_{x < a} f(x)$  la limite obtenue.
  - (2) On dit que  $f$  admet une limite à droite en  $a$  si la restriction  $f|_{I \cap ]a; +\infty[}$  admet une limite en  $a$ . Dans ce cas, on note  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  ou  $\lim_{x > a} f(x)$  la limite obtenue.
- 

### Définition/Propriétés I.2.3 (Condition nécessaire et suffisante d'existence de limite)

Soit  $a$  un point de  $\mathbb{R}$  appartenant à  $I$  mais pas extrémité de  $I$

$f$  admet une limite en  $a$  si, et seulement si, les trois conditions suivantes sont réunies :

- (1)  $f$  a une limite à gauche en  $a$ .
- (2)  $f$  a une limite à droite en  $a$
- (3)  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

## I.3 Caractérisation séquentielle de la limite

---

### Théorème I.3.1

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$

Soit  $a$  un point de  $\overline{\mathbb{R}}$ , appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$ , et  $\ell$  un point de  $\overline{\mathbb{R}}$

$f$  admet une limite  $\ell$  en  $a$  si, et seulement si, pour toute suite  $(x_n)$  d'éléments de  $I$  qui admet pour limite  $a$ , la suite réelle  $(f(x_n))$  admet pour limite  $\ell$

## I.4 Opérations sur les limites

### Définition/Propriétés I.4.1

Soit  $a$  un point de  $\overline{\mathbb{R}}$ , appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$ . Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $I$  et à valeurs réelles et  $\lambda$  un réel

#### (1) Addition

- (a) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$  avec  $\ell \in \mathbb{R}$  et  $g \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell'$  avec  $\ell' \in \mathbb{R}$  alors  $(f + g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell + \ell'$
- (b) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$  et  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell'$  avec  $\ell' \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  alors  $(f + g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$
- (c) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$  et  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell'$  avec  $\ell' \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  alors  $(f + g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$

#### (2) Multiplication par un réel.

- (a) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$  avec  $\ell \in \mathbb{R}$  alors  $\lambda f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \lambda \ell$
- (b) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$  alors  $\lambda f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \begin{cases} +\infty & \text{si } \lambda > 0 \\ 0 & \text{si } \lambda = 0 \\ -\infty & \text{si } \lambda < 0 \end{cases}$
- (c) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$  alors  $\lambda f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \begin{cases} +\infty & \text{si } \lambda < 0 \\ 0 & \text{si } \lambda = 0 \\ -\infty & \text{si } \lambda > 0 \end{cases}$

#### (3) Produit

- (a) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$  avec  $\ell \in \mathbb{R}$  et  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell'$  avec  $\ell' \in \mathbb{R}$  alors  $(fg)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \ell'$
- (b) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$  et  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell'$  avec  $\ell' \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$  alors  $(fg)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \begin{cases} +\infty & \text{si } \ell' > 0 \\ -\infty & \text{si } \ell' < 0 \end{cases}$
- (c) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$  et  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell'$  avec  $\ell' \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$  alors  $(fg)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \begin{cases} -\infty & \text{si } \ell' > 0 \\ +\infty & \text{si } \ell' < 0 \end{cases}$

#### (4) Inverse

On suppose que  $f$  ne s'annule pas sur un voisinage de  $a$  sauf éventuellement en  $a$ .

- (a) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$  avec  $\ell \in \mathbb{R}^*$  alors  $\frac{1}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{1}{\ell}$
- (b) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$  avec  $\ell \in \{+\infty, -\infty\}$  alors  $\frac{1}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$
- (c) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$  avec les termes  $f(x)$  strictement positifs au voisinage de  $a$  alors  $\frac{1}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$
- (d) Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$  avec les termes  $f(x)$  strictement négatifs au voisinage de  $a$  alors  $\frac{1}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$

#### (5) Composition

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs réelles telle que  $f(I) \subset J$ .

Soit  $g$  une fonction définie sur  $J$  et à valeurs réelles.

Soit  $a$  un point de  $\overline{\mathbb{R}}$ , appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$ .

Soit  $b$  un point de  $\overline{\mathbb{R}}$ , appartenant à  $J$  ou extrémité de  $J$ .

Soit  $\ell$  un point de  $\overline{\mathbb{R}}$ .

Si  $f$  admet pour limite  $b$  en  $a$  et si  $g$  admet pour limite  $\ell$  en  $b$  alors  $g \circ f$  admet pour limite  $\ell$  en  $a$ . Autrement dit,

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b \text{ et } g(y) \xrightarrow{y \rightarrow b} \ell \implies g \circ f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$$

## I.5 Limites et relation d'ordre

Soit  $a$  un point de  $\overline{\mathbb{R}}$ , appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$ .

---

### Définition/Propriétés I.5.1 (Passage à la limite d'une inégalité large)

Soit  $(\ell, \ell') \in \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$

Si  $f$  et  $g$  sont deux fonctions définies sur  $I$ , à valeurs réelles telles que  $f \leq g$  au voisinage  $a$  avec  $f$  de limite  $\ell$  en  $a$  et  $g$  de limite  $\ell'$  en  $a$  alors  $\ell \leq \ell'$

---

### Définition/Propriétés I.5.2 (Signe de la fonction et signe de la limite)

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , à valeurs réelles, de limite  $\ell \in \mathbb{R}$  en  $a$ .

- Si  $\ell > 0$  alors  $f$  est strictement positive au voisinage de  $a$ .
- Si  $\ell < 0$  alors  $f$  est strictement négative au voisinage de  $a$ .

## I.6 Existence d'une limite finie

Soit  $a$  un point de  $\mathbb{R}$ , appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$ .

---

### Théorème I.6.1 (Théorème d'encadrement)

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs réelles, et  $\ell$  un nombre réel. S'il existe deux fonctions  $g$  et  $h$  définies sur  $I$ , à valeurs réelles telles que  $g \leq f \leq h$  au voisinage de  $a$  avec  $g$  et  $h$  de même limite finie  $\ell$  en  $a$  alors  $f$  admet pour limite  $\ell$  en  $a$ .

---

### Définition/Propriétés I.6.2 (Propriété pratique)

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $I$ , à valeurs réelles, et  $\ell$  un nombre réel. S'il existe un voisinage de  $a$  sur lequel on a pour tout  $x$ ,  $|f(x) - \ell| \leq g(x)$  avec  $g$  de limite 0 en  $a$  alors  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$ .

---

### Définition/Propriétés I.6.3 (Corollaires de la propriété pratique)

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $I$ , à valeurs réelles.

- Si  $f$  a pour limite le réel  $\ell$  en  $a$  alors  $|f|$  a pour limite  $|\ell|$  en  $a$ .
- Si  $f$  a pour limite 0 en  $a$  et si  $g$  est bornée au voisinage de  $a$  alors  $fg$  a pour limite 0 en  $a$ .



## I.7 Existence d'une limite infinie

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs réelles.

Soit  $a$  un point de  $\mathbb{R}$ , appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$ .

---

### **Théorème I.7.1 (Théorème de minoration)**

*S'il existe une fonction  $g$  définie sur  $I$ , à valeurs réelles, telle que  $g \leq f$  au voisinage de  $a$  avec  $g$  de limite  $+\infty$  en  $a$  alors  $f$  admet pour limite  $+\infty$  en  $a$ .*

---

### **Théorème I.7.2 (Théorème de majoration)**

*S'il existe une fonction  $h$  définie sur  $I$ , à valeurs réelles telle que  $f \leq h$  au voisinage de  $a$  avec  $h$  de limite  $-\infty$  en  $a$  alors  $f$  admet pour limite  $-\infty$  en  $a$ .*

## I.8 Théorèmes de limite monotone

---

### **Théorème I.8.1**

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  avec  $a < b$ .

- Cas où la fonction  $f: ]a; b[ \rightarrow \mathbb{R}$  définie sur  $]a; b[$  est CROISSANTE
  - Si  $f$  est croissante et majorée alors  $f$  admet une limite finie en  $b$  et  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup_{x \in ]a; b[} (f(x))$
  - Si  $f$  est croissante et non majorée alors  $f$  admet pour limite  $+\infty$  en  $b$ .
  - Si  $f$  est croissante et minorée alors  $f$  admet une limite finie en  $a$  et  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf_{x \in ]a; b[} (f(x))$
  - Si  $f$  est croissante et non minorée alors  $f$  admet pour limite  $-\infty$  en  $a$ .
- Cas où la fonction  $f: ]a; b[ \rightarrow \mathbb{R}$  définie sur  $]a; b[$  est DECROISSANTE
  - Si  $f$  est décroissante et minorée alors  $f$  admet une limite finie en  $b$  et  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \inf_{x \in ]a; b[} (f(x))$
  - Si  $f$  est décroissante et non minorée alors  $f$  admet pour limite  $-\infty$  en  $b$ .
  - Si  $f$  est décroissante et majorée alors  $f$  admet une limite finie en  $a$  et  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \sup_{x \in ]a; b[} (f(x))$
  - Si  $f$  est décroissante et non majorée alors  $f$  admet pour limite  $+\infty$  en  $a$ .

## II Continuité des fonctions à valeurs réelles en un point

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$  et  $a$  un réel appartenant à  $I$ .

### II.1 Définition

---

#### Définition II.1.1

- (1)  $f$  est dite continue en  $a$  si  $f$  admet pour limite  $f(a)$  en  $a$ .
- (2)  $f$  est dite continue à gauche en  $a$  si la restriction  $f|_{I \cap ]-\infty; a[}$  est continue en  $a$  c'est-à-dire si  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  existe et vaut  $f(a)$ .
- (3)  $f$  est dite continue à droite en  $a$  si la restriction  $f|_{I \cap ]a; +\infty[}$  est continue en  $a$  c'est-à-dire si  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  existe et vaut  $f(a)$ .

### II.2 Condition nécessaire et suffisante de continuité en un point

---

#### Définition/Propriétés II.2.1

$f$  est continue en  $a$  si, et seulement si, elle est continue à gauche et à droite en  $a$ .

### II.3 Caractérisation séquentielle de la continuité en un point

---

#### Définition/Propriétés II.3.1

$f$  est continue en  $a$  si, et seulement si, pour toute suite  $(x_n)$  d'éléments de  $I$  qui admet pour limite  $a$ , la suite réelle  $(f(x_n))$  admet pour limite  $f(a)$ .

### II.4 Opérations sur les fonctions continues en un point

---

#### Définition/Propriétés II.4.1

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $I$ , à valeurs réelles.

- (1) Combinaison linéaire

Si  $f$  et  $g$  sont continues en  $a$  et  $(\lambda, \mu)$  est un couple de réels alors  $\lambda f + \mu g$  est continue en  $a$ .

(2) Produit

Si  $f$  et  $g$  sont continues en  $a$  alors  $fg$  est continue en  $a$ .

(3) Quotient

Si  $f$  et  $g$  sont continues en  $a$  et si  $g$  ne s'annule pas au voisinage de  $a$  alors  $fg$  est continue en  $a$ .

## II.5 Composition de fonctions continues en un point

---

### Définition/Propriétés II.5.1

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs réelles tel que, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f(x)$  appartient à  $J$ .

Soit  $g$  une fonction définie sur  $J$  et à valeurs réelles.

Soit  $a$  un réel de  $I$ .

Si  $f$  est continue en  $a$  et si  $g$  est continue en  $f(a)$  alors  $g \circ f$  est continue en  $a$ .

## II.6 Prolongement par continuité

---

### Définition/Propriétés II.6.1

Soit  $b$  un réel n'appartenant pas à  $I$  mais extrémité de  $I$ .

Si  $f$  admet une limite finie  $\ell$  en  $b$  alors le prolongement de  $f$  à  $I \cup \{b\}$  noté  $\tilde{f} : I \cup b \longrightarrow \mathbb{R}$  défini par  $\forall x \in I, \tilde{f}(x) = f(x)$  et  $\tilde{f}(b) = \ell$  est continu en  $b$  et appelé prolongement par continuité de  $f$  en  $b$ .

## III Continuité des fonctions sur un intervalle

### III.1 Définition

---

#### Définition III.1.1

Une fonction définie sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$  est dite continue sur  $I$  si elle est continue en tout  $a$  de  $I$ .

L'ensemble des fonctions continues sur  $I$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  est souvent noté  $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$  ou  $\mathcal{C}^I$

## III.2 Théorèmes généraux : combinaison linéaire, produit, quotient, composée

---

### Théorème III.2.1

- $\forall (f, g) \in (\mathcal{C}(I, \mathbb{R}))^2, \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \alpha f + \beta g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$
- $\forall (f, g) \in (\mathcal{C}(I, \mathbb{R}))^2, fg \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$
- $\forall (f, g) \in (\mathcal{C}(I, \mathbb{R}))^2, g(I) \subset \mathbb{R}^*, \frac{f}{g} \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$
- $\forall f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}), \forall g \in \mathcal{C}(J, \mathbb{R}), f(I) \subset J \implies g \circ f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$

## III.3 Théorème des valeurs intermédiaires et corollaires

---

### Théorème III.3.1 (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  et,  $a$  et  $b$  deux points de  $I$ .

Si  $f$  est continue sur  $I$  avec  $f(a) \leq f(b)$  alors  $f$  atteint toute valeur intermédiaire entre  $f(a)$  et  $f(b)$

---

#### Démonstration

On suppose les hypothèses réunies. Dans le cas  $a = b$ , le résultat attendu est immédiat. On se place donc dans le cas  $a < b$  (sans perte de généralité) avec  $f(a) < f(b)$  (car le cas  $f(a) = f(b)$  est immédiat).

Soit  $y$  un réel de l'intervalle  $]f(a) ; f(b)[$ .

Montrons, en suivant le principe de dichotomie, qu'il existe un réel  $x$  dans  $[a ; b]$  tel que  $y = f(x)$ .

- On note  $a_0 = a, b_0 = b$  ; on a alors  $f(a_0) < y < f(b_0)$ .
- Etape 1 : on pose  $m_0 = \frac{1}{2}(a_0 + b_0)$ .
  - si  $y = f(m_0)$  alors on a bien trouvé un réel  $x$  dans  $[a ; b]$  tel que  $y = f(x)$  : c'est terminé !
  - si  $f(a_0) < y < f(m_0)$ , on pose  $(a_1, b_1) = (a_0, m_0)$  et on continue la recherche de  $x$  dans  $[a_1 ; b_1]$ .
  - si  $f(m_0) < y < f(b_0)$ , on pose  $(a_1, b_1) = (m_0, b_0)$  et on continue la recherche de  $x$  dans  $[a_1 ; b_1]$ .

Dans ces deux derniers cas, on a :  $f(a_1) < y < f(b_1)$  et on passe à l'étape 2.

- Etape 2 : on pose  $m_1 = \frac{1}{2}(a_1 + b_1)$ .
  - si  $y = f(m_1)$  alors on a bien trouvé un réel  $x$  dans  $[a ; b]$  tel que  $y = f(x)$  : c'est terminé !
  - si  $f(a_1) < y < f(m_1)$ , on pose  $(a_2, b_2) = (a_1, m_1)$  et on continue la recherche de  $x$  dans  $[a_2 ; b_2]$ .
  - si  $f(m_1) < y < f(b_1)$ , on pose  $(a_2, b_2) = (m_1, b_1)$  et on continue la recherche de  $x$  dans  $[a_2 ; b_2]$ .

Dans ces deux derniers cas, on a :  $f(a_2) < y < f(b_2)$  et on passe à l'étape 3...0.

Dans ce processus, s'il existe un entier  $k_0$  tel que  $f(m_{k_0}) = y$ , c'est terminé ! Sinon, on a créé une suite croissante  $(a_k)$  et une suite décroissante  $(b_k)$  telles que la suite  $(a_k - b_k) = \left(\frac{b-a}{2^k}\right)$  a pour limite 0.

Ces suites sont donc adjacentes. Par théorème, elles convergent vers une même limite réelle  $\ell$  qui vérifie  $\forall k \in \mathbb{N}, a_k \leq \ell \leq b_k$  donc, en particulier,  $a_0 \leq \ell \leq b_0$  c'est-à-dire  $a \leq \ell \leq b$ .

Comme  $f$  est continue, on en déduit alors que les suites  $(f(a_k))$  et  $(f(b_k))$  convergent vers  $f(\ell)$ .

De plus, par construction des suites  $(a_k)$  et  $(b_k)$ , on a :  $\forall k \in \mathbb{N}, f(a_k) < y < f(b_k)$ . Par passage à la limite, on trouve donc :  $f(\ell) \leq y \leq f(\ell)$  puis, par antisymétrie,  $f(\ell) = y$  et c'est terminé !

Conclusion :  $f$  atteint toute valeur intermédiaire entre  $f(a)$  et  $f(b)$ . ■

### Définition/Propriétés III.3.2 (Image d'un intervalle)

L'image d'un intervalle de  $\mathbb{R}$  par une fonction continue à valeurs réelles est un intervalle de  $\mathbb{R}$ .

#### Démonstration

On suppose que  $f$  est une fonction définie, continue sur un intervalle  $I$  et à valeurs réelles.

Montrons que  $f(I)$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  à l'aide de la caractérisation des intervalles vue dans le chapitre "Compléments sur les réels".

Soit  $\alpha$  et  $\beta$  deux réels quelconques de  $f(I)$  tels que  $\alpha < \beta$ .

Alors il existe  $a$  et  $b$  deux réels de  $I$  tels que  $\alpha = f(a)$  et  $\beta = f(b)$ .

Pour tout réel  $y$  de  $[\alpha ; \beta]$ , le théorème des valeurs intermédiaires assure alors l'existence d'un réel  $x$  compris entre  $a$  et  $b$  tel que  $y = f(x)$ . Comme  $a$  et  $b$  sont des réels appartenant à l'intervalle  $I$ , le réel  $x$  appartient aussi à l'intervalle  $I$  ce qui prouve que  $y$  appartient à  $f(I)$ .

Ainsi :  $\forall (\alpha, \beta) \in (f(I))^2, \alpha < \beta \implies [\alpha ; \beta] \subset f(I)$ .

Par caractérisation des intervalles, on en déduit que  $f(I)$  est un intervalle. ■

### Définition/Propriétés III.3.3 (Cas des fonctions continues strictement monotones)

Si  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  est continue et strictement croissante sur  $I$ , intervalle de bornes  $a$  et  $b$  avec  $a < b$ , alors

- pour  $I = [a ; b]$ , on a :  $f(I) = [f(a) ; f(b)]$
- pour  $I = ]a ; b[$ , on a :  $f(I) = \left] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) ; \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \right[$
- pour  $I = [a ; b[$ , on a :  $f(I) = \left[ f(a) ; \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \right[$
- pour  $I = ]a ; b]$ , on a :  $f(I) = \left] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) ; f(b) \right]$

### III.4 Théorème des bornes atteintes et corollaire

---

#### **Théorème III.4.1 (Théorème des bornes atteintes)**

*Si  $f$  est une fonction continue sur un segment et à valeurs réelles alors  $f$  est bornée et atteint ses bornes.*

---

#### *Démonstration*

On suppose les hypothèses réunies.

$f$  étant continue sur l'intervalle  $[a ; b]$  et à valeurs réelles, l'image de  $[a ; b]$  par  $f$  est un intervalle  $J$ . On note  $m$  la borne inférieure de  $J$  et  $M$  la borne supérieure de l'intervalle  $J$  considéré comme partie de la droite achevée  $\overline{\mathbb{R}}$ .

Par propriété (vue dans le chapitre "Compléments sur les réels"), il existe une suite  $(y_n)$  d'éléments de  $J$  de limite  $m$ .

Comme  $J = f([a ; b])$ , il existe alors une suite  $(x_n)$  d'éléments de  $[a ; b]$  telle que  $\forall n \in \mathbb{N}, y_n = f(x_n)$ .

La suite  $(x_n)$  étant à valeurs dans  $[a ; b]$ , elle est bornée. D'après le théorème de Bolzano-Weiestrass, elle admet donc une suite extraite convergente. On note  $x_{\varphi(n)}$  une telle suite et  $\ell$  sa limite.

On a donc :

- $y_{\varphi(n)} \longrightarrow m$  comme suite extraite d'une suite convergente de limite  $m$  ;
- $x_{\varphi(n)} \longrightarrow \ell$  ;
- $f$  continue en  $\ell$  car  $f$  continue sur  $[a ; b]$  et  $\ell \in [a ; b]$ , comme limite d'une suite à valeurs dans  $[a ; b]$ .

On peut donc passer à la limite dans les égalités

$$\forall n \in \mathbb{N}, y_{\varphi(n)} = f(x_{\varphi(n)})$$

Cela donne  $m = f(\ell)$  et prouve donc que  $m$  est un réel et que  $m$  est atteint par  $f$ .

On montre de même que  $M$  est un réel atteint par  $f$ .

Conclusion :  $f$  est bornée et atteint ses bornes. ■

---

#### **Définition/Propriétés III.4.2 (Image d'un segment)**

L'image d'un segment de  $\mathbb{R}$  par une fonction continue à valeurs réelles est un segment de  $\mathbb{R}$ .

## III.5 Théorème de la bijection

---

### Définition/Propriétés III.5.1 (Continuité et injectivité)

Toute fonction continue sur un intervalle, à valeurs réelles et injective, est strictement monotone.

Remarque La réciproque est fausse ; en revanche, toute fonction strictement monotone sur un intervalle est injective.

---

#### Démonstration

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ , non vide et non réduit à un point, et  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  continue et injective.

Raisonnons par l'absurde en supposant que  $f$  n'est ni strictement croissante, ni strictement décroissante. Alors, il existe  $(a, b) \in I^2$  tel que  $a < b$  et  $f(a) \geq f(b)$  et il existe  $(a', b') \in I^2$  tel que  $a' < b'$  et  $f(a') \leq f(b')$ .

On note  $g : [0 ; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$  définie par :  $\forall t \in [0 ; 1], g(t) = f((1-t)a' + ta) - f((1-t)b' + tb)$ . Par théorèmes généraux,  $g$  est continue sur  $[0 ; 1]$  avec  $g(0) = f(a') - f(b')$  et  $g(1) = f(a) - f(b)$  donc  $g(0) \leq 0$  et  $g(1) \geq 0$ . Par théorème des valeurs intermédiaires, il existe alors  $t_0 \in [0 ; 1]$  tel que  $g(t_0) = 0$ .

Ainsi  $f((1-t_0)a' + t_0a) = f((1-t_0)b' + t_0b)$  puis, par injectivité de  $f$ ,  $(1-t_0)a' + t_0a = (1-t_0)b' + t_0b$  ce qui donne  $(1-t_0)(b' - a') + t_0(b - a) = 0$ . Comme les termes  $(1-t_0)(b' - a')$  et  $t_0(b - a)$  sont positifs, on en déduit que  $(1-t_0)(b' - a') = t_0(b - a) = 0$  et enfin, comme  $b' - a'$  et  $b - a$  sont strictement positifs, on trouve  $1-t_0 = 0$  et  $t_0 = 0$  ce qui est absurde.

Conclusion :  $f$  est strictement monotone. ■

---

### Théorème III.5.2 (Théorème de la bijection)

Si  $f$  est une fonction à valeurs réelles définie, continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  alors  $f$  réalise une bijection de  $I$  sur  $J = f(I)$  dont la bijection réciproque  $f^{-1}$  est définie, continue et strictement monotone sur  $J$  avec même monotonie que  $f$ .

---

#### Démonstration

On suppose les hypothèses réunies.

$f$  est injective (car strictement monotone) donc l'application  $\tilde{f} : I \longmapsto f(I)$  définie par  $\forall x \in I, \tilde{f}(x) = f(x)$  est injective et surjective donc est une bijection : on dit que  $f$  réalise une bijection de  $I$  sur  $J = f(I)$ . De plus, comme  $f$  est continue et à valeurs réelles,  $J = f(I)$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ , non vide (puisque  $I$  est non vide) et non réduit à un point de  $\mathbb{R}$  (puisque  $I$  n'est pas réduit à un point et que  $f$  est injective).

La bijection réciproque  $\tilde{f}^{-1} : J \longmapsto I$ , notée plus simplement  $f^{-1}$ , est définie sur  $J$  et strictement monotone de même monotonie que  $f$ . En effet, si on suppose que  $f$  est strictement croissante (par ex), alors pour tout  $(x, y) \in J^2$  tel que  $x < y$ , on a  $f^{-1}(x) < f^{-1}(y)$  (sinon on aurait  $f^{-1}(x) \geq f^{-1}(y)$

puis par stricte croissance de  $f$ ,  $x \geq y$  ce qui est faux) donc  $f^{-1}$  est strictement croissante sur  $J$  par définition.

Soit  $\lambda \in J$ . Comme  $f^{-1}$  est strictement monotone sur  $J$ , le corollaire du théorème de limite monotone prouve (sous réserve que cela ait du sens) que  $\ell = \lim_{\lambda^-} f^{-1}$  existe, est finie et appartient à  $I$ . Par continuité de  $f$  en  $\ell$ ,  $\lim_{x \rightarrow \ell} f(x) = f(\ell)$  puis par composition de limites,  $\lim_{y \rightarrow \lambda^-} f(f^{-1}(y)) = f(\ell)$  ce qui donne  $f(\ell) = \lambda$  puis  $\ell = f^{-1}(\lambda)$  et prouve que  $f^{-1}$  est continue à gauche en  $\lambda$ . On montre de même (sous réserve que cela ait du sens) la continuité à droite ce qui prouve la continuité de  $f^{-1}$  en tout  $\lambda$  de  $J$ .

Conclusion :  $f^{-1}$  est définie, continue et strictement monotone sur  $J$  avec même monotonie que  $f$ . ■

## IV Cas des fonctions à valeurs complexes

### IV.1 Ce qui s'étend aux fonctions complexes

---

#### Définition/Propriétés IV.1.1

- Limite finie :
  - définition et caractérisations (cf infra);
  - unicité;
  - opérations sur les limites finies;
  - lien entre existence d'une limite finie en un point et caractère borné au voisinage de ce point.
- Continuité en un point et sur un intervalle.

### IV.2 Ce qui ne s'étend pas aux fonctions à valeurs complexes

---

#### Définition/Propriétés IV.2.1

- Notion de limite infinie.
- Résultats utilisant la relation d'ordre dont les théorèmes d'existence de limite.



## IV.3 Limite d'une fonction à valeurs complexes

---

### Définition/Propriétés IV.3.1

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs complexes, et  $\ell$  un nombre complexe.

Définition :

Soit  $a$  un point de  $I$  ou une extrémité de  $I$ .

On dit que  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  si la fonction à valeurs réelles  $|f - \ell|$  a pour limite 0 en  $a$ .

Caractérisations :

- $f$  admet pour limite  $\ell$  en  $a$  (point de  $I$  ou extrémité de  $I$ ) si, et seulement si,  $\operatorname{Re}(f)$  et  $\operatorname{Im}(f)$  admettent respectivement pour limite  $\operatorname{Re}(\ell)$  et  $\operatorname{Im}(\ell)$  en  $a$ .
- $f$  est continue en  $a$  (point de  $I$ ) si, et seulement si,  $\operatorname{Re}(f)$  et  $\operatorname{Im}(f)$  le sont.
- $f$  est continue sur  $I$  si, et seulement si,  $\operatorname{Re}(f)$  et  $\operatorname{Im}(f)$  le sont.

# Chapitre 13

## Calcul matriciel et systèmes linéaires

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Matrices rectangles . . . . .</b>	<b>136</b>
I.1	Généralités . . . . .	136
I.2	Produit . . . . .	137
I.3	Transposition . . . . .	139
<b>II</b>	<b>Opérations élémentaires, systèmes linéaires . . . . .</b>	<b>139</b>
II.1	Définitions . . . . .	139
II.2	Traduction en termes de produit matriciel . . . . .	140
II.3	Système d'équation linéaires . . . . .	141
<b>III</b>	<b>Matrices carrées . . . . .</b>	<b>142</b>
III.1	Ensemble des matrices carrées . . . . .	142
III.2	Matrices carrées de formes particulières . . . . .	142
III.3	Deux formules usuelles . . . . .	142
III.4	Matrices inversibles . . . . .	143
III.5	Calculs de matrices inverses en pratique . . . . .	143
III.6	Cas particulier . . . . .	144

Dans ce chapitre  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$

### I Matrices rectangles

Soit  $(m, n, p, q, r, s) \in \mathbb{N}^6$

#### I.1 Généralités

##### Définition I.1.1

Toute application  $A : [1 ; n] \times [1 ; p] \longrightarrow \mathbb{K}$  est appelée matrice de taille  $(n, p)$  à coefficients dans  $K$ .

##### Notations et représentation

- Pour tout  $(i, j) \in [1 ; n] \times [1 ; p]$ , on pose  $a_{ij} = A(i, j)$  et on note usuellement

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

- On représente  $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$  sous forme d'un tableau, à  $n$  lignes et  $p$  colonnes, dont l'élément situé en ligne  $i$  et colonne  $j$  est le nombre  $a_{ij}$ .

### Définition/Propriétés I.1.2 (L'ensemble des matrices rectangles)

L'ensemble des matrices de taille  $(n, p)$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$  est noté  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

### Définition/Propriétés I.1.3 (Opérations sur les matrices rectangles)

On munit l'ensemble  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  de deux lois :

- une loi interne (addition entre matrices) notée  $+$  définie par :

$$\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

- une loi externe (Multiplication par un scalaire *i.e.* un élément de  $\mathbb{K}$ ) notée  $\cdot$  définie par :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \lambda.A = (\lambda a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

### Définition/Propriétés I.1.4 (Matrices élémentaires)

Toute matrice  $A$  de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  peut s'écrire  $A = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j} E_{ij}$  avec  $E_{ij}$  la matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  à coefficients tous nuls, sauf celui de la  $i^e$  ligne et  $j^e$  colonne qui vaut 1.

## I.2 Produit

### Définition I.2.1

On définit le produit de deux matrices rectangles de taille  $(n, p)$  et  $(p, q)$  de la manière suivante :

$$\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), A \times B = (c_{ik})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq k \leq q}} \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$$

avec

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$$

### Propriétés I.2.2

(1) Le produit matriciel est bilinéaire, c'est-à-dire :

$$\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, \forall C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, (\alpha A + \beta B) C = \alpha AC + \beta BC$$

$$\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, \forall C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, (\alpha A + \beta B) = \alpha CA + \beta CB$$

(2) Le produit matriciel est associatif, c'est-à-dire :

$$\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \forall C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K}), (AB) C = A (BC)$$

*Démonstration (Preuve de l'associativité du produit matriciel)*

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$ . On pose :

- $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$
- $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}}$
- $C = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq q \\ 1 \leq j \leq r}}$
- $BC = (d_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq r}}$
- $A(BC) = (e_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq r}}$
- $AB = (d'_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}}$
- $(AB)C = (e'_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq r}}$

Soit  $(i, j) \in [1 ; n] \times [1 ; r]$

$$\begin{aligned}
 A(BC) &= e_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} d_{k,j} \\
 &= \sum_{k=1}^p \left( a_{i,k} \left( \sum_{s=1}^q b_{k,s} c_{s,j} \right) \right) \\
 &= \sum_{k=1}^p \left( \sum_{s=1}^q a_{i,k} b_{k,s} c_{s,j} \right) \\
 &= \sum_{s=1}^q \left( \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,s} c_{s,j} \right) \\
 &= \sum_{s=1}^q \left( \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,s} \right) c_{s,j} \\
 &= \sum_{s=1}^q d'_{i,s} c_{s,j} \\
 &= (AB) C
 \end{aligned}$$

■

---

**Définition/Propriétés I.2.3 (Produits remarquables)**

- (1) Le produit d'une matrice  $A$  de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  et d'une matrice colonne  $X$  de  $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$  est une combinaison linéaire des colonnes de  $A$ .
- (2) Le produit des matrices élémentaires  $E_{xy}$  de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  et  $E_{zt}$  de  $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$  est la matrice  $\mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$

$$E_{xy}E_{zt} = \delta_{y,z}E_{xt} \text{ avec } \delta_{y,z} = \begin{cases} 1 & \text{si } y = z \\ 0 & \text{si } y \neq z \end{cases}$$

**Remarque**

Pour  $(i, j) \in \mathbb{N}^2$ ,  $\delta_{i,j}$  est appelé "sybome de Kronecker"

## I.3 Transposition

---

**Définition I.3.1**

La transposée de  $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$  de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est la matrice de  $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$  notée  $A^\top$  définie par :

$$A^\top = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}) \text{ avec } b_{ij} = a_{ji}$$

---

**Définition/Propriétés I.3.2 (Linéarité de la transposition)**

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda A + \mu B)^\top = \lambda A^\top + \mu B^\top$$

---

**Définition/Propriétés I.3.3 (transposée d'un produit)**

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}, (AB)^\top = B^\top A^\top$$

## II Opérations élémentaires, systèmes linéaires

### II.1 Définitions

---

**Définition II.1.1**

On appelle opération élémentaire sur les lignes  $L_1, \dots, L_n$  d'une matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  l'une des opérations suivantes :

- (1) Echange de deux lignes distinctes :

$$L_r \leftrightarrow L_s$$

avec  $r \neq s$

- (2) Multiplication d'une ligne par un scalaire non nul :

$$L_r \leftarrow \lambda L_r$$

avec  $\lambda \neq 0$ .

- (3) Addition à une ligne du produit d'une autre ligne par un scalaire non nul :

$$L_r \leftarrow L_r + \lambda L_s$$

avec  $r \neq s$  et  $\lambda \neq 0$ .

## II.2 Traduction en termes de produit matriciel

---

**Définition/Propriétés II.2.1 (Matrice identité)**

- (1) La matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  définie par  $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$  est dite matrice identité

(2)  $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), I_n A = A$

(3)  $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), A I_p = A$

---

**Définition/Propriétés II.2.2 (Opérations élémentaires et produits matriciels)**

- L'opération  $L_r \leftrightarrow L_s$  sur  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  équivaut à la multiplication  $P_{r,s} \times A$  avec  $P_{r,s} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  définie par :

$$P_{r,s} = I_n + (E_{rs} + E_{rs} - E_{rr} - E_{ss})$$

$P_{r,s}$  est dite matrice de permutation

- L'opération  $L_r \leftarrow \lambda L_r$  sur  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  équivaut à la multiplication  $D_{r,\lambda} \times A$  avec  $D_{r,\lambda} \times A$  avec  $D_{r,\lambda} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  définie par :

$$D_{r,\lambda} = I_n + (\lambda - 1) E_{rr}$$

$D_{r,\lambda}$  est dite matrice de dilatation

- L'opération  $L_r \leftarrow L_r + \lambda L_s$  sur  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  équivaut à la multiplication  $T_{r,s,\lambda} \times A$  avec  $T_{r,s,\lambda} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  définie par :

$$T_{r,s,\lambda} = I_n + \lambda E_{rs}$$

$T_{r,s,\lambda}$  est dite matrice de transvection.

## II.3 Système d'équation linéaires

### Définition/Propriétés II.3.1

Soit  $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  et  $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$

Le Système linéaire  $\mathcal{S} : \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1p}x_p = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$  d'inconnue  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^p$  se traduit

matriciellement par l'équation  $AX = B$  d'inconnue  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$  que l'on appelle encore système

- Compatibilité du système

On dit que le système  $AX = B$  est compatible si  $B$  est combinaison linéaire des colonnes de  $A$  (ce qui assure l'existence de solutions au système).

- Ensemble-solution de  $\mathcal{S}$  Si le système  $AX = B$  est compatible alors ses solutions sont les matrices  $X_0 + Y$  avec :

(1)  $X_0 \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$  une solution particulière de  $AX = B$  ;

(2)  $Y \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$  solution quelconque du système homogène  $AX = 0$  associé.

- Résolution effective de  $\mathcal{S}$  Par opérations élémentaires sur les lignes du système  $\mathcal{S}$ , on peut obtenir un système  $\mathcal{S}'$ , dit équivalent à  $\mathcal{S}$  (car il a les mêmes solutions que  $\mathcal{S}$ ) de forme trapézoïdale

$$\mathcal{S}' : \begin{cases} a'_{11}x_1 + \cdots + a'_{1p}x_p = b'_1 \\ a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2p}x_p = b'_2 \\ \vdots \\ a'_{qq}x_q + \cdots + a'_{qp}x_p = b'_q \\ 0 = b'_{q+1} \\ \vdots \\ 0 = b'_n \end{cases}$$

qui peut se traduire matriciellement par :

$$A'X = B'$$

avec  $A'$  matrice  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  telle que :

- les lignes de 1 à  $q$  contiennent chacune au moins un coefficient non nul ;
- dans chaque ligne de 2 à  $q$ , le premier coefficient non nul à partir de la gauche est situé à droite du premier coefficient non nul de la ligne précédente ;
- les lignes numérotées de  $q + 1$  à  $n$  sont nulles.

Les  $(n - q)$  dernières équations de  $\mathcal{S}'$  donnent les conditions de compatibilité du système. Ces conditions étant réunies, le nombre de paramètres pour la résolution est  $(p - q)$ .

## III Matrices carrées

### III.1 Ensemble des matrices carrées

---

#### Définition III.1.1

L'ensemble  $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$  est souvent noté plus simplement  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

### III.2 Matrices carrées de formes particulières

---

#### Définition/Propriétés III.2.1

Soit  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ , une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

(1) Matrices diagonales ou triangulaires

- (a)  $A$  est dite scalaire s'il existe  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $A = \lambda I_n$ .
- (b)  $A$  est dite diagonale si  $\forall (i, j) [1; n]^2, i \neq j \implies a_{ij} = 0$ .
- (c)  $A$  est dite triangulaire supérieure si  $\forall (i, j) [1; n]^2, i > j \implies a_{ij} = 0$ .
- (d)  $A$  est dite triangulaire inférieure si  $\forall (i, j) [1; n]^2, i < j \implies a_{ij} = 0$ .

(2) Matrices symétriques ou antisymétriques

- (a)  $A$  est dite symétrique si  $A^\top = A$ .  
On note  $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$  l'ensemble des matrices symétriques de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .
- (b)  $A$  est dite antisymétrique si  $A^\top = -A$ .  
On note  $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$  l'ensemble des matrices antisymétriques de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

### III.3 Deux formules usuelles

Soit  $(A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2$

- Formule du binôme

Si  $AB = BA$  alors, pour tout  $p \in \mathbb{N}$

$$(A + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^{n-k} B^k$$

- Une formule de factorisation

Si  $AB = BA$  alors, pour tout  $p \in \mathbb{N}$

$$A^p - B^p = (A - B) \sum_{k=0}^{p-1} A^k B^{p-1-k} = (A - B) \sum_{k=0}^{p-1} A^{p-1-k} B^k$$



### III.4 Matrices inversibles

---

#### Définition/Propriétés III.4.1

- Une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est dite inversible s'il existe  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que

$$AB = BA = I_n$$

Dans ce cas,

la matrice  $B$  est unique, notée  $B = A^{-1}$ , et appelée matrice inverse de  $A$ .

- L'ensemble des matrices inversibles de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est noté  $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$  et appelé groupe linéaire.

---

#### Propriétés III.4.2

- Si  $A$  et  $B$  sont deux matrices inversibles de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  alors  $AB$  est inversible d'inverse  $A^{-1}B^{-1}$ , autrement dit :

$$\forall (A, B) \in (\mathcal{GL}_n(\mathbb{K}))^2, AB \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}) \text{ et } (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

- Si  $A$  est une matrice inversible de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  alors  $A^\top$  est inversible d'inverse  $(A^{-1})^\top$ , autrement dit :

$$\forall A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}), A^\top \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}) \text{ et } (A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$$

---

#### Définition/Propriétés III.4.3 (Trois caractérisations des matrices inversibles)

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

- (1)  $A$  est inversible si, et seulement si, il existe  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $AB = I_n$ .

Dans ce cas,  $B = A^{-1}$ .

- (2)  $A$  est inversible si, et seulement si, il existe  $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $CA = I_n$ .

Dans ce cas,  $C = A^{-1}$ .

- (3)  $A$  est inversible si, et seulement si, pour toute matrice colonne  $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ , le système  $AX = Y$  d'inconnue  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  a une unique solution.

### III.5 Calculs de matrices inverses en pratique

---

**Définition/Propriétés III.5.1 (Calcul de l'inverse par résolution d'un système)**

La résolution du système  $AX = Y$  avec  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $(X, Y) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2$  permet de déterminer si la matrice  $A$  est inversible et d'obtenir son inverse si celle-ci existe.

En effet,

- si  $A$  est inversible alors le système  $AX = Y$  a une unique solution  $X = A^{-1}Y$ . Dans ce cas, l'expression de  $X$  en fonction de  $Y$  obtenue après résolution permet d'expliciter  $A^{-1}$ .
- Si le système  $AX = Y$  n'a pas de solution unique (pas de solution ou plusieurs solutions) alors  $A$  n'est pas inversible.

---

**Définition/Propriétés III.5.2 (Préservation de l'inversibilité par les opérations élémentaires)**

Si  $A$  est une matrice carrée inversible alors la matrice obtenue à partir de  $A$  après des opérations élémentaires sur les lignes ou colonnes de  $A$  est inversible.

---

**Remarques**

- Cela résulte de l'inversibilité des matrices de permutation, de dilatation et de transvection  $P_{r,s}$ ,  $D_{r,\lambda}$  et  $T_{r,s,\lambda}$  et de la stabilité de  $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$  par produit.
- Par contraposition, si la matrice obtenue à partir de  $A$  après des opérations élémentaires sur les lignes ou colonnes n'est pas inversible alors la matrice  $A$  n'est pas inversible.

---

**Définition/Propriétés III.5.3 (Calcul de l'inverse par opérations élémentaires)**

En réalisant en parallèle les mêmes opérations élémentaires sur les lignes (ou les colonnes) d'une matrice  $A$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et de la matrice identité  $I_n$ , on peut déterminer si la matrice  $A$  est inversible et obtenir son inverse si celle-ci existe. En effet, en essayant de retransformer  $A$  en la matrice identité  $I_n$  et en reproduisant simultanément les même opérations sur la matrice identité  $I_n$  alors à la fin de la transformation, la matrice obtenue de la matrice identité est  $A^{-1}$ . (méthode du pivot de Gauss-Jordan).

---

**Remarque**

Dans cette méthode, il est impératif de ne pas mélanger les opérations sur les lignes et colonnes : autrement dit, on agit uniquement sur les lignes ou uniquement sur les colonnes. On pourra lui préférer la méthode de résolution du système dans laquelle la confusion ne peut se faire.

## III.6 Cas particulier

---

**Définition/Propriétés III.6.1 (Matrices diagonales)**

Une matrice diagonale est inversible si, et seulement si, ses coefficients diagonaux sont tous non-nuls.

Dans ce cas, sa matrice inverse est diagonale.

---

**Définition/Propriétés III.6.2 (Matrices triangulaires)**

Une matrice triangulaire est inversible si, et seulement si, ses coefficients diagonaux sont tous non-nuls.

Dans ce cas, sa matrice inverse est triangulaire.

# Chapitre 14

## Équations différentielles linéaires

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Équations différentielles linéaires d'ordre 1 . . . . .</b>	<b>146</b>
I.1	Définition . . . . .	146
I.2	Forme générale des solutions . . . . .	147
I.3	Solutions de l'équation différentielle homogène $y' + a(t)y = 0$ . . . . .	147
I.4	Solution particulière de l'équation différentielle $y' + a(t)y = b(t)$ . . . . .	148
I.5	Théorème de Cauchy : existence et unicité . . . . .	149
<b>II</b>	<b>Equations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants .</b>	<b>149</b>
II.1	Définition . . . . .	149
II.2	Forme générale des solutions . . . . .	150
II.3	Solutions de l'équation différentielle linéaire homogène $y'' + ay' + by = 0$ . . .	150
II.4	Solution particulière de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = g(t)$ . . . . .	151
II.5	Théorème de Cauchy : existence et unicité (preuve hors programme) . . . . .	152

Dans ce chapitre,  $I$  désigne un intervalle de  $\mathbb{R}$  non vide réduit à un point de  $\mathbb{K}$  l'ensemble  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{R}$

## I Équations différentielles linéaires d'ordre 1

### I.1 Définition

#### Définition I.1.1

Soit  $a$  et  $b$  deux fonctions continues sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

La fonction  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  est dite solution de l'équation différentielle linéaire du premier ordre

$$(E) : y' + a(t)y = b(t)$$

si  $f$  est dérivable sur  $I$  et vérifie :

$$\forall t \in I, f'(t) + a(t)f(t) = b(t).$$

## I.2 Forme générale des solutions

---

### Définition/Propriétés I.2.1

Soit  $a$  et  $b$  deux fonctions continues sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

Les solutions de l'équation différentielle linéaire du premier ordre  $(E) : y' + a(t)y = b(t)$  s'obtiennent en additionnant :

- UNE solution particulière de  $(E)$  ;
- LES solutions de l'équation différentielle homogène associée  $(H) : y' + a(t)y = 0$ .

---

#### Démonstration

Soit  $a$  et  $b$  deux fonctions continues sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

on pose  $(E) : y' + a(t)y = b(t)$

Supposons que  $y_0$  est solution de  $E$

Soit  $y : I \mapsto \mathbb{K}$  dérivable

$$\begin{aligned} y \text{ solution de } (E) &\iff \forall t \in I, y'(t) + a(t)y(t) = y_0'(t) + a(t)y_0(t) \\ &\iff \forall t \in I, (y - y_0)'(t) + a(t)(y - y_0)(t) = 0 \\ &\iff y - y_0 \text{ solution de } (H) : z' + a(t)z = 0 \\ &\iff y_0 \text{ s'écrit } y = y_0 + z \text{ où } z \text{ est une solution quelconque de } (H) \text{ sur } I \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\mathcal{S}_{E,I} = y_0 + \mathcal{S}_{H,I}$$

■

## I.3 Solutions de l'équation différentielle homogène $y' + a(t)y = 0$ .

---

### Définition/Propriétés I.3.1

Soit  $a$  une fonction continue sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire homogène  $(H) : y' + a(t)y = 0$  sur  $I$  est

$$\mathcal{S}_H = \left\{ t \mapsto \lambda e^{-A(t)} \mid \lambda \in \mathbb{K} \right\}$$

où  $A$  désigne une primitive de la fonction  $a$  sur  $I$ .

---

*Démonstration*

Résolution de  $(H) : y' + a(t)y = 0$  sur  $I$

On note  $A$  une primitive de  $a$  sur  $I$

Soit  $y : I \rightarrow \mathbb{K}$  dérivable sur  $I$

$$\begin{aligned} y \text{ solution de } (H) &\iff \forall t \in I, y'(t) + A'(t)y(t) = 0 \\ &\iff \forall t \in I, y'(t)e^{A(t)} + A'(t)e^{A(t)}y(t) = 0 \text{ car } \forall t \in I, e^{A(t)} \neq 0 \\ &\iff \forall t \in I, g'(t) = 0 \text{ avec } g(t) = y(t)e^{A(t)} \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall t \in I, g(t) = \lambda \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall t \in I, y(t) = \lambda e^{-A(t)} \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\mathcal{S}_H = \left\{ t \mapsto \lambda e^{-A(t)} \mid \lambda \in \mathbb{K} \right\}$$

■

## I.4 Solution particulière de l'équation différentielle $y' + a(t)y = b(t)$ .

---

### Définition/Propriétés I.4.1 (Principe de superposition de solutions)

Soit  $a, b_1$  et  $b_2$  des fonctions continues sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

$$\text{Si } \begin{cases} f_1 : I \rightarrow K \text{ est solution de l'équation différentielle linéaire } y' + a(t)y = b_1(t) \text{ sur } I \\ f_2 : I \rightarrow K \text{ est solution de l'équation différentielle linéaire } y' + a(t)y = b_2(t) \text{ sur } I \end{cases}$$

alors,  $f_1 + f_2 : I \rightarrow K$  est solution sur  $I$  de l'équation différentielle linéaire  $y' + a(t)y = b_1(t) + b_2(t)$ .

---

### Définition/Propriétés I.4.2 (Détermination d'une solution particulière $y_0$ )

Soit  $a$  et  $b$  deux fonctions continues sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

S'il n'y a pas de solution particulière évidente/connue pour  $(E) : y' + a(t)y = b(t)$  ou si le principe de superposition des solutions n'est pas applicable pour en déterminer une alors on pourra chercher une solution particulière de  $(E)$  selon la méthode dite de "variation de la constante" c'est-à-dire sous la forme

$$y_0 : t \mapsto \lambda(t)e^{-A(t)}$$

avec  $A$  une primitive de  $a$  sur  $I$  et  $\lambda$  une fonction inconnue dérivable sur  $I$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

---

*Démonstration (Démonstration de la méthode de la variation de la constante)*

Soit  $a$  et  $b$  deux fonctions continues sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

Résolution de  $(E) : y' + a(t)y = b(t)$  sur  $I$

On pose  $y_0(t) = \lambda(t)e^{-A(t)}$  avec  $\lambda$  une fonction dérivable sur  $I$  et à valeur dans  $\mathbb{K}$  et  $A$  une primitive de  $a$

$$\begin{aligned} y_0 \text{ solution de } (E) &\iff \forall t \in I, y'_0(t) + a(t)y_0(t) = b(t) \\ &\iff \forall t \in I, \lambda'(t)e^{-A(t)} + \lambda(t) \left( -a(t)e^{-A(t)} + a(t)e^{-A(t)} \right) = b(t) \\ &\iff \forall t \in I, \lambda'(t)e^{-A(t)} = b(t) \\ &\iff \forall t \in I, \lambda'(t) = b(t)e^{A(t)} \end{aligned}$$

Ainsi en primitivant  $b(t)e^{A(t)}$  (qui existe car  $b$  et  $A$  sont continue) on trouve une solution particulière ■

## I.5 Théorème de Cauchy : existence et unicité

---

### Théorème I.5.1

Soit  $a$  et  $b$  deux fonctions continues sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

Pour tout  $t_0 \in I$  et tout  $\alpha_0 \in \mathbb{K}$ , il existe une unique solution  $f$  sur  $I$  de l'équation différentielle linéaire du premier ordre  $y' + a(t)y = b(t)$  telle que  $f(t_0) = \alpha_0$

## II Equations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

### II.1 Définition

---

#### Définition II.1.1

Soit  $a$  et  $b$  deux éléments de  $\mathbb{K}$  et  $g$  une application continue sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

La fonction  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  est dite solution de l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants

$$(E) : y'' + ay' + by = g(t)$$

si  $f$  est deux fois dérivable sur  $I$  et vérifie :  $\forall t \in I, f''(t) + af'(t) + bf(t) = g(t)$ .

## II.2 Forme générale des solutions

---

### Définition/Propriétés II.2.1

Soit  $a$  et  $b$  deux éléments de  $\mathbb{K}$  et  $g$  une application continue sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

Les solutions de l'équation différentielle linéaire du second ordre  $(E) : y'' + ay' + by = g(t)$  s'obtiennent en additionnant :

- une solution particulière de  $(E)$  ;
- les solutions de l'équation différentielle homogène associée  $(H) : y'' + ay' + by = 0$

## II.3 Solutions de l'équation différentielle linéaire homogène $y'' + ay' + by = 0$

---

### Définition/Propriétés II.3.1 (Equation caractéristique)

Soit  $a$  et  $b$  deux éléments de  $\mathbb{K}$ .

La recherche de solutions de l'équation différentielle linéaire homogène à coefficients constants

$$(H) : y'' + ay' + by = 0$$

sous la forme  $t \mapsto e^{rt}$  avec  $r \in \mathbb{K}$  conduit à l'équation

$$(EC) : r^2 + ar + b = 0$$

dite équation caractéristique associée à  $(H)$ .

---

### Définition/Propriétés II.3.2 (Ensemble des solutions dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ )

Soit  $a$  et  $b$  deux éléments de  $\mathbb{C}$

On note  $\mathcal{S}_H$  l'ensemble des solutions sur  $I$  de l'équation différentielle  $(H) : y'' + ay' + by = 0$

- Si l'équation caractéristique  $(EC)$  a deux racines distinctes  $r_1$  et  $r_2$  alors :

$$\mathcal{S}_H = \{t \mapsto \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t} \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2\}$$

- Si l'équation caractéristique  $(EC)$  a une racine double  $r$  alors

$$\mathcal{S}_H = \{t \mapsto (\lambda_1 + \lambda_2 t) e^{rt} \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2\}$$



---

**Définition/Propriétés II.3.3 (Ensemble des solutions dans le cas où  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ )**

Soit  $a$  et  $b$  deux éléments de  $\mathbb{R}$

On note  $\mathcal{S}_H$  l'ensemble des solutions sur  $I$  de l'équation différentielle  $(H) : y'' + ay' + by = 0$

- 
- Si l'équation caractéristique  $(EC)$  a deux racines distinctes  $r_1$  et  $r_2$  alors :

$$\mathcal{S}_H = \{t \mapsto \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t} \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2\}$$

- Si l'équation caractéristique  $(EC)$  a une racine double  $r$  alors

$$\mathcal{S}_H = \{t \mapsto (\lambda_1 + \lambda_2 t) e^{rt} \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2\}$$

- Si l'équation caractéristique  $(EC)$  a deux racines complexes conjuguées  $r$  et  $\bar{r}$  non réelles alors

$$\mathcal{S}_H = \{t \mapsto e^{\alpha t} (\lambda_1 \cos(\beta t) + \lambda_2 \sin(\beta t)) \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2\}$$

avec  $\alpha = \operatorname{Re}(r)$  et  $\beta = \operatorname{Im}(r)$

---

**Définition/Propriétés II.3.4 (Structure de l'ensemble des solutions)**

Soit  $a$  et  $b$  deux éléments de  $\mathbb{K}$ .

Les deux points précédents permettent de mettre en évidence le résultat suivant.

L'ensemble des solutions sur  $I$  de l'équation différentielle linéaire  $(H) : y'' + ay' + by = 0$  est donc :

$$\mathcal{S}_H = \{t \mapsto \lambda_1 y_1(t) + \lambda_2 y_2(t) \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2\}$$

où  $(y_1, y_2)$  un couple de fonctions non colinéaires solutions de  $(H)$  sur  $I$ .

## II.4 Solution particulière de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = g(t)$ .

---

**Définition/Propriétés II.4.1 (Principe de superposition de solutions)**

Soit  $a, b$  deux éléments de  $\mathbb{K}$ ,  $g_1$  et  $g_2$  des fonctions continues sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

Si  $\begin{cases} f_1 : I \longrightarrow K \text{ est solution de l'équation différentielle linéaire } y'' + ay' + by = g_1(t) \text{ sur } I \\ f_2 : I \longrightarrow K \text{ est solution de l'équation différentielle linéaire } y'' + ay' + by = g_2(t) \text{ sur } I \end{cases}$

alors,  $f_1 + f_2 : I \longrightarrow K$  est solution sur  $I$  de l'équation différentielle linéaire  $y'' + ay' + by = g_1(t) + g_2(t)$ .

---

**Définition/Propriétés II.4.2 (Détermination d'une solution particulière  $y_0$ )**

Soit  $a$  et  $b$  deux éléments de  $\mathbb{K}$  et  $g$  une application continue sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

Selon le programme de MP2I,

s'il n'y a pas de solution particulière  $y_0$  évidente/connue pour  $(E) : y'' + ay' + by = g(t)$  ou si le principe de superposition ne s'applique pas pour en déterminer une, les étudiants doivent savoir en trouver une dans les trois cas suivants selon le type du second membre.

- Cas où  $g$  est une fonction polynomiale de degré  $n$

On pourra chercher  $y_0$  sous la forme d'une fonction polynomiale de degré  $n$  si  $b$  est différent de 0 ou de degré  $n + 1$  si  $b$  est égal à 0.

- Cas où  $g : t \mapsto Ae^{\lambda t}$  avec  $A$  et  $\lambda$  deux éléments de  $\mathbb{K}$ . On pourra chercher  $y_0$  sous l'une des formes suivantes selon la valeur de  $\lambda$  :

$$y_0 : t \mapsto \begin{cases} \alpha e^{\lambda t} & \text{si } \lambda \text{ n'est pas racine de } (EC) \\ \alpha t e^{\lambda t} & \text{si } \lambda \text{ n'est pas racine simple de } (EC) \text{ avec } \alpha \in \mathbb{K} \\ \alpha t^2 e^{\lambda t} & \text{si } \lambda \text{ n'est pas racine double de } (EC) \end{cases}$$

- Cas où  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  et  $g : t \mapsto B \cos(\omega t)$  [ou  $g : t \mapsto B \sin(\omega t)$ ] avec  $B$  et  $\omega$  deux éléments de  $\mathbb{R}$

On pourra, à l'aide de la méthode décrite ci-dessus, déterminer une solution particulière  $z_0$  de l'équation

$$y'' + ay' + by = Be^{i\omega t}$$

et conclure que  $y_0 = \operatorname{Re}(z_0)$  [ou  $y_0 = \operatorname{Im}(z_0)$  selon le cas étudié] convient.

## II.5 Théorème de Cauchy : existence et unicité (preuve hors programme)

---

**Définition/Propriétés II.5.1**

Soit  $a$  et  $b$  deux éléments de  $\mathbb{K}$  et  $g$  une application continue sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

Pour tout  $t_0 \in I$  et tout  $(\alpha_0, \beta_0) \in \mathbb{K}^2$ , il existe une unique solution  $f$  sur  $I$  de l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants  $y'' + ay' + by = g(t)$  telle que  $f(t_0) = \alpha_0$  et  $f'(t_0) = \beta_0$ .

# Chapitre 15

## Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

### Sommaire

---

<b>I</b>	<b>Division euclidienne . . . . .</b>	<b>.153</b>
I.1	Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ . . . . .	153
I.2	Division euclidienne . . . . .	155
<b>II</b>	<b>PGCD et PPCM. . . . .</b>	<b>.155</b>
II.1	Cas de deux entiers naturels . . . . .	155
II.2	Cas de deux entiers relatifs . . . . .	158
II.3	PPCM . . . . .	159
<b>III</b>	<b>Entiers premiers entre eux . . . . .</b>	<b>.160</b>
III.1	Cas de couples d'entiers . . . . .	160
III.2	Cas de $n$ -uplet d'entiers avec $n \geq 2$ . . . . .	161
<b>IV</b>	<b>Nombres premiers . . . . .</b>	<b>.162</b>
IV.1	Généralités . . . . .	162
IV.2	Décomposition en produit de nombres premiers . . . . .	163
IV.3	Valuation $p$ -adique . . . . .	163
IV.4	Congruences . . . . .	165
IV.5	Caractérisation . . . . .	165
IV.6	Propriétés . . . . .	166
IV.7	Opération . . . . .	166
IV.8	Inverse modulo $n$ . . . . .	166
IV.9	Petit Théorème de Fermat . . . . .	167

---

### I Division euclidienne

Soit  $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$ .

#### I.1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

---

**Définition I.1.1**

S'il existe  $q$  dans  $\mathbb{Z}$  tel que  $a = bq$ , on dit que  $b$  divise  $a$  (ou  $b$  est un diviseur de  $a$ ) et on note  $b \mid a$ .

Dans ce cas,

on dit aussi que  $a$  est divisible par  $b$  (ou  $a$  est un multiple de  $b$ ).

---

**Définition/Propriétés I.1.2 (Ensembles des diviseurs et des multiples)**

- On note  $\mathcal{D}(a) = \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists q \in \mathbb{Z}, a = bq\}$  l'ensemble des diviseurs de  $a$ .
  - Si  $a = 0$  alors  $\mathcal{D}(a) = \mathbb{Z}$  donc  $\mathcal{D}(a)$  est infini.
  - Si  $a \neq 0$  alors  $\mathcal{D}(a) \subset \llbracket -|a| ; |a| \rrbracket$  donc  $\mathcal{D}(a)$  est fini.
- On note  $b\mathbb{Z} = \{bq \mid q \in \mathbb{Z}\}$  l'ensemble des multiples de  $b$ .
  - Si  $b = 0$  alors  $b\mathbb{Z} = \{0\}$  donc  $b\mathbb{Z}$  est fini.
  - Si  $b \neq 0$  alors  $b\mathbb{Z}$  est infini.

---

**Définition/Propriétés I.1.3 (Caractérisation des couples d'entiers associés)**

Si l'une des propositions équivalentes suivantes est vérifiée, on dit que les entiers  $a$  et  $b$  sont associés.

- (1)  $a \mid b$  et  $b \mid a$ .
- (2)  $|a| = |b|$ .
- (3)  $a = b$  ou  $a = -b$ .

---

**Définition/Propriétés I.1.4 (Propriétés immédiates)**

- (1)  $a \mid a$ .
- (2) Si  $a \mid b$  et  $b \mid c$  alors  $a \mid c$ .
- (3) Si  $a \mid b$  et  $c \mid d$  alors  $ac \mid bd$ .
- (4) Si  $a \mid b$  alors, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $an \mid bn$ .
- (5) Si  $c \mid a$  et  $c \mid b$  alors, pour tout  $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ ,  $c \mid au + bv$ .
- (6) Si  $a = bc + d$  alors  $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(d)$ .

## I.2 Division euclidienne

---

### Théorème I.2.1 (Théorème de la division euclidienne)

Pour tout couple  $(a, b)$  de  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ , il existe un unique couple  $(q, r)$  de  $\mathbb{Z}^2$  tel que :

$$a = bq + r \text{ et } 0 \leq r \leq b - 1.$$

Dans la division euclidienne de  $a$  par  $b$ ,  $a$  est appelé dividende,  $b$  diviseur,  $q$  quotient et  $r$  reste.

---

*Démonstration*

Soit  $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$

existence posons  $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$  et  $r = a - bq$

alors  $q \leq \frac{a}{b} < b + 1$

donc  $bq \leq a < b(q + 1) \iff 0 \leq r < b$ .

De plus  $q \in \mathbb{Z}$  donc  $r \in \mathbb{Z}$  ainsi avec ce qui précède on a :  $r \in \llbracket 0 ; b - 1 \rrbracket$

unicité On suppose qu'il existe  $\begin{cases} (q, r) & \in \mathbb{Z} \times \llbracket 0 ; b - 1 \rrbracket \\ (q', r') & \in \mathbb{Z} \times \llbracket 0 ; b - 1 \rrbracket \end{cases}$  tel que  $\begin{cases} a = bq + r \\ a = bq' + r' \end{cases}$

Alors  $b(q - q') = r' - r$  Ainsi

Si  $q - q' \neq 0$  alors  $|q - q'| \geq 1$  puis  $|r' - r| \geq |b|$  et donc  $|r' - r| \geq b$  car  $b > 0$ .

or  $|r' - r| \leq b - 1$  car  $\begin{cases} 0 \leq r \leq b - 1 \\ 0 \leq r' \leq b - 1 \end{cases}$

Donc  $q - q' = 0 \implies q = q'$  et aussi  $r - r' = 0 \implies r = r'$  conclusion Le couple  $q, r$  existe et est unique ■

---

### Définition/Propriétés I.2.2 (Caractérisation de la divisibilité)

Soit  $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ .

$b$  divise  $a$  si, et seulement si, le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$  est nul.

## II PGCD et PPCM

### II.1 Cas de deux entiers naturels

---

**Définition II.1.1 (Définition du PGCD)**

Soit  $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ .

Le plus grand élément (au sens de  $\leq$ ) de l'ensemble des diviseurs communs à  $a$  et  $b$  est dit PGCD de  $a$  et  $b$  et noté  $a \wedge b$  :

$$a \wedge b = \max(\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b))$$

---

**Propriétés II.1.2 (Propriété importante)**

Soit  $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ .

Si  $r$  est le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$  alors 
$$\begin{cases} \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) &= \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r) \\ a \wedge b &= b \wedge r \end{cases}$$

---

*Démonstration*

Soit  $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ , on note  $r \in \mathbb{N}$  le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$ . Montrons que

$$\begin{cases} \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) &= \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r) \\ a \wedge b &= b \wedge r \end{cases} \quad \text{par double inclusion :}$$

- Montrons que  $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) \subset \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$

Soit  $d \in \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$  alors :

$d \mid b$  donc  $d \mid bq$  avec  $q \in \mathbb{Z}^*$  et  $d \mid a$  donc  $d \mid a - bq$  or  $r = a - bq$  donc  $d \mid r$  et  $d \mid b$  donc  $d \in \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$ .

- De même Montrons que  $\mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r) \subset \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$  Soit  $d \in \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$  alors :

alors  $d \mid b$  donc  $d \mid bq$  avec  $q \in \mathbb{Z}^*$  et  $d \mid r$  donc  $d \mid bq + r$  or  $a = bq + r$  donc  $d \mid a$  et  $d \mid b$  donc  $d \in \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(a)$ .

conclusion Par double inclusion  $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$  et ainsi par définition du PGCD  $a \wedge b = b \wedge r$  ■

---

**Définition/Propriétés II.1.3 (algorithme d'euclide)**

Soit  $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ .

On pose  $r_0 = a$  et  $r_1 = b$  puis, pour tout  $i \in \mathbb{N}^*$  tel que  $r_i \neq 0$ , on définit  $r_{i+1}$  comme suit :

$r_{i+1}$  est le reste de la division euclidienne de  $r_{i-1}$  par  $r_i$ .

Alors :

- il existe  $n \in \mathbb{N}$  tel que

$$r_{n+1} = 0 \text{ et } r_n \neq 0$$

- pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,

$$r_{i-1} \wedge r_i = r_i \wedge r_{i+1}$$

En particulier  $r_0 \wedge r_1 = r_n \wedge r_{n+1}$  donc :

$$a \wedge b = r_n$$

---

### Définition/Propriétés II.1.4 (Caractérisation du PGCD)

Soit  $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ .

L'ensemble des diviseurs communs à  $a$  et  $b$  est égal à l'ensemble des diviseurs de  $a \wedge b$  :

$$\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(a \wedge b)$$

Le PGCD de  $a$  et  $b$  est donc le plus grand élément (au sens de la divisibilité) de l'ensemble des diviseurs communs à  $a$  et  $b$ , c'est-à-dire que :

- $a \wedge b \mid a$  et  $a \wedge b \mid b$
- $\forall d \in \mathbb{N}, d \mid a \text{ et } d \mid b \implies d \mid a \wedge b$ .

---

### Définition/Propriétés II.1.5 (Propriété de factorisation du PGCD)

Soit  $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ .

Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ , le PGCD de  $ka$  et  $kb$  vérifie

$$ka \wedge kb = k(a \wedge b)$$

---

#### Démonstration

Soit  $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$  et  $k \in \mathbb{N}^*$

- $\begin{cases} a \wedge b \mid a \\ k \mid k \end{cases}$  et  $\begin{cases} a \wedge b \mid b \\ k \mid k \end{cases}$  donc par propriété  $\begin{cases} k(a \wedge b) \mid ka \\ k(a \wedge b) \mid kb \end{cases}$  donc  $k(a \wedge b) \mid ka \wedge kb$  car  $\mathcal{D}(ka) \cap \mathcal{D}(kb) = \mathcal{D}(ka \wedge kb)$
- $k \mid ka$  et  $k \mid kb$  donc  $k \mid ka \wedge kb$  donc  $\exists q \in \mathbb{N}$  tel que  $ka \wedge kb = kq$

Ainsi  $kq \mid ka$  et  $kq \mid kb$  et donc  $q \mid a$  et  $q \mid b$

ainsi  $q \mid a \wedge b$  puis  $kq \mid k(a \wedge b)$  et donc enfin  $ka \wedge kb \mid k(a \wedge b)$

Ainsi on a  $k(a \wedge b) \mid ka \wedge kb$  et  $ka \wedge kb \mid k(a \wedge b)$

donc  $k(a \wedge b)$  et  $ka \wedge kb$  sont associés et donc égaux, car ce sont des entiers naturels non-nuls  
donc  $ka \wedge kb = k(a \wedge b)$  ■

## II.2 Cas de deux entiers relatifs

---

### Définition II.2.1

Soit  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ .

On appelle PGCD de  $a$  et  $b$  l'entier naturel noté  $a \wedge b$  défini par :

$$a \wedge b = \begin{cases} |a| \wedge |b| & \text{si } (a, b) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (a, b) = (0, 0) \end{cases}$$

---

### Définition/Propriétés II.2.2 (Extension des résultats vus pour les entiers naturels)

(1) Soit  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ .

- (a)  $a \wedge b$  est le plus grand élément (au sens de  $\leq$ ) de l'ensemble des diviseurs communs à  $a$  et  $b$ .
- (b)  $a \wedge b$  est le plus grand élément (au sens de  $|$ ) de l'ensemble des diviseurs communs à  $a$  et  $b$ .

(2) Soit  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ .

- (a)  $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(a \wedge b)$ .
- (b) Pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $ka \wedge kb = |k| (a \wedge b)$

---

### Définition/Propriétés II.2.3 (Relation de Bézout)

Soit  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ .

Il existe un couple d'entiers  $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ , dit couple de Bézout, tel que  $au + bv = a \wedge b$ . Remarque

- Un tel couple n'est PAS UNIQUE.
- Pour  $(a, b) \neq (0, 0)$ , on peut déterminer un tel couple par l'algorithme d'Euclide étendu.

on a :  $(r_0, r_1) = (a, b)$ ,  $r_{i-1} = r_i q_i + r_{i+1}$  (division euclidienne de  $r_{i-1}$  par  $r_i$ ) et  $n$  le plus petit entier tel que  $r_{n+1} = 0$ . Ainsi, en posant

$$\begin{cases} (u_0, v_0) = (1, 0) \\ (u_1, v_1) = (0, 1) \end{cases} \text{ et, pour tout } i \in \llbracket 1 ; N \rrbracket, (u_{i+1}, v_{i+1}) = (u_{i-1} - q_i u_i, v_{i-1} - q_i v_i)$$

. on a :  $\forall i \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, au_i + bv_i = r_i$ . En particulier, comme  $r_n$  est égal à  $a \wedge b$ , on en déduit que :

$$a \wedge b = au_n + bv_n \text{ avec } (u_n, v_n) \in \mathbb{Z}^2$$

- Il n'est pas nécessaire de connaître les relations de récurrence définissant les familles  $(u_i)_{0 \leq i \leq n}$  et  $(v_i)_{0 \leq i \leq n}$ .



## II.3 PPCM

---

### Définition II.3.1

Soit  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ . Le PPCM de  $a$  et  $b$  est l'entier naturel noté  $a \vee b$  défini par

$$a \vee b = \begin{cases} \min(|a| \mathbb{N}^* \cap |b| \mathbb{N}^*) & \text{si } a \neq 0 \text{ et } b \neq 0 \\ 0 & \text{si } a = 0 \text{ ou } b = 0 \end{cases}$$

### Remarques

- Pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $a \vee a = a \vee 1 = |1|$ .
- Pour tout  $(a, b) \in (\mathbb{Z}^*)^2$ ,  $a \vee b$  est le plus petit entier naturel non nul, multiple commun de  $a$  et  $b$ .

---

### Propriétés II.3.2

Pour tout  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ , on a :

$$|ab| = (a \wedge b)(a \vee b)$$

---

### Démonstration

$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2$

- si  $(a, b) \neq (0, 0)$  alors prenons  $k \in \mathbb{N}$

alors :

$$\begin{aligned} k \in |a| \mathbb{N}^* \cap |b| \mathbb{N}^* &\iff |a| \mid k \text{ ou } |b| \mid k \\ &\iff |ab| \mid (k|a| \wedge k|b|) \\ &\iff |ab| \mid k(|a| \wedge |b|) \\ &\iff \exists q \in \mathbb{N}, k(|a| \wedge |b|) = q|ab| \\ &\iff \exists q \in \mathbb{N}, kq \frac{|ab|}{(|a| \wedge |b|)} \\ &\iff \frac{|ab|}{(|a| \wedge |b|)} \mid k \\ &\iff k \in \frac{|ab|}{(|a| \wedge |b|)} \mathbb{N}^* \\ &\iff |a| \mathbb{N}^* \cap |b| \mathbb{N}^* = \frac{|ab|}{(|a| \wedge |b|)} \mathbb{N}^* \end{aligned}$$

$$\text{Donc } a \vee b = \frac{|ab|}{(|a| \wedge |b|)}.$$

$$\text{Ainsi } |ab| = (a \vee b)(|a| \wedge |b|) \implies |ab| = (a \vee b)(a \wedge b)$$

- De plus si  $(a, b) = (0, 0)$  alors on a toujours  $|ab| = (a \vee b)(a \wedge b)$  car  $\begin{cases} |ab| &= 0 \\ (a \vee b)(a \wedge b) &= 0 \end{cases}$  ■

### III Entiers premiers entre eux

#### III.1 Cas de couples d'entiers

Soit  $(a, b, c, n) \in \mathbb{Z}^4$

---

##### Définition III.1.1

Les entiers  $a$  et  $b$  sont dits premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. Remarque

Autrement dit,  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux si leurs seuls diviseurs communs sont  $-1$  et  $1$ .

---

##### Théorème III.1.2 (Théorème de Bézout)

$a$  et  $b$  sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe  $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$  tel que  $au + bv = 1$

---

*Démonstration (Théorème de Bézout)*

Montrons le théorème par double inclusion

- $\Rightarrow$  immédiat par relation de Bézout
- $\Leftarrow$  On suppose  $\exists(u, v) \in \mathbb{Z}^2, au + bv = 1$

Soit  $d \in \mathbb{N}$  tq  $d \mid a$  et  $d \mid b$  alors  $d \mid au + bv$  donc  $d \mid 1$  donc  $d = 1$  ainsi  $a \wedge b = 1$

---

##### Théorème III.1.3 (Lemme de Gauss)

Si  $c$  divise  $ab$  et si  $a$  et  $c$  sont premiers entre eux alors  $c$  divise  $b$ .

Remarque

Tout nombre rationnel  $r$  non nul peut s'écrire sous la forme  $r = \frac{a}{b}$  avec  $(a, b) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{N}^*$  et  $a \wedge b = 1$ .

Cette écriture est unique et appelée forme irréductible de  $r$ .

---

##### Propriétés III.1.4 (Propriétés sur le produit)

- (1) Si  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux et si  $a$  et  $b$  divisent  $n$  alors  $ab$  divise  $n$ .
- (2) Si  $a$  et  $n$  sont premiers entre eux et si  $b$  et  $n$  sont premiers entre eux alors  $ab$  et  $n$  sont premiers entre eux.

---

*Démonstration*

Soit  $(a, b, n) \in \mathbb{Z}^3$

Démontrons les deux propriétés précédentes

(1) par hypothèse  $\begin{cases} \exists q \in \mathbb{Z}, n = aq \\ \exists q' \in \mathbb{Z}, n = bq' \end{cases}$  donc  $aq = bq'$  avec  $a \wedge b = 1$  donc  $b \mid q$

$\exists q'' \in \mathbb{Z}$  tel que  $q = bq''$  ce qui donne  $n = abq''$  donc  $ab \mid n$

(2) par hypothèse et d'après le théorème de Bézout on a :

$$\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } au + nv = 1$$

$$\exists (u', v') \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } bu' + nv' = 1$$

donc par multiplication membre à membre on a :

$$ab(u'u) + n(bvu' + nvv' + auv') = 1$$

donc d'après le théorème de Bézout  $ab \wedge n = 1$  ■

## III.2 Cas de $n$ -uplet d'entiers avec $n \geq 2$

Soit  $n \in \mathbb{N}$  avec  $n \geq 2$  et  $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$ .

---

### Définition/Propriétés III.2.1 (PGCD d'un nombre fini d'entiers)

\* On appelle PGCD des entiers  $(a_1, \dots, a_n)$  l'entier naturel, noté  $a_1 \wedge \dots \wedge a_n$ , tel que

$$\mathcal{D}(a_1 \wedge \dots \wedge a_n) = \mathcal{D}(a_1) \cap \dots \cap \mathcal{D}(a_n)$$

---

### Définition/Propriétés III.2.2 (Relation de Bézout)

Il existe un  $n$ -uplet d'entiers  $(u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{Z}^n$  tel que  $a_1 u_1 + \dots + a_n u_n = a_1 \wedge \dots \wedge a_n$

---

### Définition/Propriétés III.2.3 (Entiers premiers entre eux)

Les entiers  $a_1, \dots, a_n$  sont dits :

- premiers entre eux dans leur ensemble si  $a_1 \wedge \dots \wedge a_n = 1$ .
- premiers entre eux deux à deux si  $\forall (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, i \neq j \implies a_i \wedge a_j = 1$ .

---

*Démonstration (existence et unicité de la forme irréductible de tout rationnel non nul)*

Montrons l'existence et unicité de la forme irréductible de tout rationnel non nul autrement dit

$$\forall r \in \mathbb{Q}^*, \exists! (a', b') \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{N}^*, r = \frac{a'}{b'}$$

- existence Soit  $r \in \mathbb{Q}^*$  alors par définition  $\exists (a, b) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{N}^*, r = \frac{a}{b}$

on note  $d = a \wedge b$  alors on note  $\begin{cases} a = da' & \text{avec } a' \in \mathbb{Z}^* \\ b = db' & \text{avec } b' \in \mathbb{N}^* \end{cases}$

ce qui donne  $r = \frac{da'}{db'} = \frac{a'}{b'}$  avec  $a' \wedge b' = \frac{d(a' \wedge b')}{d} = \frac{da' \wedge db'}{d} = \frac{a \wedge b}{d} = 1$

- unicité Soit  $r \in \mathbb{Q}^*$  tel que  $r = \frac{a'}{b'} = \frac{a''}{b''}$  avec  $\begin{cases} a' \wedge b' = 1 \\ a'' \wedge b'' = 1 \end{cases}$

on en déduit que  $a'b'' = a''b'$  ce qui donne  $b'' \mid a''b'$  puis  $b'' \mid b'$  car  $a' \wedge b' = 1$

de même  $b' \mid b''$  donc

$b'$  et  $b''$  sont associés et entier naturel et donc égaux ce qui donne  $a' = a''$  et  $b' = b''$  ce qui prouve l'unicité ■

## IV Nombres premiers

### IV.1 Généralités

---

#### Définition IV.1.1

Un nombre entier naturel non nul  $p$  est dit premier s'il admet uniquement deux diviseurs entiers naturels distincts (qui sont 1 et  $p$ )

---

#### Définition/Propriétés IV.1.2

Ensemble des nombres premiers L'ensemble  $\mathcal{P}$  des nombres premiers est infini.

---

*Démonstration*

Par l'absurde, supposons que  $\mathcal{P}$  est fini c'est-à-dire  $\mathcal{P} = \{\sqrt{p_1} \cdots \sqrt{p_n}\}$

On pose  $N = \left( \prod_{i=1}^n p_i \right) + 1$

alors  $\begin{cases} N \in \mathbb{N} \\ N \geq 2 \end{cases}$  donc  $N$  admet un diviseur premier  $i_0$

$$\exists i_0 \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \begin{cases} p_{i_0} \mid N \\ p_{[i_0]} \mid \prod_{i=1}^n p_i \end{cases} \quad \text{donc } p_{i_0} \mid 1$$

d'où  $p_{i_0} = 1$  ce qui est faux car  $p_{i_0}$  est premier

conclusion  $\mathcal{P}$  est infini ■

## IV.2 Décomposition en produit de nombres premiers

---

### Théorème IV.2.1

Tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 2 peut s'écrire de manière unique (à l'ordre près des facteurs) sous la forme

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$$

où  $k \in \mathbb{N}^*$  avec  $\forall i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket, \alpha_i \in \mathbb{N}^*$  et  $p_i$  est un nombre premier.

---

### Définition/Propriétés IV.2.2 (Corrolaire)

Tout entier naturel non nul  $n$  s'écrit de manière unique (à l'ordre près des facteurs) sous la forme

$$n = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p}$$

où  $(\alpha_p)_{p \in \mathcal{P}}$  est une famille presque nulle d'entiers naturels, c'est-à-dire une famille dans laquelle tous les éléments sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux.

## IV.3 Valuation $p$ -adique

---

### Définition/Propriétés IV.3.1

Soit  $p$  un nombre premier et  $n$  un entier naturel non nul.

L'entier  $\alpha_p$  qui apparaît dans la décomposition primaire de  $n$

$$n = \prod_{p \in \sqrt{\phantom{x}}} p^{\alpha_p}$$

est appelé valuation  $p$ -adique de  $n$  et noté  $v_p(n)$ .

Autrement dit

$v_p(n)$  est le plus grand entier naturel  $k$  tel que  $p^k$  divise  $n$

---

**Définition/Propriétés IV.3.2 (Valuation  $p$ -adique d'un produit)**

Pour tout nombre premier  $p$  et tous entiers naturels non nuls  $n$  et  $n'$ , on a :

$$v_p(nn') = v_p(n) + v_p(n')$$

---

**Définition/Propriétés IV.3.3 (Caractérisation de la divisibilité)**

Soit  $(a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2$ .

$b$  divise  $a$  si, et seulement si, pour tout nombre premier  $p$ , on a :  $v_p(b) \leq v_p(a)$

---

*Démonstration*

Soit  $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ , procédons par double équivalence

- $\boxed{\implies}$  on suppose  $b \mid a$

alors  $\exists q \in \mathbb{N}, a = bq$  donc  $\forall p \in \mathcal{P}, v_p(a) = v_p(b) + v_p(q) \implies v_p(a) \geq v_p(b)$

- $\boxed{\impliedby}$  on suppose  $\forall p \in \mathcal{P}, v_p(a) \geq v_p(b)$

alors  $p^{v_p(a)} = p^{v_p(a)-v_p(b)} \times p^{v_p(b)}$  donc  $p^{v_p(b)} \mid p^{v_p(a)}$  ainsi

$$\prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(b)} \mid \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(a)} \text{ donc } b \mid a$$

■

---

**Définition/Propriétés IV.3.4 (PGCD et PPCM)**

Soit  $(a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2$ .

Les PGCD et PPCM des entiers  $a$  et  $b$  vérifient :

$$a \wedge b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$$

$$a \vee b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$$

---

*Démonstration*

Soit  $(a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2$

- Montrons que  $a \wedge b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$

on note  $d = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$

$$\forall p \in \mathcal{P}, v_p(d) = \min(v_p(a), v_p(b))$$

donc  $\forall p \in \mathcal{P}, \begin{cases} v_p(d) \leq v_p(a) \\ v_p(d) \leq v_p(b) \end{cases}$  d'où  $\begin{cases} d \mid a \\ d \mid b \end{cases}$

on note alors  $\begin{cases} a = da' & \text{avec } a' \in \mathbb{N}^* \\ b = db' & \text{avec } b' \in \mathbb{N}^* \end{cases}$  Montrons alors que  $a' \wedge b' = 1$  ce qui donnerais alors  $a \wedge b = d (a' \wedge b') = d$

Soit  $k$  un diviseur commun à  $a'$  et  $b'$  différent de 1 alors  $k \geq 2$  donc  $k$  admet un diviseur premier  $p'$

donc  $\begin{cases} p' \mid a' \\ p' \mid b' \end{cases}$  d'où  $\begin{cases} v_{p'}(p') \leq v_{p'}(a) \\ v_{p'}(p') \leq v_{p'}(b) \end{cases}$  i.e.  $\begin{cases} 1 \leq v_{p'}(a) \\ 1 \leq v_{p'}(b) \end{cases}$  (1) Si  $v_{p'}(a) \leq v_{p'}(b)$  alors  $v_{p'}(d) = v_{p'}(a)$  et  $v_{p'}(a) = v_{p'}(d) + v_{p'}(a')$  d'où  $v_{p'}(a') = 0$  ce qui contredit (1)

Si  $v_{p'}(b) < v_{p'}(a)$  alors  $v_{p'}(d) = v_{p'}(b)$  donc  $v_{p'}(b') = 0$

Donc  $k = 1$  d'où  $a' \wedge b' = 1$  d'où  $a \wedge b = d$

- Montrons que  $a \vee b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$  on a :

$$\begin{aligned} a \vee b &= \frac{ab}{a \wedge b} = \frac{\left( \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(a)} \right) \left( \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(b)} \right)}{\prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}} \\ &= \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))} \end{aligned}$$

## IV.4 Congruences

Soit  $(x, y, z, t) \in \mathbb{Z}^4$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ .

### Définition IV.4.1

$x$  est dit congru à  $y$  modulo  $n$  s'il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $x = y + nk$  autrement dit si  $x - y \in n\mathbb{Z}$ .

Notation :  $x \equiv y [n]$

## IV.5 Caractérisation

### Définition/Propriétés IV.5.1

$x \equiv y [n]$  si, et seulement si, les restes des divisions euclidiennes de  $x$  et  $y$  par  $n$  sont égaux.

---

### Démonstration

Soit  $(x, y) \in \mathbb{Z}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$  Montrons la caractérisation par double inclusion

- $\boxed{\Rightarrow}$  On suppose  $x \equiv y [n]$  on écrit la division euclidienne de  $y$  par  $n$

$$\exists(q, r) \in \mathbb{Z} \times \llbracket 0 ; n - 1 \rrbracket, y = nq + r$$

par hypothèse on a :  $\exists k \in \mathbb{Z}, x = y + nk$

donc  $x = n(k + q) + r$  est la division euclidienne de  $x$  par  $n$  donc  $r$  est le reste de la division euclidienne de  $x$  et  $y$  par  $n$

- $\boxed{\Leftarrow}$  On suppose que  $x$  et  $y$  ont le même reste dans la division euclidienne de  $x$  et  $y$  par  $n$

$$\text{Ainsi } \exists(k, k') \in \mathbb{Z}^2, \exists r \in \llbracket 0 ; n - 1 \rrbracket \begin{cases} x = nk + r \\ y = nk' + r \end{cases} = nk + r$$

donc  $x - y = n(k - k')$  i.e.  $x - y \in n\mathbb{Z}$  i.e.  $x \equiv y [n]$  ■

## IV.6 Propriétés

---

### Définition/Propriétés IV.6.1

- |  |                |
|--|----------------|
| (1) $x \equiv x [n]$   | (réflexivité)  |
| (2) si $x \equiv y [n]$ alors $y \equiv x [n]$                     | (symétrie)     |
| (3) si $x \equiv y [n]$ et $y \equiv z [n]$ alors $x \equiv z [n]$ | (transitivité) |

## IV.7 Opération

---

### Définition/Propriétés IV.7.1

- |  |  |
|--|--|
| (1) Si $x \equiv y [n]$ et $z \equiv t [n]$ alors $x + z \equiv y + t [n]$ | (compatibilité avec l'addition)        |
| (2) Si $x \equiv y [n]$ et $z \equiv t [n]$ alors $xz \equiv yt [n]$ .     | (compatibilité avec la multiplication) |

## IV.8 Inverse modulo $n$



---

**Définition/Propriétés IV.8.1**

- Si  $x$  et  $n$  sont premiers entre eux, il existe un couple d'entiers  $(u, v)$  tel que  $ux + vn = 1$ .

On en déduit que

$$ux \equiv 1 [n]$$

et on dit que  $u$  est un inverse de  $x$  modulo  $n$ .

- Si  $u$  est un inverse de  $x$  modulo  $n$  alors il existe un couple d'entiers  $(u, v)$  tel que  $ux + vn = 1$ .  
On en déduit que  $x$  et  $n$  sont premiers entre eux.

## IV.9 Petit Théorème de Fermat

---

**Théorème IV.9.1**

*Si  $p$  est un nombre premier alors :*

(1)  $\forall a \in \mathbb{Z}, ap \equiv a [p]$ .

(2)  $\forall a \in \mathbb{Z}, a \wedge p = 1 \implies a^{p-1} \equiv 1 [p]$ .

# Chapitre 16

## Dérivation

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Dérivation des fonctions à valeurs réelles . . . . .</b>	<b>168</b>
I.1	Dérivée en un point . . . . .	168
I.2	Dérivabilité à droite et à gauche . . . . .	170
I.3	Condition nécessaire d'extremum local en un point intérieur . . . . .	170
I.4	Dérivée sur un intervalle . . . . .	171
<b>II</b>	<b>Théorèmes de Rolle et des accroissements finis . . . . .</b>	<b>174</b>
II.1	Théorème de Rolle . . . . .	174
II.2	Accroissements finis . . . . .	175
II.3	Applications des théorèmes des accroissements finis . . . . .	176
<b>III</b>	<b>Classe <math>C^k</math> . . . . .</b>	<b>179</b>
III.1	Notations . . . . .	179
III.2	Définitions . . . . .	179
III.3	Opérations sur les fonctions de classe $C^k$ avec $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ . . . . .	180
III.4	Composition de fonctions de classe $C^k$ avec $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ . . . . .	180
III.5	Réciproque d'une fonction de classe $C^k$ avec $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ . . . . .	181
<b>IV</b>	<b>Cas des fonctions à valeurs complexes . . . . .</b>	<b>181</b>
IV.1	Ce qui s'étend aux fonctions complexes . . . . .	181
IV.2	Ce qui ne s'étend pas aux fonctions complexes . . . . .	181
IV.3	Quelques résultats qui s'étendent détaillés . . . . .	182

Dans ce chapitre,  $I$  et  $J$  sont des intervalles de  $\mathbb{R}$ , non vides et non réduits à un point.

## I Dérivation des fonctions à valeurs réelles

### I.1 Dérivée en un point

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , et  $a$  un point de  $I$ .

---

#### Définition I.1.1 (Définition avec le taux d'accroissement)

$f$  est dite dérivable en  $a$  si la fonction  $x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  admet une limite réelle  $\ell$  en  $a$ .

Dans ce cas,

la limite  $\ell$  obtenue est appelée dérivée de  $f$  en  $a$  et notée  $f'(a)$ .

---

**Définition/Propriétés I.1.2 (Caractérisation de la dérivabilité en un point par D.L d'ordre 1)**

$f$  est dérivable en  $a$  si, et seulement si, il existe  $(b_0, b_1) \in \mathbb{R}^2$  et une application  $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$  tel que :

$$\forall x \in I, f(x) = b_0 + b_1(x - a) + (x - a)\varepsilon(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$$

Dans ce cas,  $b_0 = f(a)$  et  $b_1 = f'(a)$  et on dit que  $f$  admet un développement limité à l'ordre 1 en  $a$ .

---

**Démonstration**

- $\boxed{\Rightarrow}$  On suppose  $f$  dérivable en  $a$  alors  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a)$

$$\text{On pose } \varepsilon(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) & \text{si } x \neq a \\ 0 & \text{si } x = a \end{cases}$$

alors  $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$  et  $\forall x \in I \setminus \{a\}, (x - a)\varepsilon(x) = f(x) - f(a) - f'(x)(x - a)$  donc  $f(x) = f(a) + f'(x)(x - a) + (x - a)\varepsilon(x)$

- $\boxed{\Leftarrow}$  On suppose qu'il existe  $(b_0, b_1) \in \mathbb{R}^2$  et  $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$  tel que :
  - si  $x \neq a$  alors  $f(x) = b_0 + b_1(x - a) + (x - a)\varepsilon(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$
  - si  $x = a$  :  $f(a) = b_0$donc pour  $x \neq a$ ,  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = b_1 + \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b_1$  ainsi  $f$  dérivable en  $a$  avec  $f'(a) = b_1$  ■

---

**Définition/Propriétés I.1.3 (Condition nécessaire de dérivabilité en un point)**

Si  $f$  est dérivable en  $a$  alors  $f$  est continue en  $a$ .

---

**Remarque**

La réciproque est FAUSSE comme le prouve l'exemple classique de la fonction valeur absolue en 0.

---

**Démonstration**

Si  $f$  dérivable alors  $\forall x \in I, f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + (x - a)\varepsilon(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$  donc  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$  d'où  $f$  continue en  $a$  ■

---

**Définition/Propriétés I.1.4 (Interprétations géométrique et cinématique)**

- Si  $f$  admet une dérivée au point  $a$  alors la courbe représentative de  $f$  admet une tangente en  $M(a, f(a))$  dont la pente est égale à  $f'(a)$ .
- Si  $f(t)$  est l'abscisse à l'instant  $t \geq 0$  d'un mobile se déplaçant sur une droite et si  $f$  admet une dérivée au point  $a \geq 0$  alors  $f'(a)$  est la vitesse instantanée de ce mobile à l'instant  $a$ .

## I.2 Dérivabilité à droite et à gauche

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , et  $a$  un point de  $I$ .

---

### Définition I.2.1

- On suppose ici que  $a$  n'est pas l'extrémité gauche de  $I$ .

$f$  est dite dérivable à gauche en  $a$  si  $x \mapsto \frac{1}{x-a}(f(x) - f(a))$  admet une limite à gauche en  $a$ .

La limite obtenue (unique si elle existe) est appelée dérivée à gauche de  $f$  en  $a$  et notée  $f'_g(a)$ .

- On suppose ici que  $a$  n'est pas l'extrémité droite de  $I$ .

$f$  est dite dérivable à droite en  $a$  si  $x \mapsto \frac{1}{x-a}(f(x) - f(a))$  admet une limite à droite en  $a$ .

La limite obtenue (unique si elle existe) est appelée dérivée à droite de  $f$  en  $a$  et notée  $f'_d(a)$ .

---

### Propriétés I.2.2

On suppose ici que  $a$  n'est pas extrémité de  $I$ .

$f$  est dérivable en  $a$  si, et seulement si,  $f$  est dérivable à gauche et à droite en  $a$  avec  $f'_g(a) = f'_d(a)$ .

Dans ce cas,  $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$ .

## I.3 Condition nécessaire d'extremum local en un point intérieur

---

### Définition/Propriétés I.3.1

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , à valeurs dans  $R$ .

Si  $f$  admet un extremum local en un point  $a$  de  $I$  qui n'est pas une extrémité de  $I$ , et si  $f$  est dérivable en  $a$  alors  $f'(a) = 0$  Remarques

- Les points  $a$  de  $I$  en lesquels  $f$  est dérivable avec  $f'(a) = 0$  sont dits points critiques de  $f$ .
- La détermination des points critiques indique où des extremums sont susceptibles d'exister. Une étude complémentaire du signe de  $f(x) - f(a)$  au voisinage du point critique  $a$  est nécessaire pour conclure s'il y a extremum local ou non en ce point  $a$ .
- Il peut y avoir des extremums locaux pour  $f$  en un point extrémité  $a$  de l'intervalle  $I$  en lequel  $f$  est dérivable sans que  $f'(a)$  ne soit égal à 0.

---

### Démonstration

On suppose, sans perte de généralité, que  $f$  admet un maximum local en  $a$ , point de  $I$  qui n'est pas extrémité de  $I$ , et que  $f$  est dérivable en  $a$ . Le cas du minimum local s'en déduit en remplaçant  $f$  par  $-f$ .

Alors, par définition d'un maximum local, il existe un réel  $\delta$  strictement positif tel que

$$\forall x \in ]a - \delta ; a + \delta[ , f(x) \leq f(a)$$

Ainsi,

$$\forall x \in ]a - \delta ; a[ , \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$$

et

$$\forall x \in ]a ; a + \delta[ , \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0$$

Comme  $f$  est dérivable en  $a$  et que  $a$  n'est pas extrémité de  $I$ ,  $f$  est dérivable à droite et à gauche en  $a$  avec

$$f'_g(a) = f'_d(a) = f'(a)$$

Par passage à la limite dans les inégalités précédentes, on a d'abord  $f'_g(a) \geq 0$  et  $f'_d(a) \geq 0$  puis

$$0 \leq f'(a) \leq 0$$

ce qui donne par antisymétrie que  $f'(a) = 0$ .

Bilan : Si  $f$  a un extremum local en un point  $a$  de  $\overset{\circ}{I}$  et si  $f$  est dérivable en  $a$  alors  $f'(a) = 0$ .

Remarque :  $\overset{\circ}{I}$  désigne l'intérieur de  $I$ , c'est-à-dire ici, l'ensemble des points de  $I$  qui sont centres d'un intervalle ouvert inclus dans  $I$ . ■

## I.4 Dérivée sur un intervalle

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

---

### Définition I.4.1

$f$  est dite dérivable sur  $I$  si  $f$  est dérivable en tout point  $a$  de  $I$ .

Dans ce cas,

la fonction qui, à tout  $a$  de  $I$  fait correspondre  $f'(a)$  est appelée application dérivée de  $f$  et notée  $f'$ .

Notation Dans la suite, on note  $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$  l'ensemble des fonctions définies et dérivables sur  $I$ , à valeurs réelles.

---

**Définition/Propriétés I.4.2 (Opérations sur les fonctions dérivables)**

Les opérations sur les limites vues dans le chapitre "Limite et continuité" permettent de montrer que  $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$  est stable par combinaison linéaire, produit et quotient (sous réserve que cela ait du sens).

Plus précisément :

- une combinaison linéaire de fonctions dérivables sur  $I$  à valeurs réelles est dérivable sur  $I$  :

$$\forall (f, g) \in (\mathcal{D}(I, \mathbb{R}))^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \lambda f + \mu g \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R}) \text{ et } (\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'$$

- un produit de fonctions dérivables sur  $I$  à valeurs réelles est dérivable sur  $I$  :

$$\forall (f, g) \in (\mathcal{D}(I, \mathbb{R}))^2, f, g \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R}) \text{ et } (fg)' = f'g + fg'$$

- un quotient de fonctions dérivables sur  $I$  à valeurs réelles dont le dénominateur ne s'annule pas sur  $I$  est dérivable sur  $I$  :

$$\forall (f, g) \in (\mathcal{D}(I, \mathbb{R}))^2, \forall x \in I, g(x) \neq 0 \implies \frac{f}{g} \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R}) \text{ et } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

---

*Démonstration (Preuve dérivée  $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ )*

Soit  $(f, g) \in (\mathcal{D}(I, \mathbb{R}))^2$  avec  $\forall x \in I, g(x) \neq 0$  Soit  $a \in I$ ,

Pour  $x \in I \setminus \{a\}$

$$\begin{aligned} \frac{\frac{f}{g}(x) - \frac{f}{g}(a)}{x - a} &= \frac{\frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(a)g(x)}}{x - a} \\ &= \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{x - a} \times \frac{1}{g(a)g(x)} \\ &= \frac{1}{g(a)g(x)} \times \left( \frac{(f(x) - f(a))g(a)}{x - a} - \frac{f(a)(g(x) - g(a))}{x - a} \right) \\ &= \frac{1}{g(a)g(x)} \times \left( \frac{(f(x) - f(a))}{x - a} g(a) - f(a) \frac{(g(x) - g(a))}{x - a} \right) \end{aligned}$$

Par passage à la limite vers  $a$  et par définition de la dérivée on retrouve donc

$$\frac{\frac{f}{g}(x) - \frac{f}{g}(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{1}{g^2(a)} \times (f'(a)g(a) - f(a)g'(a)) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)} \quad \blacksquare$$

---

**Définition/Propriétés I.4.3 (Composition de fonctions dérivables)**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs réelles tel que, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f(x)$  appartient à  $J$ .

Soit  $g$  une fonction définie sur  $J$  et à valeurs réelles.

Si  $f$  est dérivable sur  $I$  et si  $g$  est dérivable sur  $J$  alors  $g \circ f$  est dérivable sur  $I$  avec

$$\forall x \in I, (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$$

---

*Démonstration*

Soit  $a \in I$ . On note  $\Delta$  la fonction définie sur  $I$  par :

$$\Delta(t) = \begin{cases} \frac{g(t) - g(f(a))}{t - f(a)} & \text{si } t \neq f(a) \\ g'(f(a)) & \text{si } t = f(a) \end{cases}$$

Par dérivabilité de  $g$  en  $f(a)$ , on a  $\lim_{t \rightarrow f(a)} \Delta(t) = g'(f(a))$  c'est-à-dire  $\lim_{t \rightarrow f(a)} \Delta(t) = \delta(f(a))$  donc  $\Delta$  est continue en  $f(a)$ . Comme  $f$  est continue en  $a$  puisqu'elle y est dérivable, on en déduit alors par composition que  $\lim_{x \rightarrow a} \Delta(f(x)) = \Delta(f(a))$  ce qui donne :

$$\lim_{x \rightarrow a} \Delta(f(x)) = g'(f(a))$$

ce qui donne :

$$\lim_{x \rightarrow a} \Delta(f(x)) = g'(f(a))$$

Par dérivabilité de  $f$  en  $a$ , on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

Comme pour tout  $x \in I \setminus \{a\}$ , on peut écrire

$$\frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} = \Delta(f(x)) \times \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

. On conclut par produit que la fonction  $x \mapsto \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a}$  admet une limite finie en  $a$  qui vaut  $g'(f(a)) \times f'(a)$  autrement dit que  $g \circ f$  est dérivable en  $a$  de dérivée  $g'(f(a)) \times f'(a)$ .

Conclusion :  $g \circ f$  est dérivable sur  $I$  de dérivée  $(g' \circ f) \times f'$ . ■

---

**Définition/Propriétés I.4.4 (Réciproque d'une fonction dérivable)**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs réelles.

Si  $f$  est une bijection de  $I$  sur  $J = f(I)$ , dérivable sur  $I$  et que sa dérivée ne s'annule pas sur  $I$  alors  $f^{-1}$  est dérivable sur  $J$  et vérifie

$$\forall y \in J, \left(f^{-1}\right)'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

---

*Démonstration*

On suppose les hypothèses réunies. Alors  $f$  est continue sur  $I$  (car elle y est dérivable), à valeurs réelles et injective (car elle est bijective de  $I$  sur  $J$ ). D'après une propriété du chapitre "Limite et continuité",  $f$  est donc strictement monotone sur  $I$ .

Par théorème de la bijection continue, on en déduit en particulier que  $f^{-1}$  est continue sur  $J$ .

Soit  $b \in J$ .

Pour tout  $y \in J \setminus \{b\}$ , on peut écrire :

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(b))} = \left( \frac{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(b))}{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)} \right)^{-1}$$

car  $y \neq b$  et  $f^{-1}$  injective donnent  $f^{-1}(y) \neq f^{-1}(b)$

Par continuité de  $f^{-1}$  en  $b$ , on a  $f^{-1}(y) \xrightarrow{y \rightarrow b} f^{-1}(b)$  et, par dérivabilité de  $f$  en  $a = f^{-1}(b)$ ,

on a :  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a) = f'(f^{-1}(b))$ . Une composition de limites donne donc :

$$\frac{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(b))}{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)} \xrightarrow{y \rightarrow b} f'(f^{-1}(b))$$

Comme  $f'(f^{-1}(b)) \neq 0$  par hypothèse sur  $f'$ , par limite d'une fonction inverse, on obtient :

$$\left( \frac{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(b))}{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)} \right)^{-1} \xrightarrow{y \rightarrow b} \left( f'(f^{-1}(b)) \right)^{-1}$$

Ainsi,

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} \xrightarrow{y \rightarrow b} \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} (\in \mathbb{R})$$

Conclusion :  $f^{-1}$  est dérivable en tout  $b$  de  $J$ , donc sur  $J$ , avec

$$\forall b \in J, \left( f^{-1} \right)'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

■

## II Théorèmes de Rolle et des accroissements finis

### II.1 Théorème de Rolle

---

#### **Théorème II.1.1 (Théorème de Rolle)**

Soit  $a$  et  $b$  deux réels tels que  $a < b$ .

Soit  $f$  une fonction définie sur  $[a ; b]$  à valeurs réelles.

Si  $f$  est continue sur le segment  $[a ; b]$ , dérivable sur l'intervalle ouvert  $]a ; b[$  et vérifie  $f(a) = f(b)$  alors il existe un réel  $c$  dans l'intervalle ouvert  $]a ; b[$  tel que  $f'(c) = 0$ .



---

### Démonstration

On suppose les hypothèses réunies

$f$  étant continue sur le segment  $[a ; b]$  et à valeurs réelles, par théorème,  $f$  est bornée et atteint ses bornes.

On note  $m = \min f$  et  $M = \max f$ , et  $(x_1, x_2) \in [a ; b]^2$  tel que  $m = f(x_1)$  et  $M = f(x_2)$ .

On raisonne par disjonction de cas.

- Si  $m = M$  alors  $f$  est une fonction constante donc sa dérivée est la fonction nulle ; le résultat attendu est alors immédiat.
- Si  $m < M$  alors l'un des réels  $m$  ou  $M$  est différent de  $f(a)$ . Dans la suite, on suppose, sans perte de généralité, que  $m \neq f(a)$ .

Alors  $f(x_1) \neq f(a)$  et  $f(x_1) \neq f(b)$  (puisque  $f(a) = f(b)$ ) donc  $x_1 \neq a$  et  $x_1 \neq b$ .

On en déduit que  $x_1$  appartient à l'intervalle ouvert  $]a ; b[$ . Comme de plus  $f$  est dérivable en  $x_1$  et  $y$  admet un minimum global (donc un extremum local), on conclut par condition nécessaire d'extremum local en un point intérieur que  $f'(x_1) = 0$ .

Conclusion : Il existe un réel  $c$  dans l'intervalle ouvert  $]a ; b[$  tel que  $f'(c) = 0$ . ■

---

## Définition/Propriétés II.1.2 (Interprétations géométrique et cinématique)

Si les hypothèses du théorème de Rolle sont réunies alors :

- il existe un point en lequel la courbe représentative de  $f$  admet une tangente horizontale ;
- il existe un instant  $c$  en lequel la vitesse instantanée d'un mobile dont l'abscisse à l'instant  $t \geq 0$  sur une droite est donnée par  $f(t)$ , est nulle.

## II.2 Accroissements finis

---

### Définition/Propriétés II.2.1 (Egalité des accroissements finis)

Soit  $a$  et  $b$  deux réels tels que  $a < b$ .

Soit  $f$  une fonction définie sur  $[a ; b]$  à valeurs réelles.

Si  $f$  est continue sur  $[a ; b]$ , dérivable sur  $]a ; b[$  alors il existe  $c$  dans  $]a ; b[$  tel que :  $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$ .

---

*Démonstration*

On suppose les hypothèses réunies et on définit

$$g : x \mapsto f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

$g$  est définie et continue sur le segment  $[a ; b]$ , dérivable sur  $]a ; b[$ , à valeurs réelles avec  $g(a) = g(b)$ .

Par théorème de Rolle, il existe donc un réel  $c$  dans  $]a ; b[$  tel que  $g'(c) = 0$  avec  $g' : x \mapsto f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$  ce qui donne :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

et donc

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$$

■

---

**Définition/Propriétés II.2.2 (Inégalité des accroissements finis)**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  à valeurs réelles.

Si  $f$  est dérivable sur  $I$  et si  $|f'|$  est majorée par un réel  $k$  alors  $f$  est  $k$ -lipschitzienne, c'est-à-dire que :

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k |x - y|$$

---

*Démonstration*

On suppose les hypothèses réunies et  $(x, y) \in I^2$ . Le cas  $x = y$  étant immédiat, on suppose sans perte de généralité que  $x < y$ .

Alors  $f$  est continue sur  $[x ; y]$ , dérivable sur  $]x ; y[$  donc, par égalité des accroissements finis, il existe un réel  $c$  dans  $]x ; y[$  tel que :

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$$

. Ainsi  $|f(y) - f(x)| = |f'(c)| |y - x|$  puis, par hypothèse sur  $|f'|$ , on en déduit :

$$|f(y) - f(x)| \leq k |y - x|$$

. Ceci étant vrai pour tout  $(x, y) \in I^2$ ,  $f$  est donc  $k$ -lipschitzienne

■

## II.3 Applications des théorèmes des accroissements finis

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur  $I$  à valeurs réelles.

---

**Définition/Propriétés II.3.1 (Caractérisation des applications constantes)**

$f$  est constante si, et seulement si, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) = 0$

---

*Démonstration*

- $\Rightarrow$  Si  $f$  est constante alors sa dérivée est nulle.
- $\Leftarrow$  Si la dérivée de  $f$  est nulle alors l'inégalité des accroissements finis donne, pour tout  $(x, y) \in I^2$ ,  $|f(x) - f(y)| \leq 0 \times |x - y|$  donc  $|f(x) - f(y)| = 0$  puis  $f(x) = f(y)$  ce qui implique que  $f$  est constante. ■

---

**Définition/Propriétés II.3.2 (Caractérisation des fonctions dérivables monotones)**

- (1)  $f$  est croissante sur  $I$  si, et seulement si, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \geq 0$ .
- (2)  $f$  est décroissante sur  $I$  si, et seulement si, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \leq 0$ .

---

*Démonstration (Caractérisation des fonctions croissantes)*

- $\Rightarrow$  Si  $f$  est croissante sur  $I$  alors, pour tout  $(x, y) \in I^2$  tel que  $x < y$ , on a  $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$ .

Comme  $f$  est dérivable en  $x$ ,  $f$  est dérivable à droite en  $x$  donc, par passage à la limite dans l'inégalité précédente, on trouve  $\lim_{y \rightarrow x^+} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$  c'est-à-dire  $f'_d(x) \geq 0$  et enfin  $f'(x) \geq 0$ .

- $\Leftarrow$  on suppose que  $f'$  est positive. Soit  $(x, y) \in I^2$  tel que  $x < y$ . Par égalité des accroissements finis, il existe  $c \in ]x ; y[$  tel que  $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c)$  donc, par hypothèse de positivité, on trouve  $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$  ce qui prouve que  $f$  croissante ■

---

**Définition/Propriétés II.3.3 (Caractérisation des fonctions dérivables strictement monotones)**

- (1)  $f$  est strictement croissante sur  $I$  si, et seulement si, les conditions suivantes sont réunies :
  - (a) pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \geq 0$ .
  - (b) il n'existe pas de réels  $a$  et  $b$  dans  $I$  avec  $a < b$  tel que, pour tout  $x$  de  $[a ; b]$ ,  $f'(x) = 0$ .
- (2)  $f$  est strictement décroissante sur  $I$  si, et seulement si, les conditions suivantes sont réunies :
  - (a) pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \leq 0$ .
  - (b) il n'existe pas de réels  $a$  et  $b$  dans  $I$  avec  $a < b$  tel que, pour tout  $x$  de  $[a ; b]$ ,  $f'(x) = 0$ .

*Démonstration (Caractérisation des fonctions strictement croissantes)*

- $\boxed{\Rightarrow}$  Si  $f$  est strictement croissante sur  $I$  alors  $f$  est croissante sur  $I$  donc  $f'$  est positive. Par ailleurs, si on suppose l'existence de réels  $a$  et  $b$  dans  $I$  avec  $a < b$  tels que  $f'_{[a;b]} = 0$  alors  $f_{[a;b]}$  est constante ce qui contredit la stricte croissance de  $f$  sur  $I$ . Ainsi, il n'existe pas de réels  $a$  et  $b$  dans  $I$  avec  $a < b$  tel que, pour tout  $x$  de  $[a ; b]$ ,  $f'(x) = 0$ .
- $\boxed{\Leftarrow}$  on suppose que, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \geq 0$  et que de plus, il n'existe pas de segment inclus dans  $I$  sur lequel la restriction de  $f'$  est nulle. Alors  $f$  est croissante sur  $I$  ainsi il n'existe pas de segment inclus dans  $I$  tel que  $f_{[a;b]}$  est une fonction constante. Si  $f$  n'est pas strictement croissante, il existe un couple  $(a, b) \in I^2$  avec  $a < b$  et  $f(a) \geq f(b)$ . Par croissance de  $f$  sur  $I$ , on en déduit :  $\forall x \in [a ; b], f(a) \leq f(x) \leq f(b)$  donc  $\forall x \in [a ; b], f(a) \leq f(x) \leq f(a)$  puis  $\forall x \in [a ; b], f(x) = f(a)$ . Ainsi  $f_{[a;b]}$  est constante ce qui contredit ce qui précède. On conclut donc que :  $f$  est strictement croissante sur  $I$ . ■

### **Théorème II.3.4 (Théorème de la limite de la dérivée)**

Soit  $a$  un point de  $I$ .

Si  $f$  est continue sur  $I$ , dérivable sur  $I \setminus \{a\}$  et si  $f'_{I \setminus \{a\}}$  admet une limite réelle  $\ell$  en  $a$  alors

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell$$

Dans ce cas :

- (1)  $f$  est dérivable en  $a$  avec  $f'(a) = \ell$  ;
- (2)  $f'$  est continue en  $a$ .

Remarque

La fonction  $f$  peut être dérivable en  $a$  sans que  $f'_{I \setminus \{a\}}$  ait une limite réelle en  $a$  (par exemple, pour la fonction  $f$  définie par  $f(0) = 0$  et  $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  si  $x \neq 0$ ).

*Démonstration*

On suppose les hypothèses réunies et on considère un réel strictement positif  $\varepsilon$ .

Puisque  $f'_{I \setminus \{a\}}$  a pour limite le réel  $\ell$ , il existe un réel strictement positif  $\delta$  tel que :

$$\forall x \in I \setminus \{a\}, |x - a| \leq \delta \implies |f'(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

Prenons alors  $x \in I \setminus \{a\}$  tel que  $|x - a| \leq \delta$ .

$f$  étant continue sur  $I$  et dérivable sur  $I \setminus \{a\}$ ,  $f$  est continue sur le segment  $[a ; x]$  ou  $[x ; a]$  (suivant que  $a < x$  ou  $a > x$ ), dérivable sur l'intervalle ouvert  $]a ; x[$  ou  $]x ; a[$ .

D'après l'égalité des accroissements finis, il existe donc un réel  $c_x$  dans  $]a ; x[$  ou  $]x ; a[$  tel que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c_x)$$

Comme  $c_x$  appartient à l'intervalle ouvert d'extrémités  $a$  et  $x$ , on a :

$$c_x \in I \setminus \{a\} \text{ et } |c_x - a| \leq |x - a| \leq \delta$$

D'après ce qui a été dit précédemment, on en déduit  $|f'(c_x) - \ell| \leq \varepsilon$ , c'est-à-dire :

$$\left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \ell \right| \leq \varepsilon$$

En résumé :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I \setminus \{a\}, |x - a| \leq \delta \implies \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \ell \right| \leq \varepsilon$$

Autrement dit :  $x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  a pour limite le réel  $\ell$  en  $a$  donc  $f$  est dérivable en  $a$  avec  $f'(a) = \ell$ .

De plus,  $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$  donc  $f'$  est continue en  $a$ . ■

### Définition/Propriétés II.3.5 (Extension du théorème de la limite de la dérivée)

Soit  $a$  un point de  $I$ .

Si  $f$  est continue sur  $I$ , dérivable sur  $I \setminus \{a\}$  et si  $f'_{|I \setminus \{a\}}$  admet une limite infinie  $\ell$  en  $a$  alors

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell$$

## III Classe $C^k$

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  à valeurs réelles.

### III.1 Notations

#### Notation III.1.1

On pose  $f^{(0)} = f$  et, pour  $k \in \mathbb{N}$ , sous réserve que cela ait du sens,  $f^{(k+1)} = (f^{(k)})'$ .

### III.2 Définitions

---

**Définition III.2.1**

Soit  $k \in \mathbb{N}$ .

- $f$  est dite  $k$  fois dérivable sur  $I$  si  $f^{(k)}$  existe.
- $f$  est dite de classe  $C^k$  sur  $I$  si  $f$  est  $k$  fois dérivable sur  $I$  avec  $f^{(k)}$  continue sur  $I$ .
- $f$  est dite de classe  $C^\infty$  sur  $I$  si, pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $f$  est de classe  $C^k$  sur  $I$ .

Remarque

Soit  $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ .

L'ensemble des applications de classe  $C^k$  sur  $I$  à valeurs dans  $R$  est souvent noté  $C^k(I, \mathbb{R})$ .

### III.3 Opérations sur les fonctions de classe $C^k$ avec $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ .

---

**Définition/Propriétés III.3.1**

$C^k(I, \mathbb{R})$  est stable par combinaison linéaire, produit et quotient (sous réserve que cela ait du sens). Plus précisément :

- une combinaison linéaire de fonctions de classe  $C^k$  sur  $I$  à valeurs réelles est de classe  $C^k$  sur  $I$  :

$$\forall (f, g) \in \left(C^k(I, \mathbb{R})\right)^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \lambda f + \mu g \in C^k(I, \mathbb{R}) \text{ et } (\lambda f + \mu g)^{(k)} = \lambda f^{(k)} + \mu g^{(k)}$$

- un produit de fonctions de classe  $C^k$  sur  $I$  à valeurs réelles est de classe  $C^k$  sur  $I$  :

$$\forall (f, g) \in \left(C^k(I, \mathbb{R})\right)^2, f, g \in C^k(I, \mathbb{R}) \text{ et } (fg)^{(k)} = \underbrace{\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} f^{(i)} g^{(k-i)}}_{\text{formule de Leibniz}} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} f^{(k-i)} g^{(i)}$$

- un quotient de fonctions de classe  $C^k$  sur  $I$  à valeurs réelles dont le dénominateur ne s'annule pas sur  $I$  est de classe  $C^k$  sur  $I$ .

### III.4 Composition de fonctions de classe $C^k$ avec $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ .

---

**Définition/Propriétés III.4.1**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs réelles tel que, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f(x)$  appartient à  $J$ .

Soit  $g$  une fonction définie sur  $J$  et à valeurs réelles.

Si  $f$  est de classe  $C^k$  sur  $I$  et si  $g$  est de classe  $C^k$  sur  $J$  alors  $g \circ f$  est de classe  $C^k$  sur  $I$ .

### III.5 Réciproque d'une fonction de classe $C^k$ avec $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$

---

#### Définition/Propriétés III.5.1

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs réelles.

Si  $f$  est une bijection de  $I$  sur  $J = f(I)$ , de classe  $C^k$  sur  $I$  et que sa dérivée ne s'annule pas sur  $I$  alors  $f^{-1}$  est de classe  $C^k$  sur  $J$ .

## IV Cas des fonctions à valeurs complexes

### IV.1 Ce qui s'étend aux fonctions complexes

---

#### Définition/Propriétés IV.1.1

- Dérivée en un point et sur un intervalle : définition et caractérisations, lien avec la continuité, dérivées à gauche et à droite, opérations
- Classe  $C^k$  : définition, opérations
- Inégalité des accroissements finis

### IV.2 Ce qui ne s'étend pas aux fonctions complexes

---

#### Définition/Propriétés IV.2.1

- — Résultats utilisant la relation d'ordre :
  - la notion d'extremum local (et donc la condition nécessaire d'existence d'un extremum local)
  - le théorème de Rolle
  - l'égalité des accroissements finis
  - les caractérisations des fonctions constantes ou monotones parmi les fonctions dérivables.
- Composition de fonctions dérivables
- Réciproque d'une fonction dérivable

### IV.3 Quelques résultats qui s'étendent détaillés

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , à valeurs complexes.

---

#### Définition IV.3.1

- $f$  est dite dérivable en  $a \in I$  si la fonction à valeurs complexes  $x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  admet une limite complexe  $\ell$  en  $a$  appelée nombre dérivé de  $f$  en  $a$  et notée  $\ell = f'(a)$ .
- $f$  est dite dérivable sur  $I$  si  $f$  est dérivable en tout point de  $I$ .

---

#### Définition/Propriétés IV.3.2 (Caractérisation)

- $f$  est dérivable en  $a \in I$  si, et seulement si,  $\operatorname{Re}((f))$  et  $\operatorname{Im}((f))$  le sont.

Dans ce cas,

$$(\operatorname{Re}(f))'(a) = (\operatorname{Re}(f'(a))) \quad \text{et} \quad (\operatorname{Im}(f))'(a) = (\operatorname{Im}(f'(a)))$$

—  $f$  est dérivable (respectivement de classe  $C^k$ ) sur  $I$  si, et seulement si,  $\operatorname{Re}((f))$  et  $\operatorname{Im}((f))$  le sont.

---

#### Définition/Propriétés IV.3.3 (Inégalité des accroissements finis)

Si  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $I$  et si  $|f'|$  est majorée par un réel  $k$  alors  $f$  est  $k$ -lipschitzienne, c'est-à-dire :

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k |x - y|$$

---

#### Démonstration

Rappel On rappelle que le théorème de Rolle et l'égalité des accroissements finis ne se généralisent pas au cas des fonctions à valeurs complexes (non réelles).

Par exemple, la fonction  $g : t \mapsto e^{2i\pi t}$  est continue sur le segment  $[0 ; 1]$ , dérivable sur  $]0 ; 1[$  avec  $g(0) = g(1)$  mais sa dérivée  $g' : t \mapsto 2i\pi e^{2i\pi t}$  ne s'annule pas sur  $]0 ; 1[$ .

La preuve de l'inégalité des accroissements finis dans le cas des fonctions à valeurs complexes ne peut donc se faire comme dans le cas réel. On peut tout de même démontrer cette inégalité, pour les fonctions à valeurs complexes de classe  $C^1$  sur un intervalle, en admettant des propriétés de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment que l'on verra dans le chapitre "Intégration sur un segment".

On suppose que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $I$  et que  $|f'|$  est majorée par un réel  $k$ .

Soit  $(x, y) \in I^2$  avec  $x \leq y$ .



Comme  $f'$  est continue sur le segment  $[x ; y]$  et  $f$  une primitive de  $f'$  sur  $I$ , on peut écrire

$$|f(x) - f(y)| = \left| \int_x^y f'(t) dt \right|$$

puis, par propriété du module de l'intégrale,

$$|f(x) - f(y)| \leq \int_x^y |f'(t)| dt$$

Par hypothèse sur  $|f'|$  et croissance de l'intégrale, on a alors

$$|f(x) - f(y)| \leq \int_x^y k dt \text{ i.e. } |f(x) - f(y)| \leq k(y - x)$$

Ainsi :

$$\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \implies |f(x) - f(y)| \leq k |y - x|$$

puis

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k |y - x|$$

Autrement dit,  $f$  est lipschitzienne de rapport  $k$ . ■

# Chapitre 17

## Structures algébriques usuelles

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Généralité . . . . .</b>	<b>.184</b>
I.1	Loi de composition interne . . . . .	184
I.2	Définitions - Propriétés . . . . .	185
I.3	Partie stable . . . . .	187
<b>II</b>	<b>Groupes, sous-groupes . . . . .</b>	<b>.187</b>
II.1	Groupes . . . . .	187
II.2	Sous-groupes . . . . .	189
<b>III</b>	<b>Morphisme de groupes . . . . .</b>	<b>.189</b>
III.1	Morphisme . . . . .	189
III.2	Isomorphisme . . . . .	192
<b>IV</b>	<b>Anneaux, corps . . . . .</b>	<b>.192</b>
IV.1	Anneaux . . . . .	192
IV.2	Sous-anneaux . . . . .	193
IV.3	Morphisme d'anneaux . . . . .	193
IV.4	Isomorphisme d'anneaux . . . . .	194
IV.5	Anneau intègre . . . . .	194
IV.6	Corps commutatif . . . . .	195

## I Généralité

Soit  $E$  un ensemble.

### I.1 Loi de composition interne

---

#### Définition/Propriétés I.1.1

On appelle loi de composition interne sur  $E$  toute application  $f$  de  $E \times E$  dans  $E$ .

A tout couple  $(x, y)$  de  $E \times E$ , est ainsi associée une unique image  $f(x, y) \in E$  souvent notée

$x \star y$  ou  $xTy$  et appelée composé de  $x$  et  $y$  pour la loi de composition interne  $\star$  ou  $T$ .

### Remarque

Un ensemble muni d'une loi de composition interne est dit magma.

## I.2 Définitions - Propriétés

---

### Définition/Propriétés I.2.1 (Associativité, commutativité)

Une loi de composition interne  $\star$  sur  $E$  est dite :

- (1) associative si  $\forall (x, y, z) \in E^3, (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$
- (2) commutative si  $\forall (x, y) \in E^2, x \star y = y \star x$ .

---

### Définition/Propriétés I.2.2 (Élément neutre)

On dit qu'une loi de composition interne  $\star$  sur  $E$  admet un élément neutre s'il existe  $e$  dans  $E$  tel que

$$\forall x \in E, x \star e = e \star x = x$$

### Remarques

- (1) Si  $\star$  admet un élément neutre sur  $E$  alors celui-ci est UNIQUE.
- (2) Un ensemble muni d'une loi de composition interne associative et qui admet un élément neutre est dit monoïde.

---

### *Démonstration (Unicité de l'élément neutre)*

Supposons qu'il existe deux élément neutre  $e$  et  $e'$  dans  $E$  pour la l.c.i  $\star$

$$\text{Alors } \forall x \in E \begin{cases} x \star e &= x \\ x \star e' &= x \end{cases}$$

en particulier en prenant  $x = e'$  dans le premier cas et  $x = e$  dans le deuxième cas, on obtient :

$$e = e \star e' = e' \star e = e'$$

donc on a bien  $e = e'$ , Ainsi  $\star$  admet un unique élément neutre dans  $E$ . ■

---

**Définition/Propriétés I.2.3 (Inversibilité)**

Soit  $\star$  une loi de composition interne sur  $E$  qui admet un élément neutre  $e$ .

Un élément  $x$  de  $E$  est dit inversible s'il existe  $x'$  dans  $E$  tel que

$$x \star x' = x' \star x = e$$

**Remarques**

- Si de plus la loi est associative alors :
  - l'élément  $x'$  est UNIQUE et dit inverse de  $x$  ;
  - si  $x$  et  $y$  sont des éléments de  $E$  inversibles alors l'élément  $x \star y$  est inversible d'inverse  $y' \star x'$ .
- Les termes "symétrisable" et "symétrique" sont parfois utilisés à la place de "inversible" et "inverse".

---

*Démonstration (Unicité de l'élément inversible si  $\star$  est associative)*

Soit  $(x, x', x'') \in E^3$  tel que 
$$\begin{cases} x \star x' = x' \star x & = e & (1) \\ x' \star x'' = x'' \star x' & = e & (2) \end{cases}$$

alors  $x'' \star (x \star x') = x'' \star e$  donc par associativité  $(x'' \star x) \star x' = x''$  donc d'après (2) on a  $e \star x' = x''$  et donc  $x' = x''$

**Conclusion** Si la l.c.i est associative sur  $E$  et admet un neutre alors tout élément inversible admet un unique inverse ■

---

**Définition/Propriétés I.2.4 (Distributivité)**

Soit  $\star$  et  $\top$  deux lois de composition interne sur  $E$ .

On dit que la loi  $\top$  est distributive par rapport à la loi  $\star$  si :

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \begin{cases} x \top (y \star z) & = (x \top y) \star (x \top z) \\ (y \star z) \top x & = (y \top x) \star (z \top x) \end{cases}$$

---

**Définition/Propriétés I.2.5 (Quelques exemples usuels de lois de composition interne )**

- Loi  $+$ 
  - sur les ensembles de nombres  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  ;
  - sur les ensembles de fonctions :  $\mathcal{F}(X, \mathbb{K}), \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$  et  $C^n(I, \mathbb{K})$  ;
  - sur les ensembles de matrices :  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$  et  $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ .
- Loi  $\times$

- sur les ensembles de nombres  $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}_+, \mathbb{R}, \mathbb{R}_+, \mathbb{C}, \mathbb{U}$  et  $\mathbb{U}_n$  ;
- sur les ensembles de fonctions :  $\mathcal{F}(X, \mathbb{K}), \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$  et  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$  ;
- sur les ensembles de matrices :  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  et  $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ .
- Autres lois
  - sur l'ensemble  $\mathcal{P}(E)$  des parties d'un ensemble  $E$  :  $\cup, \cap$  et  $\setminus$  ;
  - sur l'ensemble des applications de  $E$  dans  $E$  avec  $E$  un ensemble :  $\circ$ .

## I.3 Partie stable

---

### Définition/Propriétés I.3.1

Soit  $\star$  une loi de composition interne sur  $E$ .

On dit qu'une partie  $A$  de  $E$  est stable pour la loi  $\star$  si  $\forall (x, y) \in A^2, x \star y \in A$ .

## II Groupes, sous-groupes

### II.1 Groupes

---

#### Définition II.1.1

Un groupe est un ensemble  $G$  muni d'une loi de composition interne  $\star$  telle que :

- $\star$  est associative.
- $G$  admet un élément neutre  $e_G$  pour la loi  $\star$ .
- Tout élément  $x$  de  $G$  admet un inverse  $x'$  pour la loi  $\star$ .

#### Remarques

- (1) Il y a unicité de l'élément neutre de  $G$  et de l'inverse de tout élément de  $G$ .
- (2) Dans tout groupe, il y a au moins un élément : le neutre pour la loi du groupe.
- (3) Si  $\star$  est commutative, on dit que  $G$  est un groupe commutatif (ou groupe abélien).

---

#### Notation II.1.2 (Notations dans un groupe additif et un groupe multiplicatif)

- Lorsque la loi du groupe  $G$  est notée  $+$  alors on parle de groupe additif et on écrit :
  - (1)  $0_G$  au lieu de  $e_G$  ;
  - (2)  $-x$  au lieu de  $x'$  ;

$$(3) \quad nx = \begin{cases} x + \cdots + x & (n \text{ fois}) \quad \text{si } n \in \mathbb{N}^* \\ 0_G & \text{si } n = 0 \\ -(-nx) & \text{si } n \in \mathbb{Z}_-^* \end{cases}$$

- Lorsque la loi du groupe  $G$  est notée  $\times$  alors on parle de groupe multiplicatif et on écrit :

(1)  $1_G$  au lieu de  $e_G$  ;

(2)  $x^{-1}$  au lieu de  $x'$  ;

$$(3) \quad x^n = \begin{cases} x \times \cdots \times x & (n \text{ fois}) \quad \text{si } n \in \mathbb{N}^* \\ 1_G & \text{si } n = 0 \\ (x^{-n})^{-1} & \text{si } n \in \mathbb{Z}_-^* \end{cases}$$

### Définition/Propriétés II.1.3 (Quelques exemples usuels de groupes déjà rencontrés cette année)

- Groupes additifs
  - dans les ensembles de nombres :  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  ;
  - dans les ensembles de fonctions :  $\mathcal{F}(X, \mathbb{K}), \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$  et  $C^n(I, \mathbb{K})$  ;
  - dans les ensembles de matrices :  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$  et  $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ .
- Groupes multiplicatifs
  - dans les ensembles de nombres :  $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}_+, \mathbb{R}, \mathbb{R}_+, \mathbb{C}, \mathbb{U}$  et  $\mathbb{U}_n$  ;
  - dans les ensembles de matrices :  $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ .

### Définition/Propriétés II.1.4 (Groupe des permutations d'un ensemble)

Soit  $X$  un ensemble.

L'ensemble des applications de  $X$  dans  $X$  qui sont des bijections est un groupe pour la loi de composition interne  $\circ$ , appelé groupe des permutations de l'ensemble  $X$  et noté  $S_X$ .

### Définition/Propriétés II.1.5 (Produits finis de groupes)

Soit  $(G_1, \perp)$  et  $(G_2, \top)$  deux groupes.

Le produit cartésien  $G_1 \times G_2$  muni de la loi  $\star$  définie par :

$$\forall (x_1, x_2) \in G_1 \times G_2, \forall (y_1, y_2) \in G_1 \times G_2, (x_1, x_2) \star (y_1, y_2) = (x_1 \perp y_1, x_2 \top y_2)$$

est un groupe, dit groupe-produit.

Dans ce groupe-produit,

- l'élément neutre est  $(e_{G_1}, e_{G_2})$  où  $e_{G_1}$  est le neutre de  $G_1$  et  $e_{G_2}$  est le neutre de  $G_2$  ;
- l'inverse de  $(x_1, x_2)$  de  $G_1 \times G_2$  est  $(x'_1, x'_2)$  où  $x'_1$  est l'inverse de  $x_1$  et  $x'_2$  l'inverse de  $x_2$ .

Remarques

- on en déduit, par exemple, que :
  - $\mathbb{K}^2$  est un groupe additif de neutre  $(0, 0)$  dans lequel  $(-x, -y)$  est l'inverse de  $(x, y)$  ;
  - $(\mathbb{K}^*)^2$  est un groupe multiplicatif de neutre  $(1, 1)$  dans lequel  $(x^{-1}, y^{-1})$  est l'inverse de  $(x, y)$ .
- La propriété s'étend à un nombre fini  $m \geq 2$  de groupes  $(G_1, \perp_1), (G_2, \perp_2), \dots, (G_m, \perp_m)$ .
- Ainsi, par exemple,  $\mathbb{K}_m$  est un groupe additif et  $(\mathbb{K}^*)^m$  est un groupe multiplicatif.

## II.2 Sous-groupes

---

### Définition II.2.1

Soit  $(G, \star)$  un groupe.

Une partie  $H$  de  $G$  est dite sous-groupe de  $G$  si les deux conditions suivantes sont réunies :

- $H$  est une partie stable pour la loi  $\star$  ;
- $H$  est un groupe pour la loi de composition interne obtenue par restriction à  $H$  de la loi de composition interne  $\star$  de  $G$ .

---

### Définition/Propriétés II.2.2 (Caractérisation)

Une partie  $H$  d'un groupe  $(G, \star)$  est un sous-groupe de  $G$  si, et seulement si, les conditions suivantes sont réunies :

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| (1) $H \neq \emptyset$   | $(e_G \in H)$                       |
| (2) $\forall (x, y) \in H^2, x \star y \in H$                                | (stabilité par composition)         |
| (3) $\forall x \in H, x' \in H$ avec $x'$ l'inverse de $x$ dans $(G, \star)$ | (stabilité par passage à l'inverse) |

#### Caractérisation alternative

Une partie  $H$  d'un groupe  $(G, \star)$  est un sous-groupe de  $G$  si, et seulement si :

$$H \neq \emptyset \text{ et } \forall (x, y) \in H^2, x \star y' \in H$$

## III Morphisme de groupes

### III.1 Morphisme

---

#### Définition III.1.1

Une application  $f : G \longrightarrow G'$  est dite morphisme de groupes si  $G$  et  $G'$  sont des groupes de lois respectives  $\star$  et  $\perp$  avec

$$\forall (x, y) \in G \times G, f(x \star y) = f(x) \perp f(y)$$

---

### Propriétés III.1.2

Si  $f : G \longrightarrow G'$  est un morphisme de groupes alors :

- l'image de l'élément neutre de  $G$  par  $f$  est l'élément neutre de  $G'$ , c'est-à-dire :

$$f(e_G) = e_{G'}$$

- pour tout  $x \in G$ , l'inverse de l'image de  $x$  par  $f$  est l'image de l'inverse de  $x$  par  $f$ , c'est-à-dire :

$$(f(x))' = f(x')$$

---

#### Démonstration

Soit  $f : G \longrightarrow G'$

- Montrons que  $f(e_G) = e_{G'}$

On a  $f(e_G) = f(e_G \star e_G) = f(e_G) \perp f(e_G)$

ainsi par composition par l'inverse de  $f(e_G)$ , on trouve  $(f(e_G))' \perp f(e_G) = ((f(e_G))' \perp f(e_G)) \perp f(e_G)$

donc  $e_{G'} = e_{G'} \perp f(e_G) = f(e_G)$  par associativité de  $\perp$  puis par définition de  $e_{G'}$ .

- Montrons que l'inverse d'une image est l'image de l'inverse

Soit  $x \in G$  alors :

$$f(x) \perp f(x') = f(x \star x') = f(e_G) = e_{G'}$$

$$f(x') \perp f(x) = f(x' \star x) = f(e_G) = e_{G'}$$

donc  $(f(x))' = f(x')$  ■

---

### Définition/Propriétés III.1.3 (Image directe et réciproque)

Si  $f : G \longrightarrow G'$  est un morphisme de groupes alors,

- (1) l'image directe de tout sous-groupe  $H$  de  $G$ , est un sous-groupe de  $G'$ .
- (2) l'image réciproque de tout sous-groupe  $H'$  de  $G'$  est un sous-groupe de  $G$ .

---

#### Démonstration

- Montrons que si  $H$  est un sous groupe de  $G$  alors  $f(H)$  sous groupe  $G'$

—  $f(H) \subset G'$  par définition de  $f$

—  $f(H) \neq \emptyset$  car  $e_{G'} \in f(H)$  puisque  $e_{G'} = f(e_G)$  avec  $e_G \in H$

— Soit  $(x, y) \in (f(H))^2$ , Montrons que  $x \perp y' \in f(H)$  Par hypothèse il existe  $a$  et  $b$  dans  $H$

$$\text{tel que } \begin{cases} x = f(a) \\ y = f(b) \end{cases}$$

alors

$$x \perp y = f(a) \perp (f(b))'$$

$$= f(a) \perp f(b')$$

$$= f(a \star b') \text{ avec } a \star b' \in H \text{ car } H \text{ sous groupe}$$

Ainsi  $x \perp y \in f(H)$



donc par caractérisation,  $f(H)$  sous groupe de  $G'$

- Montrons que si  $H'$  est un sous groupe de  $G'$  alors  $f^{-1}(H')$  sous groupe  $G$ 
    - $f^{-1}(H') \subset G$  par définition de  $f^{-1}$
    - $f^{-1}(H') \neq \emptyset$  car  $e_G \in f^{-1}(H')$  puisque  $e_{G'} = f(e_G)$  avec  $f^{-1}(e_{G'}) \in H$
    - Soit  $(x, y) \in (f^{-1}(H'))^2$ , Montrons que  $x \star y' \in f^{-1}(H')$  Par hypothèse  $\begin{cases} f(x) & \in H' \\ f(y) & \in H' \end{cases}$
- alors

$$\begin{aligned} f(x \perp y') &= f(x) \perp (y') \\ &= f(x) \perp f(b)' \end{aligned}$$

d'où  $f(x \star y') \in H'$  car  $H'$  sous-groupe ainsi  $x \star y' \in f^{-1}(H')$   
Donc par caractérisation,  $f^{-1}(H')$  est un sous groupe de  $G$  ■

### Définition/Propriétés III.1.4 (Noyau et image d'un morphisme de groupes)

Si  $f : G \longrightarrow G'$  est un morphisme de groupes alors,

- (1) L'image directe  $f(G)$  est un sous-groupe particulier de  $G'$ , dit image de  $f$  et noté  $\text{Im } f$ .

$$\text{Im } f \underset{\text{déf}}{=} f(G) \underset{\text{déf}}{=} \{y \in G' \mid \exists x \in G, y = f(x)\}$$

- (2) L'image réciproque  $f^{-1}(\{e_{G'}\})$  est un sous-groupe particulier de  $G$ , dit noyau de  $f$  et noté  $\ker f$

$$\ker f \underset{\text{déf}}{=} f^{-1}(\{e_{G'}\}) \underset{\text{déf}}{=} \{x \in G \mid f(x) = e_{G'}\}$$

### Définition/Propriétés III.1.5 (Caractérisation des morphisme injectif)

Un morphisme de groupes  $f : G \longrightarrow G'$  est injectif si, et seulement si,  $\ker f = \{e_G\}$

#### Démonstration

Soit  $f : (G, \star) \longrightarrow (G', \perp)$  un morphisme de groupe

Montrons que  $f$  injectif  $\iff \ker f = \{e_G\}$  par double implication

- $\boxed{\Leftarrow}$  On suppose  $\ker f = \{e_G\}$   
Soit  $(x, y) \in G$  tel que  $f(x) = f(y)$   
alors par composition par  $(f(x))'$  on a :

$$\begin{aligned} (f(x))' \perp f(x) &= (f(x))' \perp f(y) \iff e_{G'} = f(x') \perp f(y) \\ &\iff e_{G'} = f(x' \star y) \end{aligned}$$

ainsi,  $x' \star y \in \ker f$ , donc  $x' \star y = e_G$  par hypothèse puis par composition à gauche on trouve  $y = x$

Conclusion  $f$  est injective

- $\boxed{\Rightarrow}$  On suppose  $f$  injective  
si  $\ker f \neq \{e_G\}$  alors il existe  $x \in \ker f$  tel que  $x \neq e_G$  avec  $f(x) = e_{G'}$ .  
Donc  $f(x) = f(e_G)$  d'où  $x = e_G$  car  $f$  est injective ce qui est absurde, car on a supposé  $x \neq e_G$

Conclusion  $\ker f = \{e_G\}$  ■

## III.2 Isomorphisme

---

### Définition III.2.1

$f$  est dit isomorphisme de groupes si  $f$  est un morphisme de groupes et  $f$  est bijective.

---

### Propriétés III.2.2

Si  $f : G \longrightarrow G'$  est un isomorphisme de groupes alors  $f^{-1} : G' \longrightarrow G$  est un isomorphisme de groupes.

## IV Anneaux, corps

### IV.1 Anneaux

---

#### Définition IV.1.1

Un anneau est un ensemble  $A$  muni de deux lois de composition interne  $\star$  et  $\perp$  telles que :

- (1)  $(A, \star)$  est un groupe commutatif ;
- (2)  $\perp$  est associative ;
- (3)  $\perp$  est distributive par rapport à la loi  $\star$  ;
- (4)  $A$  admet un élément neutre pour la loi  $\perp$ .

#### Remarques

- Il y a unicité de l'élément neutre pour la loi  $\perp$ .
  - Si  $\perp$  est commutative, on dit que  $A$  est un anneau commutatif.
  - Si les lois de  $A$  sont notées  $+$  et  $\times$ , les éléments neutres de  $A$  pour les lois  $+$  et  $\times$  sont alors souvent notés respectivement  $0_A$  et  $1_A$  (ou  $0$  et  $1$  s'il n'y a pas de confusion possible) et  $1_A$  est appelé élément unité de l'anneau.
- 

#### Définition/Propriétés IV.1.2 (Quelques exemples usuels d'anneaux déjà rencontrés cette année)

- Dans les ensembles de nombres :  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  ;
- Dans les ensembles de fonctions :  $\mathcal{F}(X, \mathbb{K}), \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$  et  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$  ;
- Dans les ensembles de matrices :  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

---

**Définition/Propriétés IV.1.3 (Calculs dans un anneau)**

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau.

- (1)  $\forall x \in A, 0_A \times x = x \times 0_A = 0_A$  et  $\forall x \in A, (-1_A) \times x = x \times (-1_A) = -x$
- (2)  $\forall (x, y) \in A^2, (-x) \times y = x \times (-y) = -(x \times y)$  et  $(-x) \times (-y) = x \times y$
- (3)  $\forall (x, y, z) \in A^3, (x - y) \times z = (x \times z) - (y \times z)$  et  $z \times (x - y) = (z \times x) - (z \times y)$
- (4)  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (x, y) \in A^2, x \times y = y \times x \implies (x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \times y^{n-k}$
- (5)  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (x, y) \in A^2, x \times y = y \times x \implies x^n - y^n = (x - y) \times \sum_{k=0}^{n-1} x^k \times y^{n-1-k}$

---

**Définition/Propriétés IV.1.4 (Groupe des inversibles d'un anneau)**

Si  $(A, +, \times)$  est un anneau alors l'ensemble

$$G = \{x \in A \mid x \text{ admet un symétrique pour la loi } \times \text{ dans } A\}$$

muni de la loi  $\times$  est un groupe, dit groupe des inversibles de l'anneau  $(A, +, \times)$

## IV.2 Sous-anneaux

---

**Définition/Propriétés IV.2.1**

Une partie  $H$  d'un anneau  $(A, +, \times)$  est un sous-anneau de  $A$  si, et seulement si,

- (1)  $1_A \in H$
- (2)  $\forall (x, y) \in H^2, x + y \in H$
- (3)  $\forall x \in H, -x \in H$
- (4)  $\forall (x, y) \in H^2, xy \in H$

Remarque On peut remplacer les conditions (2) et (3) par  $\forall (x, y) \in H^2, x - y \in H$ .

## IV.3 Morphisme d'anneaux

---

**Définition IV.3.1**

Une application  $f : A \longrightarrow B$  est dite morphisme d'anneaux si  $A$  et  $B$  sont des anneaux de lois respectives  $(+, \times)$  et  $(\star, \perp)$  avec :

- (1)  $f(1_A) = 1_B$
- (2)  $\forall (x, y) \in A^2, f(x + y) = f(x) \star f(y)$
- (3)  $\forall (x, y) \in A^2, f(x \times y) = f(x) \perp f(y)$

---

### Propriétés IV.3.2

Si  $f : A \longrightarrow B$  est un morphisme d'anneaux alors  $f$  est un morphisme de groupes.

---

### Définition/Propriétés IV.3.3 (Image et noyau d'un morphisme d'anneaux)

- Si  $f : A \longrightarrow B$  est un morphisme d'anneaux alors  $\text{Im } f$  est un sous-anneau de  $B$ .
- Si  $f : A \longrightarrow B$  est un morphisme d'anneaux avec  $B \neq \{0_B\}$  alors  $\ker f$  n'est pas sous-anneau de  $A$ .

En effet, on a  $f(1_A) = 1_B$  mais  $1_B \neq 0_B$  (sinon  $B$  serait égal à  $\{0_B\}$ ) donc  $1_A$  n'appartient pas à  $\ker f = \{x \in A \mid f(x) = 0_B\}$  et, par conséquent,  $\ker f$  n'est pas sous-anneau de  $A$ .

## IV.4 Isomorphisme d'anneaux

---

### Définition IV.4.1

$f$  est dit isomorphisme d'anneaux si  $f$  est un morphisme d'anneaux et  $f$  est bijective.

---

### Propriétés IV.4.2

Si  $f : A \longrightarrow B$  est un isomorphisme d'anneaux alors  $f^{-1} : B \longrightarrow A$  est un isomorphisme d'anneaux.

## IV.5 Anneau intègre

---

### Définition IV.5.1

On dit qu'un anneau  $(A, +, \times)$  est un anneau intègre si les conditions suivantes sont réunies :

- (1)  $A \neq \{0_A\}$
- (2)  $\forall (a, b) \in A^2, a \times b = 0_A \implies a = 0_A \text{ ou } b = 0_A$

#### Remarque

Des éléments  $a$  et  $b$  de  $A$  tels que  $a \times b = 0_A$  avec  $a \neq 0_A$  et  $b \neq 0_A$  sont dits diviseurs de  $0_A$ .

---

### Définition/Propriétés IV.5.2 (Quelques exemples d'anneaux intègres/non intègres déjà rencontrés)

- Dans les ensembles de nombres :  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  sont des anneaux intègres.
- Dans les ensembles de fonctions :  $\mathcal{F}(X, \mathbb{K}), \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$  et  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$  ne sont pas des anneaux intègres.
- Dans les ensembles de matrices :  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  n'est pas un anneau intègre.

## IV.6 Corps commutatif

---

### Définition IV.6.1

On dit qu'un anneau  $(A, +, \times)$  est un corps commutatif si les conditions suivantes sont réunies :

- (1)  $A \neq \{0_A\}$ .
- (2)  $A$  est commutatif.
- (3) tout élément de  $A$  différent de  $0_A$  admet un inverse dans  $A$  pour la loi  $\times$ .

---

### Propriétés IV.6.2

Tout corps commutatif est un anneau intègre.

---

### Définition/Propriétés IV.6.3 (Sous-corps)

Une partie  $H$  d'un corps  $(A, +, \times)$  est un sous-corps de  $A$  si, et seulement si, les conditions suivantes sont réunies :

- (1)  $H$  est un sous-anneau de  $A$ .
- (2)  $\forall x \in H, x \neq 0_A \implies x^{-1} \in H$  (où  $x^{-1}$  désigne l'inverse de  $x$  pour la loi  $\times$ )

# Chapitre 18

## Polynômes

### Sommaire

---

<b>I</b>	<b>Anneau des polynômes à une indéterminée . . . . .</b>	<b>196</b>
I.1	L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ . . . . .	196
I.2	L'anneau intègre $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ . . . . .	197
I.3	L'ensemble $\mathbb{K}_n[X]$ . . . . .	199
I.4	Composition de polynômes . . . . .	199
<b>II</b>	<b>Divisibilité et division euclidienne dans <math>\mathbb{K}[X]</math> . . . . .</b>	<b>200</b>
II.1	Divisibilité . . . . .	200
II.2	Division euclidienne . . . . .	201
<b>III</b>	<b>Fonctions polynomiales et racines . . . . .</b>	<b>202</b>
III.1	Fonction polynomiale associée à un polynôme . . . . .	202
III.2	Racine (ou zéro) d'un polynôme . . . . .	202
III.3	Polynômes scindés . . . . .	204
<b>IV</b>	<b>Polynômes dérivés . . . . .</b>	<b>205</b>
IV.1	Dérivée formelle d'un polynôme . . . . .	205
IV.2	Polynômes dérivés successifs . . . . .	206
<b>V</b>	<b>Trois classiques incontournables . . . . .</b>	<b>208</b>
V.1	Méthode de Horner pour l'évaluation polynomiale . . . . .	208
V.2	Formule d'interpolation de Lagrange . . . . .	209
V.3	Relations entre coefficients et racines (formules de Viète) . . . . .	210

---

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne le corps  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### I Anneau des polynômes à une indéterminée

#### I.1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

La construction de  $\mathbb{K}[X]$  n'étant pas au programme, on se contente ici d'une présentation sommaire.

**Définition/Propriétés I.1.1 (Polynômes (formels) à coefficients dans  $\mathbb{K}$ )**

Une suite  $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$  de  $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  nulle à partir d'un certain rang est dite polynôme à coefficients dans  $\mathbb{K}$ .

Pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , l'élément  $a_k$  est appelé coefficient de degré  $k$  de  $P$ .

Notations

- L'ensemble des polynômes à coefficients dans  $K$  est noté  $\mathbb{K}[X]$ .
- Le polynôme dont tous les coefficients sont nuls est dit polynôme nul et noté  $0_{\mathbb{K}[X]}$  ou même  $0$ .
- Le polynôme dont tous les coefficients sont nuls sauf celui de degré  $k$  qui vaut 1 est noté  $X^k$ .

**Définition/Propriétés I.1.2 (égalité entre deux polynômes (formels))**

Deux polynômes de  $\mathbb{K}[X]$  sont égaux si, et seulement si, leurs coefficients de même degré sont égaux.

**Définition/Propriétés I.1.3 (Degré d'un polynôme (formel))**

Le degré d'un polynôme  $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$  de  $K[X]$  est noté  $\deg(P)$  et défini de la manière suivante :

$$\deg(P) = \begin{cases} \max \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \neq 0\} & \text{si } P \neq 0_{\mathbb{K}[X]} \\ -\infty & \text{si } P = 0_{\mathbb{K}[X]} \end{cases}$$

**Définition/Propriétés I.1.4 (Coefficient dominant d'un polynôme (formel))**

Soit  $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$  un polynôme non nul de  $K[X]$ .

- Si  $P$  est de degré  $n$  alors  $a_n$  est dit coefficient dominant de  $P$ .
- Si le coefficient dominant de  $P$  est égal à 1, on dit que  $P$  est un polynôme unitaire.

**I.2 L'anneau intègre  $(\mathbb{K}[X], +, \times)$** **Définition/Propriétés I.2.1 (Multiplication par un scalaire, somme et produit)**

Soit  $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$  et  $Q = (b_k)_{k \in \mathbb{N}}$  deux polynômes de  $K[X]$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$

- Le polynôme de  $K[X]$  noté  $\lambda.P$  défini ci-dessous est dit polynôme multiplication de  $P$  par  $\lambda$  :

$$\lambda.P = (\lambda a_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

- Le polynôme de  $K[X]$  noté  $P + Q$  défini ci-dessous est dit polynôme somme de  $P$  et  $Q$  :

$$P + Q = (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

- Le polynôme de  $K[X]$  noté  $P \times Q$  défini ci-dessous est dit polynôme produit de  $P$  et  $Q$  :

$$P \times Q = (c_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ avec, pour tout } n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k$$

#### Remarque

On peut faire l'analogie ici avec les expressions des coefficients des applications polynomiales obtenues après multiplication d'une application polynomiale par un scalaire, addition ou multiplication de deux applications polynomiales. En particulier, l'expression imposée pour les coefficients du produit de deux polynômes s'explique en pensant aux produits d'applications polynomiales.

---

### Définition/Propriétés I.2.2 (Notation usuelle des polynômes)

Si  $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$  est un polynôme non nul de  $\mathbb{K}[X]$  alors on note

$$P = \sum_{k=0}^{\deg(P)} a_k X^k \text{ ou } P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$$

#### Remarques

- La somme  $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$  est finie car tous ses termes sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux.
- Par définition du produit de deux polynômes, on a bien  $X^2 = X \times X$  et même plus généralement,  $X^k = X \times X^{k-1} = X^{k-1} \times X$  pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$  ce qui justifie a posteriori la notation  $X^k$  choisie.

---

### Définition/Propriétés I.2.3 (Effet des opérations polynomiales sur le degré)

Si  $P$  et  $Q$  sont deux polynômes de  $\mathbb{K}[X]$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$  alors :

$$\deg(\lambda.P) = \deg(P) \text{ si } \lambda \neq 0$$

$$\deg(P \times Q) = \deg(P) + \deg(Q)$$

$$\begin{cases} \deg(P + Q) = \max(\deg(P), \deg(Q)) & \text{si } \deg(P) \neq \deg(Q) \\ \deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)) & \text{si } \deg(P) = \deg(Q) \end{cases}$$

---

#### *Démonstration*

Démonstration du degré du produit de deux polynôme :

on a pour tout  $n$  entier naturel tel que  $n \geq s + \ell + 1$  avec  $s = \deg(P)$  et  $\ell = \deg(Q)$ ,  $c_n = 0$

On a aussi

$$c_{s+\ell} = \sum_{k=0}^{s+\ell} a_k b_{s+\ell-k}$$

$$= a_s b_\ell \quad \text{car si } k \neq s \text{ alors } k > s \text{ donc } a_s = 0 \text{ ou } s + \ell - k > \ell \text{ donc } b_{s+\ell-k} = 0$$

or  $a_s \neq 0$  et  $b_\ell \neq 0$  donc  $a_s b_\ell \neq 0$  ainsi  $\deg(P \times Q) = s + \ell = \deg(P) + \deg(Q)$  ■



---

**Définition/Propriétés I.2.4 (Structure d'anneau intègre commutatif)**

$(\mathbb{K}[X], +, \times)$  est un anneau intègre commutatif dont l'élément neutre

- pour la loi  $+$  est le polynôme nul  $(0, 0, \dots)$  noté  $0_{\mathbb{K}[X]}$  ;
- pour la loi  $\times$  est le polynôme  $X^0 = (1, 0, \dots, 0, \dots)$  noté  $1_{\mathbb{K}[X]}$ .

En particulier , on a :

$$\forall (P, Q) \in (\mathbb{K}[X])^2, PQ = 0_{\mathbb{K}[X]} \implies P = 0_{\mathbb{K}[X]} \text{ ou } Q = 0_{\mathbb{K}[X]}$$

### I.3 L'ensemble $\mathbb{K}_n[X]$

---

**Définition I.3.1**

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $\mathbb{K}_n[X]$  l'ensemble des polynômes de  $\mathbb{K}[X]$  de degré inférieur ou égal à  $n$ .

Remarques

- Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\mathbb{K}_n[X] \subset \mathbb{K}_{n+1}[X]$
- Les éléments de  $\mathbb{K}_0[X]$  sont appelés les polynômes constants.

---

**Définition/Propriétés I.3.2 (Structure de  $\mathbb{K}_n[X]$ )**

$\mathbb{K}_n[X]$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ . Remarques

- $\mathbb{K}_n[X]$  n'est pas stable pour la loi  $\times$  donc n'est pas un anneau pour les lois usuelles  $+$  et  $\times$
- 

### I.4 Composition de polynômes

---

**Définition I.4.1**

Soit  $\forall (P, Q) \in (\mathbb{K}[X])^2$  avec  $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ .

On appelle polynôme composé de  $P$  et  $Q$  et on note  $P \circ Q$  le polynôme de  $\mathbb{K}[X]$  défini par

$$P \circ Q = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k Q^k$$

Remarque

On rappelle que  $Q^0 = 1_{\mathbb{K}[X]}$

---

**Définition/Propriétés I.4.2 (Degré)**

Si  $P$  et  $Q$  sont des polynômes non nuls de  $\mathbb{K}[X]$  et si  $Q$  est non constant alors

$$\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q)$$

## II Divisibilité et division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

Soit  $(A, B, C, D) \in (\mathbb{K}[X])^4$

### II.1 Divisibilité

---

#### Définition II.1.1

S'il existe  $Q$  dans  $\mathbb{K}[X]$  tel que  $A = BQ$ , on dit que  $B$  divise  $A$  (ou que  $B$  est un diviseur de  $A$ , ou que  $A$  est divisible par  $B$  ou encore que  $A$  est un multiple de  $B$ ) et on note  $B \mid A$ .

#### Remarque

Si  $B$  est non nul et si  $B$  divise  $A$  alors il existe un unique  $Q$  dans  $\mathbb{K}[X]$  tel que  $A = BQ$ .

---

#### Définition/Propriétés II.1.2 (Ensembles des diviseurs et des multiples)

- On note  $\mathcal{D}(A) = \{B \in \mathbb{K}[X] \mid \exists Q \in \mathbb{K}[X], A = BQ\}$  l'ensemble des diviseurs de  $A$ 
  - Si  $A = 0_{\mathbb{K}[X]}$  alors  $\mathcal{D}(A) = \mathbb{K}[X]$ .
  - Si  $A \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$  alors  $\mathcal{D}(A)$  est composée de polynômes de degré  $n \leq \deg(A)$
- On note  $B\mathbb{K}[X] = \{BQ \mid Q \in \mathbb{K}[X]\}$  l'ensemble des multiples de  $B$ .
  - Si  $B = 0_{\mathbb{K}[X]}$  alors  $B\mathbb{K}[X] = \{0_{\mathbb{K}[X]}\}$
  - Si  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$  alors  $B\mathbb{K}[X]$  est composé de  $0_{\mathbb{K}[X]}$  et de polynômes de degré  $n \geq \deg(B)$ .

#### Définition/Propriétés II.1.3 (Caractérisation des polynômes associés)

$A \mid B$  si, et seulement si, il existe  $\lambda$  dans  $\mathbb{K}^*$  tel que  $A = \lambda B$ . ( $A$  et  $B$  sont alors dits associés)

---

#### Propriétés II.1.4 (Propriétés)

- (1)  $A \mid A$
- (2) Si  $A \mid B$  et  $B \mid C$  alors  $A \mid C$
- (3) Si  $A \mid B$  et  $C \mid D$  alors  $AC \mid BD$
- (4) Si  $A \mid B$  alors, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $A^n \mid B^n$
- (5) Si  $C \mid A$  et  $C \mid B$  alors, pour tout  $(U, V) \in (\mathbb{K}[X])^2$ ,  $C \mid AU + BV$

## II.2 Division euclidienne

### Théorème II.2.1 (Théorème de la division euclidienne)

Pour tout  $(A, B)$  de  $(\mathbb{K}[X])^2$  avec  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ , il existe un unique couple  $(Q, R)$  de  $(\mathbb{K}[X])^2$  tel que :

$$A = BQ + R \text{ et } \deg(R) < \deg(B)$$

Dans la division euclidienne de  $A$  par  $B$ ,  $A$  est appelé dividende,  $B$  diviseur,  $Q$  quotient et  $R$  reste.

#### Démonstration

Soit  $(A, B) \in (\mathbb{K}[X])^2$  avec  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$

- unicité

On suppose qu'il existe deux couple  $(Q, R)$  et  $(Q_1, R_1)$  de  $(\mathbb{K}[X])^2$  tel que :

(1)  $A = BQ + R$  et  $\deg(R) < \deg(B)$

(2)  $A = BQ_1 + R_1$  et  $\deg(R_1) < \deg(B)$

Alors  $B(Q - Q_1) = R - R_1$  et donc  $\deg(B) + \deg(Q - Q_1) = \deg(R - R_1)$

avec  $\deg(R - R_1) \leq \max(\deg(R), \deg(R_1))$  donc  $\deg(R - R_1) < \deg(B)$ . Ainsi,  $\deg(B) + \deg(Q - Q_1) < \deg(B)$  donc  $\deg(Q - Q_1) < 0$  ce qui donne  $Q - Q_1 = 0_{\mathbb{K}[X]}$ . On en déduit  $Q = Q_1$  puis  $R = R_1$ .

- existence

— Dans le cas où  $B$  divise  $A$ , il existe  $Q \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $A = BQ$  donc le couple  $(Q, 0_{\mathbb{K}[X]})$  convient.

— On se place donc dans le cas où  $B$  ne divise pas  $A$  et on note  $J = \{\deg(A - BQ) \mid Q \in \mathbb{K}[X]\}$

L'ensemble  $J$  est non vide (car il contient le degré de  $A$ ) et est inclus dans  $\mathbb{N}$  (car il ne contient pas  $-\infty$  puisque  $B$  ne divise pas  $A$  donc, quel que soit  $Q \in \mathbb{K}[X]$ ,  $A - BQ \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ ). L'ensemble  $J$  admet donc un minimum que l'on note  $r$  et il existe donc  $Q_0 \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $\deg(A - BQ_0) = r$ .

Montrons que le polynôme  $R = A - BQ_0$  est de degré  $r$  strictement inférieur au degré  $b$  de  $B$ .

Pour cela, on peut raisonner par l'absurde, en supposant que  $\deg(R) \geq \deg(B)$  donc  $r - b \geq 0$ .

En notant  $\alpha$  le coefficient dominant de  $R$ , le polynôme  $S = R - \alpha X^{r-b} B$  est alors de degré strictement inférieur à  $r$ . Or  $S$  peut s'écrire aussi  $S = A - B(Q_0 + \alpha X^{r-b})$  donc  $S = A - BT$  avec  $T \in \mathbb{K}[X]$  ce qui prouve que  $\deg(S) \in J$  et donc que  $\deg(S) \geq r$  car  $r$  est le minimum de  $J$ . Ceci contredit le résultat  $\deg(S) < r$  trouvé.

Ainsi,  $\deg(R) < b$  donc  $A = BQ + R$  avec  $\deg(R) < \deg(B)$  ce qui prouve l'existence attendue.

**conclusion** il existe un unique couple  $(Q, R)$  de  $(\mathbb{K}[X])^2$  tel que :  $A = BQ + R$  et  $\deg(R) < \deg(B)$ . ■

### Définition/Propriétés II.2.2 (Caractérisation de la divisibilité)

Soit  $(A, B) \in (\mathbb{K}[X])^2$  avec  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ .

$B$  divise  $A$  si, et seulement si, le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $B$  est nul.

## III Fonctions polynomiales et racines

### III.1 Fonction polynomiale associée à un polynôme

---

#### Définition III.1.1

A tout polynôme  $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$  de  $\mathbb{K}[X]$ , on peut associer une fonction  $\tilde{P} : \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}$  définie par :

$$\forall x \in \mathbb{K}, \tilde{P} = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$$

Cette fonction  $\tilde{P}$  est dite fonction polynomiale associée à  $P$ .

#### Remarque

Par abus d'écriture, on utilise souvent la même notation pour  $P$  et  $\tilde{P}$  alors que ce sont des objets de nature différente (une suite de  $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  presque nulle pour l'un et une fonction de  $\mathbb{K}$  dans  $\mathbb{K}$  pour l'autre).

---

#### Propriétés III.1.2

Soit  $(P, Q) \in (\mathbb{K}[X])^2$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$  alors :

$$\widetilde{\lambda P} = \lambda \tilde{P} \quad \widetilde{P + Q} = \tilde{P} + \tilde{Q} \quad \widetilde{P \times Q} = \tilde{P} \times \tilde{Q} \quad \widetilde{P \circ Q} = \tilde{P} \circ \tilde{Q}$$

### III.2 Racine (ou zéro) d'un polynôme

---

#### Définition III.2.1

On dit que  $\alpha \in \mathbb{K}$  est une racine (ou un zéro) du polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$  si  $\tilde{P}(\alpha) = 0$ .

#### Remarques

Pour  $\alpha \in \mathbb{K}$ , l'écriture  $P(\alpha)$  n'a a priori pas de sens car  $P$  est une suite et pas une fonction. En pratique, on note tout de même  $P(\alpha)$  au lieu de  $\tilde{P}(\alpha)$  et on parle d'évaluation du polynôme  $P$  en  $\alpha$  et non pas de la valeur de  $P$  en  $X = \alpha$  ce qui n'a pas de sens.

---

#### Définition/Propriétés III.2.2 (Caractérisation en termes de divisibilité)

Soit  $\alpha \in \mathbb{K}$  et  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

$\alpha$  est une racine de  $P$  dans  $\mathbb{K}$  si, et seulement si, le polynôme  $X - \alpha$  divise  $P$

---

*Démonstration*

- $\boxed{\Rightarrow}$  On suppose  $\alpha$  racine de  $P$   
Par théorème de la division euclidienne sur  $P$  par  $X - \alpha$  :

$$\exists (Q, R) \in (\mathbb{K}[X])^2, P = Q(X - \alpha) + R$$

avec  $\deg(R) < \deg(X - \alpha)$  donc  $R = \beta$  avec  $\beta \in \mathbb{K}$ .

Par égalité sur les applications polynomiale on a donc  $\tilde{P} = (\overline{X - \alpha}) \tilde{Q} + \tilde{R}$

Or  $\alpha$  est racine de  $P$  donc

$$\tilde{P}(\alpha) = 0 \iff 0 = (\overline{\alpha - \alpha}) \tilde{Q}(\alpha) + \tilde{R}(\alpha)$$

$$\iff 0 = \tilde{R}(\alpha)$$

$$\iff 0 = \beta$$

Donc  $P = (X - \alpha) Q$  ainsi  $(X - \alpha) \mid P$

- $\boxed{\Leftarrow}$  On suppose que  $(X - \alpha) \mid P$   
alors  $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha) Q$  ainsi  $\tilde{P} = (\overline{X - \alpha}) \tilde{Q}$   
d'où  $\tilde{P}(\alpha) = (\overline{\alpha - \alpha}) \tilde{Q}(\alpha) = 0$   
donc  $\alpha$  est racine de  $P$ .

$\boxed{\text{conclusion}}$   $\alpha$  est une racine de  $P$  dans  $\mathbb{K}$  si, et seulement si, le polynôme  $X - \alpha$  divise  $P$  ■

---

**Définition/Propriétés III.2.3 (Propriété sur le nombre de racines)**

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

- Si  $P = 0_{\mathbb{K}[X]}$  alors  $P$  a une infinité de racines dans  $\mathbb{K}$ .
- Si  $P \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$  alors  $P$  a au plus  $\deg(P)$  racines dans  $\mathbb{K}$ .

Remarque :

Le polynôme  $P$  est entièrement déterminé par la fonction polynomiale  $\tilde{P}$  associée. En effet si,  $\tilde{P} = \tilde{Q}$  alors  $\tilde{P} - \tilde{Q} = 0_{\mathbb{K}[X]}$  donc  $P - Q$  a une infinité de racines et par conséquent  $P - Q = 0_{\mathbb{K}[X]}$  puis  $P = Q$

---

*Démonstration*

On note  $n = \deg(P)$ .

Supposons que  $P$  a strictement plus de  $n$  racines distinctes dans ce cas il existe  $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1})$  qui sont racines de  $P$ , alors par propriété :

$$Q = \prod_{k=1}^{n+1} (X - \alpha_k) \text{ divise } P$$

donc  $\deg(Q) \leq \deg(P)$  i.e.  $n + 1 \leq n$  ce qui est faux. ■

---

**Définition/Propriétés III.2.4 (Multiplicité d'une racine)**

Soit  $P$  un polynôme de  $\mathbb{K}[X]$ ,  $\alpha \in \mathbb{K}$  et  $m \in \mathbb{N}$ .

On dit que  $\alpha$  est racine de multiplicité  $m$  dans  $P$  si 
$$\begin{cases} (X - \alpha)^m \text{ divise } P \\ (X - \alpha)^{m+1} \text{ divise } P \end{cases}$$

autrement dit s'il existe  $Q \in \mathbb{K}[X]$  tel que :

$$P = (X - \alpha)^m Q \text{ avec } Q(\alpha) \neq 0$$

**Remarques**

- Dire que  $\alpha$  est de multiplicité 0 dans  $P$  signifie que  $\alpha$  n'est pas racine de  $P$ .
- Une racine de  $P$  est dite simple (resp. double, triple,...) si sa multiplicité est 1 (resp. 2,3,...)

### III.3 Polynômes scindés

---

**Définition III.3.1**

Un polynôme de  $\mathbb{K}[X]$  est dit scindé sur  $\mathbb{K}$  s'il peut s'écrire comme produit de polynômes de  $\mathbb{K}[X]$  de degré 1 (non nécessairement distincts).

---

**Définition/Propriétés III.3.2 (Propriété sur le degré)**

Soit  $P$  un polynôme non constant de  $\mathbb{K}[X]$ .

Si  $P$  est scindé sur  $\mathbb{K}$  alors le degré de  $P$  est égal à la somme des multiplicités de ses racines dans  $\mathbb{K}$ .

---

**Définition/Propriétés III.3.3 (Divisibilité par un produit de polynômes distincts de degré 1)**

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  ayant  $r$  racines distinctes  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  avec  $r \in \mathbb{N}^*$

Alors 
$$\prod_{k=1}^r (X - \alpha_k) \text{ divise } P$$

---

*Démonstration*

Montrons cette propriété par récurrence.

- Pour  $r = 1$  la propriété est vérifiée

- Soit  $r \in \mathbb{N}^*$  tel que, Pour tout  $P$  de  $\mathbb{K}[X]$  ayant  $r$  racines distinctes  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  on a  $\prod_{k=1}^r (X - \alpha_k) \mid P$

Soit  $P$  un polynôme de  $\mathbb{K}[X]$  ayant  $r+1$  racines distinctes  $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}$ . Par hypothèse de récurrence,  $\prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)$  divise  $P$  donc il existe un polynôme  $Q$  de  $K[X]$  tel que  $P =$

$$Q \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)$$

. Comme  $\alpha_{r+1}$  est racine de  $P$ , en évaluant ces polynômes en  $\alpha_{r+1}$ , on trouve  $0 = Q(\alpha_{r+1}) \prod_{k=1}^r (\alpha_{r+1} - \alpha_k)$

donc  $Q(\alpha_{r+1}) = 0$  puisque les  $\alpha_k$  sont deux à deux distincts.

Ainsi,  $Q$  a pour racine  $\alpha_{r+1}$  donc, par propriété,  $(X - \alpha_{r+1})$  divise  $Q$  i. e. il existe un polynôme

$S$  tel que  $Q = (X - \alpha_{r+1})S$  ce qui donne  $P = S \prod_{k=1}^{r+1} (X - \alpha_k)$  La propriété est donc vraie au rang  $r+1$ .

conclusion Si  $P \in \mathbb{K}[X]$  a  $r$  racines distinctes  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  avec  $r \in \mathbb{N}^*$  alors  $\prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)$  divise  $P$  ■

## IV Polynômes dérivés

### IV.1 Dérivée formelle d'un polynôme

#### Définition IV.1.1

Soit  $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$  un polynôme  $P$  noté  $P'$  défini par

$$P' = \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k X^{k-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1) a_{k+1} X^k$$

#### Définition/Propriétés IV.1.2 (Degré du polynôme dérivé)

Si  $P$  est un polynôme de  $\mathbb{K}[X]$  alors  $\begin{cases} \deg(P') = \deg(P) - 1 & \text{si } \deg(P) \geq 1 \\ P' = 0_{\mathbb{K}[X]} & \text{sinon} \end{cases}$

**Définition/Propriétés IV.1.3 (Lien avec la dérivée de la fonction polynomiale associée)**  
 Dans le cas particulier où  $P$  est un polynôme à coefficients réels, on a  $\tilde{P}' = \left(\tilde{P}\right)'$

---

**Définition/Propriétés IV.1.4 (Opération sur les polynômes dérivés)**

Soit  $P$  et  $Q$  deux polynômes de  $\mathbb{K}[X]$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$

Alors :

$$(\lambda P)' = \lambda P' \quad (P + Q)' = P' + Q' \quad (P \times Q)' = P' \times Q + P \times Q' \quad (P \circ Q)' = Q' (P' \circ Q)$$

## IV.2 Polynômes dérivés successifs

---

**Définition IV.2.1**

Soit  $P$  un polynôme de  $\mathbb{K}[X]$ .

On pose  $P^{(0)} = P$  et, pour  $k \in \mathbb{N}$ ,  $P^{(k+1)} = (P^{(k)})'$  appelé polynôme dérivé formel de  $P$  d'ordre  $k+1$

---

**Définition/Propriétés IV.2.2 (Degré des polynômes dérivés successifs)**

Si  $P$  est un polynôme de  $\mathbb{K}[X]$  et  $n$  un entier naturel alors 
$$\begin{cases} \deg(P^{(n)}) = \deg(P) - n & \text{si } \deg(P) \geq n \\ P^{(n)} = 0_{\mathbb{K}[X]} & \text{sinon} \end{cases}$$

---

**Définition/Propriétés IV.2.3 (Opérations sur les polynômes dérivés successifs)**

Soit  $P$  et  $Q$  deux polynômes de  $\mathbb{K}[X]$ ,  $\lambda \in \mathbb{K}$  et  $n \in \mathbb{N}$

Alors :

$$\begin{aligned} (\lambda P)^{(n)} &= \lambda P^{(n)} \\ (P + Q)^{(n)} &= P^{(n)} + Q^{(n)} \\ (P \times Q)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} \times Q^{(n-k)} = \binom{n}{k} P^{(n-k)} \times Q^{(k)} \quad \text{formule de Leibniz} \end{aligned}$$

---

**Définition/Propriétés IV.2.4 (Formule de Taylor polynomiale)**

Pour tout polynôme de  $P$  de  $\mathbb{K}[X]$  et tout  $\alpha$  dans  $\mathbb{K}$ , on a :

$$P = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

Remarque

On en déduit que, pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , le coefficient de degré  $k$  de  $P$  est  $a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$



---

### Démonstration

- Préliminaire :

Soit  $Q \in \mathbb{K}[X]$

Montrons que :  $Q = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{Q^{(k)}(0)}{k!} (X)^k$

Soit  $Q = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i X^i$

alors  $Q^{(k)} = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i (X^i)^{(k)}$  avec  $(X^i)^{(k)} = 0_{\mathbb{K}[X]}$  si  $k > i$

donc

$$\begin{aligned} Q^{(k)}(0) &= \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{Q^{(k)}(0)}{k!} (X)_i^a \frac{i!}{(i-k)!} X^{i-k} \\ &= a_k \frac{k!}{0!} + \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{Q^{(k)}(0)}{k!} (X)_i^a \frac{i!}{(i-k)!} X^{i-k} \\ &= a_k \frac{k!}{0!} \text{ Car en } 0 X^{i-k} = 0 \end{aligned}$$

donc  $a_k = \frac{Q^{(k)}(0)}{k!}$  ainsi on conclut que :  $Q = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{Q^{(k)}(0)}{k!} (X)^k$

- Preuve en  $\alpha$

On applique le préliminaire à  $Q = P \circ (X + \alpha)$

alors  $Q' = (P' \circ (X + \alpha)) (X + \alpha)' = P' \circ (X + \alpha)$  donc  $Q'(0) = P'(\alpha)$

et par récurrence immédiate  $Q^{(k)} = P^{(k)} \circ (X - \alpha)$  donc  $Q^{(k)}(0) = P^{(k)}(\alpha)$

Ainsi avec le préliminaire on sait :  $P \circ (X - \alpha) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X)^k$

d'où  $P \circ (X - \alpha) \circ (X + \alpha) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$

conclusion

 $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall \alpha \in \mathbb{K}, P = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$

■

---

### Définition/Propriétés IV.2.5 (Caractérisation de la multiplicité d'une racine par les polynômes)

Soit  $P$  un polynôme de  $\mathbb{K}[X]$ ,  $\alpha \in \mathbb{K}$  et  $m \in \mathbb{N}^*$ .

$\alpha$  est racine de multiplicité  $m$  dans  $P$  si, et seulement si,  $\begin{cases} P^{(k)}(\alpha) = 0 & \text{pour tout } k \in \llbracket 0 ; m-1 \rrbracket \\ P^{(m)}(\alpha) \neq 0 \end{cases}$

Remarque On en déduit que si  $\alpha$  est de multiplicité  $m$  non nulle dans  $P$  alors  $\alpha$  est de multiplicité  $m-1$  dans  $P'$ .

---

### Démonstration

Par la formule de Taylor polynomiale en  $\alpha$  on a :

$$P = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{P^k(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k + (X - \alpha)^m \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{P^k(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

$$i.e. P = (X - \alpha)^m Q + R \text{ avec } \begin{cases} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{P^k(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k = R \text{ et } \deg(R) < \deg((X - \alpha)^m) \\ \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{P^k(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k = Q \end{cases} \quad \text{On en déduit}$$

que :

$$\alpha \text{ est racine de multiplicité au moins } m \iff (X - \alpha)^m \mid P$$

$$\iff \sum_{k=0}^{m-1} \frac{P^k(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k = 0_{\mathbb{K}[X]}$$

$$\iff \forall k \llbracket 1 ; m - 1 \rrbracket P^{(k)}(\alpha) = 0$$

$$\boxed{\text{conclusion}} \alpha \text{ est racine de multiplicité } m \text{ dans } P \text{ si, et seulement si, } \begin{cases} P^{(k)}(\alpha) = 0 & \text{pour tout } k \in \llbracket 0 ; m - 1 \rrbracket \\ P^{(m)}(\alpha) \neq 0 \end{cases}$$

## V Trois classiques incontournables

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

### V.1 Méthode de Horner pour l'évaluation polynomiale

---

#### Définition/Propriétés V.1.1

L'évaluation en  $\alpha \in \mathbb{K}$  du polynôme de degré  $n$ ,  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  de  $\mathbb{K}[X]$ , peut se faire ainsi :

$$P(\alpha) = a_0 + \alpha (a_1 + \alpha (a_2 + \cdots + \alpha (a_{n-1} + \alpha a_n)))$$

Cet algorithme dit "schéma de Horner" a une complexité linéaire (en version itérative ou récursive) alors que la méthode naïve d'évaluation a une complexité quadratique.

## V.2 Formule d'interpolation de Lagrange

### Définition/Propriétés V.2.1

Soit  $(x_1, \dots, x_n)$  une famille de  $n$  éléments de  $\mathbb{K}$  deux à deux distincts.

Soit  $(y_1, \dots, y_n)$  une famille de  $n$  éléments de  $\mathbb{K}$ .

Il existe un unique polynôme  $P$  de  $K_{n-1}[X]$  tel que :  $\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, P(x_j) = y_j$ . Ce polynôme, dit polynôme interpolateur de Lagrange, est donné par :

$$p = y_1 L_1 + \dots y_n L_n \quad \text{avec} \quad \forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, L_i = \frac{\prod_{k=1, k \neq i}^n (X - x_k)}{\prod_{k=1, k \neq i}^n (x_i - x_k)}$$

Remarque :

- $\forall (i, i) \in (\llbracket 1 ; n \rrbracket)^2, L_i(x_j) = \delta_{ij}$
- Plus généralement les polynômes  $Q$  de  $\mathbb{K}[X]$  tels que  $\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, Q(x_j) = y_j$  sont les polynômes.

$$Q = P + \left( \prod_{k=1}^n (X - x_k) \right) S$$

où  $P$  est le polynôme interpolateur de Lagrange et  $S$  un polynôme quelconque de  $\mathbb{K}[X]$ .

### Démonstration

Soit  $(x_1, \dots, x_n)$  une famille de  $n$  éléments de  $\mathbb{K}$  deux à deux distincts et  $(y_1, \dots, y_n)$  une famille de  $n$  éléments de  $\mathbb{K}$ .

- unicité

On suppose qu'il existe deux polynômes  $P$  et  $Q$  de  $K_{n-1}[X]$  tels que :  $\forall j \in \llbracket 1 ; N \rrbracket, P(x_j) = Q(x_j) = y_j$

Alors :  $\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, (P - Q)(x_j) = 0$  donc le polynôme  $P - Q$  a  $n$  racines distinctes.

Comme  $P - Q$  appartient à  $K_{n-1}[X]$ , on en déduit que  $P - Q = 0_{\mathbb{K}[X]}$  puis que  $P = Q$ .

- existence

On exhibe ici un polynôme qui convient.

$$\text{Pour cela, on pose, pour tout } i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, L_i = \frac{\prod_{k=1, k \neq i}^n (X - x_k)}{\prod_{k=1, k \neq i}^n (x_i - x_k)}$$

Soit  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$

Comme produit de  $n - 1$  polynômes de degré 1,  $L_i$  est un polynôme de degré  $n - 1$  donc a fortiori  $L_i$  appartient à  $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ . De plus,  $L_i(x_i) = 1$  et  $L_i(x_j) = 0$  si  $i \neq j$  autrement dit  $L_i(x_j) = \delta_{i,j}$ .

Ainsi,  $P = \sum_{i=1}^n y_i L_i$  est un polynôme de  $\mathbb{K}_{n-1}[X]$  qui vérifie  $\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, P(x_j) = \sum_{i=1}^n y_i L_i(x_j) = y_j$ .

conclusion il existe un unique polynôme  $P$  de  $\mathbb{K}_{n-1}[X]$  tel que :  $\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, P(x_j) = y_j$ . ■

### V.3 Relations entre coefficients et racines (formules de Viète)

#### Définition/Propriétés V.3.1

Si  $P$  est un polynôme de  $\mathbb{K}[X]$  de degré  $n$ , scindé sur  $\mathbb{K}$  de racines  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  (répétées avec multiplicité)

alors, en notant  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ , on a :

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \sigma_i = (-1)^i \frac{a_{n-i}}{a_n} \quad \text{avec} \quad \sigma_i = \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_i \leq n} \alpha_{k_1} \alpha_{k_2} \dots \alpha_{k_i}$$

Remarque :

Les formules concernant la somme  $\sigma_1$  et le produit des racines  $\sigma_n$  sont à connaître par coeur :

$$\sigma_1 = \sum_{k=1}^n \alpha_k = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \quad \text{et} \quad \sigma_n = \prod_{k=1}^n \alpha_k = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

Les autres sont à savoir retrouver rapidement.

#### Démonstration

Par hypothèse sur  $P$ , on peut écrire

$$P = a_n (X - \alpha_1) (X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_n)$$

ce qui donne après calculs dans l'anneau commutatif  $\mathbb{K}[X]$

$$P = a_n \left( X^n - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) X^{n-1} + (\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1} \alpha_n) X^{n-2} + \dots + (-1)^n \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \right)$$

ou plus précisément

$$P = a_n \left( X^n - \sigma_1 X^{n-1} + \sigma_2 X^{n-2} \right) + \dots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1} X + (-1)^n \sigma_n$$

avec

$$\sigma_i = \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_i \leq n} \alpha_{k_1} \alpha_{k_2} \dots \alpha_{k_i}$$

Par ailleurs,  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  donc, comme deux polynômes sont égaux si, et seulement si, leurs coefficients de même degré sont égaux, on trouve :

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, (-1)^i \sigma_i a_n = a_{n-i}$$

et donc

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \sigma_i = (-1)^i \frac{a_{n-i}}{a_n}$$

■

# Chapitre 19

## Analyse Asymptotique (1)

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Relations de comparaison pour les fonctions . . . . .</b>	<b>211</b>
I.1	Définition . . . . .	211
I.2	Caractérisations pratiques . . . . .	212
I.3	Lien entre les relations de comparaison . . . . .	213
I.4	Traduction des croissances comparées à l'aide des " $o$ " . . . . .	213
I.5	Obtention et utilisation des équivalents . . . . .	213
I.6	Règles usuelles de manipulation des relations de comparaison . . . . .	214
<b>II</b>	<b>Développements limités . . . . .</b>	<b>214</b>
II.1	Généralités . . . . .	214
II.2	Premiers résultats importants . . . . .	216
II.3	Opérations sur les développements limités . . . . .	217
II.4	Primitivation d'un développement limité . . . . .	218
II.5	Développements limités usuels . . . . .	220
II.6	Application des développements limités à l'étude locale d'une fonction . . . . .	221

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne le corps  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  et  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ , non vide et non réduit à un point.

## I Relations de comparaison pour les fonctions

### I.1 Définition

---

#### Définition/Propriétés I.1.1 (Domination)

On dit que  $f$  est dominée par  $g$  au voisinage de  $a$  s'il existe un voisinage  $V_a$  de  $a$  et une fonction  $M : I \cap V_a \rightarrow \mathbb{K}$  bornée tel que

$$\forall x \in I \cap V_a, f(x) = M(x)g(x)$$

On note alors  $f(x) = o(g(x))$  ou  $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ .

---

**Définition/Propriétés I.1.2 (Négligeabilité)**

On dit que  $f$  est négligeable devant  $g$  au voisinage de  $a$  s'il existe un voisinage  $V_a$  de  $a$  et une fonction  $\varepsilon : I \cap V_a \rightarrow \mathbb{K}$  de limite nulle en  $a$  tel que

$$\forall x \in I \cap V_a, f(x) = \varepsilon(x)g(x)$$

On note alors  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$  ou  $f \underset{a}{=} o(g)$ .

---

**Définition/Propriétés I.1.3 (Equivalence)**

On dit que  $f$  est équivalente à  $g$  au voisinage de  $a$  s'il existe un voisinage  $V_a$  de  $a$  et une fonction  $u : I \cap V_a \rightarrow \mathbb{K}$  de limite égale à 1 en  $a$  tel que

$$\forall x \in I \cap V_a, f(x) = u(x)g(x)$$

On note alors  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$  ou  $f \underset{a}{\sim} g$ .

## I.2 Caractérisations pratiques

---

**Définition/Propriétés I.2.1**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  et  $g : I \rightarrow \mathbb{K}$  deux fonctions et  $a \in \mathbb{R}$  tel que  $a$  est point ou extrémité de  $I$ . Dans le cas où  $g$  ne s'annule pas au voisinage de  $a$ , on a les équivalences suivantes :

- (1)  $f \underset{a}{=} o(g)$  si, et seulement si, la fonction  $\frac{f}{g}$  est bornée au voisinage de  $a$ .
- (2)  $f \underset{a}{=} o(g)$  si, et seulement si, la fonction  $\frac{f}{g}$  a pour limite 0 en  $a$ .
- (3)  $f \underset{a}{\sim} g$  si, et seulement si, la fonction  $\frac{f}{g}$  a pour limite 1 en  $a$ .

Remarques

- En pratique, ce sont ces caractérisations qui seront utilisées plutôt que les définitions.
- L'étude locale de  $f$  au voisinage de  $a \in \mathbb{R}$  se ramène à l'étude de la fonction  $f(a+h)$  pour  $h \rightarrow 0$ .
- Les équivalences précédentes sont encore valables dans le cas où  $f$  et  $g$  s'annulent en  $a$  avec  $g$  qui ne s'annule pas sur un voisinage de  $a$  privé de  $a$ .

## I.3 Lien entre les relations de comparaison

---

### Définition/Propriétés I.3.1

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  et  $g : I \longrightarrow \mathbb{K}$  deux fonctions et  $a \in \mathbb{R}$  tel que  $a$  est point ou extrémité de  $I$ . Alors, on a :

- (1)  $f \underset{a}{=} o(g) \implies f \underset{a}{=} o(g)$
- (2)  $f \underset{a}{\sim} g \implies f \underset{a}{=} o(g)$
- (3)  $f \underset{a}{\sim} g \iff f \underset{a}{=} g + o(g).$

## I.4 Traduction des croissances comparées à l'aide des "o"

---

### Définition/Propriétés I.4.1 (Au voisinage de $+\infty$ )

Pour tous réels strictement positifs  $\alpha, \beta$  et  $\gamma$ , on a :

- $(\ln(x))^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\alpha);$
- $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\gamma x});$
- $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta)$  dans le cas  $\alpha < \beta$

---

### Définition/Propriétés I.4.2 (Au voisinage de 0)

Pour tous réels strictement positifs  $\alpha$  et  $\beta$ , on a :

- (1)  $|\ln(x)|^\beta \underset{x \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)$
- (2)  $x^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^\beta)$  dans le cas  $\alpha > \beta$ .

## I.5 Obtention et utilisation des équivalents

---

### Définition/Propriétés I.5.1 (Obtention d'un équivalent par encadrement)

Si  $f, g$  et  $h$  sont à valeurs réelles et vérifient  $g \leq f \leq h$  au voisinage de  $a$  avec  $g \underset{a}{\sim} h$  alors  $f \underset{a}{\sim} h$ .

---

### Définition/Propriétés I.5.2

- Si  $f \underset{a}{\sim} g$  alors  $f$  et  $g$  ont même "comportement" au voisinage de  $a$ , c'est-à-dire que :
  - $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  si, et seulement si,  $g$  a pour limite  $\ell$  en  $a$ .
  - $f$  n'a pas de limite en  $a$  si, et seulement si,  $g$  n'a pas de limite en  $a$ .
- Si  $f \underset{a}{\sim} g$  alors  $f$  et  $g$  ont le même signe au voisinage de  $a$ .

## I.6 Règles usuelles de manipulation des relations de comparaison

---

### Définition/Propriétés I.6.1 (Cas des $O$ (et des $o$ ))

- (1) Si  $f \underset{a}{=} O(g)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}^*$  alors  $f \underset{a}{=} O(\lambda g)$  et  $\lambda f \underset{a}{=} O(g)$ .
- (2) Si  $f \underset{a}{=} O(g)$  et  $g \underset{a}{=} O(h)$  alors  $f \underset{a}{=} O(h)$ .
- (3) Si  $f \underset{a}{=} O(g)$  et  $h \underset{a}{=} O(g)$  alors  $f + h \underset{a}{=} O(g)$ .
- (4) Si  $f \underset{a}{=} O(g)$  alors  $fh \underset{a}{=} O(gh)$ .
- (5) Si  $f \underset{a}{=} O(g)$  et  $i \underset{a}{=} O(h)$  alors  $fi \underset{a}{=} O(gh)$ .
- (6) Si  $f \underset{a}{=} O(g)$  et  $\lim_b h = a$  alors  $f \circ h \underset{b}{=} O(g \circ h)$ .

### Remarques

- Dans tout ce qui précède, on peut remplacer  $O$  par  $o$ .
- JAMAIS de "composition des  $O$  (ou des  $o$ ) à gauche" sans preuve directe

---

### Définition/Propriétés I.6.2 (Cas des équivalents)

- (1) Si  $f \underset{a}{\sim} g$  alors  $g \underset{a}{\sim} f$ .
- (2) Si  $f \underset{a}{\sim} g$  et  $g \underset{a}{\sim} h$  alors  $f \underset{a}{\sim} h$ .
- (3) Si  $f \underset{a}{=} O(g)$  et  $g \underset{a}{\sim} h$  alors  $f \underset{a}{=} O(h)$ .
- (4) Si  $f \underset{a}{=} o(g)$  et  $g \underset{a}{\sim} h$  alors  $f \underset{a}{=} o(h)$ .
- (5) Si  $f \underset{a}{\sim} g$  alors  $fh \underset{a}{\sim} gh$ .
- (6) Si  $f \underset{a}{\sim} g$  et  $i \underset{a}{\sim} h$  alors  $fi \underset{a}{\sim} gh$ .
- (7) Si  $f \underset{a}{\sim} g$  avec  $f$  et  $g$  strictement positives au voisinage de  $a$  alors, pour tout réel  $\beta$ ,  $f^\beta \underset{a}{\sim} g^\beta$ .
- (8) Si  $f \underset{a}{\sim} g$  avec  $f$  et  $g$  ne s'annulant pas au voisinage de  $a$  alors  $\frac{1}{f} \underset{a}{\sim} \frac{1}{g}$ .
- (9) Si  $f \underset{a}{\sim} g$  et  $\lim_b h = a$  alors  $f \circ h \underset{b}{\sim} g \circ h$ .

JAMAIS de "composition à gauche" ni de somme d'équivalents sans preuve directe.

## II Développements limités

### II.1 Généralités

Dans cette partie,  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  est une fonction et  $a$  un RÉEL, point ou extrémité de  $I$ .



---

**Définition II.1.1**

On dit que  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n \in \mathbb{N}$  en  $a$  (abrégé en  $DL_n(a)$ ) s'il existe des éléments  $b_0, \dots, b_n$  de  $\mathbb{K}$  tels que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} b_0 + b_1(x-a) + \dots + b_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

Remarque

En pratique, on se ramènera à la recherche d'un développement limité pour  $h \mapsto f(a+h)$  en 0.

---

**Définition/Propriétés II.1.2 (Exemple important déjà vu)**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x \mapsto \frac{1}{1-x}$  admet un  $DL_n(0)$  qui est :  $\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$ .

---

**Définition/Propriétés II.1.3 (Unicité d'un développement limité)**

S'il existe des éléments  $b_0, \dots, b_n$  de  $\mathbb{K}$  tels que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} b_0 + b_1(x-a) + \dots + b_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

alors ces éléments sont uniques.

- Ces éléments  $b_0, \dots, b_n$  sont appelés coefficients du  $DL_n(a)$  de  $f$ .
- La fonction polynomiale  $x \mapsto b_0 + \dots + b_n(x-a)^n$  est dite partie régulière du  $DL_n(a)$  de  $f$ .

---

*Démonstration*

On raisonne par l'absurde.

Supposons qu'il existe  $(b_0, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$  et  $(c_0, \dots, c_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$  avec  $(b_0, \dots, b_n) \neq (c_0, \dots, c_n)$  tel que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} b_0 + b_1(x-a) + \dots + b_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} c_0 + c_1(x-a) + \dots + c_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

On note  $p$  le plus petit entier de  $\llbracket 0 ; n \rrbracket$  tel que  $b_p \neq c_p$ .

Puisque  $b_k = c_k$  pour tout  $k \in \llbracket 0 ; p-1 \rrbracket$ , on a alors :

$$b_p(x-a)^p + \dots + b_n(x-a)^n + o((x-a)^n) \underset{x \rightarrow a}{=} c_p(x-a)^p + \dots + c_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

Après division par  $(x-a)^p$  sur un voisinage de  $a$  privé de  $a$ , on trouve :

$$b_p + \dots + b_n(x-a)^{n-p} + o((x-a)^{n-p}) = c_p + \dots + c_n(x-a)^{n-p} + o((x-a)^{n-p})$$

Par passage à la limite en  $a$  dans cette égalité, on obtient

$$b_p = c_p$$

ce qui est faux par hypothèse sur  $b_p$  et  $c_p$ .

On en déduit que l'hypothèse initiale est fautive ce qui permet de conclure.

conclusion si  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n$  au voisinage de  $a$  alors il est unique. ■

---

**Définition/Propriétés II.1.4 (Troncature d'un développement limité)**

Si  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n \in \mathbb{N}$  en  $a$  qui s'écrit  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n b_k(x-a)^k + o((x-a)^n)$  alors  $f$  admet un développement limité à tout ordre  $m \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$  obtenu par troncature du  $DL_n(a)$  :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^m b_k(x-a)^k + o((x-a)^m)$$

## II.2 Premiers résultats importants

---

**Définition/Propriétés II.2.1 (Développement limité et équivalent)**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction et  $a$  un RÉEL, point ou extrémité de  $I$ .

Si  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n \in \mathbb{N}$  en  $a$  qui s'écrit  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=p}^n b_k(x-a)^k + o((x-a)^n)$

avec  $p \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$  et  $b_p \neq 0$  alors  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} b_p(x-a)^p$ .

---

**Définition/Propriétés II.2.2 (Cas des fonctions paires ou impaires)**

On suppose ici que  $I$  est centré en 0. Si  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  admet un développement limité à l'ordre  $n \in \mathbb{N}$  en 0 et que

- (1)  $f$  est paire alors la partie régulière de son  $DL_n(0)$  ne comporte que des monômes pairs.
- (2)  $f$  est impaire alors la partie régulière de son  $DL_n(0)$  ne comporte que des monômes impairs.

---

*Démonstration*

On se place dans le cas où  $f$  est paire (preuve facile à adapter pour  $f$  impaire) et où  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n \in \mathbb{N}$  en 0.

Alors, il existe  $(b_0, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$  tel que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n b_k x^k + o(x^n)$$

Par composition à droite par la fonction  $h : x \mapsto -x$ , on trouve :

$$f(-x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n b_k (-x)^k + o(x^n)$$

donc

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n (-1)^k b_k x^k + o(x^n)$$

car  $f$  est paire.

Par unicité d'écriture du développement limité à l'ordre  $n \in \mathbb{N}$  de  $f$  en 0, on en déduit :

$$\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, b_k = (-1)^k b_k$$

ce qui donne, pour tous les  $k$  impairs,  $b_k = -b_k$  donc  $b_k = 0$ . Les coefficients de tous les monômes impairs dans le développement limité de  $f$  en 0 sont donc nuls.

conclusion la partie régulière du  $\mathcal{DL}_n(0)$  de  $f$  ne comporte que des monômes pairs. ■

### Définition/Propriétés II.2.3 (Caractérisation de la continuité et la dérivabilité avec un dévelop

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  une fonction et  $a$  un RÉEL appartenant à  $I$ .

- (1)  $f$  est continue en  $a$  si, et seulement si,  $f$  admet un développement limité à l'ordre 0 en  $a$ .

Dans ce cas, on a :  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + o(1)$ .

- (2)  $f$  est dérivable en  $a$  si, et seulement si,  $f$  admet un développement limité à l'ordre 1 en  $a$ .

Dans ce cas, on a :  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + f'(a)(x - a) + o((x - a))$ .

ATTENTION Ce résultat n'est pas généralisable. Ainsi, la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  si  $x \neq 0$  et  $f(0) = 0$  admet un  $DL_2(0)$  qui est  $f(x) = o(x^2)$  mais n'est pas deux fois dérivable en 0.

## II.3 Opérations sur les développements limités

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  et  $g : I \longrightarrow \mathbb{K}$  des fonctions et  $a$  un RÉEL tel que  $a$  est point ou extrémité de  $I$ .

### Définition/Propriétés II.3.1 (Combinaison linéaire)

Si  $f$  et  $g$  admettent des  $DL_n(a)$  et  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$  alors la fonction  $\lambda f + \mu g$  admet un  $DL_n(a)$  dont la partie régulière est obtenue par combinaison linéaire des parties régulières des  $DL_n(a)$  de  $f$  et  $g$ .

### Définition/Propriétés II.3.2 (Produit)

Si  $f$  et  $g$  admettent des  $DL_n(a)$  alors la fonction  $fg$  admet un  $DL_n(a)$  dont la partie régulière peut s'obtenir par troncature à l'ordre  $n$  du produit des parties régulières des  $DL_n(a)$  de  $f$  et  $g$ .

Remarque

En pratique, la mise en facteur des termes prépondérants dans  $f(x)$  et  $g(x)$  permet de prévoir l'ordre des développements limités à utiliser pour obtenir la précision souhaitée pour le  $DL$  de  $fg$ .

---

**Définition/Propriétés II.3.3 (Inverse/quotient)**

Si  $f$  admet un  $DL_n(a)$  et que  $\lim_a f = 0$  alors la fonction  $\frac{1}{1-f}$  admet un  $DL_n(a)$  qui peut s'obtenir par troncature à l'ordre  $n$  de la composée à droite de la partie régulière du  $DL_n(0)$  de  $x \mapsto \frac{1}{1-x}$  par la partie régulière du  $DL_n(a)$  de  $f$ . Remarques

- Cette propriété, combinée à celle vue sur le produit, permet d'obtenir des développements limités pour des quotients de fonctions. Là encore, la mise en facteur des termes prépondérants au numérateur et au dénominateur est un préalable à tout calcul.
- Aucun résultat général sur la composition de développements limités n'est au programme.

## II.4 Primitivation d'un développement limité

---

**Théorème II.4.1**

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  une fonction et  $a$  un RÉEL appartenant à  $I$ .

Si  $f$  est dérivable sur  $I$  et si  $f'$  admet un développement limité d'ordre  $n \in \mathbb{N}$  en  $a$  de la forme

$$f'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} c_0 + c_1(x-a) + \cdots + c_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

alors  $f$  admet un développement limité d'ordre  $n+1$  en  $a$  qui est

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \frac{c_0}{1}(x-a) + \frac{c_1}{2}(x-a)^2 + \cdots + \frac{c_n}{n+1}(x-a)^{n+1} + o(x-a)^{n+1}$$

---

*Démonstration*

Preuve dans le cas où  $f$  est à valeurs dans  $\mathbb{R}$

Montrons que  $g(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^{n+1})$  avec la fonction  $g: x \mapsto f(x) - f(a) - \sum_{k=0}^n c_k \frac{(x-a)^{k+1}}{k+1}$

D'après les théorèmes généraux,  $g$  est dérivable sur  $I$  de dérivée  $g' : x \mapsto f'(x) - \sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k$ .

D'après l'hypothèse faite sur  $f'$ , on a donc  $g'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^n)$ .

- Soit  $x \in I \cap ]a; +\infty[$ . Alors  $g$  est continue sur le segment  $[a; x]$ , dérivable sur  $]a; x[$  et à valeurs réelles. D'après l'égalité des accroissements finis, il existe donc  $c_x \in ]a; x[$  tel que  $\frac{g(x) - g(a)}{x-a} = g'(c_x)$ .
- On peut faire de même avec  $x \in I \cap ]-\infty; a[$  en travaillant sur  $[x; a]$  et  $]x; a[$ .

Ainsi, pour tout  $x \in I \setminus \{a\}$ , il existe  $c_x \in I \setminus \{a\}$  tel que  $\frac{g(x) - g(a)}{x-a} = g'(c_x)$  avec  $|c_x - a| \leq |x - a|$ .

On a donc  $c_x \xrightarrow{x \rightarrow a} a$  (par théorème d'encadrement) et on peut écrire :

$$\frac{g(x) - g(a)}{(x-a)^{n+1}} = \frac{g(x) - g(a)}{x-a} \times \frac{1}{(x-a)^n} = \frac{g'(c_x)}{(x-a)^n} = \frac{g'(c_x)}{(c_x-a)^n} \times \frac{(c_x-a)^n}{(x-a)^n}$$

avec :

- $\frac{g'(c_x)}{(c_x - a)^n} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$  par composition de limites, car  $c_x \xrightarrow{x \rightarrow a} a$  et  $\frac{g'(t)}{(t - a)^n} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$
- $x \mapsto \left| \frac{(c_x - a)^n}{(x - a)^n} \right|$  bornée (par 1) sur voisinage de  $a$  privé de  $a$ .

Ainsi  $\frac{g(x) - g(a)}{(x - a)^{n+1}} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$  donc  $g(x) - g(a) = o((x - a)^{n+1})$  puis  $g(x) = o((x - a)^{n+1})$  car  $g(a) = 0$ .

En revenant à la définition de  $g$ , cela donne  $f(x) - f(a) - \sum_{k=0}^n c_k \frac{(x - a)^{k+1}}{k + 1} \xrightarrow{x \rightarrow a} o((x - a)^{n+1})$  ce qui permet de conclure.

$$\boxed{\text{conclusion}} \quad f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=0}^n c_k \frac{(x - a)^{k+1}}{k + 1} + o((x - a)^{n+1})$$

i.e. on peut toujours primitiver un DL terme à terme ■

### Définition/Propriétés II.4.2 (Un exemple important)

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , la fonction  $x \mapsto -\ln(1 - x)$  admet un  $DL_n(0)$  qui est :

$$-\ln(1 - x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{1}{n}x^n + o(x^n)$$

### Théorème II.4.3 ( Formule de Taylor-Young)

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction et  $a$  un RÉEL appartenant à  $I$ .

Si  $f$  est de classe  $C^n$  sur  $I$  alors  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n$  en  $a$  donné par :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \frac{f^{(1)}(a)}{1!}(x - a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + o((x - a)^n)$$

ce qui peut s'écrire encore

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + o((x - a)^n)$$

### Remarques

- Ce théorème donne une condition suffisante d'existence d'un DL à l'ordre  $n$  en  $a$  pour  $f$ .
- Ce n'est pas une condition nécessaire : cf. l'exemple de la fonction

$$f : x \mapsto \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

qui admet bien un DL à l'ordre 2 en 0 mais n'est pas de classe  $C^2$  sur  $\mathbb{R}$

---

### Démonstration

On peut procéder par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$  pour montrer la propriété suivante :

$$\forall f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K}), f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$$

- Initialisation :

On a déjà vu que :  $\forall f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}), f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + o(1)$  (par continuité de  $f$  en  $a$ ) donc la propriété est vraie au rang 0.

- Hérédité :

on suppose qu'il existe un entier  $n \in \mathbb{N}$  tel que la propriété soit vraie au rang  $n$ .

On considère une fonction  $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{K})$ .

On peut appliquer l'hypothèse de récurrence à  $f'$  car  $f'$  appartient à  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ . Cela donne :

$$f'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(f')^k(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

Par théorème de primitivation des développements limités, on en déduit que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} \frac{(x-a)^{k+1}}{k+1} + o((x-a)^{n+1})$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!} (x-a)^{k+1} + o((x-a)^{n+1})$$

ce qui donne après changement d'indice

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^{n+1}) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^{n+1})$$

La propriété est donc vraie au rang  $n+1$ .

conclusion : par principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout entier naturel  $n$  ■

## II.5 Développements limités usuels

---

### Définition/Propriétés II.5.1

Soit  $n \in \mathbb{N}$

$$(1) \exp(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$(2) \operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+1})$$

$$(3) \operatorname{ch}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n})$$

- (4)  $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+1})$
- (5)  $\operatorname{ch}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n})$
- (6)  $\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$
- (7)  $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + o(x^n)$
- (8)  $(1+x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(k-1))}{k!} x^k + o(x^n)$  pour tout  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$
- (9)  $\arctan(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+1})$
- (10)  $\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$

## II.6 Application des développements limités à l'étude locale d'une fonction

---

### Définition/Propriétés II.6.1 (Calcul d'équivalents ou de limites)

La connaissance de DL permet de déterminer des limites de manière rapide en cas d'indétermination.

---

### Définition/Propriétés II.6.2 (Position relative d'une courbe et de sa tangente)

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , à valeurs RÉELLES et  $a$  un REEL appartenant à  $I$ .

Si  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n \geq 2$  en  $a$  qui s'écrit

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} b_0 + b_1(x-a) + \dots + b_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

alors  $f$  est dérivable en  $a$  avec  $b_0 = f(a)$  et  $b_1 = f'(a)$  donc

$$f(x) - (f(a) + f'(a)(x-a)) \underset{x \rightarrow a}{=} b_2(x-a)^2 + \dots + b_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

Si de plus, il existe  $p \in \mathbb{N}$  tel que  $2 \leq p \leq n$  et  $b_p \neq 0$ , on obtient alors :

$$f(x) - (f(a) + f'(a)(x-a)) \underset{x \rightarrow a}{\sim} b_p(x-a)^p$$

Cela permet de connaître, au voisinage de  $a$ , le signe de  $f(x) - (f(a) + f'(a)(x-a))$  donc les positions relatives de la courbe de  $f$  et de sa tangente au point  $(a, f(a))$  dans un repère du plan.

---

**Définition/Propriétés II.6.3 (Condition nécessaire/suffisante d'existence d'un extremum local)**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , à valeurs RÉELLES et  $a$  un point de  $I$  mais pas extrémité de  $I$ .

- Si  $f$  a un extremum local en  $a$  avec  $f$  dérivable en  $a$  alors  $f'(a) = 0$  i.e.  $a$  est point critique de  $f$ .
- Si  $a$  est point critique de  $f$  et si  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n \geq 2$  en  $a$  qui s'écrit

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + b_p(x-a)^p + \cdots + b_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

avec  $p \in \mathbb{N}$  tel que  $2 \leq p \leq n$  et  $b_p \neq 0$  alors

$$f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{\sim} b_p(x-a)^p$$

$f(x) - f(a)$  est donc de signe constant localement au voisinage de  $a$  uniquement pour  $p$  pair. Dans ce cas,  $f$  admet un extremum local en  $a$  qui vaut  $f(a)$ .

---

**Définition/Propriétés II.6.4 (Détermination d'asymptotes)**

- Pour étudier une fonction  $f$  au voisinage de  $-\infty$  (ou  $+\infty$ ), on peut commencer par calculer un développement limité de la fonction  $g : t \mapsto f(1/t)$  en  $0^-$  (ou  $0^+$ ).
- En revenant à  $f$  avec  $f : x \mapsto g(1/x)$ , on obtient alors un développement asymptotique de  $f$  au voisinage de  $-\infty$  (ou  $+\infty$ ) qu'on peut utiliser pour déterminer d'éventuelles asymptotes à la courbe de  $f$  dans un repère.



# Chapitre 20

## Espaces Vectoriels

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Espaces vectoriels . . . . .</b>	<b>223</b>
I.1	Définition . . . . .	223
I.2	Propriétés immédiates (règles de calcul) . . . . .	224
I.3	Produit fini d'espaces vectoriels . . . . .	225
I.4	Espaces vectoriels de référence déjà rencontrés . . . . .	225
I.5	Combinaison linéaire d'une famille de vecteurs . . . . .	225
<b>II</b>	<b>Sous-espaces vectoriels . . . . .</b>	<b>226</b>
II.1	Définition . . . . .	226
II.2	Caractérisation . . . . .	226
II.3	Quelques exemples de sous-espaces vectoriels déjà rencontrés . . . . .	227
II.4	Intersection de sous-espaces vectoriels . . . . .	227
II.5	Sous-espace vectoriel engendré par une partie . . . . .	228
<b>III</b>	<b>Familles génératrices, libres ou bases d'un espace vectoriel . . . . .</b>	<b>229</b>
III.1	Famille (partie) génératrice . . . . .	229
III.2	Famille (partie) libre . . . . .	229
III.3	Famille (partie) liée . . . . .	230
III.4	Base . . . . .	230
<b>IV</b>	<b>Somme et somme directe de deux sous-espaces vectoriels . . . . .</b>	<b>231</b>
IV.1	Somme de deux sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel . . . . .	231
IV.2	Somme directe . . . . .	232
IV.3	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	232

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne le corps  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## I Espaces vectoriels

### I.1 Définition

---

#### Définition I.1.1

On appelle espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$  (ou  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel) tout ensemble  $E$  muni d'une loi de composition interne  $+$  et d'une loi de composition externe  $\cdot$ , telles que :

- $(E, +)$  est un groupe commutatif.
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in E^2, \lambda.(x + y) = \lambda.x + \lambda.y$
- $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, (\lambda + \mu).x = \lambda.x + \mu.x$
- $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, (\lambda\mu).x = \lambda.(\mu.x)$
- $\forall x \in E, 1.x = x$  avec 1 l'élément unité de  $\mathbb{K}$

Remarque

Les éléments d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel sont appelés vecteurs et ceux de  $\mathbb{K}$  sont appelés scalaires

## I.2 Propriétés immédiates (règles de calcul)

### Propriétés I.2.1

Si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel alors :

- (1)  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \lambda.x = 0_E \iff \lambda = 0 \text{ ou } x = 0_E$
- (2)  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, -(\lambda.x) = (-\lambda).x = \lambda.(-x)$

*Démonstration*

Montrons la première équivalence par double implication :

- $\boxed{\Leftarrow}$  Si  $\lambda = 0$  ou  $x = 0_E$   
 — Si  $\lambda = 0$  :

$$0.x = (0 + 0).x$$

$$0.x = 0.x + 0.x$$

$$0_E = 0.x$$

— Si  $x = 0_E$

$$\lambda.0_E = \lambda.(0_E + 0_E)$$

$$\lambda.0_E = \lambda.0_E + \lambda.0_E$$

$$0_E = \lambda.0_E$$

- Si  $\lambda.x = 0_E$   
 si  $\lambda = 0$  c'est fini donc on suppose  $\lambda \neq 0$  :

$$x = 1.x$$

$$x = \frac{\lambda}{\lambda}.x$$

$$x = \frac{1}{\lambda}.0_E$$

$$x = 0_E$$

$\boxed{\text{conclusion}}$   $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \lambda.x = 0_E \iff \lambda = 0 \text{ ou } x = 0_E$  ■

## I.3 Produit fini d'espaces vectoriels

---

### Définition/Propriétés I.3.1

Si  $E_1, E_2, \dots, E_n$  sont des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels alors le produit cartésien  $E = E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$  muni des lois  $+$  et  $\cdot$  définies, par :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \forall y \in E, \begin{cases} x + y &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \\ \lambda \cdot x &= (\lambda \cdot x_1, \lambda \cdot x_2, \dots, \lambda \cdot x_n) \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} x &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \\ y &= (y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases}$$

est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel dit espace vectoriel produit

## I.4 Espaces vectoriels de référence déjà rencontrés

---

### Définition/Propriétés I.4.1

- $\mathbb{K}^n$  avec  $n \in \mathbb{N}^*$
- $\mathbb{K}[X]$
- $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  avec  $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ .
- $\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}) = \mathbb{K}^\Omega$  avec  $\Omega$  un ensemble quelconque non vide.
- $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

#### Remarque

Plus généralement, l'ensemble  $\mathcal{F}(\Omega, E)$  des fonctions de  $\Omega$  (ensemble quelconque non vide) dans  $E$  ( $\mathbb{K}$ -espace vectoriel) est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

## I.5 Combinaison linéaire d'une famille de vecteurs

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

---

### Définition/Propriétés I.5.1 (Cas particulier d'une famille finie de vecteurs)

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$  une famille finie de vecteurs de  $E$ .

Un vecteur  $x$  de  $E$  est dit combinaison linéaire de la famille  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$  s'il existe  $n$  éléments de  $\mathbb{K}$  notés  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  tels que

$$x = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n$$

Les scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  sont appelés coefficients de la combinaison linéaire.

#### Exemples

- Tout vecteur de  $\mathbb{K}^n$  est combinaison linéaire de la famille de vecteurs  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  avec

$$e_i = (\delta_{1i}, \delta_{2i}, \dots, \delta_{ni})$$

- Toute matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est combinaison linéaire de la famille de matrices  $(E_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}$  avec

$$E_{ij} = (\delta_{is}\delta_{jt})_{(s,t) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}$$

### Définition/Propriétés I.5.2 (Cas général d'une famille quelconque de vecteurs)

Soit  $I$  un ensemble et  $(e_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs de  $E$ .

Un vecteur  $x$  de  $E$  est dit combinaison linéaire de la famille  $(e_i)_{i \in I}$  s'il existe une famille  $(\lambda_i)_{i \in I}$  d'éléments de  $\mathbb{K}$  presque nulle (*i.e.* dont tous les éléments sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux), telle que

$$x = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i$$

la famille de scalaires  $(\lambda_i)_{i \in I}$  est appelée famille des coefficients de la combinaison linéaire

#### Exemple

Tout polynôme de  $\mathbb{K}[X]$  est combinaison linéaire de la famille  $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$

## II Sous-espaces vectoriels

### II.1 Définition

#### Définition/Propriétés II.1.1

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Une partie  $H$  de  $E$  est dite sous-espace vectoriel de  $E$  si :

- (1)  $H$  est une partie stable par addition et par multiplication par un scalaire ;
- (2)  $H$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour les lois de composition interne et externe obtenues par restriction à  $H$  des lois de  $E$ .

### II.2 Caractérisation

---

### Définition/Propriétés II.2.1

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $H$  une partie de  $E$ .

$H$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  si, et seulement si, les conditions suivantes sont réunies :

- (1)  $0_E \in H$
- (2)  $H$  est stable par combinaison linéaire :  $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall (x, y) \in H^2, \lambda.x + \mu.y \in H$

#### Exemples

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- $\{0_E\}$  et  $E$  sont des sous-espaces vectoriels de  $E$  ;  $\{0_E\}$  est dit sous-espace vectoriel nul de  $E$ .
- Si  $E$  est différent de  $\{0_E\}$  alors, pour tout  $x \in E \setminus \{0_E\}$ , l'ensemble  $H = \{\alpha x \mid \alpha \in \mathbb{K}\}$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  dit droite vectorielle de  $E$  engendrée par le vecteur non nul  $x$ .

#### Remarques

- En pratique, le recours à cette caractérisation est à privilégier systématiquement par rapport à la définition de sous-espace vectoriel dont la vérification des axiomes serait trop coûteuse.
- En pratique, cette caractérisation permet aussi de montrer qu'un ensemble muni d'une loi de composition interne et d'une loi de composition externe est un espace vectoriel en démontrant que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de référence pour ces lois.

## II.3 Quelques exemples de sous-espaces vectoriels déjà rencontrés

---

### Définition/Propriétés II.3.1

- $\mathbb{K}_n[X]$ , avec  $n \in \mathbb{N}$ , est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}[X]$ .
- $C^n(I, \mathbb{K})$ , avec  $n \in \mathbb{N}$  et  $I$  un intervalle non vide de  $\mathbb{R}$ , est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}^I$ .
- $\{u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid u \text{ converge}\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .
- L'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène d'inconnue  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}^n$ .
- Si  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0_{\mathbb{R}^2}\}$  alors  $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x + \beta y = 0\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$  dit droite vectorielle de  $\mathbb{R}^2$ .
- Si  $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0_{\mathbb{R}^3}\}$  alors  $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \alpha x + \beta y + \gamma z = 0\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  dit plan vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ .

## II.4 Intersection de sous-espaces vectoriels

---

**Définition/Propriétés II.4.1**

L'intersection d'une famille (quelconque) de sous-espaces vectoriels d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

**Remarque**

La réunion de sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel n'est pas, en général, un sous-espace vectoriel

---

**Démonstration**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $(H_i)_{i \in I}$  une famille de sous-espace vectoriel de  $E$

Montrons que  $H = \bigcap_{i \in I} H_i$  est un sous-espace vectoriel de  $E$

- $H \subset E$  car  $\forall i \in I, H_i \subset E$
- $0_E \in H$  car  $\forall i \in I, 0_E \in H_i$
- $H$  stable par combinaison linéaire :  
Soit  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$  et  $(x, y) \in H^2$ ,  
alors *for all*  $i \in I, \alpha x + \beta y \in H_i$  car  $x \in H_i$  et  $y \in H_i$  et  $H_i$  est stable par combinaison linéaire  
ainsi  $\alpha x + \beta y \in \bigcap_{i \in I} H_i$  et ainsi  $\alpha x + \beta y \in H$

Donc par caractérisation  $H = \bigcap_{i \in I} H_i$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  ■

## II.5 Sous-espace vectoriel engendré par une partie

Soit  $A$  une partie d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ .

---

**Définition II.5.1**

L'intersection des sous-espaces vectoriels de  $E$  contenant la partie  $A$  est appelée sous-espace vectoriel de  $E$  engendré par la partie  $A$  et notée  $\text{Vect}(A)$ .

**Remarque**

Si  $(a_i)_{i \in I}$  est une famille d'éléments de  $E$ , on note aussi  $\text{Vect}(a_i)_{i \in I}$  le sous-espace vectoriel de  $E$  engendré par la partie  $\{a_i \mid i \in I\}$  de  $E$ .

---

**Définition/Propriétés II.5.2 (Caractérisation)**

$\text{Vect}(A)$  est le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$ , au sens de l'inclusion, qui contient  $A$ .

---

**Théorème II.5.3**

- Si  $A$  est vide alors  $\text{Vect}(A)$  est égal à  $\{0_E\}$ .
- Si  $A$  est non vide alors  $\text{Vect}(A)$  est égal à l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de  $A$ .

### III Familles génératrices, libres ou bases d'un espace vectoriel

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  une famille (partie) de  $E$ .

#### III.1 Famille (partie) génératrice

---

##### Définition III.1.1

La famille (partie)  $F$  de  $E$  est dite génératrice de  $E$  si  $E = \text{Vect}(F)$

Remarques

- On dit aussi que " $F$  engendre  $E$ " au lieu de " $F$  est génératrice de  $E$ ".
  - En pratique, seule l'inclusion  $E \subset \text{Vect}(F)$  est à établir pour montrer que  $F$  engendre  $E$ . L'autre inclusion est immédiate car  $E$  est espace vectoriel donc stable par combinaison linéaire. Montrer qu'une famille  $F$  est génératrice de  $E$ , c'est donc montrer que tout élément de  $E$  peut s'écrire comme combinaison linéaire de cette famille  $F$ .
- 

##### Propriétés III.1.2

L'ajout d'un vecteur de  $E$  à une famille génératrice de  $E$  donne une nouvelle famille génératrice de  $E$ .

#### III.2 Famille (partie) libre

---

##### Définition III.2.1

La famille (ou partie)  $F$  de  $E$  est dite libre (ou linéairement indépendante) si toute combinaison linéaire nulle d'éléments de  $F$  a ses coefficients nuls.

ATTENTION à ne pas commettre la confusion avec "si les coefficients de la combinaison linéaire sont tous nuls alors celle-ci est nulle" ce qui est vrai que la famille soit libre ou non.

---

##### Propriétés III.2.2

- Si on enlève un élément à une famille libre de  $E$ , on obtient une famille libre.
  - Si on ajoute à une famille libre de  $E$  un élément de  $E$  qui n'est pas combinaison linéaire de cette famille, on obtient une famille libre
- 

##### Définition/Propriétés III.2.3 (Un exemple important à connaître)

Toute famille de polynômes de  $\mathbb{K}[X]$  de degrés entiers distincts est libre.

---

### Démonstration

On considère une combinaison linéaire nulle de polynôme de  $\mathbb{K}[X]$  de degré entier distincts que l'on

$$\text{note } \sum_{i=1}^n \lambda_i P_i = 0_{\mathbb{K}[X]} \text{ avec } \begin{cases} \lambda_i & \in \mathbb{K} \\ P_i & \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0_{\mathbb{K}[X]}\} \end{cases}.$$

On note  $d_i = \deg(P_i)$

Par définition on a  $\lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_n P_n = 0_{\mathbb{K}[X]}$

Par définition deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients de même degré sont égaux, on trouve donc :

$\lambda_n C_d(P_n) = 0$  avec  $C_d(P_n)$  le coefficients dominants de  $P_n$

d'où  $\lambda_n = 0$  car  $C_d(P_n) \neq 0$

de même pour tout les coefficients on retrouve donc  $\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \lambda_i = 0$

conclusion  $\mathbb{K}[X]$  est libre

## III.3 Famille (partie) liée

---

### Définition III.3.1

La famille (partie)  $F$  de  $E$  est dite liée (ou dépendante linéairement) si elle n'est pas libre.

Remarque

Les familles (parties) de  $E$  qui contiennent le vecteur  $0_E$  sont liées.

---

### Définition/Propriétés III.3.2 (Caractérisations)

La famille  $F$  de  $E$  est liée si, et seulement si, l'une des assertions suivantes est vérifiée :

- (1) il existe une combinaison linéaire nulle d'éléments de  $F$  qui n'a pas tous ses coefficients nuls.
- (2) il existe un élément de la famille  $F$  qui est combinaison linéaire des autres éléments de  $F$ .

## III.4 Base

---

### Définition III.4.1

La famille  $F$  est dite base de  $E$  si  $F$  est une famille génératrice de  $E$  et libre.

---

### Définition/Propriétés III.4.2 (Caractérisation)

La famille  $F$  est une base de  $E$  si, et seulement si, tout vecteur de  $E$  s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de  $F$ .

Dans ce cas, la famille presque nulle des coefficients de la combinaison linéaire égale au vecteur  $x$  est appelée famille des coordonnées de  $x$  dans la base  $F$  de  $E$ .



---

### Démonstration

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  une famille de  $E$

Montrons que  $F$  est une base si, et seulement si, tout vecteur de  $E$  s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de  $F$  par double implication

- $\boxed{\Rightarrow}$  On suppose  $F$  comme base de  $E$   
alors  $F$  est génératrice de  $E$  donc tout  $x$  de  $E$  est une combinaison linéaire de  $F$  sous la forme  
$$x = \sum_{i \in I} \lambda_i f_i \quad \text{où } (\lambda_i)_{i \in I} \text{ est une famille de scalaires presque nuls et } F = (f_i)_{i \in I}$$
  
On suppose que  $x$  s'écrit aussi  $x = \sum_{i \in I} \mu_i f_i$  alors  $0_E = \sum_{i \in I} (\lambda_i - \mu_i) f_i$   
donc  $\forall i \in I, \lambda_i - \mu_i = 0 \iff \forall i \in I, \lambda_i = \mu_i$  car  $F$  est libre car base de  $E$   
Ainsi tout  $x$  de  $E$  s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de  $F$
- $\boxed{\Leftarrow}$  On suppose que tout  $x$  de  $E$  s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de  $F$   
alors  $F$  est génératrice de  $E$ , de plus pour toute combinaison linéaire nulle de  $F$  :

$$\sum_{i \in I} \lambda_i f_i = 0_E \quad (20.1)$$

$$\sum_{i \in I} \lambda_i f_i = \sum_{i \in I} 0 \cdot f_i \quad (20.2)$$

donc  $\forall i \in I, f_i = 0$  par unicité d'écriture de  $0_E$  donc  $F$  est libre et génératrice, c'est donc une base.

**conclusion**  $F$  est une base si, et seulement si, tout vecteur de  $E$  s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de  $F$  ■

---

### Définition/Propriétés III.4.3 (Bases de référence à connaître)

- Bases canoniques de  $\mathbb{K}^n$ ,  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ ,  $\mathbb{K}[X]$  et  $\mathbb{K}^n[X]$ .
- Bases de polynômes à degrés échelonnés dans  $\mathbb{K}[X]$  et  $\mathbb{K}^n[X]$

## IV Somme et somme directe de deux sous-espaces vectoriels

Soit  $E_1$  et  $E_2$  des sous-espaces vectoriels d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ .

### IV.1 Somme de deux sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel

---

#### Définition IV.1.1

La somme des sous-espaces vectoriels  $E_1$  et  $E_2$  est l'ensemble noté  $E_1 + E_2$  défini par :

$$E_1 + E_2 = \{x \in E \mid \exists (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2, x = x_1 + x_2\}$$

---

#### Propriétés IV.1.2

Si  $E_1$  et  $E_2$  sont deux sous-espaces vectoriels de  $E$  alors  $E_1 + E_2$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Remarque

$E_1 + E_2$  est le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$  (au sens de l'inclusion) contenant  $E_1 \cup E_2$ .

## IV.2 Somme directe

### Définition IV.2.1

La somme  $E_1 + E_2$  est dite directe, et notée dans ce cas  $E_1 \oplus E_2$ , si la décomposition de tout vecteur de  $E_1 + E_2$  comme somme d'un élément de  $E_1$  et d'un élément de  $E_2$  est unique.

### Définition/Propriétés IV.2.2 (Caractérisation par l'intersection)

La somme  $E_1 + E_2$  est directe si, et seulement si,  $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$ .

#### Démonstration

Montrons que  $E_1 + E_2$  est directe si, et seulement si,  $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$  par double application

- $\boxed{\Rightarrow}$  Supposons  $E_1 + E_2$  directe
  - $\{0_E\} \subset E_1 \cap E_2$  car  $E_1$  et  $E_2$  sous-espace vectoriel de  $E$
  - Soit  $x \in E_1 \cap E_2$   
alors  $\begin{matrix} x \\ \in E_1 \end{matrix} + \begin{matrix} 0_E \\ \in E_2 \end{matrix} = \begin{matrix} x \\ \in E_2 \end{matrix} + \begin{matrix} 0_E \\ \in E_1 \end{matrix}$   
donc par unicité d'écriture, car  $x \in E_1 \oplus E_2$ , on a  $x = 0_E$  donc  $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$
- $\boxed{\Leftarrow}$  On suppose que  $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$   
Soit  $(x_1, x'_1) \in E_1^2$  et  $(x_2, x'_2) \in E_2^2$  tel que  $x_1 + x_2 = x'_1 + x'_2$   
ainsi  $\begin{matrix} x_1 - x'_1 \\ \in E_1 \end{matrix} = \begin{matrix} x_2 - x'_2 \\ \in E_2 \end{matrix}$  d'où  $x_1 - x'_1 \in E_1 \cap E_2$  i.e.  $x_1 - x'_1 = 0_E$   
donc  $x_1 = x'_1$  et  $x_2 = x'_2$  càd que  $E_1 + E_2$  possède l'unicité d'écriture et donc c'est une somme directe

$\boxed{\text{conclusion}}$   $E_1 + E_2$  est directe si, et seulement si,  $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$  ■

## IV.3 Sous-espaces supplémentaires

### Définition IV.3.1

$E_1$  et  $E_2$  sont dits supplémentaires si  $E = E_1 \oplus E_2$ .

### Définition/Propriétés IV.3.2 (Caractérisations pratiques)

- (1)  $E_1$  et  $E_2$  sont supplémentaires si, et seulement si,  $\forall x \in E, \exists! (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2, x = x_1 + x_2$ .
- (2)  $E_1$  et  $E_2$  sont supplémentaires si, et seulement si,  $E = E_1 + E_2$  et  $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$ .

#### Remarque

Le recours à une figure dans le plan ou l'espace pour représenter des sous-espaces supplémentaires est pertinent car il favorise la compréhension intuitive de la situation étudiée.

# Chapitre 21

## Espaces vectoriels de dimension finie

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Existence de bases . . . . .</b>	<b>233</b>
I.1	Définition . . . . .	233
I.2	Algorithme de construction de bases . . . . .	233
I.3	Théorèmes . . . . .	234
<b>II</b>	<b>Dimension d'un espace vectoriel . . . . .</b>	<b>235</b>
II.1	Propriétés préliminaires . . . . .	235
II.2	Dimension . . . . .	237
II.3	Caractérisation des bases en dimension finie . . . . .	238
II.4	Rang d'une famille finie de vecteurs . . . . .	238
II.5	Dimension d'un produit fini d'espaces vectoriels . . . . .	238
<b>III</b>	<b>Sous-espaces vectoriels en dimension finie . . . . .</b>	<b>239</b>
III.1	Propriétés . . . . .	239
III.2	Dimension d'une somme (formule de Grassmann) . . . . .	240
III.3	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	241

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne le corps  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### I Existence de bases

#### I.1 Définition

---

##### Définition I.1.1

On dit qu'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  est de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie.  
Exemples :  $\mathbb{K}^n$ ,  $\mathbb{K}_n[X]$ ,  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  sont de dimension finie mais pas  $\mathbb{K}[X]$ .

#### I.2 Algorithme de construction de bases

---

### Définition/Propriétés I.2.1

Soit  $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$  avec  $p \leq n$  et  $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$  une famille d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension finie. Si la famille  $(x_1, \dots, x_p)$  est libre et si la famille  $(x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, \dots, x_n)$  est génératrice de  $E$  alors  $E$  admet une base qui contient à la fois :

- tous les vecteurs  $x_1, \dots, x_p$  ;
- certains vecteurs parmi les vecteurs  $x_{p+1}, \dots, x_n$ .

---

#### Démonstration

Soit  $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, \dots, x_n)$  une famille génératrice de  $E$  telle que la famille  $(x_1, \dots, x_p)$  est libre.

#### Algorithme en langage naturel

$\mathcal{L} \leftarrow \{x_1, \dots, x_p\}$

Pour tout entier  $k$  allant de  $p+1$  à  $n$ , faire :

Si  $\mathcal{L} \cup \{x_k\}$  libre alors  $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup_a \text{ccol} x_k$

Cet algorithme termine et donne une partie  $\mathcal{L}$  libre composée des vecteurs  $x_1, \dots, x_p$  et de certains vecteurs parmi les vecteurs  $x_{p+1}, \dots, x_n$ .

Notons  $\mathcal{B}$  la famille libre ainsi obtenue après balayage et montrons qu'elle engendre  $E$ .

- Par construction de  $\mathcal{B}$ , tout vecteur de  $\mathcal{F}$  est combinaison linéaire de vecteurs de  $\mathcal{B}$  donc appartient à  $\text{Vect}(\mathcal{B})$ .
- Par stabilité des sous-espaces vectoriels de  $E$  par combinaison linéaire, on a :  $\text{Vect}(\mathcal{F}) \subset \text{Vect}(\mathcal{B})$ . Ainsi  $E \subset \text{Vect}(\mathcal{B})$  (car  $\mathcal{F}$  engendre  $E$ ) puis  $E = \text{Vect}(\mathcal{B})$  ce qui prouve que  $\mathcal{B}$  engendre  $E$ .

Conclusion :  $\mathcal{B}$  est une famille libre et génératrice de  $E$  donc c'est une base de  $E$ . ■

## I.3 Théorèmes

---

### Théorème I.3.1 (Base extraite)

De toute famille génératrice d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension finie différent de  $\{0_E\}$ , on peut extraire une base finie de  $E$ .

---

#### Démonstration

(1) Soit  $\mathcal{F}$  une famille génératrice de  $E$ .

Comme  $E$  est de dimension finie, on peut extraire de  $\mathcal{F}$  une famille finie génératrice  $\mathcal{F}'$  de  $E$ .

En effet,

par définition de la dimension finie,  $E$  admet une partie génératrice finie  $\mathcal{G}$ . Comme  $\mathcal{F}$  engendre  $E$ , tout vecteur  $x$  de  $\mathcal{G}$  est en particulier combinaison linéaire de  $\mathcal{F}$ , autrement dit il existe un nombre fini de vecteurs de  $\mathcal{F}$  dont  $x$  est la combinaison linéaire. Comme  $\mathcal{G}$  est elle-même

une partie finie, on en déduit alors qu'on peut extraire de  $\mathcal{F}$  une famille finie  $\mathcal{F}'$  telle que  $\text{Vect}(\mathcal{G}) \subset \text{Vect}(\mathcal{F}')$ . Vu le caractère générateur de  $\mathcal{G}$ , on a  $E = \text{Vect}(\mathcal{G})$  donc  $E \subset \text{Vect}(\mathcal{F}')$  et enfin  $E = \text{Vect}(\mathcal{F}')$  car  $\text{Vect}(\mathcal{F}')$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . La famille finie  $\mathcal{F}'$  extraite de  $\mathcal{F}$  engendre donc  $E$ .

Comme  $E$  n'est pas réduit à  $\{0_E\}$ , la famille  $\mathcal{F}'$  contient un vecteur non nul  $x_1$  ce qui implique que la famille  $(x_1)$  est une famille libre de  $E$ . D'après l'algorithme de construction de bases, on peut alors construire une base de  $E$  qui contient  $x_1$  et certains vecteurs de la famille finie  $\mathcal{F}'$  donc de la famille génératrice  $\mathcal{F}$ .

conclusion  $E$  a une base finie obtenue par extraction de vecteurs d'une famille génératrice.

(2) Soit  $\mathcal{L}$  une famille libre de  $E$ .

Comme  $E$  est de dimension finie alors  $\mathcal{L}$  finie par propriété et  $E$  admet une famille génératrice finie, notée  $\mathcal{F}$ , par définition. En concaténant les familles  $\mathcal{L}$  et  $\mathcal{F}$ , on obtient une nouvelle famille finie génératrice de  $E$  (car surfamille de la famille génératrice de  $E$ ). Par l'algorithme de construction de bases, on obtient alors une base finie de  $E$  composée des vecteurs de la famille libre  $\mathcal{L}$  et de certains vecteurs de la famille génératrice  $\mathcal{F}$ .

conclusion  $E$  a une base finie obtenue par complétion d'une famille libre. ■

### **Théorème I.3.2 (Base incomplète)**

*Toute famille libre (finie) d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension finie différent de  $\{0_E\}$  peut être complétée en une base finie de  $E$ .*

### **Théorème I.3.3 (Existence de bases en dimension finie)**

*Tout  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension finie différent de  $\{0_E\}$  admet des bases finies.*

## **II Dimension d'un espace vectoriel**

### **II.1 Propriétés préliminaires**

#### **Définition/Propriétés II.1.1 (Cardinal des familles libres en dimension finie)**

Si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non réduit à  $\{0_E\}$  et  $\mathcal{G}$  une famille génératrice finie de  $E$  à  $n$  éléments alors toute famille libre  $\mathcal{L}$  de  $E$  a au plus  $n$  vecteurs :

$$\text{Card}(\mathcal{L}) \leq \text{Card}(\mathcal{G})$$

Remarque :

Dans le théorème de la base incomplète, on peut donc remplacer "famille libre finie" par "famille libre".

---

### Démonstration

On note  $\mathcal{G}$  une partie génératrice de  $E$  ayant  $n$  vecteurs et on raisonne par l'absurde.

- On suppose qu'il existe une partie libre  $\mathcal{L}$  de vecteurs de  $E$  ayant  $n + 1$  éléments.

Pour  $k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ , on note  $P(k)$  la propriété suivante :

"il existe une partie génératrice  $\mathcal{G}_k$  de  $E$  comportant  $k$  éléments de  $\mathcal{L}$  et  $n - k$  éléments de  $\mathcal{G}$ ".

Montrons que, pour tout  $k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ ,  $P(k)$  est vraie.

—  $P(0)$  est vraie car la partie  $\mathcal{G}_0 = \mathcal{G}$  convient.

— Soit  $k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$  tel que  $P(k)$  est vraie. Montrons que  $P(k+1)$  est vraie.

Par hypothèse de récurrence, il existe  $\mathcal{G}_k = \{\ell_1, \dots, \ell_k, g_1, \dots, g_{n-k}\}$  partie génératrice de  $E$  telle que  $\forall i \in \llbracket 1 ; n-k \rrbracket, \ell_i \in \mathcal{L}$  et  $\forall i \in \llbracket 1 ; n-k \rrbracket, g_i \in \mathcal{G}$

Comme la partie  $\mathcal{L}$  comporte  $n+1$  éléments et que l'entier  $k$  est inférieur ou égal à  $n-1$ , il existe un vecteur  $\ell$  de  $\mathcal{L}$  qui est différent des vecteurs  $\ell_1, \dots, \ell_k$ . Ce vecteur  $\ell$  appartient à  $E$  donc, par définition de  $\mathcal{G}_k$ , il existe une famille de scalaires  $(\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_{n-k}) \in \mathbb{K}^n$  telle que

$$\ell = \sum_{i=1}^k \alpha_i \ell_i + \sum_{i=1}^{n-k} \beta_i g_i$$

La partie  $\{\ell_1, \dots, \ell_k, \ell\}$  est incluse dans la partie libre  $\mathcal{L}$  donc elle est libre et par conséquent, le vecteur  $\ell$  n'est pas combinaison linéaire de  $\{\ell_1, \dots, \ell_k\}$ . Ainsi la famille de scalaires  $(\beta_1, \dots, \beta_{n-k})$  est différente de  $(0, \dots, 0)$  autrement dit il existe  $i \in \llbracket 1 ; n-k \rrbracket$  tel que  $\beta_i$  est non nul. Quitte à rénuméroter les  $\beta_i$ , on peut supposer que  $\beta_{n-k}$  est non nul ce qui permet d'écrire

$$g_{n-k} = \frac{1}{\beta_{n-k}} \ell - \sum_{i=1}^k \frac{\alpha_i}{\beta_{n-k}} \ell_i - \sum_{i=1}^{n-1-k} \frac{\beta_i}{\beta_{n-k}} g_i$$

En notant  $\ell_{k+1} = \ell$  et  $\mathcal{G}_{k+1} = \{\ell_1, \dots, \ell_k, \ell_{k+1}, g_1, \dots, g_{n-k-1}\}$ , cela prouve que le vecteur  $g_{n-k}$  appartient à  $\text{Vect}(\mathcal{G}_{k+1})$ . Comme par ailleurs,  $\mathcal{G}_k \setminus \{g_{n-k}\}$  est inclus dans  $\mathcal{G}_{k+1}$ , on en déduit que  $\text{Vect}(\mathcal{G}_k) \subset \text{Vect}(\mathcal{G}_{k+1})$  puis  $E \subset \text{Vect}(\mathcal{G}_{k+1})$  (car  $\mathcal{G}_k$  est génératrice de  $E$ ) et enfin que  $E = \text{Vect}(\mathcal{G}_{k+1})$ .

Autrement dit, la partie  $\mathcal{G}_{k+1}$  est génératrice de  $E$  et comporte  $k+1$  éléments de  $\mathcal{L}$  et  $n - (k+1)$  éléments de  $\mathcal{G}$ . La propriété  $P(k+1)$  est donc vraie.

Par théorème de récurrence, la propriété  $P(k)$  est donc vraie pour tout entier  $k$  de  $\llbracket 0 ; n \rrbracket$ .

En particulier,  $P(n)$  est vraie. Il existe donc une partie génératrice de  $E$  composée de  $n$  vecteurs de  $\mathcal{L}$ . Comme  $\mathcal{L}$  comporte  $n+1$  vecteurs, l'un des vecteurs de  $\mathcal{L}$  est donc combinaison linéaire des  $n$  autres vecteurs ce qui contredit le caractère libre de  $\mathcal{L}$ .

conclusion : il n'existe pas de parties libres à  $n+1$  éléments dans  $E$ .

- On suppose qu'il existe une famille libre de  $E$  ayant un nombre de vecteurs supérieur ou égal à  $n+1$ . Toute sous-famille de cette famille libre est alors libre par propriété. En particulier, toute sous-famille à  $n+1$  éléments de cette famille est libre ce qui est faux d'après la propriété démontrée ci-dessus.

conclusion il n'existe pas de parties libres à plus de  $n+1$  éléments dans  $E$ .

conclusion : Si  $E$  a une famille génératrice à  $n$  vecteurs alors les familles libres de  $E$  ont au plus  $n$  vecteurs ■

---

### Définition/Propriétés II.1.2 (Cardinal des bases en dimension finie)

Si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non réduit à  $\{0_E\}$  alors :

- toutes les bases de  $E$  sont finies ;
- toutes les bases de  $E$  ont le même nombre de vecteurs (appelé cardinal des bases).

## II.2 Dimension

---

### Définition II.2.1

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

On appelle dimension de  $E$ , et on note  $\dim E$ , l'entier naturel défini de la manière suivante :

- Si  $E \neq \{0_E\}$  alors  $\dim E = \text{Card}(\mathcal{B})$  où  $\mathcal{B}$  est une base quelconque de  $E$ .
- Si  $E = \{0_E\}$  alors  $\dim E = 0$ .

Remarque

L'espace vectoriel nul est donc le seul  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie égale à 0.

---

### Définition/Propriétés II.2.2 ( Dimension d'espaces vectoriels déjà rencontrés)

- (1)  $\dim \mathbb{K}^n = n$
- (2)  $\dim \mathbb{K}_n[X] = n + 1$
- (3)  $\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = n \times p$
- (4) Solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1  
Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ , non vide et non réduit à un point, et  $a \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ . L'ensemble-solution sur  $I$  de  $(E) : y' + a(t)y = 0$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 1.
- (5) Solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants  
Soit  $(a, b) \in \mathbb{K}^2$  L'ensemble-solution sur  $\mathbb{R}$  de  $(E) : y'' + ay' + by = 0$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2.
- (6) Suites récurrentes linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants  
Soit  $(a, b) \in \mathbb{K} \times \mathbb{K}^*$ . L'ensemble des suites  $(u_n)$  de  $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  vérifiant  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + au_{n+1} + bu_n = 0$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2.

## II.3 Caractérisation des bases en dimension finie

---

### Définition/Propriétés II.3.1

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie égale à  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- (1) Une famille libre de  $E$  est une base de  $E$  si, et seulement si, elle compte  $n$  vecteurs.
- (2) Une famille génératrice de  $E$  est une base de  $E$  si, et seulement si, elle compte  $n$  vecteurs.

## II.4 Rang d'une famille finie de vecteurs

---

### Définition/Propriétés II.4.1

On appelle rang d'une famille finie de vecteurs  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ , et on note  $\text{rg}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , la dimension de l'espace vectoriel engendré par cette famille :

$$\text{rg}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \dim \text{Vect}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

#### Remarque

On a  $\text{rg}(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq n$  avec égalité si, et seulement si, la famille  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  est libre.

## II.5 Dimension d'un produit fini d'espaces vectoriels

---

### Définition/Propriétés II.5.1

Si  $E_1, \dots, E_n$  sont des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie alors le  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E_1 \times \dots \times E_n$  est de dimension finie avec

$$\dim E_1 \times \dots \times E_n = \dim E_1 + \dots + \dim E_n$$

#### Remarque

Si, pour tout  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on note,  $\mathcal{B}_j$  une base de  $E_j$  alors une base de  $E_1 \times \dots \times E_n$  est la concaténation des familles

$$\left( (e, 0_{E_2}, \dots, 0_{E_n})_{e \in \mathcal{B}_1}, (0_{E_1}, e, \dots, 0_{E_n})_{e \in \mathcal{B}_2}, \dots, (0_{E_1}, 0_{E_2}, \dots, e)_{e \in \mathcal{B}_n} \right)$$



## III Sous-espaces vectoriels en dimension finie

### III.1 Propriétés

---

#### Définition/Propriétés III.1.1 (Dimension d'un sous-espace vectoriel)

Si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie alors

- (1) tout sous-espace vectoriel  $H$  de  $E$  est de dimension finie inférieure ou égale à celle de  $E$ .
- (2) un sous-espace vectoriel  $H$  de  $E$  est égal à  $E$  si, et seulement si, sa dimension est égale à celle de  $E$ .

#### Remarque

Une base de  $E$  obtenue en complétant une base d'un sous-espace vectoriel  $H$  de  $E$  est dite base de  $E$  adaptée à  $H$ .

---

#### Démonstration

On suppose que  $E$  est de dimension finie.

- Dans le cas où  $E$  est de dimension nulle, les deux résultats sont immédiats car on a  $E = \{0_E\}$  donc le seul sous-espace vectoriel de  $E$  est  $H = \{0_E\}$  qui est de dimension finie nulle.
- On se place dans le cas où  $E$  est de dimension  $n$  avec  $n \geq 1$  autrement dit le cas où  $E \neq \{0_E\}$ .
  - Dans le cas  $H = \{0_E\}$ , les deux résultats sont immédiats car  $H$  est de dimension finie égale à 0 donc strictement inférieure à  $n$ .
  - On se place dans le cas  $H \neq \{0_E\}$ . Alors  $H$  contient un vecteur  $x_1$  différent de  $0_E$  donc  $\{x_1\}$  est une partie libre de  $H$  (et de  $E$ ).

#### Algorithme en langage naturel

$\mathcal{L}_1 \leftarrow \{x_1\}$  Tant que  $\mathcal{L}_k$  n'est pas une partie génératrice de  $H$ ,  
faire  $\mathcal{L}_{k+1} \leftarrow \mathcal{L}_k \cup \{x_{k+1}\}$  avec  $x_{k+1}$  un vecteur de  $H \setminus \text{Vect}(\mathcal{L}_k)$ .

Par construction, les  $\mathcal{L}_k$  sont des parties libres de  $E$  donc de cardinal inférieur ou égal à  $n$  (qui est la dimension de  $E$ ) et contiennent  $k$  vecteurs de  $H$ . L'algorithme se termine donc (sinon la suite des cardinaux des parties  $\mathcal{L}_k$  serait une suite d'entiers croissante et majorée par  $n$  donc stationnaire ce qui contredirait sa stricte monotonie). Ainsi, il existe un entier  $k_0$  dans  $\llbracket 1 ; k \rrbracket$  tel que  $\mathcal{L}_{k_0}$  est une partie génératrice et libre de  $H$  donc une base de  $H$  de cardinal  $k_0 \leq n$ .

Par définition,  $H$  est donc de dimension finie avec  $\dim H \leq \dim E$ .

Par ailleurs, si  $\dim H = \dim E$  alors, par définition, toute base  $\mathcal{B}_H$  de  $H$  a pour cardinal la dimension de  $E$ . Comme  $H$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ ,  $\mathcal{B}_H$  est donc une famille libre de  $E$  qui a pour cardinal la dimension de  $E$ . Par caractérisation des bases,  $\mathcal{B}_H$  est donc une base de  $E$  ce qui implique que  $E = \text{Vect}(\mathcal{B}_H)$  donc que  $E = H$  puisque  $\mathcal{B}_H$  est base de  $H$ .

conclusion tout sous-espace vectoriel  $H$  de  $E$  est de dimension finie telle que  $\dim H \leq \dim E$  avec égalité des dimension si, et seulement si,  $H$  est égal à  $E$ . ■

---

**Définition/Propriétés III.1.2 (Egalité de sous-espaces vectoriels en dimension finie)**

Soit  $H$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension finie.

$H = G$  si, et seulement si,  $H \subset G$  et  $\dim H = \dim G$ .

## III.2 Dimension d'une somme (formule de Grassmann)

---

**Définition/Propriétés III.2.1**

Soit  $H$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ .

Si  $H$  et  $G$  sont de dimension finie alors  $H + G$  est de dimension finie avec

$$\dim H + G = \dim H + \dim G - \dim H \cap G$$

Remarques

Si de plus la somme  $H + G$  est directe alors :

- $\dim H \oplus G = \dim H + \dim G$
- la concaténation d'une base de  $H$  et d'une base de  $G$  donne une base de  $H \oplus G$  dite adaptée à la somme directe.

---

*Démonstration*

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (de dimension non nécessairement finie) et,  $H$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de dimension finie de  $E$ .

- Par propriété,  $H \cap G$  est sous-espace vectoriel de  $E$  inclus dans  $H$  donc sous-espace vectoriel de  $H$ .

Comme  $H$  est de dimension finie,  $H \cap G$  est de dimension finie donc admet une base finie  $\mathcal{B}_{H \cap G} = (e_i)_{i \in I}$ . Comme  $\mathcal{B}_{H \cap G} = (e_i)_{i \in I}$  est une famille libre de  $H \cap G$  (donc de  $H$  et  $G$ ), on peut la compléter en :

- une base finie  $\mathcal{B}_H$  de  $H$  en lui ajoutant des vecteurs  $h_j$  avec  $j \in J$ ;
- une base finie  $\mathcal{B}_G$  de  $G$  en lui ajoutant des vecteurs  $g_k$  avec  $k \in K$ .

La famille  $\mathcal{B}$  obtenue en concaténant les familles  $(e_i)_{i \in I}$ ,  $(h_j)_{j \in J}$  et  $(g_k)_{k \in K}$  est alors une famille génératrice du sous-espace vectoriel  $H + G$ . En effet, tout élément de  $H + G$  s'écrit comme somme d'un élément de  $H$  et d'un élément de  $G$  donc comme combinaison linéaire de la famille obtenue en concaténant  $\mathcal{B}_H$  et  $\mathcal{B}_G$  et donc a fortiori comme combinaison linéaire de  $\mathcal{B}$ .

Comme  $\mathcal{B}$  est une famille finie,  $H + G$  est alors de dimension finie par définition.

- Montrons que la famille  $\mathcal{B}$  ainsi créée est une base de  $H + G$ . On considère une combinaison linéaire nulle de la famille  $\mathcal{B}$ . Elle peut s'écrire sous la forme

$$\sum_{i \in I} \alpha_i e_i + \sum_{j \in J} \beta_j h_j + \sum_{k \in K} \gamma_k g_k = 0_E$$

avec  $(\alpha_i)_{i \in I}$ ,  $(\beta_j)_{j \in J}$  et  $(\gamma_k)_{k \in K}$  trois familles de scalaires. Alors

$$\underbrace{\sum_{j \in J} \beta_j h_j}_{\in H} = - \underbrace{\sum_{i \in I} \alpha_i e_i + \sum_{k \in K} \gamma_k g_k}_{\in G}$$

donc le vecteur  $\sum_{j \in J} \beta_j h_j$  appartient à  $H \cap G$ . Comme  $(e_i)_{i \in I}$  est une base de  $H \cap G$ , il existe donc une unique famille de scalaires  $(\alpha'_i)_{i \in I}$  telle que

$$\sum_{j \in J} \beta_j h_j = \sum_{i \in I} \alpha'_i e_i$$

En réinjectant dans la toute première égalité, on trouve

$$\sum_{i \in I} (\alpha_i + \alpha'_i) e_i + \sum_{k \in K} \gamma_k g_k = 0_E$$

Comme  $\mathcal{B}_G$  est une base de  $G$ , c'est une famille libre de  $E$  donc l'égalité précédente implique que

$$\forall i \in I, \alpha_i + \alpha'_i = 0 \text{ et } \forall k \in K, \gamma_k = 0$$

En réinjectant dans la trouve première égalité, on trouve

$$\sum_{i \in I} \alpha_i e_i + \sum_{j \in J} \beta_j h_j = 0_E$$

Comme  $\mathcal{B}_H$  est une base de  $H$ , c'est une famille libre de  $E$  donc l'égalité précédente implique que

$$\forall i \in I, \alpha_i = 0 \text{ et } \forall j \in J, \beta_j = 0$$

avec de plus

$$\forall k \in K, \gamma_k = 0$$

En résumé, toute combinaison linéaire nulle de la famille  $\mathcal{B}$  a ses coefficients nuls donc, par définition,  $\mathcal{B}$  est libre. Comme  $\mathcal{B}$  est de plus une famille génératrice de  $H + G$ , on en déduit que  $\mathcal{B}$  est une base de  $H + G$ .

Par construction de la famille finie  $\mathcal{B}$ , on a :

$$\text{Card}(\mathcal{B}) = \text{Card}(\mathcal{B}_H) + \text{Card}(\mathcal{B}_G) - \text{Card}(\mathcal{B}_{H \cap G})$$

Par définition de la dimension d'un espace vectoriel, on a alors :

$$\dim H + G = \dim H + \dim G - \dim H \cap G$$

conclusion  $\dim H + G = \dim H + \dim G - \dim H \cap G$  ■

### III.3 Sous-espaces supplémentaires

#### Théorème III.3.1 (Théorème d'existence)

*Tout sous-espace vectoriel d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie possède au moins un supplémentaire.*

Remarques

- Il n'y a pas unicité des supplémentaires dans un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Ainsi  $H = X^2 \mathbb{K}_1[X]$  et  $G = (X^2 + 1) \mathbb{K}_1[X]$  sont des sous-espaces vectoriels différents de  $E = \mathbb{K}_3[X]$  tous deux supplémentaires de  $\mathbb{K}_1[X]$  dans l'espace vectoriel de dimension finie  $E$ .
- L'existence d'un supplémentaire pour tout sous-espace vectoriel en dimension quelconque dépasse les ambitions du programme de MP2I-MPI.

---

### Démonstration

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $H$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

- Dans le cas où  $H = \{0_E\}$ , on a immédiatement  $E = \{0_E\} \oplus E$  donc  $H$  admet comme supplémentaire  $E$ .
- On se place dans le cas où  $H \neq \{0_E\}$ . Comme  $H$  est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel de dimension finie  $E$ ,  $H$  est alors de dimension finie supérieure ou égale à 1.  $H$  admet donc une base finie  $\mathcal{B}_H = (e_1, \dots, e_p)$ , avec  $p = \dim H$ , que l'on peut compléter en une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$  de  $E$  où  $n = \dim E$ . Par unicité d'écriture de tout vecteur de  $E$  dans la base  $\mathcal{B}$  et par définition d'une somme directe, on en déduit que

$$E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) \oplus \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$$

autrement dit, que

$$E = H \oplus \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$$

ce qui signifie que  $H$  admet  $\text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$  comme supplémentaire.

conclusion tout sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie a un supplémentaire. ■

---

### Définition/Propriétés III.3.2 (Caractérisation des sous-espaces supplémentaires avec la dimension)

Soit  $H$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension finie.

- (1)  $H$  et  $G$  sont supplémentaires si, et seulement si,  $\dim E = \dim H + \dim G$  et  $H + G = E$
- (2)  $H$  et  $G$  sont supplémentaires si, et seulement si,  $\dim E = \dim H + \dim G$  et  $H \cap G = \{0_E\}$

Remarque

Lorsque  $H$  et  $G$  sont des sous-espaces supplémentaires de  $E$ , la concaténation d'une base de  $H$  et d'une base de  $G$  donne une base de  $E$  dite adaptée à la décomposition en somme directe.

# Chapitre 22

## Application Linéaire (1)

### Sommaire

---

<b>I</b>	<b>Généralités . . . . .</b>	<b>. 243</b>
I.1	Définitions - Notations . . . . .	243
I.2	Opérations . . . . .	244
I.3	Structures algébriques des ensembles d'applications linéaires . . . . .	244
I.4	Image directe et image réciproque d'un sous-espace vectoriel . . . . .	244
I.5	Image et noyau d'une application linéaire . . . . .	245
I.6	Rang d'une application linéaire . . . . .	245
<b>II</b>	<b>Des applications linéaires usuelles . . . . .</b>	<b>. 247</b>
II.1	Homothéties . . . . .	247
II.2	Projections/projecteurs . . . . .	247
II.3	Symétries . . . . .	248
<b>III</b>	<b>Isomorphismes . . . . .</b>	<b>. 249</b>
III.1	Détermination d'une application linéaire . . . . .	249
III.2	Caractérisations de l'injectivité, la surjectivité ou la bijectivité . . . . .	250
III.3	Applications linéaires entre espaces de même dimension finie . . . . .	250
III.4	Espaces vectoriels isomorphes . . . . .	251
<b>IV</b>	<b>Théorème du rang . . . . .</b>	<b>. 251</b>
IV.1	Théorème du rang (version géométrique) . . . . .	251
<b>V</b>	<b>Formes linéaires et hyperplans. . . . .</b>	<b>. 252</b>
V.1	Formes linéaires . . . . .	252
V.2	Hyperplans . . . . .	252
V.3	Hyperplans en dimension finie . . . . .	253
V.4	Intersection d'hyperplans en dimension finie . . . . .	255

---

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne le corps  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  et, sauf mention contraire  $E, F$  et  $G$  sont des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

### I Généralités

#### I.1 Définitions - Notations

---

**Définition I.1.1**

- (1) Une application  $u$  de  $E$  dans  $F$  est dite application linéaire de  $E$  dans  $F$  si :

$$\forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall(x, y) \in E^2, u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

- (2) Les applications linéaires de  $E$  dans  $F$  constituent  $\mathcal{L}(E, F)$ .  
(3) Les applications linéaires bijectives de  $E$  dans  $F$  sont dites isomorphismes de  $E$  sur  $F$ .  
(4) Les applications linéaires de  $E$  dans  $E$  sont dites endomorphismes de  $E$  et constituent  $\mathcal{L}(E)$ .  
(5) Les endomorphismes bijectifs de  $E$  sont dits automorphismes de  $E$  et constituent  $\mathcal{GL}(E)$ .

**Remarque**

Toute application  $u$  linéaire de  $E$  vers  $F$  est un morphisme de groupes additifs donc  $u(0_E) = 0_F$ .

## I.2 Opérations

---

**Définition/Propriétés I.2.1**

- (1) La combinaison linéaire de deux applications linéaires est une application linéaire.  
(2) La composée de deux applications linéaires est une application linéaire.  
(3) La bijection réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme.

## I.3 Structures algébriques des ensembles d'applications linéaires

---

**Définition/Propriétés I.3.1**

- (1)  $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel car sous-espace vectoriel du  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $\mathcal{F}(E, F)$ .  
(2)  $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$  est un anneau dont l'élément neutre pour la loi  $\circ$  est  $\text{Id}_E$ .  
(3)  $(\mathcal{GL}(E), \circ)$  est un groupe dit groupe linéaire.

## I.4 Image directe et image réciproque d'un sous-espace vectoriel

---

**Définition/Propriétés I.4.1**

Si  $u$  est une application linéaire de  $E$  dans  $F$  alors

- (1) l'image directe par  $u$  d'un sous-espace vectoriel de  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $F$  ;  
(2) l'image réciproque par  $u$  d'un sous-espace vectoriel de  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

## I.5 Image et noyau d'une application linéaire

---

### Définition/Propriétés I.5.1 (Structures algébriques)

Si  $u$  est une application linéaire de  $E$  dans  $F$  alors :

- (1)  $\text{Im } u = u(E) = \{y \in F \mid \exists x \in E, y = u(x)\}$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ , appelé image de  $u$  ;
- (2)  $\ker u = u^{-1} \{0_F\} = \{x \in E \mid u(x) = 0_F\}$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , appelé noyau de  $u$ .

---

### Définition/Propriétés I.5.2 (Famille génératrice de l'image d'une application linéaire)

Si  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $E = \text{Vect}((x_i)_{i \in I})$  alors  $\text{Im}(u) = \text{Vect}((u(x_i))_{i \in I})$ .

---

### Définition/Propriétés I.5.3 (Caractérisation des applications linéaires injectives/surjectives)

- (1) Une application linéaire  $u$  de  $E$  dans  $F$  est injective si, et seulement si,  $\ker u = \{0_E\}$ .
- (2) Une application (linéaire)  $u$  de  $E$  dans  $F$  est surjective si, et seulement si,  $\text{Im } u = F$ .

Remarques

Sans la linéarité, l'équivalence 1 n'est pas conservée alors que l'équivalence 2 est conservée.

## I.6 Rang d'une application linéaire

---

### Définition I.6.1 (Définition du rang d'une application linéaire)

Une application linéaire  $u$  de  $E$  dans  $F$  est dite de rang fini si son image  $\text{Im}(u)$  est de dimension finie. Dans ce cas, la dimension de  $\text{Im}(u)$  est appelée rang de  $u$  et notée  $\text{rg}(u)$  :

$$\text{rg}(u) = \dim(\text{Im}(u))$$

---

### Définition/Propriétés I.6.2 (Conditions suffisantes de finitude du rang)

- (1) Si  $u : E \longrightarrow F$  est linéaire et  $E$  de dimension finie alors  $u$  est de rang fini avec  $\text{rg}(u) \leq \dim E$ .
- (2) Si  $u : E \longrightarrow F$  est linéaire et  $F$  de dimension finie alors  $u$  est de rang fini avec  $\text{rg}(u) \leq \dim F$ .

---

**Définition/Propriétés I.6.3 (Rang d'une composée)**

Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $v \in \mathcal{L}(F, G)$ .

- (1) Si  $u$  et  $v$  sont de rang fini alors  $v \circ u$  est de rang fini et vérifie  $\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$ .
- (2) Invariance du rang par composition par un isomorphisme
  - (a) si  $u$  est un isomorphisme et  $v$  de rang fini alors  $v \circ u$  est de rang fini et  $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(v)$ .
  - (b) si  $v$  est un isomorphisme et  $u$  de rang fini alors  $v \circ u$  est de rang fini et  $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u)$ .

---

**Démonstration**

- On suppose que  $u$  et  $v$  sont de rang fini.

- Comme  $v$  est de rang fini alors  $\text{Im } v$  est de dimension finie. L'inclusion naturelle  $\text{Im } v \circ u \subset \text{Im } v$  donne alors que  $\text{Im } v \circ u$  est de dimension finie (comme sous-espace vectoriel d'un espace de dimension finie), donc que  $v \circ u$  est de rang fini, avec  $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(v)$  par définition du rang.
- D'autre part,  $\text{Im } v \circ u = \{v \circ u(x) \mid x \in E\} = \{v(u(x)) \mid x \in E\}$  donc on a :

$$\text{Im } v \circ u = \{v(y) \mid y \in \text{Im } u\}$$

On s'intéresse alors à  $\tilde{v} = v|_{\text{Im } u}$  autrement dit à l'application  $\tilde{v} : \text{Im } u \longrightarrow G$  définie par

$$\forall y \in \text{Im } u, \tilde{v}(y) = v(y)$$

$\tilde{v}$  est linéaire (car  $v$  l'est) d'espace de départ,  $\text{Im } u$ , de dimension finie (car  $u$  est de rang fini) donc, par propriété,  $\tilde{v}$  est de rang fini avec  $\text{rg}(\tilde{v}) \leq \dim(\text{Im } u)$  c'est-à-dire  $\dim(\text{Im } \tilde{v}) \leq \dim(\text{Im } u)$ .

Par définition de  $\tilde{v}$ , on a donc  $\text{Im } v \circ u = \text{Im } \tilde{v}$  ce qui permet de conclure que  $\dim(\text{Im } v \circ u) \leq \dim(\text{Im } u)$  autrement dit que  $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(u)$ .

Ainsi  $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(v)$  et  $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(u)$  donc  $\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$

conclusion si  $u$  et  $v$  sont de rang fini alors  $v \circ u$  est de rang fini et  $\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$ .

- Invariance du rang par composition par un isomorphisme

- (1) On suppose que  $u$  est un isomorphisme et que  $v$  de rang fini.

On a vu au 1 que  $\text{Im } v \circ u = \{v(y) \mid y \in \text{Im } u\}$  autrement dit que  $\text{Im } v \circ u = v(\text{Im } u)$  par définition de l'image directe d'un ensemble.

Or  $u$  est un isomorphisme de  $E$  vers  $F$  donc est en particulier surjectif ce qui donne  $\text{Im } u = F$ .

Ainsi,  $\text{Im } v \circ u = v(F)$  avec  $v(F) = \text{Im } v$ , par définition de l'image de  $v$ , linéaire de  $F$  dans  $G$ .

On en déduit que  $\text{Im } v \circ u = \text{Im } v$  ce qui prouve que  $v \circ u$  est de rang fini (car  $v$  l'est) et que  $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(v)$ .

conclusion pour  $u$  isomorphisme et  $v$  de rang fini, on a  $v \circ u$  de rang fini et  $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(v)$ .



- (2) On suppose que  $v$  est un isomorphisme et  $u$  de rang fini. On reprend les notations et une partie des résultats de la preuve du 1
- On a  $\text{Im } v \circ u = \text{Im } \tilde{v}(\star)$  avec  $\tilde{v} = v|_{\text{Im } u}$  qui est de rang fini car elle est linéaire sur un espace de dimension finie  $\text{Im } u$ . Par conséquent,  $\text{Im } \tilde{v}$  est de dimension finie et donc  $\text{Im } v \circ u$  aussi vu l'égalité écrite. Autrement dit,  $v \circ u$  est de rang fini.
  - Déterminons une base de  $\text{Im } \tilde{v}$  (donc de  $\text{Im } v \circ u$ )

Soit  $(y_1, \dots, y_n)$  une base de  $\text{Im } u$  (espace de départ de  $\tilde{v}$ ) avec  $n = \dim \text{Im } u$ .

Alors, par propriété,  $\text{Im } \tilde{v} = \text{Vect}(\tilde{v}(y_1), \dots, \tilde{v}(y_n))$  i.e.  $(\tilde{v}(y_1), \dots, \tilde{v}(y_n))$  engendre  $\text{Im } \tilde{v}$ .

De plus,  $(\tilde{v}(y_1), \dots, \tilde{v}(y_n))$  est une famille libre de  $G$ .

En effet, pour  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$  tel que  $\lambda_1 \tilde{v}(y_1) + \dots + \lambda_n \tilde{v}(y_n) = 0_G$ , on a

$\lambda_1 v(y_1) + \dots + \lambda_n v(y_n) = 0_G$  donc, par linéarité de  $v$ ,  $v(\lambda_1 y_1 + \dots + \lambda_n y_n) = 0_G$  ce qui prouve que  $\lambda_1 y_1 + \dots + \lambda_n y_n$  appartient au noyau de  $v$ . Comme  $v$  est un isomorphisme,  $v$  est en particulier linéaire injective donc son noyau est réduit à  $\{0_F\}$ . On en déduit que  $\lambda_1 y_1 + \dots + \lambda_n y_n = 0_F$  puis, par liberté de  $(y_1, \dots, y_n)$ , que  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$  ce qui prouve la liberté de  $(\tilde{v}(y_1), \dots, \tilde{v}(y_n))$ .

Ainsi,  $(\tilde{v}(y_1), \dots, \tilde{v}(y_n))$  est une base de  $\text{Im } \tilde{v}$  donc  $\dim \text{Im } \tilde{v} = n = \dim \text{Im } u$  puis. On obtient alors :  $\dim \text{Im } v \circ u = \dim \text{Im } u$  autrement dit  $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u)$ .

conclusion pour  $v$  isomorphisme et  $u$  de rang fini, on a  $v \circ u$  de rang fini et  $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u)$ . ■

## II Des applications linéaires usuelles

### II.1 Homothéties

#### Définition II.1.1

Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

L'application  $h_\lambda = \lambda \text{Id}_E$  est un endomorphisme de  $E$  appelé homothétie de rapport  $\lambda$ .

### II.2 Projections/projecteurs

On suppose ici que  $E_1$  et  $E_2$  sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de  $E$ . Alors :

$$\forall x \in E, \exists! (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2, x = x_1 + x_2$$

.

---

**Définition II.2.1 (Définition géométrique)**

L'application  $p : E \longrightarrow E$  définie par

$$\forall x \in E, p(x) = x_1$$

est appelée projection (ou projecteur) sur  $E_1$  parallèlement à  $E_2$ .

---

**Propriétés II.2.2 (Propriétés)**

Si  $p$  est la projection sur  $E_1$  parallèlement à  $E_2$  alors :

- (1)  $p$  est un endomorphisme de  $E$  qui vérifie  $p \circ p = p$  ;
- (2)  $E_1 = \text{Im } p = \ker(p - \text{Id}_E) = \{x \in E \mid p(x) = x\}$  ;
- (3)  $E_2 = \ker p$ .

---

**Définition/Propriétés II.2.3 (Caractérisation algébrique)**

Une application  $p : E \longrightarrow E$  est un projecteur de  $E$  si, et seulement si,  $p$  est linéaire et  $p^2 = p$ .

Dans ce cas, on a :

- (1)  $E = \text{Im } p \oplus \ker p$  ;
- (2)  $p$  est la projection sur  $\text{Im } p = \ker(p - \text{Id}_E)$  parallèlement à  $\ker p$  ;
- (3)  $\forall x \in E, x = p(x) + (x - p(x))$  avec  $\begin{cases} p(x) & \in \text{Im } p \\ x - p(x) & \in \ker p \end{cases}$

---

**Définition/Propriétés II.2.4 (Remarques)**

- (1) Le seul projecteur de  $E$  bijectif est  $\text{Id}_E$  .
- (2) On peut avoir  $E = \text{Im } u \oplus \ker u$  sans que l'endomorphisme  $u$  de  $E$  ne soit un projecteur.

## II.3 Symétries

On suppose ici que  $E_1$  et  $E_2$  sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de  $E$ . Alors :

$$\forall x \in E, \exists!(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2, x = x_1 + x_2$$

---

**Définition II.3.1 (Définition géométrique)**

L'application  $s : E \longrightarrow E$  définie par

$$\forall x \in E, s(x) = x_1 - x_2$$

est appelée symétrie par rapport à  $E_1$  parallèlement à  $E_2$ .

Remarque

Cette application vérifie  $s = 2p - \text{Id}_E$  où  $p$  est la projection sur  $E_1$  parallèlement à  $E_2$ .

---

**Propriétés II.3.2**

Si  $s$  est la symétrie par rapport à  $E_1$  parallèlement à  $E_2$  alors :

- (1)  $s$  est un endomorphisme de  $E$  qui vérifie  $s \circ s = \text{Id}_E$  ;
- (2)  $E_1 = \ker(s - \text{Id}_E) = \{x \in E \mid s(x) = x\}$  ;
- (3)  $E_2 = \ker(s + \text{Id}_E) = \{x \in E \mid s(x) = -x\}$ .

---

**Définition/Propriétés II.3.3 (Caractérisation algébrique)**

Une application  $s : E \longrightarrow E$  est une symétrie de  $E$  si, et seulement si,  $s$  est linéaire et  $s^2 = \text{Id}_E$ .

Dans ce cas :

- (1)  $E = \ker(s - \text{Id}_E) \oplus \ker(s + \text{Id}_E)$  ;
- (2)  $s$  est la symétrie par rapport à  $\ker(s - \text{Id}_E)$  parallèlement à  $\ker(s + \text{Id}_E)$  ;
- (3)  $\forall x \in E, x = \frac{1}{2}(x + s(x)) + \frac{1}{2}(x - s(x))$  avec  $\begin{cases} \frac{1}{2}(x + s(x)) & \in \ker(s - \text{Id}_E) \\ \frac{1}{2}(x - s(x)) & \in \ker(s + \text{Id}_E) \end{cases}$

---

**Définition/Propriétés II.3.4 (Bijectivité des symétries)**

Toute symétrie  $s$  de  $E$  est un automorphisme de  $E$  dont la bijection réciproque est  $s$ .

## III Isomorphismes

### III.1 Détermination d'une application linéaire

---

**Définition/Propriétés III.1.1 (Action sur une base)**

Si  $(e_i)_{i \in I}$  est une base de  $E$  et  $(f_i)_{i \in I}$  une famille de  $F$  alors il existe un unique  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  tel que :

$$\forall i \in I, u(e_i) = f_i.$$

Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminée par la connaissance de son action sur les vecteurs d'une base de son espace vectoriel de départ.

---

**Définition/Propriétés III.1.2 (Recollement)**

Si  $E_1$  et  $E_2$  sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de  $E$  avec  $u_1 \in L(E_1, F)$  et  $u_2 \in L(E_2, F)$  alors il existe un unique  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  tel que :

$$u_1 = u|_{E_1} \text{ et } u_2 = u|_{E_2}$$

Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminée par la connaissance de son action sur les vecteurs de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de son espace vectoriel de départ.

## III.2 Caractérisations de l'injectivité, la surjectivité ou la bijectivité

---

**Définition/Propriétés III.2.1**

Soit  $u$  une application linéaire de  $E$  dans  $F$  et  $(e_i)_{i \in I}$  une base de  $E$ .

- (1)  $u$  est surjective si, et seulement si,  $(u(e_i))_{i \in I}$  est une famille génératrice de  $F$ .
- (2)  $u$  est injective si, et seulement si,  $(u(e_i))_{i \in I}$  est une famille libre de  $F$ .
- (3)  $u$  est bijective si, et seulement si,  $(u(e_i))_{i \in I}$  est une base de  $F$ .

## III.3 Applications linéaires entre espaces de même dimension finie

---

**Définition/Propriétés III.3.1 (Caractérisation des isomorphismes)**

Si  $u$  est une application linéaire entre deux  $\mathbb{K}$  espaces vectoriels de même dimension finie alors les trois propositions suivantes sont deux à deux équivalentes.

- (1)  $u$  est injective
- (2)  $u$  est surjective
- (3)  $u$  est bijective.

---

**Définition/Propriétés III.3.2 (Caractérisation des automorphismes)**

Si  $u$  est un endomorphisme de  $E$  avec  $E$  de dimension finie alors les trois propositions suivantes sont deux à deux équivalentes.

- (1)  $u$  est bijective.
- (2)  $u$  est inversible à droite (c'est-à-dire qu'il existe  $v \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $u \circ v = \text{Id}_E$ ).
- (3)  $u$  est inversible à gauche (c'est-à-dire qu'il existe  $w \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $w \circ u = \text{Id}_E$ ).

## III.4 Espaces vectoriels isomorphes

---

**Définition III.4.1**

Deux espaces vectoriels  $E$  et  $F$  sont dits isomorphes s'il existe un isomorphisme de  $E$  vers  $F$ .

---

**Définition/Propriétés III.4.2 (Caractérisation par la dimension)**

Si  $E$  est de dimension finie alors  $F$  est isomorphe à  $E$  si, et seulement si,  $E$  et  $F$  ont même dimension.

---

**Définition/Propriétés III.4.3 (dimension de  $\mathcal{L}(E, F)$ )**

Si  $E$  et  $F$  sont de dimension finie alors  $\mathcal{L}(E, F)$  l'est aussi et  $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$

## IV Théorème du rang

### IV.1 Théorème du rang (version géométrique)

---

**Théorème IV.1.1**

Si  $u$  est une application linéaire de  $E$  vers  $F$  et si  $S$  est un supplémentaire de  $\ker(u)$  dans  $E$  alors l'application  $\tilde{u} : S \rightarrow \Im u$  définie par

$$\forall x \in S, \tilde{u}(x) = u(x)$$

est un isomorphisme.

Remarques

- L'image d'une application linéaire est donc isomorphe à tout supplémentaire de son noyau.
- On dit aussi que  $u$  induit un isomorphisme de  $S$  sur  $\Im(u)$ .
- On note parfois  $\tilde{u}$  de la manière suivante  $\tilde{u} = u|_S^{\Im(u)}$  en parlant de bi-restriction de  $u$ .

---

**Théorème IV.1.2 (Théorème du rang (version dimension finie))**

Si  $u$  est une application linéaire de  $E$  vers  $F$  avec  $E$  de dimension finie alors

- (1)  $u$  est de rang fini ;
- (2)  $\dim E = \dim \ker(u) + \operatorname{rg}(u)$ .

Remarques

- la dimension finie de l'espace de départ sur lequel est définie l'application linéaire suffit ici.
- ATTENTION  
Le théorème du rang n'implique pas l'égalité  $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u$  (★). En effet,
  - (★) peut n'avoir aucun sens si  $E$  et  $F$  sont distincts (sens de  $x + y$  avec  $x \in E$  et  $y \in F$  ?) ;
  - (★) peut être fausse si  $E$  et  $F$  sont égaux (cf  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}[X])$  définie par  $\forall P \in \mathbb{R}[X], u(P) = P'$ ).

## V Formes linéaires et hyperplans

### V.1 Formes linéaires

---

**Définition/Propriétés V.1.1**

Toute application linéaire de  $E$  vers  $\mathbb{K}$  est dite forme linéaire sur  $E$ .

Exemple

Si  $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$  est une base de  $E$  alors tout  $x$  de  $E$  s'écrit de manière unique sous la forme

$$x = \sum_{i \in I} \underbrace{e_i^*(x)}_{\in \mathbb{K}} e_i$$

Les fonctions  $e_i^* : E \longrightarrow \mathbb{K}$  sont des formes linéaires sur  $E$  dite formes coordonnées relativement à  $\mathcal{B}$ .

### V.2 Hyperplans

---

**Définition V.2.1**

Un sous-espace vectoriel de  $E$  est dit hyperplan s'il est le noyau d'une forme linéaire non nulle sur  $E$ .

---

**Définition/Propriétés V.2.2 (Caractérisations des hyperplans comme supplémentaires de droite)**

Soit  $H$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

$H$  est un hyperplan de  $E$  si, et seulement si,  $H$  est supplémentaire d'une droite de  $E$ .

Remarque

Dans le cas où  $H$  est un hyperplan, pour toute droite  $D$  de  $E$  non contenue dans  $H$ , on a :  $E = H \oplus D$ .

---

### Démonstration

- On suppose que  $H$  est un hyperplan de  $E$ .  
Alors, par définition, il existe  $\varphi$  dans  $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$  avec  $\varphi \neq 0_{\mathcal{L}(E, \mathbb{K})}$  tel que  $H = \ker \varphi$ .

Comme  $\varphi$  n'est pas nulle, il existe un vecteur  $a$  de  $E$  tel que  $\varphi(a) \neq 0$  autrement dit tel que  $a \in E \setminus H$ .

Le sous-espace vectoriel  $D = \text{Vect}(a)$  est alors une droite puisque  $a$  est différent de  $0_E$ .

Montrons que  $E = H \oplus D$

Soit  $x \in E$ .

— analyse on suppose qu'il existe  $(x_H, x_D) \in H \times D$  tel que  $x = x_H + x_D$ .

Alors :  $\exists \lambda \in \mathbb{K}, x_D = \lambda a$  et  $x_H = x - x_D$  avec  $\varphi(x_H) = 0$  par définition de  $H$ . Par linéarité de  $\varphi$ , cela donne  $\varphi(x) - \lambda \varphi(a) = 0$  puis  $\lambda = \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}$  car  $\varphi(a) \neq 0$ .

On en déduit donc que le seul couple  $(x_H, x_D)$  possible est  $\left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a, \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a\right)$ .

— synthèse : on a bien  $x = \left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a\right) + \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a$  avec  $\frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a \in D$  (par définition de  $D$  car  $\frac{\varphi(x)}{\varphi(a)} \in \mathbb{K}$ ) et  $x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a \in H$  (par définition de  $H$  et linéarité de  $\varphi$  car  $\varphi\left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a\right) = \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}\varphi(a) = 0$ ).

On en déduit que tout vecteur de  $E$  s'écrit de manière unique comme somme d'un élément de  $H$  et d'un élément de  $D$ . Ainsi  $E = H \oplus D$  ce qui prouve que  $H$  est supplémentaire d'une droite de  $E$ .

- On suppose que  $H$  est supplémentaire d'une droite de  $E$  que l'on note  $D = \text{Vect}(a)$  avec  $a \neq 0_E$ .

Tout  $x \in E$  s'écrit donc de manière unique sous la forme

$$x = x_H + \lambda a \text{ avec } x_H \in H \text{ et } \lambda \in \mathbb{K}$$

On définit alors l'application linéaire  $\varphi : E \longrightarrow \mathbb{K}$  par recollement en posant :

$$\forall x_H \in H, \varphi(x_H) = 0 \text{ et } \forall \lambda \in \mathbb{K}, \varphi(\lambda a) = \lambda$$

Alors,  $\varphi$  est une forme linéaire (par définition), non nulle car  $\varphi(a) = 1 (\neq 0)$  et de noyau  $H$ . En effet,

$$\varphi(x) = 0 \iff \varphi(x_H + \lambda a) = 0 \iff \varphi(x_H) + \varphi(\lambda a) = 0 \iff \lambda = 0 \iff x = x_H \iff x \in H$$

On en déduit donc, par définition, que  $H$  est un hyperplan de  $E$ .

conclusion :  $H$  hyperplan de  $E$  si, et seulement si,  $H$  est supplémentaire d'une droite de  $E$ . ■

## V.3 Hyperplans en dimension finie

Sauf mention contraire, dans cette partie,  $E$  est de dimension finie non nulle notée  $n$ .

---

**Définition/Propriétés V.3.1 (Caractérisations des hyperplans avec la dimension)**

Un sous-espace vectoriel  $H$  de  $E$  est un hyperplan de  $E$  si, et seulement si,  $\dim(H) = \dim(E) - 1$ .

---

**Définition/Propriétés V.3.2 (Equations d'un hyperplan en dimension finie)**

Soit  $H$  un sous-espace vectoriel de  $E$  et  $B = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

$H$  est un hyperplan de  $E$  si, et seulement si, il existe  $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\}$  tel que :

$$x \in H \iff a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0$$

avec  $(x_1, \dots, x_n)$  la famille des coordonnées du vecteur  $x$  de  $E$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

L'équation  $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0$  est dite équation de  $H$  dans la base  $\mathcal{B}$

Remarque

Dans ce cas,  $H = \ker \varphi$  où  $\varphi$  est la forme linéaire sur  $E$  définie par

$$\varphi : x \longmapsto a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$$

.

---

**Définition/Propriétés V.3.3 (Comparaison des équations d'un hyperplan en dimension finie)**

Deux formes linéaires non nulles sur  $E$  de même noyau sont proportionnelles.

Remarque

: les équations d'un même hyperplan en dimension finie diffèrent donc à une constante multiplicative non nulle près.

---

**Définition/Propriétés V.3.4 (Hyperplans en dimension 2 et 3)**

- Les hyperplans d'un espace vectoriel  $E$  de dimension finie égale à 2 sont les droites de  $E$ . Leurs équations dans une base de  $E$  sont de la forme  $ax + by = 0$  avec  $(a, b) \in \mathbb{K}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  en notant  $x$  et  $y$  les coordonnées d'un vecteur de  $E$  dans la base considérée.
- Les hyperplans d'un espace vectoriel  $E$  de dimension finie égale à 3 sont les plans de  $E$ . Leurs équations dans une base de  $E$  sont de la forme  $ax + by + cz = 0$  avec  $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$  en notant  $x, y$  et  $z$  les coordonnées d'un vecteur de  $E$  dans la base considérée.

Remarque

On retrouve ainsi la forme des équations cartésiennes de droites vectorielles de  $\mathbb{R}^2$  et plans vectoriels de  $\mathbb{R}^3$  vues dans le chapitre "Espaces vectoriels".



## V.4 Intersection d'hyperplans en dimension finie

On suppose ici que  $E$  est de dimension finie non nulle  $n$  et que  $m \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ .

### Théorème V.4.1

- (1) Si  $H_1, \dots, H_m$  sont des hyperplans de  $E$  alors  $\dim \bigcap_{k=1}^m H_k \geq \dim E - m$ .
- (2) Si  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $\dim E - m$  alors il existe  $m$  hyperplans de  $E$  notés  $H_1, \dots, H_m$  tels que  $F = \bigcap_{k=1}^m H_k$ .

### Démonstration

- (1) On note  $F = \bigcap_{k=1}^m H_k$  avec  $H_1, \dots, H_m$  des hyperplans de  $E$ , respectivement noyaux de  $\varphi_1, \dots, \varphi_m$  formes linéaires non nulles sur  $E$ . On considère l'application  $u : E \longrightarrow K^m$  définie par :

$$\forall x \in E, u(x) = (\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x))$$

$u$  est linéaire sur  $E$  (car les  $\varphi_i$  le sont) avec  $E$  de dimension finie. Le théorème du rang implique donc que  $\dim E = \dim \ker u + \dim \operatorname{Im} u$ .

Par ailleurs,  $F = \ker u$  (car  $F = \bigcap_{k=1}^m \ker \varphi_k$ ) et  $\dim \operatorname{Im} u \leq m$  (car  $\operatorname{Im} u \subset K^m$  et  $\dim K^m = m$ ).

Ainsi,  $\dim F = \dim E - \dim \operatorname{Im} u$  donc  $\dim F \geq \dim E - m$ .

conclusion : si  $H_1, \dots, H_m$  sont des hyperplans de  $E$  alors  $\dim \bigcap_{k=1}^m H_k \geq \dim E - m$ .

- (2) Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $p = \dim E - m$ .

Soit  $\mathcal{B}_F = (e_1, \dots, e_p)$  une base de  $F$ , complétée en  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$  base de  $E$ .

Pour  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on note  $e_i^\star$  la  $i_e$  forme coordonnée relativement à la base  $\mathcal{B}$  de  $E$ . Soit  $x \in E$ .

$$x \in F \iff \forall i \in \llbracket p+1 ; n \rrbracket e_i^\star(x) = 0.$$

$$\iff x \in \bigcap_{i=p+1}^n \ker e_i^\star$$

$$\iff x \in \bigcap_{k=1}^{n-p} \ker e_{n-k+1}^\star \quad (\text{après le changement d'indice } i = n - k + 1)$$

Ainsi  $F = \bigcap_{k=1}^{n-p} H_k$  avec  $H_k = \ker e_{n-k+1}^\star$  hyperplan de  $E$  (comme noyau d'une forme linéaire non nulle sur  $E$ ) et  $n - p = m$ .

conclusion : si  $F$  est sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $\dim E - m$  alors  $F$  est intersection de  $m$  hyperplans de  $E$ . ■

---

**Définition/Propriétés V.4.2 (Système d'équations d'un sous-espace vectoriel)**

Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $\dim E - m$  et  $H_1, \dots, H_m$  des hyperplans de  $E$  tels que

$$F = \bigcap_{k=1}^m H_k$$

Le système d'équations obtenu en rassemblant des équations des  $m$  hyperplans  $H_i$  relativement à une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  est appelé système d'équations du sous-espace vectoriel  $F$  relativement à  $\mathcal{B}$ .

Exemple Une droite vectorielle de  $\mathbb{R}^3$  a donc un système d'équations du type

$$\begin{cases} ax + by + cz &= 0 \\ a'x + b'y + c'z &= 0 \end{cases}$$

avec  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$  et  $(a', b', c') \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ .

# Chapitre 23

## Matrice et Application Linéaire (2)

### Sommaire

---

<b>I</b>	<b>Matrice d'une application linéaire en dimension finie . . . . .</b>	<b>257</b>
I.1	Matrice d'un vecteur et d'une famille de vecteurs . . . . .	257
I.2	Matrice d'une application linéaire dans un couple de bases . . . . .	258
I.3	Matrice d'un endomorphisme dans une base . . . . .	260
<b>II</b>	<b>Application linéaire canoniquement associée à une matrice . . . . .</b>	<b>261</b>
II.1	Définition . . . . .	261
II.2	Identification usuelle de $\mathbb{K}^m$ et $\mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{K})$ . . . . .	261
II.3	Noyau, Image, rang d'une matrice . . . . .	261
II.4	Retour sur les systèmes linéaires . . . . .	262
<b>III</b>	<b>Changement de bases. . . . .</b>	<b>263</b>
III.1	Matrice de passage entre deux bases . . . . .	263
III.2	Effet des changements de bases. . . . .	264
<b>IV</b>	<b>Matrices semblables et trace . . . . .</b>	<b>265</b>
IV.1	Matrices (carrées) semblables . . . . .	265
IV.2	Trace d'une matrice (carrée) . . . . .	265
IV.3	Trace d'un endomorphisme en dimension finie . . . . .	265
<b>V</b>	<b>Matrices (rectangles) équivalentes et rang . . . . .</b>	<b>266</b>
V.1	Définition . . . . .	266
V.2	Invariance du rang par multiplication par une matrice inversible . . . . .	266
V.3	Caractérisation des matrices de rang $r$ . . . . .	267
V.4	Rang et transposition . . . . .	268
V.5	Rang et opérations élémentaires . . . . .	268
V.6	Rang et matrices extraites . . . . .	268

---

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  et  $(m, n, p) \in (\mathbb{N}^*)^3$ .

### I Matrice d'une application linéaire en dimension finie

#### I.1 Matrice d'un vecteur et d'une famille de vecteurs

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$  muni d'une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ .

---

**Définition/Propriétés I.1.1 (Cas d'un vecteur)**

Soit  $x$  un vecteur de  $E$  dont l'écriture dans la base  $\mathcal{B}$  de  $E$  est  $x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$  avec  $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ . On appelle matrice du vecteur  $x$  dans la base  $\mathcal{B}$ , et on note  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ , la matrice de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  définie par :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

---

**Définition/Propriétés I.1.2 (Cas d'une famille finie de vecteurs)**

Soit  $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p)$  une famille finie de  $p$  vecteurs de  $E$ .

On appelle matrice de la famille de vecteurs  $\mathcal{F}$  dans la base  $\mathcal{B}$  et on note  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$  la matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  dont la  $j^e$  colonne contient les coordonnées de  $x_j$ , le  $j^e$  vecteur de  $\mathcal{F}$ , dans  $\mathcal{B}$  :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ \vdots \\ e_i \\ \vdots \\ e_n \end{matrix}$$

## I.2 Matrice d'une application linéaire dans un couple de bases

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $p$  muni d'une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ . Soit  $F$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$  muni d'une base  $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$ . Soit  $G$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $m$  muni d'une base  $\mathcal{D} = (g_1, \dots, g_m)$ .

---

**Définition I.2.1**

Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ . On appelle matrice de l'application linéaire  $u$  relativement aux bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$ , et on note  $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ , la matrice de la famille de vecteurs  $(u(\mathcal{B}))$  dans la base  $\mathcal{C}$  de  $F$  :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(e_1), \dots, u(e_p)) = \begin{matrix} & \begin{matrix} u(e_1) & \cdots & u(e_j) & \cdots & u(e_p) \end{matrix} \\ & \begin{matrix} \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & & & \vdots \\ a_{i1} & & a_{ij} & & a_{ip} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} & \begin{matrix} f_1 \\ \vdots \\ f_i \\ \vdots \\ f_n \end{matrix} \end{matrix}$$

---

**Définition/Propriétés I.2.2 (Coordonnées de l'image d'un vecteur par une application linéaire)**

Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $(x, y) \in E \times F$ . Alors,

$$u(x) = y \iff AX = Y \text{ avec } \begin{cases} A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \\ X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \\ Y = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(y) \end{cases}$$

---

**Définition/Propriétés I.2.3 (Isomorphisme entre les espaces vectoriels  $\mathcal{L}(E, F)$  et  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ )**

Pour  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$  des bases fixées de  $E$  et  $F$ , l'application  $\psi : u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  est un isomorphisme d'espaces vectoriels de  $\mathcal{L}(E, F)$  dans  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

Remarque

Autrement dit,  $\mathcal{L}(E, F)$  et  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  sont des espaces vectoriels isomorphes.

---

**Définition/Propriétés I.2.4 (Matrice d'une combinaison linéaire ou d'une composée d'applications)**

$$(1) \forall (u, v) \in (\mathcal{L}(E, F))^2, \forall (\lambda, \mu) \in K^2, \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\lambda u + \mu v) = \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) + \mu \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(v).$$

$$(2) \forall (u, v) \in \mathcal{L}(E, F) \times \mathcal{L}(F, G), \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{D}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u).$$

---

**Définition/Propriétés I.2.5 (Matrice d'un isomorphisme)**

Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  avec  $E$  et  $F$  de même dimension finie.

$u$  est un isomorphisme de  $E$  sur  $F$  si, et seulement si,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  est inversible avec, dans ce cas,

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1}) = \left( \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \right)^{-1}$$

---

*Démonstration*

- $\boxed{\implies}$  Supposons que  $u$  est un isomorphisme de  $E$  sur  $F$ .

Alors, par propriété, sa bijection réciproque  $u^{-1}$  est un isomorphisme de  $F$  sur  $E$  et on a :

$$u \circ u^{-1} = \text{Id}_F \text{ et } u^{-1} \circ u = \text{Id}_E$$

. Par traduction matricielle de ces égalités d'applications linéaires, on trouve successivement :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \times \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1}) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}}(\text{Id}_F) \text{ et } \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1}) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(\text{Id}_E).$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \times \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1}) = I_n \text{ et } \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1}) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = I_n.$$

Ceci prouve, par définition, que :  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  est inversible d'inverse  $\text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1})$ .

- $\boxed{\Leftarrow}$  Supposons que  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  est inversible.

Alors,  $A^{-1}$  existe et appartient à  $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ . Comme  $\psi : w \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(w)$  est un isomorphisme de  $\mathcal{L}(F, E)$  vers  $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ , il existe une unique application linéaire  $v \in \mathcal{L}(F, E)$  telle que  $A^{-1} = \psi(v) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(v)$ .

Or  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(v \circ u) = A^{-1} \times A = I_n$$

puis

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(\text{Id}_E)$$

et enfin

$$v \circ u = \text{Id}_E$$

car une application linéaire est déterminée par la donnée de sa matrice dans un couple de bases fixé.

Ainsi,  $u$  est inversible à gauche donc, par caractérisation des isomorphismes entre espaces vectoriels de même dimension finie,  $u$  est un isomorphisme de  $E$  vers  $F$ .

$\boxed{\text{conclusion}}$  le résultat attendu est montré par double-implication. ■

### I.3 Matrice d'un endomorphisme dans une base

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$  muni d'une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ .

#### Définition I.3.1

Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On appelle matrice de l'endomorphisme  $u$  relativement à la base  $\mathcal{B}$ , et on note  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ , la matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(u)$ .

#### Propriétés I.3.2 (Isomorphisme entre les espaces vectoriels (resp. les anneaux) $\mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ )

Pour  $\mathcal{B}$  base fixée de  $E$ , l'application  $\psi : u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$  est un isomorphisme d'espaces vectoriels et un isomorphisme d'anneaux de  $\mathcal{L}(E)$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

En particulier,

- (1)  $\forall (u, v) \in (\mathcal{L}(E))^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\lambda u + \mu v) = \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) + \mu \text{Mat}_{\mathcal{B}}(v)$ .
- (2)  $\forall (u, v) \in (\mathcal{L}(E))^2, \text{Mat}_{\mathcal{B}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$
- (3)  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E) = I_n$ .

#### Définition/Propriétés I.3.3 (Matrice d'un automorphisme)

Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

$u$  est un automorphisme de  $E$  si, et seulement si,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$  est inversible avec, dans ce cas,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^{-1}) = \left( \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \right)^{-1}$$

## II Application linéaire canoniquement associée à une matrice

### II.1 Définition

---

#### Définition II.1.1

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

On appelle application linéaire canoniquement associée à  $A$  l'application  $u$  de  $\mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$  telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_{can}, \mathcal{C}_{can}}(u) = A$$

où  $\mathcal{B}_{can}$  et  $\mathcal{C}_{can}$  sont les bases canoniques (*i.e.* usuelles) de  $\mathbb{K}^p$  et  $\mathbb{K}^n$ .

### II.2 Identification usuelle de $\mathbb{K}^m$ et $\mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{K})$

---

#### Définition/Propriétés II.2.1

L'application de  $\mathbb{K}^m$  dans  $\mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{K})$  qui à  $x \in \mathbb{K}^m$  associe  $X = \text{Mat}_{\mathcal{D}_{can}}(x)$  où  $\mathcal{D}_{can}$  est la base usuelle de  $\mathbb{K}^m$  est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Remarque

Dans la suite de ce cours, on identifiera donc souvent tout vecteur de  $\mathbb{K}^m$  à la matrice-colonne de ses coordonnées dans la base usuelle de  $\mathbb{K}^m$  autrement dit, on identifiera  $\mathbb{K}^m$  et  $\mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{K})$ .

### II.3 Noyau, Image, rang d'une matrice

---

#### Définition II.3.1

On appelle noyau (resp. image, resp. rang) de  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  et on note  $\ker A$  (resp.  $\text{Im } A$ , resp.  $\text{rg } A$ ) le noyau (resp. l'image, resp. le rang) de l'application linéaire  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$  canoniquement associée à  $A$ .

Autrement dit,

- (1)  $\ker A = \{x \in \mathbb{K}^p \mid u(x) = 0_{\mathbb{K}^n}\} = \{X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \mid AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}\}.$
- (2)  $\text{Im } A = \{u(x) \mid x \in \mathbb{K}^p\} = \{AX \mid X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})\}.$
- (3)  $\text{rg } A = \dim \text{Im } u = \dim \text{Im } A.$

#### Propriétés II.3.2

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

- (1)  $\text{Im } A = \text{Vect}((C_1, \dots, C_p))$  avec  $C_1, \dots, C_p$  les colonnes de  $A$ .
- (2)  $\text{rg } A = \dim \text{Vect}(C_1, \dots, C_p) = \text{rg}(C_1, \dots, C_p)$  donc  $\text{rg}(A) \leq \min n, p$ .
- (3)  $\ker A$  a pour système d'équations 
$$\begin{cases} L_1 X = 0 \\ \dots \\ L_n X = 0 \end{cases} \quad \text{avec } X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \text{ et } L_1, \dots, L_n \text{ les lignes de } A.$$

---

**Définition/Propriétés II.3.3 (Caractérisations des matrices inversibles)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Les assertions suivantes sont deux à deux équivalentes :

- (1)  $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ .
- (2)  $\ker A = \{0_{\mathbb{K}^n}\}$ .
- (3)  $\text{Im } A = \mathbb{K}^n$  (*i.e.* les colonnes de  $A$  engendrent  $\mathbb{K}^n$ ).
- (4)  $\text{rg } A = n$ .
- (5)  $A$  est inversible à droite (*i.e.* il existe  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $AB = I_n$ ).
- (6)  $A$  est inversible à gauche (*i.e.* il existe  $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $CA = I_n$ ).

---

**Définition/Propriétés II.3.4 (Cas des matrices triangulaires)**

Une matrice triangulaire est inversible si, et seulement si, tous ses éléments diagonaux sont non nuls.

**Remarque**

L'inverse d'une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure) inversible est une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure) et

$$\text{pour } T = \begin{pmatrix} t_{11} & \times & \dots & \times \\ 0 & t_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \times \\ 0 & \dots & 0 & t_{nn} \end{pmatrix} \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}), \text{ on a } T^{-1} = \begin{pmatrix} t_{11}^{-1} & \star & \dots & \star \\ 0 & t_{22}^{-1} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \star \\ 0 & \dots & 0 & t_{nn}^{-1} \end{pmatrix}$$

## II.4 Retour sur les systèmes linéaires

Soit  $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ ,  $X = (x_i) \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$  et  $B = (b_i) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$

---

**Définition/Propriétés II.4.1 (Rappels)**

$$\text{Le système linéaire } \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases} \text{ d'inconnue } (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p \text{ est équivalent à } AX = B.$$

Dans le cas où  $B = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$ , on dit que le système linéaire est homogène.

**Remarque**

Autrement dit, le système linéaire est équivalent à l'équation linéaire  $u(x) = b$  où  $u$  est l'application linéaire de  $\mathbb{K}^p$  dans  $\mathbb{K}^n$  canoniquement associée à  $A$ ,  $x$  est le vecteur de  $\mathbb{K}^p$  de matrice  $X$  dans la base usuelle de  $\mathbb{K}^p$  et  $b$  le vecteur de  $\mathbb{K}^n$  de matrice  $B$  dans la base usuelle de  $\mathbb{K}^n$ .



---

**Définition/Propriétés II.4.2 (Solutions d'un système linéaire)**

- Cas d'un système linéaire homogène
  - On appelle rang du système linéaire homogène  $AX = 0$  le rang de  $A$ .
  - L'ensemble des solutions du système homogène  $AX = 0$  est le noyau de  $A$  donc est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $p - r$  où  $r$  est le rang du système.
- Cas d'un système linéaire non homogène
  - On dit que le système  $AX = B$  est compatible si  $B$  appartient à l'image de  $A$ .
  - Si le système  $AX = B$  est compatible alors ses solutions sont les matrices  $X_0 + Y$  avec :
    - (1)  $X_0 \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$  une solution particulière de  $AX = B$  ;
    - (2)  $Y \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$  solution quelconque du système homogène  $AX = 0$  associé.

L'ensemble-solution du système linéaire  $AX = B$  est donc :

- soit l'ensemble-vidé (si le système n'est pas compatible) ;
- soit l'ensemble noté  $X_0 + \ker A$  défini par

$$X_0 + \ker A = \{X_0 + Y \mid Y \in \ker A\}$$

On dit alors que c'est un  $\mathbb{K}$ -espace affine passant par  $X_0$  (solution particulière de  $AX = B$ ) et dirigé par  $\ker A$  (espace vectoriel des solutions du système linéaire homogène  $AX = 0$  associé)

---

**Définition/Propriétés II.4.3 (Cas particulier où la matrice du système est inversible)**

On se place ici dans le cas où  $n = p$ .

Le système linéaire  $AX = B$  admet une solution et une seule si, et seulement si,  $A$  est inversible.

Dans ce cas, on dit que le système est de Cramer.

## III Changement de bases

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle muni de deux bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$ . Soit  $F$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle muni de deux bases  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{C}'$ .

### III.1 Matrice de passage entre deux bases

---

**Définition III.1.1**

On appelle matrice de passage de  $\mathcal{B}$  à  $\mathcal{B}'$ , et on note  $\text{Pass}(\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}')$ , la matrice de  $\mathcal{B}'$  dans la base  $\mathcal{B}$  :

$$\text{Pass}(\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}') = \underset{\mathcal{B}}{\text{Mat}}(\mathcal{B}') = \begin{pmatrix} \begin{matrix} e'_1 & \cdots & e'_j & \cdots & e'_p \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \end{matrix} \\ \begin{matrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{pj} & \cdots & a_{np} \end{matrix} \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ \vdots \\ e_i \\ \vdots \\ e_n \end{matrix}$$

---

**Propriétés III.1.2**

(1)  $\text{Pass}(\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}') = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E).$

(2)  $P = \text{Pass}(\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}')$  est inversible d'inverse  $P^{-1} = \text{Pass}(\mathcal{B}' \longrightarrow \mathcal{B}).$

## III.2 Effet des changements de bases...

---

**Définition/Propriétés III.2.1 (...sur la matrice des coordonnées d'un vecteur dans une base)**

Pour  $x \in E$ , on a

$$X = PX'$$

avec

$$P = \text{Pass}(\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}'), X = \text{Mat}_B(x) \text{ et } X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'_x}(.)$$

**Remarque**

Cette formule est très simple mais elle donne les coordonnées d'un vecteur dans "l'ancienne base" en fonction des coordonnées dans "la nouvelle base" ce qui n'est pas ce que l'on cherche à obtenir en général.

---

**Définition/Propriétés III.2.2 (...sur la matrice d'une application linéaire dans un couple de bases)**

Pour  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ , on a

$$A' = Q^{-1}AP$$

avec

$$A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(u), Q = \text{Pass}(\mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}'), A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \text{ et } P = \text{Pass}(\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}')$$

---

**Définition/Propriétés III.2.3 (...sur la matrice d'un endomorphisme dans une base)**

Pour  $u \in \mathcal{L}(E)$ , on a

$$A' = P^{-1}AP$$

avec

$$A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u), A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{ et } P = \text{Pass}(\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}')$$

## IV Matrices semblables et trace

### IV.1 Matrices (carrées) semblables

---

#### Définition IV.1.1

Deux matrices  $A$  et  $A'$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  sont dites semblables s'il existe une matrice  $P$  dans  $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$  telle que  $A' = P^{-1}AP$

---

#### Définition/Propriétés IV.1.2 (Caractérisation géométrique)

Deux matrices  $A$  et  $A'$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  sont semblables si, et seulement si, elles représentent le même endomorphisme dans des bases différentes.

Remarque

Un des enjeux majeurs du programme d'algèbre linéaire en MPI est de réduire les matrices en déterminant des matrices diagonales ou triangulaires qui leur sont semblables.

### IV.2 Trace d'une matrice (carrée)

---

#### Définition IV.2.1

On appelle trace de la matrice  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , et on note  $\text{tr}(A)$ , le scalaire égal à la somme des éléments diagonaux de  $A$  :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} \quad (\in \mathbb{K})$$

---

#### Propriétés IV.2.2

- (1)  $\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) (\mathbb{K}))^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \text{tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \text{tr}(A) + \mu \text{tr}(B)$
- (2)  $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}), \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$
- (3) Deux matrices semblables ont même trace.

### IV.3 Trace d'un endomorphisme en dimension finie

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle

---

**Définition IV.3.1**

On appelle trace de l'endomorphisme  $u$  de  $E$ , et on note  $\text{tr}(u)$ , la trace d'une matrice représentant  $u$  dans une base quelconque de  $E$ .

---

**Propriétés IV.3.2**

- (1)  $\forall (u, v) \in (\mathcal{L}(E))^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \text{tr}(\lambda u + \mu v) = \lambda \text{tr}(u) + \mu \text{tr}(v)$
  - (2)  $\forall (u, v) \in (\mathcal{L}(E))^2, \text{tr}(u \circ v) = \text{tr}(v \circ u)$ .
- 

**Définition/Propriétés IV.3.3 (Cas particulier des projecteurs)**

La trace d'un projecteur de  $E$  est égale à son rang.

---

## V Matrices (rectangles) équivalentes et rang

### V.1 Définition

---

**Définition V.1.1**

Deux matrices  $A$  et  $B$  de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  sont dites équivalentes s'il existe une matrice  $U$  dans  $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$  et une matrice  $V$  dans  $\mathcal{GL}_p(\mathbb{K})$  telles que  $B = UAV$ .

Remarque

Les matrices d'une même application linéaire dans des couples différents de base sont équivalentes.

### V.2 Invariance du rang par multiplication par une matrice inversible

---

**Définition/Propriétés V.2.1**

- (1)  $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall U \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}), \text{rg } UA = \text{rg } A$
- (2)  $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall V \in \mathcal{GL}_p, \text{rg } AV = \text{rg } A$

Remarques

- Le rang d'une matrice est conservé par multiplication (à droite/gauche) par une matrice inversible.
- Des matrices équivalentes ont même rang.

### V.3 Caractérisation des matrices de rang $r$

#### Définition/Propriétés V.3.1

Une matrice  $A$  de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est de rang  $r$  si, et, seulement si,  $A$  est équivalente à  $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,p-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,p-r} \end{pmatrix}$

Remarque

Si  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  est de rang  $r$  alors il existe un couple de bases dans lequel  $u$  a pour matrice  $J_r$

*Démonstration*

- $\boxed{\Leftarrow}$  Supposons que  $A$  est équivalente  $J_r$ .  
Alors, par propriété, le rang de  $A$  est égal au rang de  $J_r$ . Comme les  $r$  premières colonnes de  $J_r$  forment une famille libre de  $\mathbb{K}^n$  et que les suivantes sont nulles, le rang de  $J_r$  est égal à  $r$ .  
 $\boxed{\text{conclusion}}$  :  $A$  est de rang  $r$ .
- $\boxed{\Rightarrow}$  Supposons que  $A$  est de rang  $r$ .  
Par définition, l'application linéaire  $u : \mathbb{K}^p \longrightarrow \mathbb{K}^n$  canoniquement associée à  $A$  est alors de rang  $r$ .

Par théorème du rang appliqué à  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$  avec  $\mathbb{K}^p$  de dimension finie  $p$ , on a :  $\dim \ker u = p - r$ .

Soit  $S$  un supplémentaire de  $\ker u$  dans  $\mathbb{K}^p$  (qui existe car  $\mathbb{K}^p$  est de dimension finie). On a :  $\dim S = r$ .

On considère  $\mathcal{B}_S = (e_1, \dots, e_r)$  une base de  $S$  et  $\mathcal{B}_{\ker u} = (e_{r+1}, \dots, e_p)$  une base de  $\ker u$ .

— Puisque  $\mathbb{K}^p = S \oplus \ker u$ , par concaténation de  $\mathcal{B}_S$  et  $\mathcal{B}_{\ker u}$ , on obtient une base de  $\mathbb{K}^p$

$$B' = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_p)$$

dite adaptée à la décomposition en somme directe.

— D'après la version géométrique du théorème du rang, l'application  $\tilde{u} : S \longrightarrow \text{Im } u$  définie par  $\forall x \in S, \tilde{u}(x) = u(x)$  est un isomorphisme donc transforme toute base de  $S$  en une base de  $\text{Im } u$ .

Ainsi,  $(\tilde{u}(e_1), \dots, \tilde{u}(e_r)) = (u(e_1), \dots, u(e_r))$  est une base de  $\text{Im } u$  donc une famille libre de  $\mathbb{K}^n$ .

On peut donc la compléter, par théorème de la base incomplète, en une base de  $\mathbb{K}^n$  :

$$C' = (u(e_1), \dots, u(e_r), f_{r+1}, \dots, f_n)$$

Comme  $\forall i \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, \tilde{u}(e_i) = u(e_i)$  et  $\forall i \in \llbracket r+1 ; p \rrbracket, u(e_i) = 0_{\mathbb{K}^n}$ , par définition de la matrice d'une application linéaire dans un couple de bases, on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}', C'}(u) = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,p-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,p-r} \end{pmatrix}.$$

$\boxed{\text{conclusion}}$   $A$  et  $J_r$  sont équivalentes, par propriété, car elles représentent  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$  dans des couples de bases différents. ■

## V.4 Rang et transposition

---

### Définition/Propriétés V.4.1

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

- (1) Le rang de  $A$  est égal au rang de  $A^\top$ .
- (2) Le rang de  $A$  est égal au rang de la famille de ses vecteurs lignes.

## V.5 Rang et opérations élémentaires

---

### Définition/Propriétés V.5.1

Les opérations élémentaires sur les colonnes (resp. lignes) d'une matrice conservent l'image (resp. le rang, resp. le noyau).

## V.6 Rang et matrices extraites

---

### Définition V.6.1

Toute matrice obtenue en otant des lignes ou colonnes de  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est dite matrice extraite de  $A$ .

---

### Propriétés V.6.2

Le rang de  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est supérieur ou égal au rang de toute matrice extraite de  $A$ .

---

#### Démonstration

On note  $B$  une matrice extraite de la matrice  $A$ , c'est-à-dire une matrice obtenue en supprimant des colonnes  $C_{j_1}, \dots, C_{j_s}$  ou des lignes  $L_{i_1}, \dots, L_{i_t}$  de  $A$ .

Par propriété, le rang d'une matrice est le rang de la famille de ses colonnes donc on a  $\text{rg } A \geq \text{rg } A'$  où  $A'$  est la matrice extraite de  $A$  obtenue en supprimant les colonnes  $C_{j_1}, \dots, C_{j_s}$ .

De même

$$\text{rg } A'^\top \geq \text{rg } B^\top$$

car  $B$  est la matrice extraite de  $A'$  en supprimant les lignes  $L_{i_1}, \dots, L_{i_t}$  donc  $B^\top$  est une matrice extraite de  $A'^\top$  en supprimant des colonnes.

Le rang étant invariant par transposition, on en déduit que :  $\text{rg } A \geq \text{rg } B$ .

conclusion Le rang de  $A$  est supérieur ou égal au rang de toute matrice extraite de  $A$ . ■

---

**Définition/Propriétés V.6.3 (Caractérisation du rang par les matrices carrées extraites)**

Le rang de  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est la taille maximale des matrices extraites de  $A$  qui sont inversibles.

---

*Démonstration*

Soit  $r \in \mathbb{N}^*$ .

Montrons que :  $\text{rg} A \geq r$  si, et seulement si, il existe une matrice extraite de  $A$  inversible et de taille  $r$ .

(ce qui prouvera que le rang de  $A$  est la taille maximale des matrices extraites de  $A$  inversibles sachant de plus que la matrice nulle est de rang nul et qu'aucune de ses matrices extraites n'est inversible).

- Supposons qu'il existe une matrice extraite de  $A$  qui soit inversible et de taille  $r$ .

Alors, par caractérisation de l'inversibilité par le rang, cette matrice est de rang  $r$  donc, par propriété vue sur le rang des matrices extraites de  $A$ , on a :  $\text{rg} A \geq r$ .

- Supposons  $\text{rg} A \geq r$ .

Il existe donc  $r$  colonnes,  $C_{j_1} \dots, C_{j_r}$ , de  $A$  qui forment une famille libre. On note  $B \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$  la matrice extraite de  $A$  en ne conservant que ces colonnes ;  $B$  est de rang  $r$ .

Par propriété, la matrice  $B^T \in \mathcal{M}_{r,n}(\mathbb{K})$  est aussi de rang  $r$ . En reprenant le même principe, on obtient donc une matrice  $D \in \mathcal{M}_{r,r}(\mathbb{K})$  de rang  $r$  extraite de  $B^T$  en ne conservant que  $r$  colonnes de  $B^T$  formant une famille libre.

Les colonnes conservées étant des lignes de la matrice  $B$ , la matrice  $D^T \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$  est une matrice extraite de  $A$  de taille  $r$  et de rang  $r$  donc elle est inversible.

Ainsi, il existe bien une matrice extraite de  $A$  inversible et de taille  $r$ .

conclusion  $\text{rg} A \geq r$  si, et seulement si, il existe une matrice extraite de  $A$  inversible et de taille  $r$  ■

# Chapitre 24

## Arithmétique des Polynômes

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Arithmétique dans <math>\mathbb{K}[X]</math></b>	<b>270</b>
I.1	PGCD de deux polynômes	270
I.2	PPCM de deux polynômes	272
I.3	Couple de polynômes premiers entre eux	272
I.4	PGCD d'un nombre fini de polynômes	273
<b>II</b>	<b>Polynômes irréductibles.</b>	<b>274</b>
II.1	Théorème de D'Alembert-Gauss	274
II.2	Polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$	274
II.3	Décomposition en facteurs irréductibles	274

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne le corps  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

On rappelle une définition et une notation vues dans le chapitre "Polynômes" :

- deux polynômes  $A$  et  $B$  sont dits associés, s'il existe un scalaire non nul  $\lambda$  tel que  $A = \lambda B$ .
- $\mathcal{D}(A)$  désigne l'ensemble des diviseurs du polynôme  $A$  de  $\mathbb{K}[X]$  dans  $\mathbb{K}[X]$ .

### I Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

#### I.1 PGCD de deux polynômes

##### Définition I.1.1 (Définition des PGCD)

Soit  $(A, B) \in (\mathbb{K}[X])^2$  tel que  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ .

Tout diviseur commun de  $A$  et  $B$  dans  $\mathbb{K}[X]$  de degré maximal est dit PGCD des polynômes  $A$  et  $B$ .

##### Remarques

- Pour tout  $A \in \mathbb{K}[X]$ , les PGCD de  $A$  et  $1_{\mathbb{K}[X]}$  sont les associés du polynôme  $1_{\mathbb{K}[X]}$ .
- Pour tout  $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0_{\mathbb{K}[X]}\}$ , les PGCD de  $0_{\mathbb{K}[X]}$  et  $B$  sont les associés du polynôme  $B$ .
- Pour tout  $(A, B) \in (\mathbb{K}[X])^2$  tel que  $(A, B) \neq (0_{\mathbb{K}[X]}, 0_{\mathbb{K}[X]})$ , les PGCD de  $A$  et  $B$  sont les PGCD de  $B$  et  $A$ .



---

**Propriétés I.1.2 (Propriété importante des PGCD)**

Soit  $(A, B) \in (\mathbb{K}[X])^2$  tel que  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ .

Si  $R$  est le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $B$  alors

$$\mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B) = \mathcal{D}(B) \cap \mathcal{D}(R)$$

donc les PGCD de  $A$  et  $B$  sont les PGCD de  $B$  et de  $R$ .

Remarque

Plus généralement si  $A = BC + D$  avec  $(A, B, C, D) \in (\mathbb{K}[X])^4$  alors  $\mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B) = \mathcal{D}(B) \cap \mathcal{D}(D)$ .

---

**Définition/Propriétés I.1.3 (Algorithme d'Euclide)**

Soit  $(A, B) \in (\mathbb{K}[X])^2$  tel que  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ .

On pose :

$$R_0 = A \text{ et } R_1 = B$$

Pour tout  $i \in \mathbb{N}^*$  tel que  $R_i \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ , on définit  $R_{i+1}$  comme suit :

$R_{i+1}$  est le reste de la division euclidienne de  $R_{i-1}$  par  $R_i$ .

Alors :

- il existe  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $R_{n+1} = 0_{\mathbb{K}[X]}$  et  $R_n \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$
- pour tout  $i \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ , les PGCD de  $R_{i-1}$  et  $R_i$  sont les PGCD de  $R_i$  et  $R_{i+1}$ .

En particulier, les PGCD de  $A$  et  $B$  sont les PGCD de  $R_n$  et  $R_{n+1}$  donc sont les polynômes associés à  $R_n$ . Remarques

- Les PGCD de  $A$  et  $B$  sont les polynômes associés au dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide encore appelé algorithme des divisions euclidiennes successives.
- Parmi les polynômes associés au dernier reste non nul  $R_n$ , un seul est unitaire.

---

**Définition/Propriétés I.1.4 (Caractérisation des PGCD)**

Soit  $(A, B) \in (\mathbb{K}[X])^2$  tel que  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ .

L'ensemble des diviseurs communs à  $A$  et  $B$  est égal à l'ensemble des diviseurs d'un de leurs PGCD.

---

**Définition/Propriétés I.1.5 (Définition et caractérisation du PGCD)**

Soit  $(A, B) \in (\mathbb{K}[X])^2$  tel que  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ .

- Le polynôme unitaire de plus haut degré de  $\mathbb{K}[X]$  diviseur commun de  $A$  et  $B$  est appelé le PGCD de  $A$  et  $B$  et noté  $A \wedge B$ .
- Le polynôme  $A \wedge B$  est caractérisé par les trois propriétés suivantes :
  - (1)  $A \wedge B$  est un polynôme unitaire de  $\mathbb{K}[X]$ .
  - (2)  $A \wedge B \mid A$  et  $A \wedge B \mid B$ .
  - (3)  $\forall D \in \mathbb{K}[X], D \mid A \text{ et } D \mid B \implies D \mid A \wedge B$ .

---

### Définition/Propriétés I.1.6 (Relation de Bézout)

Soit  $(A, B) \in (\mathbb{K}[X])^2$  tel que  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ .

Il existe un couple de polynômes  $(U, V) \in (\mathbb{K}[X])^2$ , dit couple de Bézout, tel que  $AU + BV = A \wedge B$ .

Remarque

Un tel couple, qui n'est pas unique, peut être déterminé par l'algorithme d'Euclide étendu selon le même principe que celui vu dans  $\mathbb{Z}$ .

## I.2 PPCM de deux polynômes

---

### Définition/Propriétés I.2.1

Soit  $(A, B) \in (\mathbb{K}[X])^2$  avec  $A \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$  et  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ .

- Tout multiple commun non nul de  $A$  et  $B$  de degré minimal est dit PPCM de  $A$  et  $B$ .
- L'unique polynôme unitaire de plus bas degré de  $\mathbb{K}[X]$  qui est multiple commun de  $A$  et  $B$  est appelé le PPCM de  $A$  et  $B$  et noté  $A \vee B$ .

## I.3 Couple de polynômes premiers entre eux

Soit  $(A, B, C) \in (\mathbb{K}[X])^3$  avec  $A \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ ,  $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$  et  $C \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ .

---

### Définition I.3.1

On dit que les polynômes  $A$  et  $B$  sont premiers entre eux si  $A \wedge B = 1_{\mathbb{K}[X]}$ .

---

### Théorème I.3.2 (Théorème de Bézout)

$A$  et  $B$  sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe  $(U, V) \in (\mathbb{K}[X])^2$  tel que  $AU + BV = 1_{\mathbb{K}[X]}$ .

---

**Définition/Propriétés I.3.3 (Lemme de Gauss)**

Si  $C$  divise  $AB$  et si  $C$  est premier avec  $A$  alors  $C$  divise  $B$ .

---

**Définition/Propriétés I.3.4 (Propriétés sur le produit)**

- Si  $A$  et  $B$  sont premiers entre eux et divisent  $C$  alors  $AB$  divise  $C$ .
- Si  $A$  et  $C$  sont premiers entre eux et si  $B$  et  $C$  sont premiers entre eux alors  $AB$  et  $C$  sont premiers entre eux.

## I.4 PGCD d'un nombre fini de polynômes

Soit  $n \in \mathbb{N}$  avec  $n \geq 2$  et  $(A_1, \dots, A_n) \in (\mathbb{K}[X])^n$  tel que l'un au moins des  $A_i$  est différent de  $0_{\mathbb{K}[X]}$ .

---

**Définition/Propriétés I.4.1 (PGCD)**

On appelle PGCD des polynômes  $A_1, A_2, \dots$  et  $A_n$  et on note  $A_1 \wedge \dots \wedge A_n$  le polynôme unitaire de degré maximal de  $\mathbb{K}[X]$  diviseur commun de  $A_1, A_2, \dots$  et  $A_n$ .

On a alors :

$$\mathcal{D}(A_1 \wedge \dots \wedge A_n) = \mathcal{D}(A_1) \cap \dots \cap \mathcal{D}(A_n)$$

.

---

**Définition/Propriétés I.4.2 (Relation de Bézout)**

Il existe un  $n$ -uplet de polynômes  $(U_1, \dots, U_n) \in (\mathbb{K}[X])^n$  tel que  $A_1 U_1 + \dots + A_n U_n = A_1 \wedge \dots \wedge A_n$ .

---

**Définition/Propriétés I.4.3 (Polynômes premiers entre eux)**

Les polynômes  $A_1, A_2, \dots$  et  $A_n$  sont dits :

- premiers entre eux dans leur ensemble si  $A_1 \wedge \dots \wedge A_n = 1_{\mathbb{K}[X]}$ .
- premiers entre eux deux à deux si  $\forall (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, i \neq j \implies A_i \wedge A_j = 1_{\mathbb{K}[X]}$ .

## II Polynômes irréductibles

### II.1 Théorème de D'Alembert-Gauss

---

#### Théorème II.1.1

*Tout polynôme non constant de  $\mathbb{C}[X]$  admet au moins une racine complexe.*

#### Remarques

- *Tout polynôme non constant de  $\mathbb{C}[X]$  est donc scindé sur  $\mathbb{C}$ .*
- *Deux polynômes de  $\mathbb{C}[X]$  sont premiers entre eux si, et seulement si, ils n'ont pas de racine commune.*

### II.2 Polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$

---

#### Définition II.2.1

Un polynôme  $P$  de  $\mathbb{K}[X]$  est dit irréductible s'il n'est pas constant et que ses seuls diviseurs dans  $\mathbb{K}[X]$  sont les polynômes constants et les polynômes associés à  $P$ .

#### Remarque

Un polynôme  $P$  de  $\mathbb{K}[X]$  irréductible dans  $\mathbb{K}[X]$  n'a donc comme seuls diviseurs, à une constante multiplicative près, que  $1_{\mathbb{K}[X]}$  et lui-même (analogie avec la notion de nombre premier vue dans  $\mathbb{Z}$ ).

---

#### Définition/Propriétés II.2.2 (Caractérisation des polynômes irréductibles)

- Les polynômes irréductibles de  $\mathbb{C}[X]$  sont les polynômes de degré 1.
- Les polynômes irréductibles de  $\mathbb{R}[X]$  sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 qui n'ont pas de racine réelle.

### II.3 Décomposition en facteurs irréductibles

---

#### Théorème II.3.1

- *Tout polynôme non constant de  $\mathbb{K}[X]$  admet au moins un diviseur irréductible dans  $\mathbb{K}[X]$ .*
- *Tout polynôme non constant  $P$  de  $\mathbb{K}[X]$  peut s'écrire, de manière unique à l'ordre près des facteurs, sous la forme*

$$P = \lambda(P_1)\alpha_1(P_2)\alpha_2 \dots (P_m)\alpha_m$$

*avec*

- (1)  $\lambda$  le coefficient dominant de  $P$ .
- (2)  $m, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  des entiers naturels non nuls.
- (3)  $P_1, P_2, \dots, P_m$  des polynômes irréductibles unitaires deux à deux distincts de  $\mathbb{K}[X]$ .

---

**Définition/Propriétés II.3.2 (Caractérisation de la divisibilité dans  $\mathbb{C}[X]$ )**

Soit  $(A, B) \in (\mathbb{C}[X])^2$  avec  $B \neq 0_{\mathbb{C}[X]}$ .

$B$  divise  $A$  si, et seulement si, toute racine de  $B$  de multiplicité  $\beta$  est racine de  $A$  de multiplicité  $\alpha \geq \beta$ .

---

**Définition/Propriétés II.3.3 (Racines conjuguées des polynômes de  $\mathbb{R}[X]$ )**

Deux racines complexes conjuguées d'un polynôme de  $\mathbb{R}[X]$  ont même multiplicité.

# Chapitre 25

## Fractions Rationnelles

### Sommaire

---

<b>I</b>	<b>Généralités . . . . .</b>	<b>. 276</b>
I.1	Le corps $\mathbb{K}(X)$ . . . . .	276
I.2	Degré d'une fraction rationnelle . . . . .	277
I.3	Partie entière d'une fraction rationnelle . . . . .	278
I.4	Zéros et pôles d'une fraction rationnelle . . . . .	278
I.5	Fonction rationnelle . . . . .	278
<b>II</b>	<b>Décomposition en éléments simples . . . . .</b>	<b>. 278</b>
II.1	Théorème de décomposition sur $\mathbb{C}$ (preuve hors programme) . . . . .	278
II.2	Théorème de décomposition sur $\mathbb{R}$ (preuve hors programme) . . . . .	279
II.3	Quelques applications des décompositions en éléments simples . . . . .	279
II.4	Deux cas particuliers . . . . .	280

---

## I Généralités

La construction de l'ensemble des fractions rationnelles étant hors programme, la présentation faite ici est volontairement élémentaire.

### I.1 Le corps $\mathbb{K}(X)$

---

#### Définition I.1.1

- On appelle fraction rationnelle à coefficients dans  $\mathbb{K}$  tout quotient (formel) du type

$$F = \frac{A}{B} \text{ avec } A \in \mathbb{K}[X] \text{ et } B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0_{\mathbb{K}[X]}\}$$

Si  $A$  et  $B$  sont premiers entre eux, on dit que la fraction rationnelle est irréductible.

- L'ensemble des fractions rationnelles à coefficients dans  $K$  est noté  $\mathbb{K}(X)$ .

#### Remarques

- Les éléments de  $\mathbb{K}(X)$  se manipulent comme les éléments de  $\mathbb{Q}$ .

- Tout polynôme  $A$  est identifié à la fraction rationnelle  $\frac{A}{1_{\mathbb{K}}[X]}$  donc  $\mathbb{K}[X]$  est inclus dans  $\mathbb{K}(X)$ .
- Les fractions rationnelles  $\frac{A_1}{B_1}$  et  $\frac{A_2}{B_2}$  sont égales si, et seulement si,  $A_1B_2$  et  $A_2B_1$  sont égaux.

### Définition/Propriétés I.1.2 (Opérations sur l'ensemble $\mathbb{K}(X)$ )

Pour tous  $F_1 = \frac{A_1}{B_1}$  et  $F_2 = \frac{A_2}{B_2}$  éléments de  $\mathbb{K}(X)$ , on pose :

$$F_1 + F_2 = \frac{A_1B_2 + A_2B_1}{B_1B_2} \text{ et } F_1 \times F_2 = \frac{A_1A_2}{B_1B_2}$$

#### Remarque

Ces opérations, qui ne dépendent pas de l'écriture des fractions rationnelles  $F_1$  et  $F_2$ , prolongent l'addition et la multiplication vues dans  $\mathbb{K}[X]$ .

### Définition/Propriétés I.1.3 (Structure de corps)

L'ensemble  $(\mathbb{K}(X), +, \times)$  est un corps :

- dont l'élément neutre pour l'addition est le polynôme  $0_{\mathbb{K}[X]}$  ;
- dont l'élément neutre pour la multiplication est le polynôme  $1_{\mathbb{K}}[X]$  ;
- qui contient l'anneau intègre  $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ .

#### Remarque

Avec la loi externe  $\cdot$  définie sur  $\mathbb{K}(X)$  par

$$\forall \lambda \in K, \forall F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X), \lambda.F = \frac{\lambda A}{B}$$

$(\mathbb{K}(X), +, \cdot)$  est aussi un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

## I.2 Degré d'une fraction rationnelle

### Définition/Propriétés I.2.1

Pour tout  $F = \frac{A}{B}$  de  $\mathbb{K}(X)$ , on définit le degré de la fraction rationnelle  $F$ , noté  $\deg(F)$ , par :

$$\deg(F) = \deg(A) - \deg(B)$$

#### Remarque

Le degré d'une fraction rationnelle, qui ne dépend pas de l'écriture de celle-ci, appartient à  $\mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$  et prolonge la notion de degré vu pour les polynômes de  $\mathbb{K}[X]$

## I.3 Partie entière d'une fraction rationnelle

---

### Définition/Propriétés I.3.1

Toute fraction rationnelle  $F = \frac{A}{B}$  de  $\mathbb{K}(X)$  s'écrit de manière unique sous la forme  $F = E + F_1$  avec :

- $E$  un polynôme de  $\mathbb{K}[X]$ , appelé partie entière de la fraction rationnelle  $F$  ;
- $F_1$  une fraction rationnelle de  $\mathbb{K}(X)$  de degré strictement négatif.

Plus précisément,

- le polynôme  $E$  est le quotient de la division euclidienne de  $A$  par  $B$  ;
- la fraction rationnelle  $F_1$  est égale à  $\frac{\mathbb{R}}{B}$  où  $\mathbb{R}$  est le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $B$ .

## I.4 Zéros et pôles d'une fraction rationnelle

---

### Définition/Propriétés I.4.1

Soit  $F = \frac{A}{B}$  une fraction rationnelle irréductible de  $\mathbb{K}(X)$  et  $m \in \mathbb{N}$ .

- Toute racine du polynôme  $A$  de multiplicité  $m$  est dite zéro de  $F$  de multiplicité  $m$ .
- Toute racine du polynôme  $B$  de multiplicité  $m$  est dite pôle de  $F$  de multiplicité  $m$ .

## I.5 Fonction rationnelle

---

### Définition/Propriétés I.5.1

Soit  $F = \frac{A}{B}$  une fraction rationnelle irréductible de  $\mathbb{K}(X)$ .

La fonction  $\tilde{F} : x \mapsto \frac{A(x)}{B(x)}$  définie sur  $\mathbb{K}$  privé de l'ensemble (fini) des pôles de  $F$  et à valeurs dans  $\mathbb{K}$  est dite fonction rationnelle associée à la fraction rationnelle  $F$ .

## II Décomposition en éléments simples

### II.1 Théorème de décomposition sur $\mathbb{C}$ (preuve hors programme)



---

**Définition/Propriétés II.1.1**

Si  $F$  est une fraction rationnelle de  $\mathbb{C}(X)$  de partie entière  $E$  et de pôles deux-à-deux distincts  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  de multiplicités  $m_1, \dots, m_r$  alors il existe une unique famille de complexes  $(a_{k,p})_{(k,p) \in \llbracket 1;r \rrbracket \times \llbracket 1;m_k \rrbracket}$  telle que :

$$F = E + \sum_{k=1}^r \left( \sum_{p=1}^{m_k} \frac{a_{k,p}}{(X - \lambda_k)^p} \right)$$

autrement dit :

$$F = E + \underbrace{\left( \frac{a_{1,1}}{(X - \lambda_1)} + \frac{a_{1,2}}{(X - \lambda_1)^2} + \dots + \frac{a_{1,m_1}}{(X - \lambda_1)^{m_1}} \right)}_{\text{Partie polaire associée au pôle } \lambda_1} + \dots + \underbrace{\left( \frac{a_{r,1}}{(X - \lambda_r)} + \frac{a_{r,2}}{(X - \lambda_r)^2} + \dots + \frac{a_{r,m_r}}{(X - \lambda_r)^{m_r}} \right)}_{\text{Partie polaire associée au pôle } \lambda_r}$$

**Remarque**

Pour décomposer une fraction rationnelle de  $\mathbb{C}(X)$  en éléments simples, il convient de l'écrire sous forme irréductible puis de décomposer son dénominateur en facteurs irréductibles de  $\mathbb{C}[X]$ , c'est-à-dire en produit de polynômes de degré 1.

## II.2 Théorème de décomposition sur $\mathbb{R}$ (preuve hors programme)

---

**Définition/Propriétés II.2.1**

Si  $F = \frac{A}{B}$  est une fraction rationnelle irréductible de  $\mathbb{R}(X)$  de partie entière  $E$  et que la décomposition du polynôme  $B$  en facteurs irréductibles de  $\mathbb{R}[X]$  s'écrit

$$B = \beta \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{m_k} \prod_{k=1}^s (X^2 + b_k X + c_k)^{n_k}$$

alors il existe d'uniques suites de réels  $(a_{k,p})_{(k,p) \in \llbracket 1;r \rrbracket \times \llbracket 1;m_k \rrbracket}$ ,  $(d_{k,p})_{(k,p) \in \llbracket 1;s \rrbracket \times \llbracket 1;n_k \rrbracket}$  et  $(e_{k,p})_{(k,p) \in \llbracket 1;s \rrbracket \times \llbracket 1;n_k \rrbracket}$  telles que :

$$F = E + \sum_{k=1}^r \left( \sum_{p=1}^{m_k} \frac{a_{k,p}}{(X - \lambda_k)^p} \right) + \sum_{k=1}^s \left( \sum_{p=1}^{n_k} \frac{d_{k,p}X + e_{k,p}}{(X^2 + b_k X + c_k)^p} \right)$$

**Remarque**

Les irréductibles de  $\mathbb{R}[X]$  sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racine réelle. Dans la décomposition en facteurs irréductibles écrite pour  $B$  ci-dessus, les réels  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  sont les racines réelles deux-à-deux distinctes de  $B$  de multiplicités respectives  $m_1, \dots, m_r$ , les couples deux-à-deux distincts de réels  $(b_k, c_k)$  vérifient  $b_k^2 - 4c_k < 0$  et les  $n_k$  sont des entiers non nuls.

## II.3 Quelques applications des décompositions en éléments simples

---

**Définition/Propriétés II.3.1 (Calcul de primitives)**

---

**Définition/Propriétés II.3.2 (Calcul de dérivées successives)**

---

**Définition/Propriétés II.3.3 (Calcul de sommes de séries numériques)**

## II.4 Deux cas particuliers

---

**Définition/Propriétés II.4.1 (Coefficients des éléments simples associés aux pôles simples)**

Si  $F = \frac{A}{B}$  est une fraction rationnelle irréductible de  $\mathbb{K}(X)$  et  $\lambda$  est un pôle simple de  $F$  alors, dans la décomposition en éléments simples de  $F$ , le coefficient de l'élément simple  $\frac{1}{X - \lambda}$  est :

$$a = \frac{A(\lambda)}{B'(\lambda)}$$

. Remarque

Plus généralement, lorsque  $\lambda$  est un pôle de multiplicité  $m$  de la fraction irréductible  $F$ , l'évaluation en  $\lambda$  de la fraction rationnelle obtenue après réduction de  $(X - \lambda)^m F$  donne le coefficient de l'élément simple  $\frac{1}{(X - \lambda)^m}$  dans la décomposition en éléments simples de  $F$

---

**Définition/Propriétés II.4.2 (Décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle du**

Soit  $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0_{\mathbb{K}[X]}\}$ .

- On suppose que  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  et que la décomposition de  $B$  en facteurs irréductibles de  $\mathbb{C}[X]$  s'écrit

$$B = \beta \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{m_k}$$

Alors, la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle  $F = \frac{B'}{B}$  sur  $\mathbb{C}$  est :

$$\frac{B'}{B} = \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{(X - \lambda_k)}$$

- On suppose que  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  et que la décomposition de  $B$  en facteurs irréductibles de  $\mathbb{R}[X]$  s'écrit

$$B = \beta \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{m_k} \prod_{k=1}^s (X^2 + b_k X + c_k)^{n_k}$$

Alors, la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle  $F = \frac{B'}{B}$  sur  $\mathbb{R}$  est :

$$\frac{B'}{B} = \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{X - \lambda_k} + \sum_{k=1}^s \frac{n_k (2X + b_k)}{X^2 + b_k X + c_k}$$

# Chapitre 26

## Analyse Asymptotique (2)

### Sommaire

I	Relations de comparaison pour les fonctions . . . . .	282
II	Relation de comparaison pour les suites . . . . .	282
II.1	Définitions . . . . .	282
II.2	Caractérisations pratiques . . . . .	283
II.3	Lien entre les relations de comparaison . . . . .	283
II.4	Croissances comparées de suites usuelles . . . . .	284
II.5	Règles usuelles de manipulation des relations de comparaison . . . . .	284
II.6	Obtention et utilisation des équivalents . . . . .	285
II.7	Formule de Stirling (à connaître) . . . . .	285
II.8	Utilisation des développements limités et équivalents usuels . . . . .	285

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne le corps  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## I Relations de comparaison pour les fonctions

Se reporter au chapitre "Analyse asymptotique (1)"

## II Relation de comparaison pour les suites

Sauf mention contraire, dans cette partie,  $(u_n)$  et  $(v_n)$  désignent deux suites à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

### II.1 Définitions

---

#### Définition/Propriétés II.1.1

**Domination** On dit que  $(u_n)$  est dominée par  $(v_n)$  s'il existe un entier naturel  $n_0$  et une suite  $(w_n)$  bornée tel que

$$\forall n \in \llbracket n_0 ; +\infty \llbracket, u_n = v_n w_n$$

On note alors  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ .

---

**Définition/Propriétés II.1.2 (Négligeabilité)**

On dit que  $(u_n)$  est négligeable devant  $(v_n)$  s'il existe un entier naturel  $n_0$  et une suite  $(w_n)$  de limite nulle tel que

$$\forall n \in \llbracket n_0 ; +\infty \llbracket, u_n = v_n w_n$$

On note alors  $u_n = o(v_n)$ .

---

**Définition/Propriétés II.1.3 (Equivalence)**

On dit que  $(u_n)$  est équivalente à  $(v_n)$  s'il existe un entier naturel  $n_0$  et une suite  $(w_n)$  de limite égale à 1 tel que

$$\forall n \in \llbracket n_0 ; +\infty \llbracket, u_n = v_n w_n$$

On note alors  $u_n \sim v_n$ .

## II.2 Caractérisations pratiques

---

**Définition/Propriétés II.2.1**

Dans le cas où  $(v_n)$  ne s'annule pas à partir d'un certain rang, on a les équivalences suivantes :

- (1)  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  si, et seulement si, la suite  $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$  est bornée.
- (2)  $u_n = o(v_n)$  si, et seulement si, la suite  $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$  a pour limite 0.
- (3)  $u_n \sim v_n$  si, et seulement si, la suite  $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$  a pour limite 1.

## II.3 Lien entre les relations de comparaison

---

**Définition/Propriétés II.3.1**

- (1)  $u_n = o(v_n) \implies u_n = \mathcal{O}(v_n)$  ;
- (2)  $u_n \sim v_n \implies u_n = \mathcal{O}(v_n)$  ;
- (3)  $u_n \sim v_n \iff u_n = v_n + o(v_n)$ .

## II.4 Croissances comparées de suites usuelles

---

### Définition/Propriétés II.4.1

Pour tous réels strictement positifs  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$ , on a :

- (1)  $(\ln(n))^\beta = o(n^\alpha)$
- (2)  $n^\alpha = o(e^{\gamma n})$
- (3)  $e^{\gamma n} = o(n!)$ .
- (4)  $n^\alpha = o(n^\beta)$  dans le cas  $\alpha < \beta$

## II.5 Règles usuelles de manipulation des relations de comparaison

---

### Définition/Propriétés II.5.1 (Cas des $\mathcal{O}$ (et des $o$ ))

- (1) Si  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}^*$  alors  $u_n = \mathcal{O}(\lambda v_n)$  et  $\lambda u_n = \mathcal{O}(v_n)$ .
- (2) Si  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  et  $w_n = \mathcal{O}(v_n)$  alors  $u_n + w_n = \mathcal{O}(v_n)$ .
- (3) Si  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  et  $v_n = \mathcal{O}(w_n)$  alors  $u_n = \mathcal{O}(w_n)$ .
- (4) Si  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  alors  $u_n w_n = \mathcal{O}(v_n w_n)$ .
- (5) Si  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  et  $w_n = \mathcal{O}(x_n)$  alors  $u_n w_n = \mathcal{O}(v_n x_n)$ .
- (6) Si  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  et  $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante alors  $u_{\varphi(n)} = \mathcal{O}(v_{\varphi(n)})$ .

### Remarques

- Dans tout ce qui précède, on peut remplacer  $\mathcal{O}$  par  $o$ .
- JAMAIS de "composition des  $\mathcal{O}$  (ou des  $o$ ) à gauche" par une fonction sans preuve directe.

---

### Définition/Propriétés II.5.2 (Cas des équivalents)

- (1) Si  $u_n \sim v_n$  alors  $v_n \sim u_n$ .
- (2) Si  $u_n \sim v_n$  et  $v_n \sim w_n$  alors  $u_n \sim w_n$ .
- (3) Si  $u_n = \mathcal{O}((v_n))$  et  $v_n \sim w_n$  alors  $u_n = \mathcal{O}(w_n)$ .
- (4) Si  $u_n = o(v_n)$  et  $v_n \sim w_n$  alors  $u_n = o(w_n)$ .
- (5) Si  $u_n \sim v_n$  alors  $u_n w_n \sim v_n w_n$ .
- (6) Si  $u_n \sim v_n$  et  $w_n \sim x_n$  alors  $u_n w_n \sim v_n x_n$ .
- (7) Si  $u_n \sim v_n$  avec  $(u_n)$  et  $(v_n)$  strictement positives à partir d'un certain rang alors  $u_n^\beta \sim v_n^\beta$  pour tout réel  $\beta$ .
- (8) Si  $u_n \sim v_n$  avec  $(u_n)$  et  $(v_n)$  qui ne s'annulent pas à partir d'un certain rang alors  $\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{v_n}$ .
- (9) Si  $u_n \sim v_n$  et  $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante alors  $u_{\varphi(n)} \sim v_{\varphi(n)}$ .

JAMAIS de "composition à gauche" par une fonction ni de somme d'équivalents sans preuve directe.

## II.6 Obtention et utilisation des équivalents

---

### Définition/Propriétés II.6.1 (Obtention d'un équivalent par encadrement)

Si  $(u_n)$ ,  $(v_n)$  et  $(w_n)$  sont à valeurs réelles et vérifient  $v_n \leq u_n \leq w_n$  à partir d'un certain rang avec  $v_n \sim w_n$  alors  $u_n \sim v_n$ .

---

### Définition/Propriétés II.6.2 (Limite, signe et équivalent)

- Si  $u_n \sim v_n$  alors  $(u_n)$  et  $(v_n)$  ont même "comportement" c'est-à-dire que :
  - $(u_n)$  a pour limite  $\ell$  si, et seulement si,  $(v_n)$  a pour limite  $\ell$ .
  - $(u_n)$  n'a pas de limite si, et seulement si,  $(v_n)$  n'a pas de limite.
- Si  $u_n \sim v_n$  alors  $u_n$  et  $v_n$  ont le même signe à partir d'un certain rang.

## II.7 Formule de Stirling (à connaître)

---

### Définition/Propriétés II.7.1

Un équivalent de la suite  $(n!)$  est donné par la formule de Stirling suivante :

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

#### Remarques

- La démonstration de ce résultat de cours n'est pas exigible mais on en verra une dans le TD sur les séries numériques.
- On peut déduire de cet équivalent un développement asymptotique de la suite  $(\ln n!)$  qui est :

$$\ln n! = n \ln(n) - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + o(1).$$

## II.8 Utilisation des développements limités et équivalents usuels

---

### Définition/Propriétés II.8.1

Une connaissance parfaite des développements limités et équivalents usuels vus pour les fonctions dans le chapitre "Analyse asymptotique (1)" est nécessaire pour traiter les problèmes d'analyse asymptotique sur les suites, étudier la nature des séries numériques en MP2I ainsi que les différents types de convergence des séries de fonctions et les problèmes d'intégrabilité des fonctions sur un intervalle en MPI.

# Chapitre 27

## Fonction Convexe

### Sommaire

---

<b>I</b>	<b>Généralités . . . . .</b>	<b>286</b>
I.1	Définition . . . . .	286
I.2	Inégalité de Jensen . . . . .	287
I.3	Caractérisation de la convexité par la croissance des pentes . . . . .	287
I.4	Inégalité des trois pentes . . . . .	287
I.5	Position de la courbe représentative par rapport aux sécantes . . . . .	287
<b>II</b>	<b>Convexité et fonctions dérivables ou deux fois dérivables . . . . .</b>	<b>288</b>
II.1	Fonctions convexes dérivables . . . . .	288
II.2	Fonctions convexes deux fois dérivables . . . . .	288
<b>III</b>	<b>Quelques exemples d'inégalités de convexité (à retrouver) . . . . .</b>	<b>288</b>
III.1	Inégalités usuelles . . . . .	288
III.2	Moyennes arithmétique, géométrique et harmonique (HP mais classique) . .	289

---

Dans ce chapitre,  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ , non vide et non réduit à un point.

## I Généralités

### I.1 Définition

---

#### Définition I.1.1

Une fonction  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  est dite convexe sur  $I$  si :

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0 ; 1], f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

#### Interprétation géométrique

$f$  est convexe si, et seulement si, tout sous-arc de sa courbe représentative est situé au-dessous de la corde correspondante.



## I.2 Inégalité de Jensen

---

### Définition/Propriétés I.2.1

Si  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  est convexe sur  $I$  alors, pour tous  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $(x_1, \dots, x_n) \in In$  et  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$  tels que  $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$ , on a :

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)$$

## I.3 Caractérisation de la convexité par la croissance des pentes

---

### Définition/Propriétés I.3.1

$f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  est convexe sur  $I$  si, et seulement si, pour tout  $a \in I$ , la fonction  $\delta_a : I \setminus \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$\forall x \in I \setminus \{a\}, \delta_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

est croissante.

Remarque

On appelle parfois  $\delta_a$  la fonction "pente en  $a$ ".

## I.4 Inégalité des trois pentes

---

### Définition/Propriétés I.4.1

Si  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  est convexe sur  $I$  alors, pour tout  $(a, b, c) \in I^3$  tel que  $a < b < c$ , on a :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$$

## I.5 Position de la courbe représentative par rapport aux sécantes

---

### Définition/Propriétés I.5.1

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction convexe et  $(x, y) \in I^2$  avec  $x < y$ .

La courbe représentative de  $f$  est située :

- sous la sécante à la courbe aux points d'abscisse  $x$  et  $y$  sur le segment  $[x ; y]$  ;
- au-dessus de la sécante à la courbe aux points d'abscisse  $x$  et  $y$  sur  $I \setminus [x ; y]$  .

## II Convexité et fonctions dérivables ou deux fois dérivables

### II.1 Fonctions convexes dérivables

---

#### Définition/Propriétés II.1.1 (Caractérisation des fonctions convexes dérivables)

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable sur  $I$ .

Alors :  $f$  est convexe sur  $I$  si, et seulement si,  $f'$  est croissante sur  $I$ .

---

#### Définition/Propriétés II.1.2 (Position de la courbe représentative par rapport aux tangentes)

Si  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  est une fonction convexe et dérivable sur  $I$  alors la courbe représentative de  $f$  est située au-dessus de ses tangentes.

### II.2 Fonctions convexes deux fois dérivables

---

#### Définition/Propriétés II.2.1

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction deux fois dérivable sur  $I$ .

Alors :  $f$  est convexe sur  $I$  si, et seulement si,  $f''$  est positive sur  $I$

## III Quelques exemples d'inégalités de convexité (à retrouver)

### III.1 Inégalités usuelles

---

#### Définition/Propriétés III.1.1

(1)  $\forall x \in \mathbb{R}, \exp(x) \geq x + 1.$

(2)  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \exp\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{\exp(x) + \exp(y)}{2}$

(3)  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln(x) \leq x - 1$

(4)  $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \ln\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\ln(x) + \ln(y)}{2}$

(5)  $\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], \frac{2}{\pi}x \leq \sin(x) \leq x$

(6)  $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[ \left[ |\tan(x)| \geq |x| \right.$

(7)  $\forall x \in \mathbb{R}, |\arctan(x)| \leq |x|$

## III.2 Moyennes arithmétique, géométrique et harmonique (HP mais classique)

---

### Définition/Propriétés III.2.1

Pour  $(x_k)_{1 \leq k \leq n} \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ , on appelle moyenne :

- arithmétique des réels  $x_1, \dots, x_n$  le réel  $A_n$  défini par

$$A_n = \frac{1}{n} \left( \sum_{k=1}^n x_k \right)$$

- géométrique des réels  $x_1, \dots, x_n$  le réel  $G_n$  défini par

$$G_n = \left( \prod_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{n}}$$

- harmonique des réels  $x_1, \dots, x_n$  le réel  $H_n$  défini par

$$H_n = \frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}}$$

Ces trois réels vérifient :

$$H_n \leq G_n \leq A_n$$

# Chapitre 28

## Séries numériques

### Sommaire

---

<b>I</b>	<b>Généralités</b>	<b>290</b>
I.1	Définition et notation d'une série	290
I.2	Nature d'une série	291
I.3	Condition nécessaire de convergence	291
I.4	Somme et reste d'une série convergente	291
I.5	Lien suite-série	292
I.6	Opérations algébriques sur les séries convergentes	292
I.7	Cas des séries à termes complexes	292
I.8	Premières séries de référence : les séries géométriques de raison $a \in \mathbb{K}$	293
<b>II</b>	<b>Séries à termes réels positifs.</b>	<b>293</b>
II.1	Condition nécessaire et suffisante de convergence	293
II.2	Théorèmes de comparaison	293
II.3	Encadrement des sommes partielles par la méthode des rectangles	294
II.4	Autres séries de références importantes : les séries de Riemann	294
<b>III</b>	<b>Convergence absolue d'une série</b>	<b>295</b>
III.1	Définition	295
III.2	Propriété importante	296
III.3	Théorème de domination	296
III.4	Dernières séries de référence à connaître : les séries exponentielles	296
<b>IV</b>	<b>Séries alternées</b>	<b>296</b>
IV.1	Définition	296
IV.2	Théorème spécial pour certaines séries alternées (règle de Leibniz)	297

---

Dans tout ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne le corps  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### I Généralités

Dans cette partie, sauf mention contraire,  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont deux suites de  $\mathbb{K}$ .

#### I.1 Définition et notation d'une série

---

**Définition I.1.1**

On pose, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ .

- (1) La suite  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est appelée série de terme général  $u_n$  et notée  $\sum_{n \geq 0} u_n$  ou plus simplement  $\sum u_n$ .
- (2) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $S_n$  est appelé somme partielle d'ordre  $n$  de la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$ .

## I.2 Nature d'une série

---

**Définition I.2.1**

La série  $\sum u_n$  est dite convergente si la suite de ses sommes partielles  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente.

Sinon, elle est dite divergente.

## I.3 Condition nécessaire de convergence

---

**Définition/Propriétés I.3.1**

Si la série  $\sum u_n$  converge alors la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0.

Attention : la réciproque est fausse comme le montre l'exemple de la série harmonique  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ .

---

**Définition/Propriétés I.3.2 (Divergence grossière)**

Si la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ne converge pas vers 0 alors la série  $\sum u_n$  diverge.

Dans ce cas, on dit que la série  $\sum u_n$  diverge grossièrement.

## I.4 Somme et reste d'une série convergente

---

**Définition I.4.1**

Si la série  $\sum u_n$  converge alors :

- (1) la limite  $S$  de la suite  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est appelée somme de la série  $\sum u_n$  et notée  $S = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ .
- (2) pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $R_n = S - S_n$  est appelé reste d'ordre  $n$  de la série  $\sum u_n$  et noté  $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ .

---

**Propriétés I.4.2**

La suite  $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$  des restes d'une série convergente a pour limite 0.

## I.5 Lien suite-série

---

**Définition/Propriétés I.5.1**

La suite  $(u_n)$  et la série télescopique  $\sum (u_{n+1} - u_n)$  ont même nature.

## I.6 Opérations algébriques sur les séries convergentes

---

**Définition/Propriétés I.6.1**

Si les séries  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  convergent alors, pour tout  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ ,

- (1) la série  $\sum (\alpha u_n + \beta v_n)$  converge,
- (2)  $\sum_{k=0}^{+\infty} (\alpha u_k + \beta v_k) = \alpha \left( \sum_{k=0}^{+\infty} u_k \right) + \beta \left( \sum_{k=0}^{+\infty} v_k \right)$ . (linéarité de la somme)

Remarque

On en déduit que l'application qui, à une série convergente associe sa somme, est linéaire.

## I.7 Cas des séries à termes complexes

---

**Définition/Propriétés I.7.1**

La série de nombres complexes  $\sum u_n$  converge si, et seulement si, les séries de nombres réels  $\sum_{n \geq 0} \operatorname{Re}(u_n)$

et  $\sum_{n \geq 0} \operatorname{Im}(u_n)$  convergent. Dans ce cas, les sommes de ces séries vérifient :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \operatorname{Re}(u_k) \right) + i \left( \sum_{n \geq 0} \operatorname{Im}(u_k) \right)$$

## I.8 Premières séries de référence : les séries géométriques de raison $a \in \mathbb{K}$

---

### Définition/Propriétés I.8.1

- (1) La série géométrique  $\sum a^n$  est convergente si, et seulement si,  $|a| < 1$ .  
(2) Dans le cas  $|a| < 1$ , on a :

(a)  $\sum_{k=0}^{+\infty} a^k = \frac{1}{1-a}$

(b)  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} a^k = \frac{a^{n+1}}{1-a}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$

## II Séries à termes réels positifs

### II.1 Condition nécessaire et suffisante de convergence

---

#### Définition/Propriétés II.1.1

Une série  $\sum u_n$  de nombres réels positifs converge si, et seulement si, la suite de ses sommes partielles  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est majorée avec, en cas de convergence :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \lim_n S_n = \sup_n S_n.$$

### II.2 Théorèmes de comparaison

---

#### Théorème II.2.1

(1) Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont deux suites de nombres réels telles que  $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq v_n$  alors,

- la convergence de la série  $\sum v_n$  implique la convergence de la série  $\sum u_n$ .
- la divergence de la série  $\sum u_n$  implique la divergence de la série  $\sum v_n$ .

En cas de convergence, les sommes de ces séries vérifient :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$$

(2) Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont deux suites de nombres réels positifs telles que  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  alors,

- la convergence de la série  $\sum v_n$  implique la convergence de la série  $\sum u_n$ .
- la divergence de la série  $\sum u_n$  implique la divergence de la série  $\sum v_n$ .

(3) Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont deux suites de nombres réels positifs telles que  $u_n \sim v_n$  alors, les séries  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  sont de même nature.

#### Remarques

En cas de convergence des séries avec  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  ou  $u_n \sim v_n$ , on ne peut pas écrire de relation de comparaison entre leurs sommes.

## II.3 Encadrement des sommes partielles par la méthode des rectangles

### Définition/Propriétés II.3.1

Si  $f$  est une application continue sur  $[0 ; +\infty[$ , à valeurs positives et décroissante alors, pour tout entier naturel  $n$ , on a :

$$\int_0^{n+1} f(t)dt \leq \sum_{k=0}^n f(k) \leq f(0) + \int_0^n f(t)dt.$$

#### Remarques

- Le résultat est conservé si on remplace 0 par  $n_0 \in \mathbb{N}^*$  et  $n \in \mathbb{N}$  par  $n \in \llbracket n ; +\infty \rrbracket$ .
- Le résultat s'adapte dans le cas où  $f$  est croissante en changeant le sens des inégalités.

## II.4 Autres séries de références importantes : les séries de Riemann

### Définition/Propriétés II.4.1

Pour  $\alpha \in \mathbb{R}$ , la série de Riemann  $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^\alpha}$  converge si, et seulement si,  $\alpha > 1$ .

#### Remarque

Contrairement aux séries géométriques, il n'existe pas de formule générale donnant la valeur des sommes des séries de Riemann convergentes.

#### Démonstration

- Si  $\alpha < 0$  alors  $\sum \frac{1}{k^\alpha} = \sum k^{-\alpha} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty$
- Si  $\alpha = 0$  alors  $\sum \frac{1}{k^\alpha} = \sum 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$
- Si  $\alpha > 0$  : On pose  $f_\alpha : [1 ; +\infty[ \longrightarrow \mathbb{R}_+$  On remarque donc que  $\begin{cases} f_\alpha \in \mathcal{C}([1 ; +\infty[, \mathbb{R}_+)) \\ f_\alpha \text{ est décroissante} \end{cases}$   

$$t \longmapsto \frac{1}{t^\alpha}$$

$$\text{Ainsi } \forall n \in \mathbb{N} \quad \int_1^{n+1} f_\alpha(t)dt \leq \underbrace{\sum_{k=1}^n f_\alpha(k)}_{=S_n} \leq f_\alpha(1) + \int_1^n f_\alpha(t)dt$$



or de manière immédiate  $\int f_\alpha(t)dt = \int t^{-\alpha} = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} t^{-\alpha+1} & \text{si } \alpha \neq 1 \\ \ln(t) & \text{si } \alpha = 1 \end{cases}$  Ainsi :

— Pour  $\alpha = 1$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln(n+1) \leq S_n$$

donc

$$S_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty \text{ et donc } \sum \frac{1}{n} \text{ Diverge}$$

— pour  $0 < \alpha < 1$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{1-\alpha} \left( (n+1)^{1-\alpha} - 1 \right) \leq S_n$$

donc

$$S_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty \text{ et donc } \sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ Diverge}$$

— pour  $\alpha > 1$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,$$

$$\begin{aligned} S_n &\leq 1 + \frac{1}{1-\alpha} \left( (n+1)^{1-\alpha} - 1 \right) \\ &\leq 1 - \frac{1}{1-\alpha} + \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} \\ &\leq 1 - \frac{1}{1-\alpha} \end{aligned}$$

donc  $S_n$  est majorée ce qui implique que  $\sum \frac{1}{n^\alpha}$  converge ■

### III Convergence absolue d'une série

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de  $\mathbb{K}$ .

#### III.1 Définition

---

##### Définition III.1.1

La série  $\sum u_n$  est dite absolument convergente si la série  $\sum |u_n|$  converge.

## III.2 Propriété importante

---

### Définition/Propriétés III.2.1

Si la série  $\sum u_n$  converge absolument alors la série  $\sum u_n$  converge avec, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\left| \sum_{k=n}^{+\infty} u_k \right| \leq \sum_{k=n}^{+\infty} |u_k|$$

## III.3 Théorème de domination

---

### Théorème III.3.1

Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite de  $\mathbb{K}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite de nombres réels positifs tel que  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  alors, la convergence de la série  $\sum v_n$  implique la convergence absolue de la série  $\sum u_n$  donc sa convergence.

## III.4 Dernières séries de référence à connaître : les séries exponentielles

---

### Définition/Propriétés III.4.1

Pour tout  $z \in \mathbb{K}$ , la série  $\sum \frac{z^n}{n!}$  converge absolument donc converge. Sa somme est notée  $\exp(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}$  et appelée exponentielle du nombre  $z$ .

## IV Séries alternées

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de nombres réels.

### IV.1 Définition

---

#### Définition IV.1.1

La série  $\sum u_n$  est dite série alternée si, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1}$  et  $u_n$  sont de signes contraires.

## IV.2 Théorème spécial pour certaines séries alternées (règle de Leibniz)

---

### Théorème IV.2.1

Si la suite  $(u_n)$  converge en décroissant vers 0 alors :

(1) la série  $\sum (-1)^n u_n$  converge ;

(2) pour tout  $n_0 \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{n=n_0}^{+\infty} (-1)^n u_n$  a même signe que son premier terme  $(-1)^{n_0} u_{n_0}$  et vérifie

$$\left| \sum_{n=n_0}^{+\infty} (-1)^n u_n \right| \leq |(-1)^{n_0} u_{n_0}|.$$

### Remarque

Une série alternée peut être convergente sans vérifier les hypothèses du critère spécial.

# Chapitre 29

## Intégration sur un segment

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Continuité uniforme . . . . .</b>	<b>298</b>
I.1	Définition . . . . .	298
I.2	Propriétés . . . . .	299
I.3	Théorème de Heine (preuve non exigible) . . . . .	299
<b>II</b>	<b>Continuité par morceaux sur un segment . . . . .</b>	<b>300</b>
II.1	Subdivision d'un segment . . . . .	300
II.2	Fonctions en escalier sur un segment . . . . .	301
II.3	Fonctions continues par morceaux sur un segment . . . . .	301
II.4	Approximation uniforme des fonctions continues par morceaux . . . . .	301
<b>III</b>	<b>Intégrale sur un segment d'une fonction continue par morceaux . . . . .</b>	<b>303</b>
III.1	Cas particulier des fonctions en escalier sur un segment . . . . .	303
III.2	Cas général des fonctions continues par morceaux sur un segment . . . . .	305
III.3	Valeur moyenne . . . . .	306
III.4	Propriétés . . . . .	306
III.5	Sommes de Riemann à pas constant . . . . .	308
<b>IV</b>	<b>Lien entre intégrale et primitive d'une fonction continue . . . . .</b>	<b>309</b>
IV.1	Théorème fondamental . . . . .	309
<b>V</b>	<b>Formules de Taylor globales . . . . .</b>	<b>311</b>
V.1	Formule de Taylor avec reste intégral . . . . .	311
V.2	Inégalité de Taylor-Lagrange . . . . .	312

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne le corps  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  et  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ , non vide et non réduit à un point.

## I Continuité uniforme

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

En MP2I, la notion de continuité uniforme est introduite pour construire l'intégrale. L'étude systématique des fonctions uniformément continues n'est pas un attendu ; la présentation faite ici est donc sommaire.

### I.1 Définition

---

### Définition I.1.1

$f$  est dite uniformément continue sur  $I$  si :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall (a, x) \in I^2, |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$$

#### Remarque

Ici le réel  $\delta$  ne dépend que du réel  $\varepsilon$  et pas des points de  $I$  (d'où la dénomination "continuité uniforme") contrairement au réel  $\delta$  qui apparaît dans la définition de la continuité rappelée ci-dessous qui lui dépend du réel  $\varepsilon$  et des points  $a$  de  $I$  considérés :

Rappel :  $f$  est continue sur  $I$  si, pour tout réel  $a$  de  $I$ , la fonction  $f$  a pour limite  $f(a)$  en  $a$  :

$$\forall a \in I, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I, |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$$

## I.2 Propriétés

---

### Propriétés I.2.1

$f$  lipschitzienne sur  $I \implies f$  uniformément continue sur  $I \implies f$  est continue sur  $I$ .

#### Remarque

Les réciproques de ces propriétés sont fausses (cf TD).

## I.3 Théorème de Heine (preuve non exigible)

---

### Définition/Propriétés I.3.1

Toute fonction numérique, qui est continue sur un segment de  $\mathbb{R}$ , y est uniformément continue.

---

#### Démonstration

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $a < b$  et  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  une fonction continue sur le segment  $[a ; b]$ .

Montrons que  $f$  est uniformément continue sur le segment  $[a ; b]$  en raisonnant par l'absurde.

On suppose que  $f$  n'est pas uniformément continue ce qui se traduit par :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists (x, y) \in ([a ; b])^2, |x - y| \leq \delta \text{ et } |f(x) - f(y)| > \varepsilon$$

Pour cet  $\varepsilon > 0$ , on peut en déduire, en particulier que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists (x_n, y_n) \in ([a ; b])^2, |x_n - y_n| \leq \frac{1}{n} \text{ et } |f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon$$

- Comme la suite  $(x_n)$  est à valeurs dans le segment  $[a ; b]$ , elle est bornée. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut donc en extraire une suite  $(x_{\varphi(n)})$ , avec  $\varphi$  application strictement croissante de  $\mathbb{N}^*$  dans  $\mathbb{N}^*$ , qui converge vers  $c \in [a ; b]$  ce qui implique

$$|x_{\varphi(n)} - c| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

- Par inégalité triangulaire vérifiée par  $|\cdot|$  (valeur absolue ou module), on a successivement

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |y_{\varphi(n)} - c| \leq |y_{\varphi(n)} - x_{\varphi(n)}| + |x_{\varphi(n)} - c|$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |y_{\varphi(n)} - c| \leq \frac{1}{\varphi(n)} + |x_{\varphi(n)} - c|$$

et enfin, par théorème d'encadrement :

$$|y_{\varphi(n)} - c| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Par conséquent, la suite  $(y_{\varphi(n)})$  converge aussi vers  $c \in [a ; b]$ .

- Comme  $f$  est continue sur  $[a ; b]$ , elle l'est en  $c$ . Par caractérisation séquentielle de la continuité de  $f$  en  $c$ , on en déduit que les suites  $(f(x_{\varphi(n)}))$  et  $(f(y_{\varphi(n)}))$  convergent toutes deux vers  $f(c)$  donc que la suite  $(f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)}))$  converge vers 0. Ainsi,  $|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  ce qui est incompatible avec les inégalités

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| > \varepsilon$$

conclusion l'hypothèse initiale est fausse donc  $f$  est uniformément continue sur  $[a ; b]$ .

Remarque

En revanche, la continuité sur un intervalle quelconque n'implique pas l'uniforme continuité sur cet intervalle comme le montre l'exemple simple de la fonction  $x \mapsto x^2$  sur  $\mathbb{R}_+$ . ■

## II Continuité par morceaux sur un segment

Soit  $a$  et  $b$  deux réels tels que  $a < b$ .

### II.1 Subdivision d'un segment

---

#### Définition/Propriétés II.1.1

On appelle subdivision du segment  $[a ; b]$  toute famille finie  $(a_i)_{i \in \llbracket 0; n \rrbracket}$  telle que  $\underbrace{a_0}_{=a} < a_1 < \dots <$

$$\underbrace{a_n}_{=b}.$$

Le réel positif  $\sigma = \max_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket} |a_i - a_{i-1}|$  est appelé pas de cette subdivision.

## II.2 Fonctions en escalier sur un segment

---

### Définition/Propriétés II.2.1

Une fonction  $f$  définie sur le segment  $[a ; b]$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ , est dite en escalier sur le segment  $[a ; b]$  s'il existe une subdivision  $(a_i)_{i \in \llbracket 0 ; n \rrbracket}$  de  $[a ; b]$  telle que, pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , la restriction de  $f$  à  $]a_{i-1} ; a_i[$  est une fonction constante.

L'ensemble des fonctions en escalier sur  $[a ; b]$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ , est noté  $\mathcal{E}([a ; b], \mathbb{K})$ .

## II.3 Fonctions continues par morceaux sur un segment

---

### Définition II.3.1

Une fonction  $f$  définie sur le segment  $[a ; b]$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ , est dite continue par morceaux sur le segment  $[a ; b]$  s'il existe une subdivision  $(a_i)_{i \in \llbracket 0 ; n \rrbracket}$  de  $[a ; b]$  telle que, pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , la restriction de  $f$  à  $]a_{i-1} ; a_i[$  est prolongeable en une fonction continue sur le segment  $[a_{i-1} ; a_i]$ .

L'ensemble des fonctions continues par morceaux sur  $[a ; b]$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ , est noté  $\mathcal{CM}([a ; b], \mathbb{K})$ .

#### Remarques

- $\mathcal{E}([a ; b], \mathbb{K}) \subset \mathcal{CM}([a ; b], \mathbb{K})$  et  $\mathcal{C}([a ; b], \mathbb{K}) \subset \mathcal{CM}([a ; b], \mathbb{K})$ .
- $\mathcal{CM}([a ; b], \mathbb{K})$  est sous-espace vectoriel de  $(\mathcal{F}([a ; b], \mathbb{K}), +, \cdot)$  et sous-anneau de  $(\mathcal{F}([a ; b], \mathbb{K}), +, \cdot, \times)$ .

## II.4 Approximation uniforme des fonctions continues par morceaux

---

### Définition/Propriétés II.4.1

Soit  $f$  une fonction continue par morceaux sur le segment  $[a ; b]$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

Alors, pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe une fonction  $\varphi : [a ; b] \rightarrow \mathbb{K}$  en escalier sur le segment  $[a ; b]$  telle que

$$\sup_{t \in [a ; b]} |f(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon.$$

#### Remarques

- La borne supérieure écrite a du sens car toute fonction de  $\mathcal{CM}([a ; b], \mathbb{K})$  est bornée.
- On déduit du résultat précédent que :

$$\forall f \in \mathcal{CM}([a ; b], \mathbb{K}), \exists (\varphi_n) \in (\mathcal{E}([a ; b], \mathbb{K}))^{\mathbb{N}}, \sup_{t \in [a ; b]} |f(t) - \varphi_n(t)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Dans ce cas, on dit que la suite de fonctions  $(\varphi_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur  $[a ; b]$ .

---

*Démonstration*

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $a < b$  et  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  une fonction continue par morceaux sur le segment  $[a ; b]$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ .

Montrons l'existence de  $\varphi : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  en escalier sur le segment  $[a ; b]$  telle que  $\sup_{t \in [a; b]} |f(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon$ .

- Cas particulier où  $f$  est continue sur le segment  $[a ; b]$ .

Dans ce cas, d'après le théorème de Heine,  $f$  est uniformément continue sur le segment  $[a ; b]$ .

Il existe donc un réel  $\delta > 0$  tel que, pour tout  $(x, y) \in ([a ; b])^2$ ,  $|x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$  (★).

On note  $n$  un entier  $n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\frac{b-a}{n} \leq \delta$  (fixé dans la suite).

On crée alors une subdivision  $(a_i)_{i \in \llbracket 0; n \rrbracket}$  du segment  $[a ; b]$  en posant, pour tout  $i \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ ,  $a_i = a + i \frac{b-a}{n}$

On considère enfin la fonction  $\varphi$ , en escalier sur le segment  $[a ; b]$ , définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \forall x \in [a_{i-1} ; a_i[ , \varphi(x) = f(a_{i-1}) \text{ et } \varphi(b) = f(b)$$

Montrons que  $\sup_{t \in [a; b]} |f(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon$ .

Pour tout  $t \in [a ; b[$ , il existe  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$  tel que  $t \in [a_{i-1} ; a_i[$  donc  $|t - a_{i-1}| \leq a_i - a_{i-1} \leq \frac{b-a}{n} \leq \delta$ .

Par continuité uniforme de  $f$ , avec (★), on a :  $|f(t) - \varphi(t)| = |f(t) - f(a_{i-1})| \leq \varepsilon$ . Ainsi,

$$\forall t \in [a ; b] , |f(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon$$

(car l'inégalité est triviale pour  $t = b$ ).

Comme la fonction  $t \mapsto |f(t) - \varphi(t)|$  est par  $\varepsilon$  sur le segment  $[a ; b]$ , elle admet une borne supérieure qui vérifie  $\sup_{t \in [a; b]} |f(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon$  (en cas d'existence, la borne supérieure est le plus petit des majorants).

conclusion il existe  $\varphi : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  en escalier sur le segment  $[a ; b]$  telle que  $\sup_{t \in [a; b]} |f(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon$ .

- Cas général où  $f$  est continue par morceaux sur le segment  $[a ; b]$ .

On note  $(a_i)_{i \in \llbracket 0; n \rrbracket}$  une subdivision du segment  $[a ; b]$  adaptée à la fonction  $f$ .

Soit  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ .

Par définition, la restriction  $f|_{]a_{i-1}; a_i[}$  est prolongeable en une fonction continue sur  $[a_{i-1} ; a_i]$ .



D'après le point précédent, il existe donc une fonction en escalier  $\varphi_i : [a_{i-1} ; a_i] \longrightarrow \mathbb{K}$  tel que

$$\forall t \in ]a_{i-1} ; a_i[ , |f(t) - \varphi_i(t)| \leq \varepsilon$$

On définit alors une fonction en escalier  $\varphi$  sur  $[a ; b]$  en posant :

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket , \forall t \in ]a_{i-1} ; a_i[ , \varphi(t) = \varphi_i(t)$$

$$\forall i \in \llbracket 0 ; n \rrbracket , \varphi(a_i) = f(a_i)$$

Par construction, cette fonction  $\varphi$  vérifie

$$\forall t \in [a ; b] , \forall f(t) - \varphi(t) \leq \varepsilon$$

et on conclut, comme dans le cas précédent, que  $\sup_{t \in [a; b]} |f(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon$ .

conclusion il existe  $\varphi : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  en escalier sur le segment  $[a ; b]$  telle que  $\sup_{t \in [a; b]} |f(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon$

Remarque : vocabulaire et notation

Dans ce résultat, la fonction  $\varphi$  dépend du réel  $\varepsilon > 0$  fixé.

Si on applique ce résultat avec  $\varepsilon = \frac{1}{n+1}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on en déduit l'existence d'une suite de fonctions  $(\varphi_n)$  en escalier sur le segment  $[a ; b]$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, \sup_{t \in [a; b]} |f(t) - \varphi_n(t)| \leq \frac{1}{n+1}$ .

Ainsi

$$\sup_{t \in [a; b]} |f(t) - \varphi_n(t)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

ce que l'on note plus simplement, en anticipant sur ce qui sera vu en MPI,

$$\|f - \varphi_n\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et on dit que la suite de fonctions  $(\varphi_n)$  en escalier sur  $[a ; b]$  converge uniformément vers  $f$  sur  $[a ; b]$  ou encore que  $f$  est limite uniforme de la suite de fonctions  $(\varphi_n)$  en escalier sur  $[a ; b]$ . ■

### III Intégrale sur un segment d'une fonction continue par morceaux

Soit  $a$  et  $b$  deux réels tels que  $a < b$ .

#### III.1 Cas particulier des fonctions en escalier sur un segment

---

**Définition/Propriétés III.1.1**

Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  une fonction en escalier sur  $[a ; b]$  et  $(a_i)_{i \in \llbracket 0; n \rrbracket}$  une subdivision de  $[a ; b]$  adaptée à  $f$ .

Pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on note  $\lambda_i$  la valeur prise par  $f$  sur  $]a_{i-1} ; a_i[$ .

Alors, le scalaire  $\sum_{i=1}^n \lambda_i (a_i - a_{i-1})$  est :

- indépendant de la subdivision de  $[a ; b]$  adaptée à  $f$  choisie ;
- appelé l'intégrale de  $f$  sur  $[a ; b]$  et noté  $\int_{[a;b]} f$  ou  $\int_a^b f$  ou encore  $\int_a^b f(t)dt$  :

$$\int_{[a;b]} f = \int_a^b f = \int_a^b f(t)dt = \sum_{i=1}^n \lambda_i (a_i - a_{i-1})$$

Remarque

Dans le cas  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , on peut interpréter cette intégrale comme "aire algébrique sous la courbe de  $f$ ".

---

*Démonstration*

- Convergence de la suite  $\left( \int_{[a;b]} \varphi_n \right)$

Par hypothèse  $\|f - \varphi_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc, il existe un rang  $n_0$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies \|f - \varphi_n\|_\infty \leq 1$ .

Par inégalité triangulaire sur la norme  $\|\cdot\|_{+\infty}$ , on en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, \|\varphi_n\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|f - \varphi_n\|_\infty \leq \|f\|_\infty + 1$$

puis, par inégalité triangulaire et croissance de l'intégrale sur un segment d'une fonction en escalier :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, \left| \int_{[a;b]} \varphi_n \right| \leq \int_{[a;b]} |\varphi_n| \leq \int_{[a;b]} (\|f\|_\infty + 1)$$

Ainsi, la suite  $\left( \int_{[a;b]} \varphi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$  est bornée. D'après le théorème de Bolzano-

Weierstrass, elle admet donc une suite extraite  $\left( \int_{[a;b]} \varphi_{\alpha(n)} \right)_{n \in \mathbb{N}}$  convergente. On note  $\ell \in \mathbb{K}$  la limite de cette suite.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

En utilisant la linéarité, l'inégalité triangulaire et la croissance de l'intégrale sur un segment d'une fonction en escalier, on trouve successivement

$$\int_{[a;b]} \varphi_n - \int_{[a;b]} \varphi_{\alpha(n)} = \int_{[a;b]} (\varphi_n - \varphi_{\alpha(n)})$$

$$\left| \int_{[a;b]} \varphi_n - \int_{[a;b]} \varphi_{\alpha(n)} \right| \leq \int_{[a;b]} |\varphi_n - \varphi_{\alpha(n)}| \leq \int_{[a;b]} \|\varphi_n - \varphi_{\alpha(n)}\|_\infty \leq (b - a) \|\varphi_n - \varphi_{\alpha(n)}\|_\infty$$

avec, par inégalité triangulaire sur la norme,

$$\|\varphi_n - \varphi_{\alpha(n)}\|_\infty \leq \|\varphi_n - f\|_\infty + \|f - \varphi_{\alpha(n)}\|_\infty$$

donc

$$\left| \int_{[a;b]} \varphi_n - \int_{[a;b]} \varphi_{\alpha(n)} \right| \leq (b-a) (\|f - \varphi_n\|_\infty + \|f - \varphi_{\alpha(n)}\|_\infty)$$

Comme  $(b-a) (\|f - \varphi_n\|_\infty + \|f - \varphi_{\alpha(n)}\|_\infty) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  par hypothèse, on obtient par théorème d'encadrement que

$$\int_{[a;b]} \varphi_n - \int_{[a;b]} \varphi_{\alpha(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

puis, comme  $\int_{[a;b]} \varphi_{\alpha(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ , que

$$\int_{[a;b]} \varphi_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$$

conclusion la suite  $\left( \int_{[a;b]} \varphi_n \right)$  converge.

- Limite de la suite  $\left( \int_{[a;b]} \varphi_n \right)$  indépendante du choix de la suite  $(\varphi_n)$ .

On considère ici une autre suite  $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de fonctions en escalier sur  $[a ; b]$  telle que  $\|f - \psi_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ . Avec des arguments du même type que ci-dessus, on a :

$$\left| \int_{[a;b]} \varphi_n - \int_{[a;b]} \psi_n \right| = \left| \int_{[a;b]} (\varphi_n - \psi_n) \right| \leq (b-a) \|\varphi_n - \psi_n\|_\infty \leq (b-a) (\|f - \varphi_n\|_\infty + \|f - \psi_n\|_\infty)$$

puis

$$\left| \int_{[a;b]} \varphi_n - \int_{[a;b]} \psi_n \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et enfin, puisque les deux suites d'intégrales convergent,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a;b]} \varphi_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a;b]} \psi_n$$

conclusion la limite de  $\left( \int_{[a;b]} \varphi_n \right)$  ne dépend pas de la suite de fonctions en escalier  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  qui approche uniformément  $f$  sur  $[a ; b]$ . ■

## III.2 Cas général des fonctions continues par morceaux sur un segment

### Définition/Propriétés III.2.1

Soit  $f : [a ; b] \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction continue par morceaux sur  $[a ; b]$ .

Soit  $(\varphi_n)$  une suite de fonctions en escalier sur  $[a ; b]$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$  telle que

$$\sup_{t \in [a;b]} |f(t) - \varphi_n(t)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Alors, la suite  $\left( \int_{[a;b]} \varphi_n \right)$  converge et sa limite est :

- indépendante du choix de la suite  $(\varphi_n)$  ;
- appelée l'intégrale de  $f$  sur  $[a ; b]$  et notée  $\int_{[a;b]} f$  ou  $\int_a^b f$  ou encore  $\int_a^b f(t)dt$  :

$$\int_{[a;b]} f = \int_a^b f = \int_a^b f(t)dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \int_{[a;b]} \varphi_n \right)$$

Remarque

Cette définition prolonge bien celle vu pour les fonctions en escalier sur le segment  $[a ; b]$  car, lorsque  $f$  est en escalier sur  $[a ; b]$ , on retrouve la même intégrale que celle définie dans le paragraphe précédent.

### III.3 Valeur moyenne

---

#### Définition/Propriétés III.3.1

Pour tout  $f$  de  $\mathcal{CM}([a ; b], \mathbb{K})$ , le scalaire  $\frac{1}{b-a} \int_{[a;b]} f$  est dit valeur moyenne de  $f$  sur  $[a ; b]$ .

### III.4 Propriétés

---

#### Définition/Propriétés III.4.1 (Linéarité de l'intégrale)

Si  $f : [a ; b] \rightarrow \mathbb{K}$  et  $g : [a ; b] \rightarrow \mathbb{K}$  sont deux fonctions continues par morceaux sur  $[a ; b]$  et,  $\alpha$  et  $\beta$  deux éléments de  $\mathbb{K}$  alors

$$\int_{[a;b]} (\alpha f + \beta g) = \alpha \left( \int_{[a;b]} f \right) + \beta \left( \int_{[a;b]} g \right)$$

---

#### Définition/Propriétés III.4.2 (Positivité (pour les fonctions à valeurs réelles))

Si  $f : [a ; b] \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction continue par morceaux et positive sur  $[a ; b]$  alors

$$\int_{[a;b]} f \geq 0$$

---

#### Définition/Propriétés III.4.3 (Croissance (pour les fonctions à valeurs réelles))

Si  $f : [a ; b] \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : [a ; b] \rightarrow \mathbb{R}$  sont des fonctions continues par morceaux telles que  $f \leq g$  alors

$$\int_{[a;b]} f \leq \int_{[a;b]} g$$

---

**Définition/Propriétés III.4.4 (Inégalité triangulaire intégrale)**

Si  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  est une fonction continue par morceaux sur  $[a ; b]$  alors

$$\left| \int_{[a;b]} f \right| \leq \int_{[a;b]} |f|$$

---

**Définition/Propriétés III.4.5 (Relation de Chasles)**

Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  une fonction continue par morceaux sur  $[a ; b]$ .

Alors, pour tout  $(\alpha, \beta, \gamma) \in [a ; b]$ , on a :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t)dt = \int_{\alpha}^{\gamma} f(t)dt + \int_{\gamma}^{\beta} f(t)dt$$

avec les notations suivantes\*

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t)dt = \begin{cases} \int_{[\alpha;\beta]} f & \text{si } \alpha < \beta \\ 0 & \text{si } \alpha = \beta \\ - \int_{[\beta;\alpha]} f & \text{si } \alpha > \beta \end{cases}$$

---

**Définition/Propriétés III.4.6 (Nullité (pour les fonctions à valeurs réelles))**

Si  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{R}$  est une fonction CONTINUE, positive et d'intégrale nulle sur  $[a ; b]$  alors  $f$  est la fonction nulle.

Remarque

Cette propriété n'est pas conservée dans le cas où  $f$  est seulement continue par morceaux.

---

**Définition/Propriétés III.4.7 (Cas des fonctions à valeurs complexes)**

Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{C}$  une fonction continue par morceaux sur  $[a ; b]$ .

Alors :

$$\int_{[a;b]} f = \int_{[a;b]} \operatorname{Re}(f) + i \int_{[a;b]} \operatorname{Im}(f)$$

---

**Définition/Propriétés III.4.8 (Cas des fonctions paires ou impaires)**

Soit  $a$  un réel strictement positif et  $f : [-a ; a] \longrightarrow \mathbb{K}$  une fonction continue par morceaux sur  $[-a ; a]$ .

(1) Si  $f$  est paire alors  $\int_{-a}^a f(t)dt = 2 \int_0^a f(t)dt$

(2) Si  $f$  est impaire alors  $\int_{-a}^a f(t)dt = 0$ .

---

**Définition/Propriétés III.4.9 (Cas des fonctions périodiques)**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction continue par morceaux sur  $\mathbb{R}$ .

Si  $f$  est périodique de période  $T$  alors, pour tout réel  $a$ , on a : 
$$\int_a^{a+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt$$

---

**Définition/Propriétés III.4.10 (Conséquences pratiques de la définition)**

- Si  $f$  et  $g$  sont des fonctions continues par morceaux à valeurs dans  $\mathbb{K}$  qui coïncident sur  $[a ; b]$  privé d'un nombre fini de points alors

$$\int_{[a;b]} f = \int_{[a;b]} g$$

- Si  $f$  est une fonction continue par morceaux à valeurs dans  $\mathbb{K}$  et  $(a_i)_{i \in \llbracket 0;n \rrbracket}$  une subdivision de  $[a ; b]$  contenant les points de discontinuité de  $f$  alors

$$\int_{[a;b]} f = \sum_{i=1}^n \left( \int_{[a_{i-1}; a_i]} f \right)$$

### III.5 Sommes de Riemann à pas constant

---

**Définition/Propriétés III.5.1**

Si  $f : [a ; b] \rightarrow \mathbb{K}$  est une fonction continue par morceaux sur  $[a ; b]$  alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \left( \sum_{k=0}^{n-1} f \left( a + k \frac{b-a}{n} \right) \right) = \int_{[a;b]} f$$

Remarque

Dans le cas où  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , le réel  $\frac{b-a}{n} \left( \sum_{k=0}^{n-1} f \left( a + k \frac{b-a}{n} \right) \right)$  correspond à la somme des aires de  $n$  rectangles de largeur  $\frac{b-a}{n}$  et de longueur  $f \left( a + k \frac{b-a}{n} \right)$  avec  $k$  qui varie dans  $\llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$

*Démonstration*

Soit  $f \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{K})$

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f(a_k) - \int_{[a;b]} f \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f(a_k) - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{[a_k; a_{k+1}]} f \right| \\
 &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \left( \frac{b-a}{n} f(a_k) - \int_{[a_k; a_{k+1}]} f \right) \right| \\
 &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{[a_k; a_{k+1}]} (f(a_k) - f) \right| \\
 &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{[a_k; a_{k+1}]} |f(a_k) - f| \\
 &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{[a_k; a_{k+1}]} M |a_k - t| \quad \text{Car } f \text{ est } M\text{-lipschitzienne} \\
 &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{[a_k; a_{k+1}]} M (a_k - t) \\
 &\leq \sum_{k=0}^{n-1} M \left( \frac{-1}{2} t^2 + a_k t \right)_{a_k}^{a_{k+1}} \\
 &\leq \frac{M}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left( \frac{b-a}{n} \right)^2 \\
 &\leq \frac{M}{2} \times \frac{n(b-a)^2}{n^2} \\
 &\leq \frac{M(b-a)^2}{2n}
 \end{aligned}$$

or  $\frac{M(b-a)^2}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \left( \sum_{k=0}^{n-1} f \left( a + k \frac{b-a}{n} \right) \right) = \int_{[a;b]} f$  ■

## IV Lien entre intégrale et primitive d'une fonction continue

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ , continue sur  $I$ , à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

### IV.1 Théorème fondamental

### Théorème IV.1.1

(1) Pour tout  $a$  appartenant à  $I$ , la fonction  $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$  est :

- dérivable sur  $I$  de dérivée la fonction  $f$  ;
- l'unique primitive de la fonction  $f$  sur  $I$  qui s'annule en  $a$ .

(2) Pour toute primitive  $F$  de  $f$  sur  $I$ , on a :

$$\forall (a, b) \in I^2, \int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

#### Démonstration

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  continue sur  $I$

Soit  $a \in I$ , on note  $F : I \longrightarrow \mathbb{K}$   
$$x \mapsto \int_a^x f(t)dt$$

Montrons que  $F$  est dérivable sur  $I$  avec  $F' = f$  c'est-à-dire  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $I$

Soit  $x_0 \in I$

$$\begin{aligned} \forall x \in I \setminus \{x_0\} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{x - x_0} \left( \int_{x_0}^x f(t)dt - \int_{x_0}^{x_0} f(t)dt \right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \left( \int_{x_0}^x f(t)dt - f(x_0)dt \right) \right| \\ &\leq \begin{cases} \frac{1}{|x - x_0|} \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt & \text{si } x > x_0 \\ \frac{1}{|x - x_0|} \int_x^{x_0} |f(t) - f(x_0)| dt & \text{si } x < x_0 \end{cases} \end{aligned}$$

Soit  $\varepsilon > 0$   $f$  étant continue en  $x_0$   $\exists \delta > 0$  tel que  $\forall t \in I |t - x_0| \leq \delta \implies |f(t) - f(x_0)| \leq \varepsilon$

Donc par croissance de l'intégrale : 
$$\forall x \in I |x - x_0| \leq \delta \implies |\Delta(x) - f(x_0)| \leq \begin{cases} \frac{1}{|x - x_0|} \int_{x_0}^x \varepsilon dt & \text{si } x > x_0 \\ \frac{1}{|x - x_0|} \int_x^{x_0} \varepsilon dt & \text{si } x < x_0 \end{cases} \leq \varepsilon$$

Ainsi  $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in I, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \implies \left| \frac{F(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| \leq \varepsilon$

i.e.  $\frac{F(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0) \in \mathbb{K}$

i.e.  $F$  dérivable en  $x_0$  avec  $F'(x_0) = f(x_0) \quad \forall x_0 \in I$

Ainsi  $\forall f \in C(I, \mathbb{K}) \forall a \in I, F : x \longrightarrow \int_a^x f(t)dt$  alors  $F \in \underbrace{\mathcal{D}(I, \mathbb{R})}_{F \in C^1(I, \mathbb{R})}$  et  $F' = f$  ■



---

**Définition/Propriétés IV.1.2 (Existence de primitives)**

Toute fonction numérique continue sur un intervalle  $I$  admet des primitives sur  $I$  et celles-ci permettent de calculer les intégrales de cette fonction sur tout segment inclus dans  $I$ .

## V Formules de Taylor globales

### V.1 Formule de Taylor avec reste intégral

---

**Définition/Propriétés V.1.1**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Si  $f$  est une application de classe  $C^{n+1}$  sur  $I$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$  alors, pour tout couple  $(a, x) \in I^2$ , on a :

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

avec

$$T_n(x) = \sum_{K=0}^n \frac{(x-a)^K}{K!} f^{(K)}(a) \text{ et } R_n(x) = \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

---

*Démonstration*

Montrons cette formule par récurrence

- $n = 0$  :

Soit  $f \in C^1(I, \mathbb{K})$

$$\text{Alors } T_0(x) = \frac{f^{(0)}(a)}{0!} (x-a)^0 = f(a) \text{ et } R_0(x) = \int_a^x \frac{x-t}{0!} f^{(1)}(t) dt = f(x) - f(a)$$

$$\text{donc } T_0(x) + R_0(x) = f(x)$$

- Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que la propriété est vrai au rang  $n$  :

Soit  $f \in C^{n+2}(I, \mathbb{K})$  alors  $f \in C^{n+1}(I, \mathbb{K})$  donc par hypothèse  $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$

Donc par Intégration Par Partie de  $R_n(x)$ ,

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \left[ \frac{-(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(t) \right]_a^x - \int_a^x \frac{-(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t) dt \\ &= \frac{-(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t) dt \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } \forall (a, x) \in I^2, f(x) = T_n(x) + \frac{-(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t) dt = T_{n+1}(x) + R_{n+1}(x) \quad \blacksquare$$

## V.2 Inégalité de Taylor-Lagrange

---

### Définition/Propriétés V.2.1

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Si  $f$  est une application de classe  $C^{n+1}$  sur  $I$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$  alors, pour tout couple  $(a, x) \in I^2$ , on a :

$$|f(x) - T_n(x)| \leq \frac{|x - a|^{n+1}}{(n+1)} M_{n+1}$$

avec

$$M_{n+1} \text{ un majorant de } f^{(n+1)} \text{ sur } [a; x] \text{ ( ou } [x, a] \text{ )}$$

---

### Démonstration

Soit  $f \in C^{n+1}(I, \mathbb{K})$  et  $(a, x) \in I^2$ , alors par théorème de Taylor avec reste intégral :

$$\begin{aligned} |f(x) - T_n(x)| &= \left| \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \right| \\ &\leq \begin{cases} \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} |f^{(n+1)}(t)| dt & \text{si } x > a \\ \int_x^a \frac{(x-t)^n}{n!} |f^{(n+1)}(t)| dt & \text{si } x < a \end{cases} \quad \text{inégalité triangulaire} \end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} f(x) - T_n(x) &\leq \begin{cases} \frac{M_{n+1}}{n!} \int_a^x (x-t)^n dt & \text{si } x > a \\ \frac{M_{n+1}}{n!} \int_x^a (t-x)^n dt & \text{si } x < a \end{cases} \quad M_{n+1} \text{ un majorant de } f^{(n+1)} \text{ car } f \text{ est } n+1\text{-lipschitzien} \\ &\leq \begin{cases} \frac{(a-x)^{n+1}}{(n+1)!} M_{n+1} & \text{si } x > a \\ \frac{(a-x)^{n+1}}{(n+1)!} M_{n+1} dt & \text{si } x < a \end{cases} \\ &\leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} M_{n+1} \end{aligned}$$

Par ailleurs  $\frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} M_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Donc  $T_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$  donc  $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$  ■

---

### Définition/Propriétés V.2.2 (Remarque)

Les deux formules précédentes ont une nature globale contrairement à la formule de Taylor-Young vue dans le chapitre "Analyse asymptotique (1)" qui elle a une nature locale.

# Chapitre 30

## Groupe Symétrique

### Sommaire

---

<b>I</b>	<b>Généralités</b>	<b>.313</b>
I.1	Groupe symétrique	313
I.2	Cycles, transposition	314
I.3	Décomposition des permutations en produit de cycles disjoints	314
<b>II</b>	<b>Signature d'une permutation</b>	<b>.315</b>
II.1	Décomposition d'une permutation en produit de transpositions	315
II.2	Théorème d'existence et unicité de la signature (ADMIS)	315

---

## I Généralités

### I.1 Groupe symétrique

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

---

#### Définition/Propriétés I.1.1 (Rappel sur le groupe des permutations d'un ensemble)

Soit  $X$  un ensemble.

L'ensemble des applications de  $X$  dans  $X$  qui sont des bijections est un groupe pour la loi de composition interne  $\circ$ , appelé groupe des permutations de l'ensemble  $X$  et noté  $\mathcal{S}_X$ .

---

#### Définition/Propriétés I.1.2 (Groupe symétrique)

Le groupe des permutations de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  est appelé groupe symétrique et souvent noté  $\mathcal{S}_n$  plutôt que  $\mathcal{S}_{\llbracket 1 ; n \rrbracket}$ .

## I.2 Cycles, transposition

Soit  $n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$ .

---

### Définition/Propriétés I.2.1 (Cycle de longueur $p$ )

Soit  $p \in \llbracket 2 ; n \rrbracket$ .

Tout élément  $\sigma$  de  $\mathcal{S}_n$  pour lequel il existe des éléments distincts  $a_1, \dots, a_p$  de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  tel que :

$$\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \dots, \sigma(a_{p-1}) = a_p, \sigma(a_p) = a_1$$

et

$$\sigma(k) = k \text{ si } k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \setminus \{a_1, \dots, a_p\}$$

est dit cycle de longueur  $p$  de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  et noté  $\sigma = (a_1 a_2 \dots a_p)$ .

---

### Définition/Propriétés I.2.2 (Transposition)

Tout cycle de longueur 2 de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  est aussi appelé transposition de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$

## I.3 Décomposition des permutations en produit de cycles disjoints

Soit  $n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$

---

### Définition/Propriétés I.3.1 (Cycles disjoints)

Les cycles  $(a_1 a_2 \dots a_p)$  et  $(b_1 b_2 \dots b_q)$  de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  sont dits disjoints si  $\{a_1, \dots, a_p\} \cap \{b_1, \dots, b_q\} = \emptyset$ .

#### Remarques

- Deux cycles disjoints commutent.
- Le terme "cycles disjoints" est parfois remplacé par "cycles à supports disjoints" ; le support d'une permutation  $\sigma$  de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  étant l'ensemble des éléments de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  qui ne sont pas invariants par  $\sigma$ .

---

### Définition/Propriétés I.3.2 (Théorème de décomposition des permutations (ADMIS))

Toute permutation de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  peut s'écrire comme composée de cycles disjoints. Cette décomposition est unique, à l'ordre près des facteurs.

#### Remarque

Le terme "produit" remplace le terme "composée" si on utilise la notation usuelle  $\sigma\sigma'$  au lieu de  $\sigma \circ \sigma'$ .

## II Signature d'une permutation

Soit  $n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$ .

### II.1 Décomposition d'une permutation en produit de transpositions

---

#### Définition/Propriétés II.1.1

Toute permutation de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  peut s'écrire comme composée de transpositions.

#### Remarque

La décomposition d'une permutation de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  comme composée de transpositions n'est pas unique.

### II.2 Théorème d'existence et unicité de la signature (ADMIS)

---

#### Théorème II.2.1

Il existe un morphisme de groupes  $\varepsilon$  de  $(S_n, \circ)$  dans  $(\{-1, 1\}, \times)$  qui envoie les transpositions sur  $-1$ .

Il est défini par :

$$\forall \sigma \in S_n, \varepsilon(\sigma) = \prod_{\{i,j\} \in A} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

où

$$A = \left\{ \{i, j\} \mid (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2 \right\}$$

. Ce morphisme de groupes est unique et appelé signature de  $S_n$ .

#### Remarques

- La signature d'un cycle de longueur  $p$  est  $(-1)^{p-1}$ .
- La signature sera utilisée dans le chapitre "Déterminants" pour définir formellement le déterminant d'une famille de vecteurs, d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée.

---

#### Démonstration

- Montrons que  $\varepsilon$  est un morphisme de groupes de  $(S_n, \circ)$  vers  $\{-1, 1\}$ .

On remarque d'abord que  $\varepsilon$  est bien définie car, pour tout  $\{i, j\} \in A$ , on a  $i \neq j$ .

— Soit  $\sigma \in S_n$ .

$\psi_\sigma : \{i, j\} \mapsto \{\sigma(i), \sigma(j)\}$  est une bijection de  $A$  vers  $A$  (de réciproque  $\psi_{\sigma^{-1}}$ ) donc, avec le changement d'indice  $\{k, \ell\} = \psi_\sigma(\{i, j\})$ , on a  $\prod_{\{i,j\} \in A} |\sigma(j) - \sigma(i)| = \prod_{\{k,\ell\} \in A} |k - \ell| =$

$$\prod_{\{i,j\} \in A} |j - i| \text{ donc } \frac{\prod_{\{i,j\} \in A} |\sigma(j) - \sigma(i)|}{\prod_{\{i,j\} \in A} |j - i|} = 1 \text{ ce qui donne bien } \varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}.$$

— Soit  $(\sigma, \sigma') \in (\mathcal{S}_n)^2$ .

$$\varepsilon(\sigma \circ \sigma') = \prod_{\{i,j\} \in A} \frac{\sigma \circ \sigma'(j) - \sigma \circ \sigma'(i)}{j - i} = \prod_{\{i,j\} \in A} \frac{\sigma \circ \sigma'(j) - \sigma \circ \sigma'(i)}{\sigma'(j) - \sigma'(i)} \times \prod_{\{i,j\} \in A} \frac{\sigma'(j) - \sigma'(i)}{j - i}$$

Avec le changement d'indice  $\{k, \ell\} = \psi_{\sigma'}(\{i, j\})$ , on a :

$$\varepsilon(\sigma \circ \sigma') = \prod_{\{k,\ell\} \in A} \frac{\sigma(k) - \sigma(\ell)}{k - \ell} \times \prod_{\{i,j\} \in A} \frac{\sigma'(j) - \sigma'(i)}{j - i} = \varepsilon(\sigma) \times \varepsilon(\sigma')$$

ce qui donne bien que  $\varepsilon$  est un morphisme de groupes.

conclusion  $\varepsilon$  est un morphisme de groupes de  $(\mathcal{S}_n, \circ)$  vers  $\{-1, 1\}$ .

- Montrons que  $\varepsilon$  envoie toute transposition de  $\mathcal{S}_n$  vers  $-1$ .

Soit  $\tau = \begin{pmatrix} a & b \\ & \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_n$  une transposition avec  $a < b$  et  $\{i, j\} \in A$ .

— Si  $i \in \{a, b\}$  et  $j \in \{a, b\}$  alors

$$\frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} = \frac{\tau(b) - \tau(a)}{b - a} = \frac{a - b}{b - a} = -1$$

— Si  $i \notin \{a, b\}$  et  $j = a$  alors

$$\frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} = \frac{\tau(a) - \tau(i)}{a - i} = \frac{b - i}{a - i}$$

— Si  $i \notin \{a, b\}$  et  $j = b$  alors

$$\frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} = \frac{\tau(b) - \tau(i)}{b - i} = \frac{a - i}{b - i}$$

— Si  $i \notin \{a, b\}$  et  $j \notin \{a, b\}$  alors

$$\frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} = \frac{j - i}{j - i} = 1$$

Les ensembles

$$A_1 = \{\{a, b\}\}, A_2 = \{\{i, j\} \in A \mid i \notin \{a, b\} \text{ et } j \in \{a, b\}\}$$

et

$$A_3 = \{\{i, j\} \in A \mid i \notin \{a, b\} \text{ et } j \notin \{a, b\}\}$$

formant une partition de  $A$ , on en déduit que :

$$\varepsilon(\tau) = \prod_{\{i,j\} \in A_1} \frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} \times \prod_{\{i,j\} \in A_2} \frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} \times \prod_{\{i,j\} \in A_3} \frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i}$$

donc que

$$\varepsilon(\tau) = -1 \times \prod_{\{i,j\} \in A_2} \underbrace{\left( \frac{b-i}{a-i} \times \frac{a-i}{b-i} \right)}_{=1} \times \prod_{\{i,j\} \in A_3} 1$$

et enfin  $\varepsilon(\tau) = -1$ .

- Montrons que  $\varepsilon$  est l'unique morphisme de groupes de  $(\mathcal{S}_n, \circ)$  vers  $\{-1, 1\}$  qui envoie les transpositions sur  $-1$ .

Supposons qu'il existe un autre morphisme de groupes, noté  $\varepsilon'$ , de  $(\mathcal{S}_n, \circ)$  vers  $\{-1, 1\}$  qui envoie les transpositions sur  $-1$ .

Soit  $\sigma \in \mathcal{S}_n$ . Alors  $\sigma$  peut s'écrire comme composée de  $p$  transpositions notées  $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_p$  :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_p$$

Alors, par hypothèse sur les applications  $\varepsilon$  et  $\varepsilon'$ , on a :

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau_1)\varepsilon(\tau_2) \dots \varepsilon(\tau_p) = (-1)^p \text{ et } \varepsilon'(\sigma) = \varepsilon'(\tau_1)\varepsilon'(\tau_2) \dots \varepsilon'(\tau_p) = (-1)^p$$

donc  $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon'(\sigma)$ .

conclusion  $\varepsilon = \varepsilon'$  d'où l'unicité du morphisme de groupes vérifiant les conditions souhaitées. ■

# Chapitre 31

## Déterminants

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Formes <math>n</math>-linéaires alternées . . . . .</b>	<b>318</b>
I.1	Définition . . . . .	318
I.2	Propriétés . . . . .	319
<b>II</b>	<b>Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base . . . . .</b>	<b>319</b>
II.1	Théorème . . . . .	319
II.2	Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base . . . . .	320
II.3	Formule de changement de bases . . . . .	321
II.4	Caractérisation des bases par le déterminant . . . . .	322
<b>III</b>	<b>Déterminant d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée. . . . .</b>	<b>322</b>
III.1	Cas d'un endomorphisme en dimension finie . . . . .	322
III.2	Déterminant d'une matrice carrée . . . . .	324
III.3	Calcul de déterminants en pratique . . . . .	326
III.4	Comatrice . . . . .	329

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## I Formes $n$ -linéaires alternées

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$  de dimension finie non nulle  $n$ .

### I.1 Définition

#### Définition I.1.1

Une application  $f : E^n \longrightarrow \mathbb{K}$  est dite forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$  si :

- (1)  $\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \forall (x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n) \in E^{n-1}, (x \longmapsto f(x_1, \dots, x_{j-1}, x, x_{j+1}, \dots, x_n)) \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ .
- (2)  $f$  s'annule en tout  $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$  pour lequel il existe  $(j, k) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$  avec  $j \neq k$  et  $x_j = x_k$ .



## I.2 Propriétés

---

### Définition/Propriétés I.2.1 (Effet sur les familles liées)

Si  $f$  est une forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$  et  $(x_1, \dots, x_n)$  une famille de vecteurs de  $E$  liée alors

$$f(x_1, \dots, x_n) = 0$$

---

### Définition/Propriétés I.2.2 (Antisymétrie)

Si  $f$  est une forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$  alors  $f$  est antisymétrique, c'est-à-dire que :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (j, k) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, j < k \implies f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n) = -f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n).$$

#### Remarque

En notant  $\varepsilon$  la signature de  $\mathcal{S}_n$ , l'antisymétrie de  $f$  se traduit par : pour tout  $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$  et pour toute transposition  $\theta$  de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $f(x_{\theta(1)}, \dots, x_{\theta(n)}) = \varepsilon(\theta)f(x_1, \dots, x_n)$ .

---

### Définition/Propriétés I.2.3 (Effet d'une permutation)

Si  $f$  est une forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$  alors :

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma)f(x_1, \dots, x_n).$$

## II Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$  de dimension finie non nulle  $n$  muni d'une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ .

### II.1 Théorème

---

#### Théorème II.1.1

(1) Il existe une unique forme  $n$ -linéaire alternée  $f$  sur  $E$  telle que  $f(\mathcal{B}) = f(e_1, \dots, e_n) = 1$ . Cette forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$  est notée  $\det_{\mathcal{B}}$  et vérifie :

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1.$$

(2) Toute forme  $n$ -linéaire alternée  $g$  sur  $E$  est un multiple de  $\det_{\mathcal{B}}$  avec, plus précisément :

$$g = g(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}.$$

### Démonstration

On note  $\mathcal{A}_n$  l'ensemble des formes  $n$ -linéaires alternées sur  $E$  et on considère  $g \in \mathcal{A}_n$ .

Soit  $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ .

Pour tout  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on note  $x_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$  la décomposition de  $x_j$  dans la base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  de  $E$ .

Alors, par  $n$ -linéarité de  $g$ , on a :  $g(x_1, \dots, x_n) = \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^n} a_{i_1,1} \dots a_{i_n,n} \underbrace{g(e_{i_1}, \dots, e_{i_n})}_{=0 \text{ Si deux indices égaux}}$

Vu le caractère alterné de  $g$ , on ne conserve dans la somme que les termes correspondant aux  $n$ -uplets  $(i_1, \dots, i_n)$  d'éléments deux à deux distincts, c'est-à-dire les  $n$ -uplets  $(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$  avec  $\sigma$  qui décrit le groupe symétrique  $\mathcal{S}_n$ . Ainsi :

$$g(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} a_{\sigma(1),1} \dots a_{\sigma(n),n} g(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)})$$

Comme  $g$  est forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$ , on a :  $\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, g(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) g(e_1, \dots, e_n)$  où  $\varepsilon(\sigma)$  est la signature de  $\sigma$ . Cela donne, après factorisation,

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, g(x_1, \dots, x_n) = \left( \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i} \right) \underbrace{g(e_1, \dots, e_n)}_{\in \mathbb{K}} \text{ donc } g = g(e_1, \dots, e_n) f \quad \star$$

en notant  $f : E^n \longrightarrow \mathbb{K}$  la forme  $n$ -linéaire alternée définie par  $f : (x_1, \dots, x_n) \longmapsto \left( \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i} \right)$  avec  $(a_{k,i})_{1 \leq k \leq n}$  famille des coordonnées de  $x_k$ .

Pour tout  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on a  $e_j = \sum_{i=1}^n \delta_{i,j} e_i$  donc  $f(e_1, \dots, e_n) = \varepsilon(\text{Id}_{\mathcal{S}_n}) \prod_{i=1}^n \delta_{\text{Id}_{\mathcal{S}_n}(i),i}$  puis  $f(e_1, \dots, e_n) = 1$ .

1. La relation  $(\star)$  assure de plus que  $f$  est la seule forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$  vérifiant cette égalité.

D'après  $(\star)$ , on a l'inclusion  $\mathcal{A}_n \subseteq \text{Vect}(f)$  puis  $\mathcal{A}_n = \text{Vect}(f)$  (car tout  $g$  de  $\text{Vect}(f)$  est forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$  puisque  $f$  l'est) avec  $\text{Vect}(f)$  espace vectoriel de dimension 1 (car  $f$  n'est pas nulle puisqu'elle vaut 1 en  $(e_1, \dots, e_n)$ ).

conclusion

L'ensemble des formes  $n$ -linéaires alternées sur  $E$  est un espace vectoriel de dimension 1 engendré par  $f : (x_1, \dots, x_n) \longmapsto \left( \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i} \right)$ , seule forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$  qui vérifie  $f(\mathcal{B}) = 1$ .

En notant  $f = \det_{\mathcal{B}}$  (dit déterminant dans la base  $\mathcal{B}$  de  $E$ ), on a donc  $g = g(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$  pour toute forme  $n$ -linéaire alternée  $g$  sur  $E$ . ■

## II.2 Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base

---

**Définition II.2.1**

Soit  $(x_1, \dots, x_n)$  une famille de  $n$  vecteurs de  $E$ .

Le scalaire  $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$  est dit déterminant de la famille  $(x_1, \dots, x_n)$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

---

**Définition/Propriétés II.2.2 (Expression du déterminant avec les coordonnées)**

Si  $(x_1, \dots, x_n)$  est une famille de  $n$  vecteurs de  $E$  et  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$  alors :

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \left( \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j)j} \right)$$

**Remarque**

À l'issue de ce chapitre, on disposera de moyens plus pratiques que le recours à cette formule théorique pour calculer le déterminant d'une famille de vecteurs.

---

**Définition/Propriétés II.2.3 (Cas particuliers des dimension 2 et 3)**

- Si  $E$  est de dimension 2 et  $(x, y)$  une famille de deux vecteurs de  $E$  de matrice  $\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix}$  dans une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  alors :

$$\det_{\mathcal{B}}(x, y) = x_1 y_2 - x_2 y_1 \underset{\text{Not.}}{=} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

- Si  $E$  est de dimension 3 et  $(x, y, z)$  une famille de trois vecteurs de  $E$  de matrice  $\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix}$  dans une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  alors :

$$\det_{\mathcal{B}}(x, y, z) = x_1 y_2 z_3 + x_2 y_3 z_1 + x_3 y_1 z_2 - x_3 y_2 z_1 - x_2 y_1 z_3 - x_1 y_3 z_2 \underset{\text{Not.}}{=} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

## II.3 Formule de changement de bases

---

**Définition/Propriétés II.3.1**

Si  $\mathcal{B}'$  est une autre base de  $E$  alors  $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$  c'est-à-dire que :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E, \det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$$

## II.4 Caractérisation des bases par le déterminant

---

### Définition/Propriétés II.4.1

Une famille  $\mathcal{B}' = (x_1, \dots, x_n)$  de  $n$  vecteurs de  $E$  est une base de  $E$  si, et seulement si,  $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \neq 0$  avec dans ce cas,

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = (\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}))^{-1}$$

#### Remarque

En 2<sup>e</sup> année MPI, les notions d'orientation d'un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et de bases directes ou indirectes seront définies en utilisant la notion de déterminant.

## III Déterminant d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée

### III.1 Cas d'un endomorphisme en dimension finie

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$  de dimension finie non nulle.

---

#### Théorème III.1.1

Soit  $u$  un endomorphisme de  $E$ .

Le scalaire  $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ , qui ne dépend pas de la base  $\mathcal{B}$  de  $E$  considérée, est appelé déterminant de  $u$  et noté  $\det(u)$  :

$$\det(u) = \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B})) \text{ avec } \mathcal{B} \text{ base quelconque de } E$$

#### Exemples simples

- En particulier,  $\det(0_{\mathcal{L}(E)}) = 0$  et  $\det(\text{Id}_E) = 1$ .
- Plus généralement,
  - le déterminant d'une homothétie  $h_\alpha$  de  $E$  de rapport  $\alpha$  est :  $\det(h_\alpha) = \alpha^{\dim E}$ .
  - le déterminant d'une projection  $p$  de  $E$  autre que l'identité est :  $\det(p) = 0$ .
  - le déterminant d'une symétrie  $s$  de  $E$  est :  $\det(s) = (-1)^{\dim E - \dim F}$  où  $F = \ker(s - \text{Id}_E)$

---

#### Démonstration

On considère l'application  $g : E^n \longrightarrow \mathbb{K}$  définie par

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, g(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}'}(u(x_1), \dots, u(x_n))$$

Montrons que  $g(\mathcal{B}') = \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$  ce qui donnera le résultat souhaité.

Comme  $\det_{\mathcal{B}'}$  est une forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$  et que  $u$  est un endomorphisme de  $E$ , on vérifie aisément que  $g$  est une forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$ .

Par théorème, on a donc :

$$g = g(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$$

En particulier :

$$g(\mathcal{B}') = g(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$$

Or  $g(\mathcal{B}) = \det_{\mathcal{B}'}(u(\mathcal{B}))$  (par définition de  $g$ ) et  $\det_{\mathcal{B}'}(u(\mathcal{B})) = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$  (par formule de changement de bases) donc :

$$g(\mathcal{B}') = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$$

Comme  $\det_{\mathcal{B}}'(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}')$  (par formule de changement de bases) et  $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}') = 1$  (par définition de  $\det_{\mathcal{B}'}$ ), on en déduit que :

$$g(\mathcal{B}') = \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$$

autrement dit

$$\det_{\mathcal{B}'}(u(\mathcal{B}')) = \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$$

■

### Propriétés III.1.2

- (1)  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u \in \mathcal{L}(E), \det(\lambda u) = \lambda^{\dim E} \det(u)$
- (2)  $\forall (u, v) \in (\mathcal{L}(E))^2, \det(v \circ u) = \det(v) \det(u) = \det(u) \det(v)$
- (3)  $\forall q \in \mathbb{N}, \forall u \in \mathcal{L}(E), \det(u^q) = (\det u)^q$

### Définition/Propriétés III.1.3 (Caractérisation des automorphismes avec le déterminant)

Un endomorphisme  $u$  de  $E$  est bijectif si, et seulement si,  $\det(u) \neq 0$  avec dans ce cas,

$$\det(u^{-1}) = (\det(u))^{-1}$$

### Définition/Propriétés III.1.4 (Morphisme de groupes de $\mathcal{GL}(E)$ vers $\mathbb{K}^*$ )

L'application  $u \in \mathcal{GL}(E) \mapsto \det(u)$  est un morphisme de groupes de  $(\mathcal{GL}(E), \circ)$  vers  $(\mathbb{K}^*, \times)$ .

## III.2 Déterminant d'une matrice carrée

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

---

### Définition III.2.1

On appelle déterminant d'une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , et on note  $\det(A)$ , le déterminant de l'endomorphisme de  $\mathbb{K}^n$  canoniquement associé à  $A$ .

#### Exemples simples

En particulier,  $\det(0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}) = 0$  et  $\det(I_n) = 1$ .

---

### Définition/Propriétés III.2.2 (Caractère $n$ -linéaire alterné du déterminant par rapport aux co

Si  $C_1, \dots, C_n$  sont les colonnes de  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $B_{can}$  est la base canonique de  $\mathbb{K}^n$  alors

$$\det(A) = \det_{B_{can}}(C_1, \dots, C_n)$$

donc le déterminant d'une matrice carrée est  $n$ -linéaire alterné par rapport aux colonnes.

---

### Propriétés III.2.3

Soit  $A$  et  $\mathcal{B}$  deux matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\lambda \in \mathbb{K}$  et  $q \in \mathbb{N}$ .

- (1)  $\det(A) = -\det(A')$  où  $A'$  est la matrice obtenue en échangeant deux colonnes de  $A$ .
- (2) Si deux colonnes de  $A$  sont égales (resp. si les colonnes de  $A$  sont liées) alors  $\det(A) = 0$ .
- (3)  $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$
- (4)  $\det(AB) = \det(A) \det(\mathcal{B}) = \det(\mathcal{B}) \det(A)$ .
- (5)  $\det(A^q) = (\det(A))^q$ .

---

### Définition/Propriétés III.2.4 (Caractérisation des matrices inversibles avec le déterminant)

Une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est inversible si, et seulement si,  $\det(A) \neq 0$  avec, dans ce cas,

$$\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$$

---

### Définition/Propriétés III.2.5 (Morphisme de groupes de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ vers $\mathbb{K}^*$ )

L'application  $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}) \mapsto \det(A)$  est un morphisme de groupes de  $(\mathcal{GL}_n(\mathbb{K}), \times)$  vers  $(\mathbb{K}^*, \times)$ .

---

**Définition/Propriétés III.2.6 (Déterminant de matrices semblables)**

Si  $A$  et  $B$  sont des matrices semblables alors  $\det(A) = \det(B)$ .

---

*Démonstration*

Montrons que la réciproque est fausse

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

on a bien  $\det(A) = \det(B)$

Or  $A$  n'est pas semblable à  $B$  car sinon on aurait  $B = P^{-1}AP = P^{-1}P = I_n$  ce qui est faux ■

---

**Définition/Propriétés III.2.7 (Expression du déterminant à l'aide des coefficients de la matrice)**

Si  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  alors

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \left( \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j)j} \right)$$

---

**Définition/Propriétés III.2.8 (Déterminant et transposition)**

Les déterminants d'une matrice carrée et de sa transposée sont égaux :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(A^\top) = \det(A)$$

*Remarque*

Les propriétés vues sur le déterminant d'une matrice carrée relatives à ses colonnes s'étendent aux lignes.

---

*Démonstration*

Montrons que  $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(A^\top) = \det(A)$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \left( \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i} \right) \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \left( \prod_{j=1}^n a_{j\sigma^{-1}(j)} \right) && \text{Changement d'indices } i = \sigma^{-1}(j) \text{ possible car } \sigma \text{ est une bijection} \\ &= \sum_{\sigma' \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma') \left( \prod_{j=1}^n a_{j\sigma'(j)} \right) && \sigma' = \sigma^{-1} \text{ possible car } \varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1}) \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \left( \prod_{j=1}^n a'_{\sigma'(j)j} \right) && a'_{1,t} = a_{t,1} \\ &= \det(A^\top) \end{aligned}$$

### III.3 Calcul de déterminants en pratique

On note  $C_1, \dots, C_n$  les colonnes (resp.  $L_1, \dots, L_n$  les lignes) de  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

---

**Définition/Propriétés III.3.1 (Effet des opérations élémentaires sur un déterminant)**

- (1) L'opération élémentaire  $C_r \leftarrow \lambda C_r$  multiplie le déterminant par  $\lambda$ .
- (2) L'opération élémentaire  $C_r \leftrightarrow C_s$  avec  $r \neq s$  multiplie le déterminant par  $-1$ .
- (3) L'opération élémentaire  $C_r \leftarrow C_r + \lambda C_s$  avec  $r \neq s$  ne modifie pas le déterminant.

**Remarque**

On obtient le même résultat avec les opérations élémentaires sur les lignes.

---

**Définition/Propriétés III.3.2 (Développement suivant une colonne (ou une ligne))**

Pour  $(i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$ , on appelle cofacteur du coefficient  $a_{ij}$  de  $A$  le scalaire noté  $A_{ij}$  défini par :

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

où  $M_{ij}$  est le déterminant de la matrice extraite de  $A$  obtenue en supprimant  $L_i$  et  $C_j$ .

- (1) Formule de calcul du déterminant par développement suivant la  $j^e$  colonne.

$$\det(A) = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij}$$

- (2) Formule de calcul du déterminant par développement suivant la  $i^e$  ligne.

$$\det(A) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}$$

**Remarque :**

Sauf cas particulier, avant d'utiliser ces formules de développement, on effectuera des opérations élémentaires pour obtenir un maximum de zéros ou un facteur commun sur une ligne/colonne.

---

**Démonstration**

On note  $C_1, \dots, C_n$  les colonnes (resp.  $L_1, \dots, L_n$  les lignes) de  $A$  et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  la base usuelle de  $\mathbb{K}^n$ .

Soit  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ .

Par définition du déterminant de  $A$ , on a :

$$\det(A) = \det_{\mathcal{B}}(C_1, \dots, C_j, \dots, C_n) = \det_{\mathcal{B}}\left(C_1, \dots, \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i, \dots, C_n\right)$$

Par linéarité du déterminant d'une matrice par rapport à chacune de ses colonnes, on trouve :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \det_{\mathcal{B}}(C_1, \dots, e_i, \dots, C_n) \quad (\star)$$



On note

$$A_{ij} = \det_{\mathcal{B}} (C_1, \dots, C_{j-1}, e_i, C_{j+1}, \dots, C_n)$$

Comme l'échange de deux colonnes multiplie le déterminant par  $-1$ , en intervertissant successivement les colonnes  $j$  et  $j+1$ , puis  $j+1$  et  $j+2$  jusqu'aux colonnes  $n-1$  et  $n$  (ce qui fait  $n-j$  interversions), on trouve :

$$A_{ij} = (-1)^{n-j} \det_{\mathcal{B}} (C_1, \dots, C_{j-1}, C_{j+1}, C_{j+2}, \dots, C_n, e_j)$$

. On procède de même avec les lignes en intervertissant successivement les lignes  $i$  et  $i+1$ , puis  $i+1$  et  $i+2$  jusqu'aux lignes  $n-1$  et  $n$  (ce qui fait  $n-i$  interversions) et on trouve :

$$A_{ij} = (-1)^{n-j} (-1)^{n-i} \det \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} & 0 \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} & 0 \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} & 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi,  $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det B_{ij}$  (★★) où  $B_{ij}$  est la matrice définie par blocs

$$B_{ij} = \begin{pmatrix} C_{ij} & 0_{n-1,1} \\ D_{ij} & 1 \end{pmatrix}$$

avec

- $C_{ij}$  matrice extraite de  $A$  en otant  $L_i$  et  $C_j$
- $D_{ij}$  ligne extraite de  $L_i$  en otant sa colonne  $j$ .

Montrons que  $\det B_{ij} = \det C_{ij}$

(cas particulier d'un résultat général qui sera montré en MPI : le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est égal au produit des déterminants de ses blocs diagonaux)

Pour simplifier, on note  $B$  (resp.  $C$ ) et pas  $B_{ij}$  (resp.  $C_{ij}$ ) avec  $\mathcal{B} = (b_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2}$  et  $C = (c_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1;n-1 \rrbracket^2}$ .

On sait que

$$\det B = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) b_{\sigma(1),1} b_{\sigma(2),2} \dots b_{\sigma(n),n}$$

avec, par définition de  $B$ ,  $b_{\sigma(n),n} = \begin{cases} 0 & \text{si } \sigma(n) \neq n \\ 1 & \text{si } \sigma(n) = n \end{cases}$

Ainsi :

$$\det B = \sum_{\sigma \in T_n} \varepsilon(\sigma) b_{\sigma(1),1} b_{\sigma(2),2} \dots b_{\sigma(n-1),n-1}$$

avec  $T_n = \{\sigma \in \mathcal{S}_n \mid \sigma(n) = n\}$  (i.e. l'ensemble des permutations de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  qui laissent  $n$  invariant).

$\psi : T_n \longrightarrow \mathcal{S}_{n-1}$  définie par  $\forall \sigma \in T_n, \psi(\sigma) = \sigma'$  avec  $\sigma \in \mathcal{S}_{n-1}$  tel que  $\forall i \in \llbracket 1 ; n-1 \rrbracket, \sigma'(i) = \sigma(i)$

- est bijective (de bijection réciproque  $\psi : \mathcal{S}_{n-1} \longrightarrow T_n$  définie par  $\forall \sigma' \in \mathcal{S}_{n-1}, \psi(\sigma') = \sigma$  avec  $\sigma \in \mathcal{S}_n$  tel que  $\forall i \in \llbracket 1 ; n-1 \rrbracket, \sigma(i) = \sigma'(i)$  et  $\sigma(n) = n$ )
- conserve la signature des permutations i.e.  $\forall \sigma \in T_n, \varepsilon(\psi(\sigma)) = \varepsilon(\sigma)$  car, comme  $\sigma$  et  $\sigma' = \psi(\sigma)$  coïncident sur  $\llbracket 1 ; n-1 \rrbracket$  et que  $n$  est invariant par  $\sigma$ , les permutations  $\sigma$  et  $\psi(\sigma)$  peuvent se décomposer en le même produit de transpositions donc ont même signature.

On en déduit, avec le changement d'indice bijectif  $\sigma' = \psi(\sigma)$ , que

$$\det B = \sum_{\sigma' \in \mathcal{S}_{n-1}} \varepsilon(\sigma') b_{\sigma'(1),1} b_{\sigma'(2),2} \dots b_{\sigma'(n-1),n-1}$$

Vu le lien entre les coefficients de  $C$  et ceux de  $\mathcal{B}$ , on en déduit que  $\det \mathcal{B} = \sum_{\sigma' \in \mathcal{S}_{n-1}} \varepsilon(\sigma') c_{\sigma'(1),1} c_{\sigma'(2),2} \dots c_{\sigma'(n-1),n-1}$ ,

ce qui donne, par formule théorique du déterminant de  $C$  :

$$\det B = \det C$$

conclusion avec les résultats (★) et (★★) trouvés, on en déduit que :

$$\det(A) = a_{1j}A_{1j} + \dots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij}$$

où  $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$  où  $M_{ij} = \det(C_{ij})$  avec  $C_{ij}$ , matrice extraite de  $A$  en otant  $L_i$  et  $C_j$ . ■

### Définition/Propriétés III.3.3 (Déterminant de matrices particulières)

- (1) Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses éléments diagonaux.
- (2) Déterminant de la matrice de Vandermonde pour  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ .

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq s < t \leq n} (x_t - x_s)$$

#### Démonstration

Soit  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$

On note  $V(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$

Montrons que  $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq s < t \leq n} (x_t - x_s)$  par récurrence forte

- Soit  $n = 2, \begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1$
- supposons la propriété vrai pour tout  $n$  inférieur à  $n+1$ , Montrons alors cette propriété au rang  $n+1$

Alors  $V(x_1, \dots, x_{n+1}) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{vmatrix}$

On cherche  $P = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$  tel que  $\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket P(x_i) = 0$

On remarque que  $P = \prod_{k=1}^n (x - x_k)$  convient

Ainsi en faisant  $C_{n+1} \leftarrow C_{n+1} + a_{n-1}C_n + \dots + a_1C_2 + a_0C_1$  sur les colonnes, alors d'après les propriétés de  $P$  sur les  $x_i$

On obtient

$$\begin{aligned} V(x_1, \dots, x_{n+1}) &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & 0 \\ 1 & x_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & P \end{vmatrix} \\ &= \text{développement par rapport à } C_{n+1} \quad P(x_{n+1}) \prod_{1 \leq s < t \leq n} (x_t - x_s) \\ &= \prod_{1 \leq s < t \leq n+1} (x_t - x_s) \end{aligned}$$

### III.4 Comatrice

---

#### Définition III.4.1

Soit  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On appelle comatrice de  $A$ , et on note  $\text{Com}(A)$ , la matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  définie par

$$\text{Com}(A) = (A_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2}$$

où  $A_{ij}$  est le cofacteur de l'élément  $a_{ij}$  de  $A$ .

Remarque

Autrement dit, la comatrice de  $A$  est la matrice des cofacteurs de  $A$ .

---

#### Définition/Propriétés III.4.2 (Relation liant $A$ et sa comatrice)

Pour toute matrice  $A$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on a :

$$A \text{Com}(A)^\top = \text{Com}(A)^\top A = \det(A)I_n.$$

---

#### Définition/Propriétés III.4.3 (Expression de l'inverse d'une matrice)

Si  $A$  est une matrice inversible de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  alors

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Com}(A)^\top$$

Remarque

Cette formule est à bannir pour des calculs pratiques lorsque  $n \geq 3$  en raison de la lourdeur des calculs qu'elle implique.

# Chapitre 32

## Espaces préhilbertiens réels

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Généralités . . . . .</b>	<b>330</b>
I.1	Produit scalaire . . . . .	330
I.2	Quatre exemples usuels à connaître . . . . .	331
I.3	Inégalités remarquables . . . . .	331
I.4	Norme associée à un produit scalaire . . . . .	333
<b>II</b>	<b>Orthogonalité . . . . .</b>	<b>333</b>
II.1	Vecteurs orthogonaux et vecteurs unitaires . . . . .	334
II.2	Orthogonal d'une partie . . . . .	334
II.3	Familles orthogonales et familles orthonormales . . . . .	334
<b>III</b>	<b>Bases orthonormales . . . . .</b>	<b>335</b>
III.1	Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt . . . . .	335
III.2	Existence de bases orthonormales . . . . .	336
III.3	Calculs dans une base orthonormale . . . . .	336
<b>IV</b>	<b>Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie. . . . .</b>	<b>337</b>
IV.1	Supplémentaire orthogonal d'un sous-espace de dimension finie . . . . .	337
IV.2	Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie . . . . .	338
IV.3	Détermination pratique du projeté orthogonal d'un vecteur . . . . .	338
IV.4	Caractérisation du projeté orthogonal d'un vecteur . . . . .	339
IV.5	Cas particulier des hyperplans . . . . .	339

Dans ce chapitre,  $E$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$

## I Généralités

### I.1 Produit scalaire

#### Définition I.1.1

(1) On appelle produit scalaire sur  $E$  toute application  $\varphi$  de  $E \times E$  dans  $\mathbb{R}$  qui vérifie :

- (a)  $\forall (x, y) \in E^2, \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$ . ( $\varphi$  symétrique)
- (b)  $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall (x, y, z) \in E^3, \varphi(x, \lambda y + \mu z) = \lambda \varphi(x, y) + \mu \varphi(x, z)$ . ( $\varphi$  linéaire à droite)

- (c)  $\forall x \in E, \varphi(x, x) \geq 0.$  ( $\varphi$  positive)
- (d)  $\forall x \in E, \varphi(x, x) = 0 \implies x = 0_E.$  ( $\varphi$  définie)

#### Remarques

- Le réel  $\varphi(x, y)$  est souvent noté  $\langle x|y \rangle$ ,  $(x|y)$  ou encore  $x \cdot y$ .
  - L'application  $\varphi$  est une forme bilinéaire symétrique définie positive sur  $E \times E$ .
- (2) Un  $\mathbb{R}$  espace vectoriel muni d'un produit scalaire est dit :
- (a) espace préhilbertien réel ;
  - (b) espace euclidien s'il est de plus de dimension finie.

## I.2 Quatre exemples usuels à connaître

---

### Définition/Propriétés I.2.1

- (1) L'application  $((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) \mapsto x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$  est un produit scalaire sur  $\mathbb{R}^n$ .
- (2) L'application  $(X, Y) \mapsto X^T Y$  est un produit scalaire sur  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mathbb{R}$ .
- (3) L'application  $(A, B) \mapsto \text{tr}(A^T B)$  est un produit scalaire sur  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \mathbb{R}$ .
- (4) Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  avec  $a < b$ .

L'application  $(f, g) \mapsto \int_a^b f(t)g(t)dt$  est un produit scalaire sur  $C([a, b], \mathbb{R})$

## I.3 Inégalités remarquables

Soit  $E$  un espace préhilbertien réel de produit scalaire noté  $\langle .|. \rangle$ .

---

### Définition/Propriétés I.3.1 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

$$\forall (x, y) \in E^2, |\langle x|y \rangle| \leq \sqrt{\langle x|x \rangle} \sqrt{\langle y|y \rangle}$$

#### Remarque

Il y a égalité dans l'inégalité précédente si, et seulement si, la famille  $(x, y)$  est liée.

---

*Démonstration*

Soit  $(x, y) \in E^2$ , on note  $P : \lambda \mapsto \langle \lambda x + y | \lambda x + y \rangle$

Ainsi  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\begin{cases} P(\lambda) \geq 0 \text{ par positivité du produit scalaire} \\ P(\lambda) = \lambda \langle x | \lambda x + y \rangle + \langle y | \lambda x + y \rangle = \lambda^2 \langle x | x \rangle + 2\lambda \langle x | y \rangle + \langle y | y \rangle \end{cases}$

- Cas où  $x \neq 0_E$

Alors  $\langle x | x \rangle \neq 0$  donc  $P$  est fonction polynomiale de degré 2 positive donc  $\Delta \leq 0$  avec  $\Delta = 4\langle x | y \rangle^2 - 4\langle x | x \rangle \langle y | y \rangle$

ainsi  $\langle x | y \rangle^2 \leq \langle x | x \rangle \langle y | y \rangle$  donc  $|\langle x | y \rangle| \leq \sqrt{\langle x | x \rangle} \sqrt{\langle y | y \rangle}$

- Si  $x = 0_E$  alors l'inégalité est triviale car  $\begin{cases} \langle x | y \rangle &= 0 \\ \langle x | x \rangle \langle y | y \rangle &= 0 \end{cases}$

Etude du cas d'égalité

Pour  $x = 0_E$  il y a égalité trivialement

Pour  $x \neq 0_E$ , l'égalité implique  $\Delta = 0$  donc  $\exists \lambda_0 \in \mathbb{R}, P(\lambda_0) = 0$  ce qui implique par le caractère défini du produit scalaire que  $\lambda_0 x + y = 0_E$  et donc que  $(x, y)$  est liée

Ainsi si il y a égalité avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz alors  $(x, y)$  est liée

Réciproquement, si  $(x, y)$  est liée alors sans perte de généralité  $\exists \lambda \in \mathbb{R}$  tel que  $x = \lambda y$

$|\langle x | y \rangle| = |\lambda \langle y | y \rangle| = |\lambda| \langle y | y \rangle$   
 $\sqrt{\langle x | x \rangle} \sqrt{\langle y | y \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle y | y \rangle} \sqrt{\langle y | y \rangle} = |\lambda| \langle y | y \rangle$  Ce qui démontre bien que  $|\langle x | y \rangle| = \sqrt{\langle x | x \rangle} \sqrt{\langle y | y \rangle}$  ■

---

**Définition/Propriétés I.3.2 (négalité de Minkowski)**

$$\forall (x, y) \in E^2, \sqrt{\langle x + y | x + y \rangle} \leq \sqrt{\langle x | x \rangle} + \sqrt{\langle y | y \rangle}$$

Remarque

Il y a égalité dans l'inégalité précédente si, et seulement si,  $x = 0_E$  ou  $(x \neq 0_E \text{ et } \exists \alpha \in \mathbb{R}_+, y = \alpha x)$ .

---

*Démonstration*

Soit  $(x, y) \in E^2$

$$\langle x + y | x + y \rangle = \langle x | x \rangle + 2\langle x | y \rangle + \langle y | y \rangle$$

et

$$\langle x | y \rangle \leq |\langle x | y \rangle| \leq \sqrt{\langle x | x \rangle} \sqrt{\langle y | y \rangle} \quad \text{par Cauchy-Schwarz}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \langle x + y | x + y \rangle &\leq \langle x | x \rangle + 2\sqrt{\langle x | x \rangle} \sqrt{\langle y | y \rangle} + \langle y | y \rangle \\ \left( \sqrt{\langle x + y | x + y \rangle} \right)^2 &\leq \left( \sqrt{\langle x | x \rangle} + \sqrt{\langle y | y \rangle} \right)^2 \\ \sqrt{\langle x + y | x + y \rangle} &\leq \sqrt{\langle x | x \rangle} + \sqrt{\langle y | y \rangle} \end{aligned}$$

par ailleurs le cas d'égalité est vérifié que si  $\langle x|y \rangle = |\langle x|y \rangle| = \sqrt{\langle x|x \rangle} \sqrt{\langle y|y \rangle}$  ainsi il y a égalité si, et

$$\text{seulement si, } \begin{cases} \langle x|y \rangle \geq 0 \\ (x, y) \text{ liée} \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0_E \\ \text{ou} \\ x \neq 0_E \text{ et } \exists \alpha \in \mathbb{R}, y = \alpha x \end{cases} \quad \blacksquare$$

## I.4 Norme associée à un produit scalaire

Soit  $E$  un espace préhilbertien réel de produit scalaire noté  $\langle .|. \rangle$ .

### Définition/Propriétés I.4.1

- L'application de  $E$  dans  $\mathbb{R}_+$ , notée  $\|.\|$ , définie par

$$\forall x \in E, \|x\| = \sqrt{\langle x|x \rangle}$$

vérifie :

- (1)  $\forall x \in E, \|x\| = 0 \implies x = 0_E$  ; (séparation)
- (2)  $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$  ; (homogénéité)
- (3)  $\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  . (inégalité triangulaire)

On dit que c'est une norme sur  $E$  (la notion de norme sera reprise dans un cadre plus général en MPI) et plus particulièrement que c'est la norme associée au produit scalaire  $\langle .|. \rangle$ .

Remarque

Il y a égalité dans l'inégalité triangulaire si, et seulement si,  $x = 0_E$  ou  $(x \neq 0_E \text{ et } \exists \alpha \in \mathbb{R}_+, y = \alpha x)$ .

- L'application  $d : E \times E$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = \|x - y\|$  est dite distance associée à la norme  $\|.\|$ .

### Définition/Propriétés I.4.2 (Deux identités remarquables)

Si  $\|.\|$  est la norme associée au produit scalaire  $\langle .|. \rangle$  sur l'espace préhilbertien réel  $E$  alors :

- (1)  $\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x|y \rangle$  ;
- (2)  $\forall (x, y) \in E^2, \langle x|y \rangle = \frac{1}{2} \left( \|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2 \right)$  . (formule de polarisation)

## II Orthogonalité

Soit  $E$  un espace préhilbertien réel de produit scalaire  $\langle .|. \rangle$  et de norme associée  $\|.\|$ .

## II.1 Vecteurs orthogonaux et vecteurs unitaires

---

### Définition/Propriétés II.1.1

- (1) Deux vecteurs  $x$  et  $y$  de  $E$  sont dits orthogonaux si  $\langle x|y \rangle = 0$ .
- (2) Un vecteur  $x$  de  $E$  est dit unitaire (ou normé) si  $\|x\| = 1$ .

## II.2 Orthogonal d'une partie

---

### Définition II.2.1

L'ensemble des vecteurs de  $E$  qui sont orthogonaux à tous les vecteurs d'une partie  $F$  de  $E$  est appelé orthogonal de  $F$  et noté  $F^\perp$  :

$$F^\perp = \{y \in E \mid \forall x_F \in F, \langle x_F|y \rangle = 0\}$$

---

### Définition/Propriétés II.2.2 (Structure de l'orthogona)

Si  $F$  est une partie de  $E$  alors  $F^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

## II.3 Familles orthogonales et familles orthonormales

---

### Définition II.3.1

Une famille de vecteurs de  $E$  est dite :

- (1) orthogonale si ses vecteurs sont orthogonaux deux à deux.
- (2) orthonormale (orthonormée) si elle est orthogonale et que ses vecteurs sont unitaires (normés).

---

### Définition/Propriétés II.3.2 (Liberté des familles orthogonales)

Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls de  $E$  est une famille libre de  $E$ .

#### Remarque

En particulier, toute famille orthonormale de vecteurs de  $E$  est libre



---

### Théorème II.3.3 (Théorème de Pythagore)

Soit  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $p \geq 2$ .

Si la famille  $(x_1, \dots, x_p)$  est une famille orthogonale de  $E$  alors

$$\left\| \sum_{k=1}^p x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^p \|x_k\|^2$$

#### Remarque

La réciproque est vraie pour  $p = 2$  et fausse pour  $p \geq 3$ .

---

#### Démonstration

Démontrons cette égalité par récurrence en supposons les hypothèses vérifiées

- $p = 2$

$$\|x_1 + x_2\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \underbrace{\langle x_1 | x_2 \rangle}_{=0}$$

car  $x_1$  et  $x_2$  sont orthogonaux

■

- Supposons la propriété vérifiée au rang  $n$  montrons là au rang  $n + 1$

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^{n+1} x_k \right\|^2 &= \left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 + \|x_{n+1}\|^2 + 2 \underbrace{\left\langle \sum_{k=1}^n x_k \middle| x_{n+1} \right\rangle}_{=0} \\ &= \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2 + \|x_{n+1}\|^2 \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \|x_k\|^2 \end{aligned}$$

car  $\sum_{k=1}^n x_k$  et  $x_{n+1}$  sont orthogonaux

## III Bases orthonormales

Soit  $E$  un espace euclidien de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  de produit scalaire  $\langle . | . \rangle$  et de norme associée  $\| . \|$ .

### III.1 Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

---

**Définition/Propriétés III.1.1**

Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base quelconque de  $E$ .

- Etape 1 : on pose  $u_1 = e_1$ .
- Etape 2 : on pose  $u_2 = e_2 + \alpha_1 u_1$  et on cherche  $\alpha_1 \in \mathbb{R}$  tel que  $\langle u_1 | u_2 \rangle = 0$ .

Par linéarité à droite, on trouve :  $\alpha_1 = -\frac{\langle u_1 | e_2 \rangle}{\langle u_1 | u_1 \rangle}$  puisque  $u_1 \neq 0_E$ . Avec cette valeur de  $\alpha_1$ , on obtient un vecteur  $u_2$  orthogonal à  $u_1$  tel que  $u_2 \neq 0_E$ .

- Etape 3 : on pose  $u_3 = e_3 + \beta_1 u_1 + \beta_2 u_2$  et on cherche  $(\beta_1, \beta_2) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $\langle u_1 | u_3 \rangle = 0$  et  $\langle u_2 | u_3 \rangle = 0$ .

Par linéarité à droite, on trouve :  $\beta_1 = -\frac{\langle u_1 | e_3 \rangle}{\langle u_1 | u_1 \rangle}$  et  $\beta_2 = -\frac{\langle u_2 | e_3 \rangle}{\langle u_2 | u_2 \rangle}$  puisque  $u_1 \neq 0_E$  et  $u_2 \neq 0_E$ . Avec ces valeurs de  $\beta_1$  et  $\beta_2$ , on obtient un vecteur  $u_3$  orthogonal à  $u_1$  et  $u_2$  avec  $u_3 \neq 0_E$ .

Après  $n$  étapes, on obtient  $(u_1, u_2, \dots, u_n)$  famille orthogonale de vecteurs non nuls de  $E$  donc famille libre de  $E$ . Cette famille de  $E$  étant orthogonale, libre et de cardinal égal à la dimension de  $E$ , on en déduit que  $(u_1, u_2, \dots, u_n)$  est une base orthogonale de  $E$ .

La famille  $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$  définie par  $\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, e'_i = \frac{1}{\|u_i\|} u_i$  est alors une base orthonormée de  $E$ .

## III.2 Existence de bases orthonormales

---

**Définition/Propriétés III.2.1**

- (1) Tout espace euclidien de dimension non nulle admet au moins une base orthonormale.
- (2) Toute famille orthonormale d'un espace euclidien peut être complétée en une base orthonormale.

## III.3 Calculs dans une base orthonormale

---

**Définition/Propriétés III.3.1 (Coordonnées d'un vecteur)**

Si  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  est une base orthonormée de  $E$  alors les coordonnées  $(x_1, \dots, x_n)$  d'un vecteur  $x$  de  $E$  dans la base  $\mathcal{B}$  vérifient

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, x_i = \langle e_i | x \rangle \text{ i.e. } X = \underset{\mathcal{B}}{\text{Mat}}(x) = \begin{pmatrix} \langle e_1 | x \rangle \\ \dots \\ \langle e_n | x \rangle \end{pmatrix}$$

---

**Définition/Propriétés III.3.2 (Expression de la norme et du produit scalaire)**

Soit  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$  et  $(x, y) \in E^2$  tel que  $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$  et  $Y = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(y)$ . Alors :

$$\langle x|y \rangle = X^T Y \quad \text{et} \quad \|x\| = \sqrt{X^T X}$$

## IV Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie

Soit  $E$  un espace préhilbertien réel de produit scalaire  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  et de norme associée  $\|\cdot\|$ .

### IV.1 Supplémentaire orthogonal d'un sous-espace de dimension finie

---

**Définition/Propriétés IV.1.1**

Si  $F$  est un sous-espace vectoriel de dimension finie de  $E$  alors  $E = F \oplus F^\perp$ .

Remarques

- (1) Cette propriété n'est pas conservée lorsque  $F$  est un sous-espace vectoriel de dimension non finie.
- (2) Dans le cas particulier où  $E$  est euclidien, pour tout sous-espace vectoriel  $F$  de  $E$ , on a :

$$E = F \oplus F^\perp \text{ et } \dim E = \dim F + \dim F^\perp$$

.

---

*Démonstration*

Supposons les hypothèses vérifiées

Procédons par analyse-synthèse pour démontrer que  $E = F \oplus F^\perp$

- analyse

Supposons que  $E = F \oplus F^\perp$  alors tout  $x$  de  $E$  s'écrit  $x = x_F + x_{F^\perp}$

Soit  $\mathcal{B}_F = (e_1, \dots, e_p)$  une base orthonormée de  $F$  alors  $x_F = \sum_{k=1}^p \langle x|e_k \rangle e_k$

avec  $\forall k \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \langle x|e_k \rangle = \langle x_F|e_k \rangle + \underbrace{\langle x_{F^\perp}|e_k \rangle}_{=0}$

$$\text{Ainsi } \begin{cases} x_F \\ x_{F^\perp} = x - x_F \end{cases} = \sum_{k=1}^p \langle x|e_k \rangle e_k$$

- synthèse

Pour  $x \in E$  :

- $x_F \in F$
- $x_{F^\perp} \in F^\perp$
- Car

$$\begin{aligned}
 \forall k \in \llbracket 1 ; P \rrbracket \quad \langle e_k | x_{F^\perp} \rangle &= \langle e_k | x \rangle - \langle e_k | x_F \rangle \\
 &= \langle e_k | x \rangle - \sum_{i=1}^P \langle x | e_i \rangle \langle e_k | e_i \rangle \\
 &= \langle e_k | x \rangle - \langle x | e_k \rangle \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

conclusion Si  $F$  est un sous-espace vectoriel de dimension finie de  $E$  préhilbertien alors  $E = F \oplus F^\perp$  ■

## IV.2 Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie

### Définition/Propriétés IV.2.1

Si  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension finie alors :

- (1) on peut définir la projection sur  $F$  parallèlement à  $F^\perp$  ;
- (2) cette projection est appelée projection orthogonale sur  $F$  et souvent notée  $p_F$  ;
- (3) pour tout  $x$  de  $E$ ,  $p_F(x)$  est appelé projeté orthogonal de  $x$  sur  $F$  .

## IV.3 Détermination pratique du projeté orthogonal d'un vecteur

### Définition/Propriétés IV.3.1

Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension finie et  $p_F(x)$  le projeté orthogonal sur  $F$  de  $x \in E$ .

- (1) Utilisation d'une base orthonormée de  $F$

Si  $(e_1, \dots, e_q)$  est une base orthonormée de  $F$  alors,

$$p_F(x) = \langle e_1 | x \rangle e_1 + \dots + \langle e_q | x \rangle e_q$$

.

- (2) Utilisation d'une famille génératrice de  $F$

En écrivant que  $p_F(x)$  est un vecteur de  $F$  tel  $x - p_F(x)$  est orthogonal à tous les vecteurs d'une famille génératrice de  $F$  , on obtient un système linéaire qui permet de déterminer  $p_F(x)$ .

## IV.4 Caractérisation du projeté orthogonal d'un vecteur

---

### Définition/Propriétés IV.4.1

Si  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension finie alors, pour tout  $x$  de  $E$ ,  $p_F(x)$  est l'unique vecteur  $y_0$  de  $F$  tel que

$$\|x - y_0\| = \min_{y \in F} \|x - y\|.$$

Ce minimum est appelé distance de  $x$  à  $F$ , noté  $d(x, F)$ , et vérifie donc :

$$d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$$

#### Remarque

On dit que le projeté orthogonal de  $x$  sur le sous-espace de dimension finie  $F$  est l'unique élément de  $F$  qui réalise la distance de  $x$  à  $F$ .

## IV.5 Cas particulier des hyperplans

On suppose ici que  $E$  est un espace euclidien de dimension non nulle.

---

### Définition/Propriétés IV.5.1 (Vecteur normal à un hyperplan)

Si  $H$  est un hyperplan de  $E$  alors tout vecteur directeur de la droite  $H^\perp$  est appelé vecteur normal à  $H$ .

#### Remarque

Si  $H$  est un hyperplan de  $E$  dont l'équation dans une base orthonormée  $\mathcal{B}$  de  $E$  est

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$$

alors le vecteur  $a$  de  $E$  de coordonnées  $(a_1, \dots, a_n)$  dans la base orthonormée  $\mathcal{B}$  est vecteur normal à  $H$ .

---

### Définition/Propriétés IV.5.2 (Distance d'un vecteur à un hyperplan $H$ )

Si  $x$  est un vecteur de  $E$  et  $H$  un hyperplan de  $E$  de vecteur normal unitaire  $a$  alors

$$d(x, H) = \|x - p_H(x)\| = \|p_{H^\perp}(x)\| = |\langle a|x \rangle|$$

# Chapitre 33

## Dénombrement - Probabilité sur un univers fini

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Dénombrement</b>	<b>340</b>
I.1	Cardinal d'un ensemble fini	340
I.2	Listes et combinaisons	341
<b>II</b>	<b>Probabilités sur un univers fini</b>	<b>342</b>
II.1	Expérience aléatoire et univers	342
II.2	Espaces probabilisés finis	343
II.3	Probabilités conditionnelles	344
II.4	Événements indépendants	345

### I Dénombrement

Conformément au programme officiel de MP2I, on exclut ici toute formalisation excessive. Les propriétés intuitives sont donc admises et le recours systématique à des bijections pour dénombrer n'est pas attendu.

#### I.1 Cardinal d'un ensemble fini

##### Définition I.1.1

Soit  $A$  un ensemble.

$A$  est dit fini s'il est vide ou s'il existe un entier naturel non nul  $n$  et une bijection de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  vers  $A$ .

Dans ce cas,

- si  $A$  est vide, on dit que  $A$  est de cardinal égal à 0.
- si  $A$  est non vide alors l'entier  $n$  ci-dessus est unique et appelé cardinal de  $A$ .

Notations utilisées pour le cardinal :  $\text{Card}(A)$  ou  $|A|$ .

---

### Propriétés I.1.2

- Cardinal d'une partie  
Si  $B$  est une partie d'un ensemble fini  $A$  alors  $B$  est un ensemble fini avec  $\text{Card}(B) \leq \text{Card}(A)$  [et égalité des cardinaux si, et seulement si,  $B = A$ ].
- Opérations sur les cardinaux
  - (1) Si  $A$  et  $B$  sont deux ensembles finis alors :
    - (a)  $A \cup B$  est un ensemble fini et  $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$ .
    - (b)  $A \times B$  est un ensemble fini et  $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$ .
  - (2) Soit  $A$  et  $B$  des parties d'un ensemble fini  $E$ .
    - (a)  $A \setminus B$  est un ensemble fini et  $\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$
    - (b)  $A$  est un ensemble fini et  $\text{Card}(A) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$ .
- Caractérisation des bijections entre ensembles finis de même cardinal  
Une application entre deux ensembles finis de même cardinal est bijective si, et seulement si, elle est injective, si, et seulement si, elle est surjective.
- Cardinal de l'ensemble des applications entre deux ensembles finis  
Si  $A$  et  $B$  sont des ensembles finis alors l'ensemble  $B^A$  des applications de  $A$  vers  $B$  est fini avec

$$\text{Card}(B^A) = \text{Card}(B)^{\text{Card}(A)}$$

.

- Cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble fini  
Si  $A$  est un ensemble fini alors l'ensemble  $\mathcal{P}(A)$  des parties de  $A$  est fini avec

$$\text{Card}(\mathcal{P}(A)) = 2^{\text{Card}A}.$$

## I.2 Listes et combinaisons

---

### Définition I.2.1

Soit  $A$  un ensemble fini et  $p$  un entier naturel.

- (1) On appelle  $p$ -liste (ou  $p$ -uplet) d'éléments de  $A$  tout élément  $(a_1, a_2, \dots, a_p)$  de  $A_p$ .
- (2) On appelle  $p$ -arrangement d'éléments de  $A$  toute  $p$ -liste d'éléments distincts de  $A$ .
- (3) On appelle  $p$ -combinaison d'éléments de  $A$  toute partie de  $A$  à  $p$  éléments.

---

### Propriétés I.2.2

Soit  $A$  un ensemble fini de cardinal  $n$  et  $p$  un entier naturel non nul inférieur ou égal à  $n$ .

- (1) Le nombre de  $p$ -listes d'éléments de  $A$  est égal à  $n^p$ .
- (2) Le nombre de  $p$ -listes d'éléments distincts de  $A$  est égal à  $\prod_{k=0}^{p-1} (n - k) = \frac{n!}{(n - p)!}$ .
- (3) Le nombre de  $p$ -combinaisons d'éléments de  $A$  est égal à  $\frac{n!}{p!(n - p)!} = \binom{n}{p}$ .

### Remarques

Le nombre d'applications

- injectives d'un ensemble fini de cardinal  $p$  dans un ensemble fini de cardinal  $n$  est égal à  $\frac{n!}{(n-p)!}$
- bijectives d'un ensemble fini de cardinal  $n$  dans lui-même est égal à  $n!$ .

---

### Définition/Propriétés I.2.3 (Retour sur les formules de Pascal et du binôme )

$$(1) \quad \forall (n, p) \in \mathbb{N}^2, p \leq n \implies \binom{p}{n} + \binom{p+1}{n} = \binom{p+1}{n+1} \quad (\text{formule du triangle de Pascal})$$

$$(2) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, (a+b)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} a^p b^{n-p} \quad (\text{formule du binôme de Newton})$$

## II Probabilités sur un univers fini

### II.1 Expérience aléatoire et univers

---

#### Définition/Propriétés II.1.1 (Expérience aléatoire)

Une expérience qui, reproduite dans des conditions identiques, peut conduire à plusieurs résultats possibles dont on ne peut prévoir le résultat par avance est dite expérience aléatoire.

---

#### Définition/Propriétés II.1.2 (Univers)

L'ensemble des issues (résultats possibles ou réalisations) d'une expérience aléatoire est appelé univers (ou espace des états) et souvent noté  $\Omega$ .

Conformément au programme de MP2I, on se limite en 1<sup>re</sup> année à des univers finis.

---

#### Définition/Propriétés II.1.3 (Evénements)

- (1) Toute partie de l'univers  $\Omega$  est appelée événement.
- (2) Parmi les parties de l'univers  $\Omega$ , on trouve :
  - la partie  $\Omega$ , dite événement certain ;
  - la partie  $\emptyset$ , dite événement impossible ;



- les singletons de  $\Omega$ , dits événements élémentaires souvent notés  $\{\omega\}$  à pour  $\omega \in \Omega$ .
- (3) Soient  $A$  et  $B$  deux parties de l'univers  $\Omega$  (autrement dit deux événements).
- La partie  $\bar{A} = \Omega \setminus A$  est dite événement contraire de  $A$ .
  - La partie  $A \cup B$  est dite événement "A ou B".
  - La partie  $A \cap B$  est dite événement "A et B".
  - Les parties  $A$  et  $B$  sont dites événements incompatibles (ou disjoints) si  $A \cap B = \emptyset$ .
- (4) Soit  $q \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, A_2, \dots, A_q$  des parties de  $\Omega$ . L'ensemble  $\{A_1, A_2, \dots, A_q\}$  est dit système complet d'événements de  $\Omega$  si c'est une partition de  $\Omega$  autrement dit si :
- $\bigcup_{i=1}^q A_i = \Omega$ ; (la réunion des événements du système est l'événement certain)
  - $\forall i \in \llbracket 1 ; q \rrbracket, A_i \neq \emptyset$ ; (pas d'événement impossible dans le système)
  - $\forall (i, j) \in \llbracket 1 ; q \rrbracket^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$ . (événements du système incompatibles deux à deux)

Remarque

On note parfois  $\Omega = \bigsqcup_{i=1}^q A_i$  pour indiquer que les événements  $A_i$  sont deux à deux disjoints.

## II.2 Espaces probabilisés finis

### Définition II.2.1

Soit  $\Omega$  un univers fini.

On appelle probabilité sur  $\Omega$  toute application  $\mathbb{P}$  de  $\mathcal{P}(\Omega)$  dans  $[0 ; 1]$  telle que :

- (1)  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$  ;
- (2)  $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega) \times \mathcal{P}(\Omega), A \cap B = \emptyset \implies \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ .

Le couple  $(\Omega, \mathbb{P})$  est alors appelé espace probabilisé fini.

### Propriétés II.2.2

Soit  $(\Omega, \mathbb{P})$  un espace probabilisé fini.

- (1)  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ . (événement impossible)
- (2)  $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$ . (événement contraire)
- (3)  $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega) \times \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ . (réunion d'événements)
- (4)  $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega) \times \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$  (différence d'événements)
- (5)  $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega) \times \mathcal{P}(\Omega), A \subset B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$  (croissance des probabilités)

---

**Définition/Propriétés II.2.3 (Distribution de probabilités)**

On appelle distribution de probabilités sur un ensemble fini  $I$  toute famille de réels positifs indexée par  $I$  et de somme égale à 1 .

---

**Définition/Propriétés II.2.4 (Détermination d'une probabilité)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Si  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$  est un univers fini et  $p_1, \dots, p_n$  des réels positifs tels que  $p_1 + \dots + p_n = 1$  alors il existe une probabilité  $\mathbb{P}$  et une seule sur  $\Omega$  telle que  $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$ .

**Remarque**

Autrement dit, une probabilité sur un univers fini est entièrement déterminée :

- par sa valeur sur les singletons de l'univers.
- par la distribution de probabilités  $(\mathbb{P}(\{\omega\}))_{\omega \in \Omega}$  .

---

**Définition/Propriétés II.2.5 (Probabilité uniforme)**

Soit  $(\Omega, \mathbb{P})$  un espace probabilisé fini.

$\mathbb{P}$  est dite probabilité uniforme sur  $\Omega$  s'il existe  $p \in [0 ; 1]$  tel que  $\forall \omega \in \Omega, \mathbb{P}(\{\omega\}) = p$ .

Dans ce cas,

$$p = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)} \text{ et } \forall \omega \in \Omega, \mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)} \text{ et } \forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

## II.3 Probabilités conditionnelles

Soit  $(\Omega, \mathbb{P})$  un espace probabilisé fini.

---

**Définition II.3.1**

Soient  $(A, B) \in \mathcal{P}(\Omega) \times \mathcal{P}(\Omega)$  tel que  $\mathbb{P}(B) > 0$ .

On appelle probabilité conditionnelle de  $A$  sachant  $B$  le réel, noté  $\mathbb{P}(A|B)$  ou  $\mathbb{P}_B(A)$ , défini par

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

**Remarque**

Pour tout  $B \in \mathcal{P}(\Omega)$  tel que  $\mathbb{P}(B) > 0$ , l'application  $\mathbb{P}_B : A \mapsto \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$  est une probabilité sur  $\Omega$  et vérifie donc toutes les propriétés précédemment énoncées sur les probabilités.

Ainsi, on a notamment :

- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}_B(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}_B(A).$
- $\forall (A, C) \in \mathcal{P}(\Omega) \times \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}_B(A \cup C) = \mathbb{P}_B(A) + \mathbb{P}_B(C) - \mathbb{P}_B(A \cap C).$

---

### Définition/Propriétés II.3.2 (Formule des probabilités composées)

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 2$ . Si  $A_1, \dots, A_n$  sont des événements tels que  $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$  est non nulle alors

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}_{A_1}(A_2) \mathbb{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots \mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

---

### Définition/Propriétés II.3.3 (Formule des probabilités totales)

Si  $\{A_1, \dots, A_n\}$  est un système complet d'événements et  $B$  un événement quelconque alors

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}_{A_i}(B) \mathbb{P}(A_i)$$

avec la convention usuelle suivante conservée dans la suite du chapitre :  $\mathbb{P}_{A_i}(B) \mathbb{P}(A_i) = 0$  si  $\mathbb{P}(A_i) = 0$ .

---

### Définition/Propriétés II.3.4 (Formules de Bayes)

Soit  $B$  un événement de probabilité non nulle.

- (1) Si  $A$  est un événement alors

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}_A(B) \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

.

- (2) Si  $\{A_1, \dots, A_n\}$  est un système complet d'événements alors

$$\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \frac{\mathbb{P}_B(A_j) = \mathbb{P}_{A_j}(B) \mathbb{P}(A_j)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}_{A_i}(B) \mathbb{P}(A_i)}$$

(conséquence immédiate de la formule de Bayes précédente et de la formule des probabilités totales)

## II.4 Événements indépendants

Soit  $(\Omega, \mathbb{P})$  un espace probabilisé fini.

---

**Définition/Propriétés II.4.1 (Couple d'événements indépendants)**

Deux événements  $A$  et  $B$  sont dits indépendants si  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ .

**Remarques**

- Si  $B$  est de probabilité non nulle, l'indépendance de  $A$  et  $B$  se traduit par  $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$ .
- La notion d'indépendance est une notion probabiliste (et pas ensembliste) à ne pas confondre avec la notion ensembliste d'événements disjoints/incompatibles

---

**Définition/Propriétés II.4.2 (Famille finie d'événements indépendants)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 2$ .

Les événements  $A_1, \dots, A_n$  sont dits indépendants si, pour tout  $I \subset \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} (\mathbb{P}(A_i))$$

**Remarques**

- On parle parfois de mutuelle indépendance au lieu d'indépendance.
- Pour  $n$  entier naturel supérieur ou égal à 2,
- si les événements  $A_1, \dots, A_n$  sont indépendants alors ils sont deux à deux indépendants.
- la réciproque de l'implication précédente est fausse pour  $n \geq 3$ . Des événements peuvent être indépendants deux à deux sans être indépendants.

---

**Définition/Propriétés II.4.3 (Indépendance et événements contraires)**

- Si  $A$  et  $B$  sont deux événements indépendants alors  $A$  et  $\overline{B}$  sont indépendants.
- Plus généralement, pour  $n$  entier naturel supérieur ou égal à 2,

si les événements  $A_1, \dots, A_n$  sont indépendants alors les événements  $A'_1, \dots, A'_n$  tels que

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, A'_i \in \{A_i, \overline{A_i}\}$$

le sont aussi.

# Chapitre 34

## Variables aléatoires sur un univers fini

### Sommaire

---

<b>I</b>	<b>Loi d'une variable aléatoire . . . . .</b>	<b>.347</b>
I.1	Définitions, propriétés et notations . . . . .	347
I.2	Image d'une variable aléatoire par une fonction . . . . .	348
I.3	Lois usuelles . . . . .	349
I.4	Loi conditionnelle d'une variable aléatoire . . . . .	350
I.5	Couple de variables aléatoires . . . . .	350
I.6	Extension . . . . .	351
<b>II</b>	<b>Variables aléatoires indépendantes . . . . .</b>	<b>.351</b>
II.1	Cas de deux variables aléatoires . . . . .	351
II.2	Cas des $n$ -uplets de variables aléatoires avec $n \geq 2$ . . . . .	352
<b>III</b>	<b>Espérance d'une variable aléatoire réelle ou complexe . . . . .</b>	<b>.353</b>
III.1	Définition . . . . .	353
III.2	Propriétés . . . . .	353
III.3	Espérance de variables aléatoires usuelles . . . . .	353
III.4	Formule de transfert . . . . .	354
III.5	Produit de variables aléatoires indépendantes . . . . .	354
<b>IV</b>	<b>Variance, écart type, covariance . . . . .</b>	<b>.355</b>
IV.1	Variance et écart-type d'une variable aléatoire réelle . . . . .	355
IV.2	Covariance de deux variables aléatoires réelles . . . . .	355
IV.3	Inégalités probabilistes . . . . .	357

---

Dans ce chapitre,  $(\Omega, \mathbb{P})$  désigne un espace probabilisé FINI.

### I Loi d'une variable aléatoire

#### I.1 Définitions, propriétés et notations

Soit  $E$  un ensemble.

**Définition/Propriétés I.1.1 (Variable aléatoire)**

Toute application  $X$  définie sur l'univers  $\Omega$  à valeurs dans  $E$  est dite variable aléatoire (réelle si  $E = \mathbb{R}$ ).

Pour toute partie  $A$  de  $E$ , l'image réciproque  $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}$  est une partie de  $\Omega$  donc un événement qui est noté  $(X \in A)$  ou  $\{X \in A\}$  :

$$(X \in A) = \{X \in A\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}$$

**Définition/Propriétés I.1.2 (Loi d'une variable aléatoire)**

On appelle loi de la variable aléatoire  $X : \Omega \longrightarrow E$ , l'application  $\mathbb{P}_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) \longrightarrow [0 ; 1]$  définie par :

$$\forall A \in \mathcal{P}(X(\Omega)), \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A).$$

Remarques

- $\mathbb{P}_X$  est une probabilité sur  $X(\Omega)$ .
- la loi de la variable aléatoire  $X : \Omega \longrightarrow E$  (autrement dit  $\mathbb{P}_X$ ) est entièrement déterminée par la connaissance de l'ensemble fini  $X(\Omega)$  et des valeurs  $\mathbb{P}(X = x)$  pour  $x$  variant dans  $X(\Omega)$  avec :

$$\forall x \in X(\Omega), \mathbb{P}_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$$

.

- la loi de la variable aléatoire  $X : \Omega \longrightarrow E$  (autrement dit  $\mathbb{P}_X$ ) est entièrement déterminée par la distribution de probabilités  $(\mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$  sur  $X(\Omega)$  et on a :

$$\forall A \in \mathcal{P}(X(\Omega)), \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in A} \mathbb{P}(X = x)$$

**Notation I.1.3**

Lorsque  $X$  et  $Y$  sont deux variables aléatoires sur  $\Omega$  de même loi (*i.e.*  $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$ ), on note  $X \sim Y$ .

Remarque

si  $X$  et  $Y$  sont deux variables aléatoires sur  $\Omega$  égales alors elles ont évidemment même loi.

La réciproque est fausse.

**I.2 Image d'une variable aléatoire par une fonction****Définition/Propriétés I.2.1**

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles.

Soit  $X : \Omega \longrightarrow E$  une variable aléatoire sur  $\Omega$  et  $f : E \longrightarrow F$  une application.

- (1) L'application  $f \circ X : \Omega \longrightarrow F$  est une variable aléatoire sur  $\Omega$ , notée  $f(X)$ .

(2) La loi de  $f(X)$  est entièrement déterminée par la connaissance de  $f$  et de la loi de  $X$  :

$$\forall y \in f(X(\Omega)), \mathbb{P}_{f(X)}(\{y\}) = \mathbb{P}(f(X) = y) = \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ f(x)=y}} \mathbb{P}(X = x)$$

$$\forall A \in \mathcal{P}(f(X(\Omega))), \mathbb{P}_{f(X)}(A) = \mathbb{P}(f(X) \in A) = \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ f(x) \in A}} \mathbb{P}(X = x)$$

Remarque

Si  $X$  et  $Y$  sont deux variables aléatoires sur  $\Omega$  de même loi alors, sous réserve que cela ait du sens, les variables aléatoires  $f(X)$  et  $f(Y)$  ont même loi.

### I.3 Lois usuelles

---

#### Définition/Propriétés I.3.1 (Loi uniforme)

Soit  $E$  un ensemble fini non vide.

On dit que la variable aléatoire  $X : \Omega \longrightarrow E$  suit la loi uniforme sur  $E$  (ou que  $X$  est une variable uniforme sur  $E$ ) si sa loi  $\mathbb{P}_X$  est la probabilité uniforme sur  $E$ , c'est-à-dire :

$$\forall A \in \mathcal{P}(E), \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(E)}$$

On le note  $X \sim \mathcal{U}(E)$ .

---

#### Définition/Propriétés I.3.2 (Loi de Bernoulli)

Soit  $p$  un réel de  $[0 ; 1]$ .

On dit que la variable aléatoire  $X : \Omega \longrightarrow 0, 1$  suit la loi de Bernoulli de paramètre  $p$  (ou que  $X$  est une variable de Bernoulli de paramètre  $p$ ) si sa loi  $\mathbb{P}_X$  vérifie

$$\mathbb{P}_X(\{1\}) = \mathbb{P}(X = 1) = p \text{ et } \mathbb{P}_X(\{0\}) = \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$$

On le note  $X \sim \mathcal{B}(p)$ .

- Indicatrice d'un événement

Soit  $A$  un événement.

L'indicatrice de  $A$  est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre  $\mathbb{P}(A)$  :  $1_A \sim \mathcal{B}(\mathbb{P}(A))$ .

- Interprétation/Modélisation

Pour une expérience aléatoire du type "Succès-Echec", la variable aléatoire réelle prenant la valeur 1 en cas de succès et la valeur 0 en cas d'échec suit une loi de Bernoulli de paramètre  $p = \mathbb{P}(\text{"Succès"})$ .

---

**Définition/Propriétés I.3.3 (Loi binomiale)**

Soit  $n$  un entier naturel non nul et  $p$  un réel de  $[1 ; 0]$  .

On dit que la variable aléatoire  $X : \Omega \longrightarrow \llbracket 0 ; n \rrbracket$  suit la loi binomiale de paramètres  $n$  et  $p$  (ou que  $X$  est une variable binomiale de paramètres  $n$  et  $p$ ) si sa loi  $\mathbb{P}_X$  vérifie

$$\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \mathbb{P}_X(\{k\}) = \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

On le note  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .

- Interprétations/Modélisations

- (1) Si on répète  $n$  expériences aléatoires indépendantes du type "Succès-Echec" de même probabilité de succès, la variable aléatoire réelle comptabilisant le nombre de succès obtenus après les  $n$  expériences suit la loi binomiale de paramètres  $n$  et  $p$ .
- (2) Si on considère "une urne" contenant uniquement des "boules blanches" en proportion  $p \in [1 ; 0]$  et des "boules noires" en proportion  $1 - p$  et qu'on effectue  $n$  tirages successifs "d'une boule" dans "l'urne" avec remise après chaque tirage, la variable aléatoire réelle comptabilisant le nombre de "boules blanches" tirées après les  $n$  tirages suit la loi binomiale de paramètres  $n$  et  $p$ .

## I.4 Loi conditionnelle d'une variable aléatoire

---

**Définition/Propriétés I.4.1**

Soit  $X$  une variable aléatoire sur  $\Omega$  et  $A$  un événement de probabilité non nulle.

On appelle "loi conditionnelle de  $X$  sachant l'événement  $A$ " l'application de  $\mathcal{P}(X(\Omega))$  dans  $[1 ; 0]$  qui, à tout  $B$  de  $\mathcal{P}(X(\Omega))$ , associe le réel  $\mathbb{P}_A(X \in B)$  .

Remarque

Cette loi est entièrement déterminée par la distribution de probabilités  $(\mathbb{P}_A(X = x))_{x \in X(\Omega)}$  sur  $X(\Omega)$  :

$$\forall B \in \mathcal{P}(X(\Omega)), \mathbb{P}_A(X \in B) = \sum_{x \in B} \mathbb{P}_A(X = x)$$

## I.5 Couple de variables aléatoires

---

**Définition I.5.1**

Si  $X : \Omega \longrightarrow E$  et  $Y : \Omega \longrightarrow F$  sont deux variables aléatoires alors l'application  $Z : \Omega \longrightarrow E \times F$  définie par

$$\forall \omega \in \Omega, Z(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$$

est une variable aléatoire, dite couple des variables aléatoires  $X$  et  $Y$  et notée  $Z = (X, Y)$ .

Ces notations sont conservées dans la suite de ce paragraphe.



---

**Définition/Propriétés I.5.2 (Loi conjointe, lois marginales)**

(1) La loi  $\mathbb{P}_{(X,Y)}$  du couple  $(X,Y)$ , dite loi conjointe de  $X$  et  $Y$ , est définie par :

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \mathbb{P}_{(X,Y)}(\{(x, y)\}) = \mathbb{P}((X, Y) = (x, y)) = \mathbb{P}((X = x) \cap (Y = y))$$

(2) La loi  $\mathbb{P}_X$  est dite première loi marginale du couple  $(X, Y)$  et vérifie :

$$\forall x \in X(\Omega), \mathbb{P}_X(\{x\}) = P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}((X = x) \cap (Y = y))$$

(3) La loi  $\mathbb{P}_Y$  est dite seconde loi marginale du couple  $(X, Y)$  et vérifie :

$$\forall y \in Y(\Omega), \mathbb{P}_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}((X = x) \cap (Y = y))$$

**Remarque**

- La probabilité  $\mathbb{P}((X = x) \cap (Y = y))$  est souvent notée  $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$
- La loi conjointe permet de déterminer les lois marginales ; la réciproque est fausse.
- La connaissance de la loi de  $X$  et de la loi de  $Y$  sachant l'événement  $\{X = x\}$  pour tout  $x \in X(\Omega)$  permet de déterminer la loi conjointe de  $X$  et  $Y$  :

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \mathbb{P}((X, Y) = (x, y)) = \mathbb{P}(Y = y | X = x) \mathbb{P}(X = x)$$

## I.6 Extension

---

**Définition/Propriétés I.6.1**

On définit de même la notion de  $n$ -uplet de variables aléatoires (avec  $n \geq 3$ ) et, dans ce cadre, les notions de loi conjointe et lois marginales.

## II Variables aléatoires indépendantes

Dans cette partie,  $(\Omega, \mathbb{P})$  désigne un espace probabilisé fini.

### II.1 Cas de deux variables aléatoires

---

**Définition II.1.1**

Les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  définies sur  $\Omega$  sont dites indépendantes si, pour tout  $(A, B)$  de  $\mathcal{P}(X(\Omega)) \times \mathcal{P}(Y(\Omega))$ , les événements  $(X \in A)$  et  $(Y \in B)$  sont indépendants.

---

**Définition/Propriétés II.1.2 (Caractérisation)**

Les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  définies sur  $\Omega$  sont indépendantes si, et seulement si,

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \mathbb{P}((X, Y) = (x, y)) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$$

---

**Définition/Propriétés II.1.3 (Images de variables aléatoires indépendantes)**

Si  $X$  et  $Y$  sont deux variables aléatoires définies sur  $\Omega$  indépendantes et si  $f$  et  $g$  sont des applications définies respectivement sur  $X(\Omega)$  et  $Y(\Omega)$  alors les variables aléatoires  $f(X)$  et  $g(Y)$  sont indépendantes.

## II.2 Cas des $n$ -uplets de variables aléatoires avec $n \geq 2$

Dans la suite de cette partie,  $n$  désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2.

---

**Définition II.2.1**

Les variables aléatoires  $X_1, \dots, X_n$  définies sur  $\Omega$  sont dites indépendantes si pour tout  $(A_1, \dots, A_n)$  de  $\prod_{i=1}^n \mathcal{P}(X_i(\Omega))$ , les événements  $(X_1 \in A_1), \dots, (X_n \in A_n)$  sont indépendants.

---

**Définition/Propriétés II.2.2 (Caractérisation)**

Les variables aléatoires  $X_1, \dots, X_n$  définies sur  $\Omega$  sont indépendantes si, et seulement si,

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega), \mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) = (x_1, \dots, x_n)) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = x_i).$$

- Modélisation

Pour modéliser  $n$  expériences aléatoires indépendantes, on peut utiliser un  $n$ -uplet  $(X_1, \dots, X_n)$  de variables aléatoires indépendantes correspondant aux résultats des différentes expériences.

---

**Définition/Propriétés II.2.3 (Somme de variables aléatoires de Bernoulli indépendantes)**

Si  $X_1, \dots, X_n$  sont des variables aléatoires définies sur  $\Omega$ , indépendantes et de loi de Bernoulli  $\mathcal{B}(p)$  alors  $X_1 + \dots + X_n$  suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$ .

---

**Définition/Propriétés II.2.4 (Lemme des coalitions)**

Si  $X_1, \dots, X_n$  sont des variables aléatoires indépendantes sur  $\Omega$  alors  $f(X_1, \dots, X_m)$  et  $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$  sont des variables aléatoires indépendantes pour toutes applications  $f$  et  $g$  pour lesquelles cela a du sens.

### III Espérance d'une variable aléatoire réelle ou complexe

#### III.1 Définition

---

**Définition/Propriétés III.1.1**

Si  $X : \Omega \longrightarrow$

$K$  est une variable aléatoire numérique telle que  $X(\Omega) = \{X_1, \dots, X_q\}$  alors le scalaire

$$E(X) = \sum_{k=1}^q x_k \mathbb{P}(X = x_k) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$$

est dit espérance de la variable aléatoire  $X$ . Si  $E(X) = 0$ ,  $X$  est dite variable aléatoire centrée.

Remarques

- $E(X)$ , moyenne des valeurs de  $X$  pondérées par leurs probabilités, est un indicateur de position.
- Comme  $\Omega = \bigsqcup_{x \in X(\Omega)} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\} = \bigsqcup_{x \in X(\Omega)} \{X = x\}$ , par additivité de  $\mathbb{P}$ , on obtient

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\})$$

formule alternative utilisée pour les preuves sur l'espérance et pas pour des calculs pratiques.

#### III.2 Propriétés

---

**Propriétés III.2.1**

Soient  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$  et  $Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$  des variables aléatoires numériques et  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ .

- $E(\alpha X + \beta Y) = \alpha E(X) + \beta E(Y)$ . (linéarité de l'espérance)
- Dans le cas  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ,  $X \geq 0 \implies E(X) \geq 0$ . (positivité de l'espérance)
- Dans le cas  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ,  $X \leq Y \implies E(X) \leq E(Y)$ . (croissance de l'espérance)
- $|E(X)| \leq E(|X|)$ . (inégalité triangulaire)

#### III.3 Espérance de variables aléatoires usuelles

---

**Définition/Propriétés III.3.1**

- (1) Si  $X$  est une variable aléatoire numérique constante égale à  $m$  alors  $E(X) = m$ .
- (2) Si  $X$  est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre  $p$ , alors  $E(X) = p$ .
- (3) Si  $X$  est une variable aléatoire binomiale de paramètres  $n$  et  $p$ , alors  $E(X) = np$ .

Remarque

En particulier, pour toute partie  $A$  de  $\Omega$ , on a :  $E(1_A) = \mathbb{P}(A)$ .

### III.4 Formule de transfert

---

#### Définition/Propriétés III.4.1

Soit  $E$  un ensemble quelconque.

Si  $X : \Omega \longrightarrow E$  est une variable aléatoire et  $f : X(\Omega) \longrightarrow \mathbb{K}$  une application numérique alors

$$E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(X = x)$$

#### Remarques

- (1) Pour déterminer l'espérance de la variable aléatoire  $f(X)$  :
  - il suffit de connaître la loi de  $X$  ;
  - il n'est pas nécessaire de connaître la loi de  $f(X)$ .
- (2) Si  $(X_1, \dots, X_n)$  est un  $n$ -uplet de variables aléatoires sur  $\Omega$  et si  $f : X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega) \longrightarrow \mathbb{K}$  est une application numérique, la formule de transfert s'écrit :

$$E(f(X_1, \dots, X_n)) = \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega)} f(x_1, \dots, x_n) P((X_1, \dots, X_n) = (x_1, \dots, x_n))$$

### III.5 Produit de variables aléatoires indépendantes

---

#### Définition/Propriétés III.5.1

Si  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$  et  $Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$  sont des variables aléatoires numériques indépendantes alors

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

#### . Remarques

- Plus généralement, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $n \geq 3$ , si  $X_1 : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$  sont des variables aléatoires numériques indépendantes alors

$$E\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) = \prod_{i=1}^n E(X_i)$$

- Les réciproques sont fausses.

## IV Variance, écart type, covariance

### IV.1 Variance et écart-type d'une variable aléatoire réelle

---

#### Définition IV.1.1

Soit  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  une variable aléatoire réelle.

- (1) On appelle variance de  $X$  le réel, noté  $V(X)$ , défini par

$$V(X) = E(X - E(X))^2$$

Dans le cas  $V(X) = 1$ ,  $X$  est dite variable aléatoire réduite.

- (2) On appelle écart-type de  $X$  le réel, noté  $\sigma(X)$ , défini par

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

#### Remarque

Les réels positifs  $V(X)$  et  $\sigma(X)$  sont des indicateurs de dispersion des valeurs de  $X$  autour de  $E(X)$  ;

s'ils sont petits (resp. grands), il y a faible (resp. forte) dispersion.

---

#### Propriétés IV.1.2

Soient  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  une variable aléatoire réelle et  $(\alpha, \beta)$  un couple de réels.

- (1) On a :  $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ .  
(2) On a :  $V(\alpha X + \beta) = \alpha^2 V(X)$ .

#### Remarque

Dans le cas  $\sigma(X) > 0$ , la variable aléatoire  $\frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$  est centrée réduite.

---

#### Définition/Propriétés IV.1.3 (Variance de variables aléatoires suivant des lois usuelles)

- (1) Si  $X$  est une variable aléatoire réelle constante égale à  $m$  alors  $V(X) = 0$ .  
(2) Si  $X$  est une variable aléatoire de loi de Bernoulli de paramètre  $p$ , alors  $V(X) = p(1 - p)$ .  
(3) Si  $X$  est une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres  $n$  et  $p$ , alors  $V(X) = np(1 - p)$ .

### IV.2 Covariance de deux variables aléatoires réelles

---

#### Définition IV.2.1

Si  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  sont deux variables aléatoires réelles alors le réel, noté  $\text{Cov}(X, Y)$ , défini par

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

est dit covariance de  $X$  et  $Y$ .

Dans le cas où  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ , on dit que les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  sont décorrélées.

---

**Propriétés IV.2.2**

Si  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  sont deux variables aléatoires réelles alors

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

---

**Définition/Propriétés IV.2.3 (Covariance de deux variables aléatoires réelles indépendantes)**

Si  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  sont deux variables aléatoires réelles indépendantes alors  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ .

Remarque

Autrement dit, deux variables aléatoires réelles indépendantes sont décorréliées ; la réciproque est fausse.

---

**Définition/Propriétés IV.2.4 (Variance d'une somme de deux variables aléatoires réelles)**

Si  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  sont deux variables aléatoires réelles alors :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

.

---

**Définition/Propriétés IV.2.5 (Variance d'une somme de deux variables aléatoires réelles décor**

Soit  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  deux variables aléatoires réelles.

$X$  et  $Y$  sont décorréliées si, et seulement si,  $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ .

---

**Définition/Propriétés IV.2.6 (Variance de  $n$  variables aléatoires réelles (programme de 2e ann**

La variance de la somme de  $n (\geq 3)$  variables aléatoires réelles sera abordée en MPI :

$$V\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n V(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

Remarque

Si  $X$  est une variable aléatoire binomiale de paramètres  $n$  et  $p$  alors on écrit  $X = X_1 + \dots + X_n$  avec  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires de Bernoulli de même paramètre  $p$  et indépendantes. On retrouve alors la variance connue pour une variable aléatoire binomiale  $X$  avec la formule ci-dessus :

$$V(X) = \sum_{k=1}^n V(X_k) = \sum_{k=1}^n p(1-p) = np(1-p)$$

## IV.3 Inégalités probabilistes

---

### Définition/Propriétés IV.3.1 (Inégalité de Markov)

Si  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$  est une variable aléatoire numérique et  $a$  un réel strictement positif alors

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{E(|X|)}{a}$$

.

---

### Définition/Propriétés IV.3.2 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev)

Si  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  est une variable aléatoire réelle et  $a$  un réel strictement positif alors

$$\mathbb{P}(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$$

.

# Chapitre 35

## fonctions de deux variables réelles

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Ouverts et boules de l'espace euclidien usuel <math>\mathbb{R}^2</math></b>	<b>358</b>
I.1	Boules pour la norme euclidienne	358
I.2	Ouverts pour la norme euclidienne	359
I.3	Continuité des fonctions de deux variables réelles à valeurs réelles	359
<b>II</b>	<b>Dérivées partielles d'ordre 1</b>	<b>360</b>
II.1	Dérivées partielles d'ordre 1	360
<b>III</b>	<b>Existence de dérivées partielles et continuité : point de vigilance !</b>	<b>361</b>
III.1	Classe $C^1$	361
III.2	Classe $C^1$ et continuité	363
III.3	Gradient d'une fonction de classe $C^1$	363
<b>IV</b>	<b>Extremums</b>	<b>364</b>
IV.1	Définitions	364
IV.2	Condition NECESSAIRE d'existence d'un extremum local	364
<b>V</b>	<b>Règle de la chaîne</b>	<b>365</b>
V.1	Dérivée selon un vecteur	365
V.2	Expression des dérivées directionnelles avec le gradient	365
V.3	Règle de la chaîne	365
V.4	Propriétés	366

Dans ce chapitre, on s'intéresse à des fonctions de deux variables réelles à valeurs réelles (vision géométrique, calculs de dérivées partielles et "règle de la chaîne" essentiellement). Ce chapitre sera entièrement repris en MPI dans un cadre plus général ; le point de vue du cours de MP2I est donc essentiellement pratique sans extension ou développement théorique.

### I Ouverts et boules de l'espace euclidien usuel $\mathbb{R}^2$

On munit l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^2$  du produit scalaire usuel noté  $\langle .|. \rangle$  et de la norme associée notée  $\|.\|$ .

#### I.1 Boules pour la norme euclidienne



---

**Définition/Propriétés I.1.1**

Soit  $r \in \mathbb{R}_+^*$  et  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ .

On appelle boule ouverte de centre  $a = (x_0, y_0)$  et de rayon  $r$  pour la norme  $\|\cdot\|$ , l'ensemble  $\mathcal{B}(a, r)$  défini par :

$$\mathcal{B}(a, r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < r\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r\}$$

## I.2 Ouverts pour la norme euclidienne

---

**Définition/Propriétés I.2.1**

Soit  $\mathcal{O}$  une partie de  $\mathbb{R}^2$ .

$\mathcal{O}$  est dit ouvert de  $\mathbb{R}^2$  (pour la norme euclidienne) si tout point de  $\mathcal{O}$  est centre d'une boule ouverte (pour la norme euclidienne) incluse dans  $\mathcal{O}$  :

$$\forall a \in \mathcal{O}, \exists r \in \mathbb{R}_+^*, \mathcal{B}(a, r) \subset \mathcal{O}$$

.

## I.3 Continuité des fonctions de deux variables réelles à valeurs réelles

---

**Définition/Propriétés I.3.1 (Représentation graphique)**

A toute fonction  $f : \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}$  définie sur une partie  $\mathcal{U}$  de  $\mathbb{R}^2$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  peut être associé l'ensemble de points de  $\mathbb{R}^3$

$$S = \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in \mathcal{U}\}$$

dit surface d'équation cartésienne  $z = f(x, y)$  permettant ainsi de représenter graphiquement  $f$ .

---

**Définition/Propriétés I.3.2 (Continuité sur un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ )**

Soit  $\mathcal{O}$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  et  $f : \mathcal{O} \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur  $\mathcal{O}$ .

$f$  est dite continue sur l'ouvert  $\mathcal{O}$  si  $f$  est continue en tout  $(x_0, y_0)$  de  $\mathcal{O}$  ce qui se traduit par :

$$\forall (x_0, y_0) \in \mathcal{O}, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall (x, y) \in \mathcal{O}, \underbrace{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}_{= \|(x, y) - (x_0, y_0)\|} \leq \delta \implies |f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq \varepsilon$$

Remarque

Cette définition étend la notion de continuité vue pour les fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles ; la norme euclidienne sur  $\mathbb{R}^2$  remplace ici la valeur absolue, norme usuelle sur  $\mathbb{R}$ .

---

### Propriétés I.3.3

- (1) La combinaison linéaire de fonctions continues sur un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  est continue.
- (2) Le produit de fonctions continues sur un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  est continu.
- (3) L'inverse d'une fonction continue sur un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  à valeurs dans  $\mathbb{R}^*$  est continue.
- (4) La composée, à gauche ou à droite, d'une fonction continue sur un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  par une fonction continue est continue. Plus précisément :
  - Si  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$  est continue sur un ouvert  $\mathcal{O}$  de  $\mathbb{R}^2$  et si  $g : \mathcal{O}' \rightarrow \mathbb{R}^2$  est continue sur un ouvert  $\mathcal{O}'$  de  $\mathbb{R}^2$  avec  $g(\mathcal{O}') \subset \mathcal{O}$  alors  $f \circ g$  est continue sur  $\mathcal{O}'$ .
  - Si  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$  est continue sur un ouvert  $\mathcal{O}$  de  $\mathbb{R}^2$  et si  $h : \mathcal{O}' \rightarrow \mathbb{R}$  est continue sur un ouvert  $\mathcal{O}'$  de  $\mathbb{R}$  avec  $f(\mathcal{O}) \subset \mathcal{O}'$  alors  $h \circ f$  est continue sur  $\mathcal{O}$ .

---

### Exemple I.3.4

- Les fonctions polynomiales de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  sont continues sur tout ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .
- Les quotients de fonctions polynomiales définies sur  $\mathbb{R}^2$  sont continues sur tout ouvert de  $\mathbb{R}^2$  où leur dénominateur ne s'annule pas.

## II Dérivées partielles d'ordre 1

### II.1 Dérivées partielles d'ordre 1

Soit  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un ouvert  $\mathcal{O}$  de  $\mathbb{R}^2$  et  $a = (x_0, y_0)$  un point de  $\mathcal{O}$ .

---

#### Définition/Propriétés II.1.1 (Dérivées partielles en un point)

- On dit  $f$  admet une dérivée partielle d'ordre 1 en  $(x_0, y_0)$  par rapport à la première place si la fonction  $f_1 : t \mapsto f(t, y_0)$  est dérivable en  $x_0$ . Dans ce cas, la dérivée obtenue est notée  $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$  :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f'_1(x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{f(t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h + x_0, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

- On dit  $f$  admet une dérivée partielle d'ordre 1 en  $(x_0, y_0)$  par rapport à la seconde place si la fonction  $f_2 : t \mapsto f(x_0, t)$  est dérivable en  $y_0$ . Dans ce cas, la dérivée obtenue est notée  $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$  :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f'_2(y_0) = \lim_{t \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, t) - f(x_0, y_0)}{t - y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, h + y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

#### Remarque

Pour  $(x_0, y_0) \in \mathcal{O}$ , les fonctions  $f_1 : t \mapsto f(t, y_0)$  et  $f_2 : t \mapsto f(x_0, t)$  sont respectivement appelées première fonction partielle et seconde fonction partielle de  $f$  en  $(x_0, y_0)$ .

---

**Définition/Propriétés II.1.2 (Dérivées partielles sur un ouvert)**

Si  $f$  admet une dérivée partielle d'ordre 1 en tout  $(x_0, y_0)$  de  $\mathcal{O}$  par rapport :

- à la première place alors la fonction  $(x_0, y_0) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$  définie sur  $\mathcal{O}$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , est appelée première fonction dérivée partielle d'ordre 1 et notée  $\frac{\partial f}{\partial x}$  ;
- à la seconde place alors la fonction  $(x_0, y_0) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$  définie sur  $\mathcal{O}$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , est appelée seconde fonction dérivée partielle d'ordre 1 et notée  $\frac{\partial f}{\partial y}$

### III Existence de dérivées partielles et continuité : point de vigilance !

---

**Définition/Propriétés III.0.1**

Contrairement aux cas des fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles pour lesquelles la dérivabilité implique la continuité, l'existence de dérivées partielles d'ordre 1 pour une fonction de deux variables réelles à valeurs dans  $\mathbb{R}$  n'assure pas sa continuité.

Exemple

La fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}^2$  par  $g(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$  si  $(x, y) \neq (0, 0)$  et  $g(0, 0) = 0$  admet des dérivées partielles d'ordre 1 en 0 mais n'est pas continue en  $(0, 0)$  car la suite  $\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)_{n \geq 1}$  tend vers  $(0, 0)$  alors que la suite  $\left(g\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)\right)$  ne tend pas vers  $g(0, 0)$ .

#### III.1 Classe $C^1$

---

**Définition III.1.1**

Soit  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un ouvert  $\mathcal{O}$  de  $\mathbb{R}^2$ .

$f$  est dite de classe  $C^1$  sur l'ouvert  $\mathcal{O}$  si ses dérivées partielles d'ordre 1 existent et sont continues sur  $\mathcal{O}$ .

---

**Définition/Propriétés III.1.2 (Opérations sur les applications de classe  $C^1$ )**

- (1) La combinaison linéaire de fonctions de classe  $C^1$  sur un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  est de classe  $C^1$ .

- (2) Le produit de fonctions de classe  $C^1$  sur un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  est de classe  $C^1$ .
- (3) L'inverse d'une fonction de classe  $C^1$  sur un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  à valeurs dans  $\mathbb{R}^*$  est de classe  $C^1$ .
- (4) La composée, à gauche ou à droite, d'une fonction de classe  $C^1$  sur un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  par une fonction de classe  $C^1$  est de classe  $C^1$ . (preuve avec la règle de la chaîne vue au II).

### Exemple III.1.3

- Les fonctions polynomiales de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  sont de classe  $C^1$  sur tout ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .
- Les quotients de fonctions polynomiales définies sur  $\mathbb{R}^2$  sont de classe  $C^1$  sur tout ouvert de  $\mathbb{R}^2$  où leur dénominateur ne s'annule pas.

### Définition/Propriétés III.1.4 (Développement limité (preuve hors programme))

Soit  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un ouvert  $\mathcal{O}$  de  $\mathbb{R}^2$ .

Si  $f$  est de classe  $C^1$  sur l'ouvert  $\mathcal{O}$  alors,

pour tout  $(x_0, y_0)$  de  $\mathcal{O}$  et pour tout  $(h, k) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $(x_0 + h, y_0 + k) \in \mathcal{O}$ , on a :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + o(\|(h, k)\|)$$

avec

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{o(\|(h, k)\|)}{\|(h, k)\|} = 0$$

### Remarques

- Pour tout  $(x_0, y_0) \in \mathcal{O}$ , le caractère "ouvert" de  $\mathcal{O}$  assure la possibilité de trouver une boule ouverte centrée en  $(x_0, y_0)$  incluse dans  $\mathcal{O}$  donc de trouver des  $(h, k) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $(x_0 + h, y_0 + k) \in \mathcal{O}$ .
- Ce développement limité de  $f$  en  $(x_0, y_0)$  donne une approximation locale en  $(x_0, y_0)$  de la fonction  $(h, k) \mapsto f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$  par l'application linéaire

$$(h, k) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k$$

Cela préfigure la notion de différentielle de  $f$  en  $(x_0, y_0)$  qui sera vue en MPI.

- Si on munit  $\mathbb{R}^3$  de sa structure euclidienne usuelle, le plan d'équation cartésienne

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

est dit plan tangent à la surface  $S$  d'équation  $z = f(x, y)$  au point  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .

## III.2 Classe $C^1$ et continuité

---

### Définition/Propriétés III.2.1

Soit  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un ouvert  $\mathcal{O}$  de  $\mathbb{R}^2$ .

Si  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathcal{O}$  alors  $f$  est continue sur  $\mathcal{O}$ .

Remarque

On rappelle que l'existence de dérivées partielles d'ordre 1 n'assure pas la continuité (cf II.2).

## III.3 Gradient d'une fonction de classe $C^1$

---

### Définition/Propriétés III.3.1 (Définition par les coordonnées)

Soit  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie et de classe  $C^1$  sur un ouvert  $\mathcal{O}$  de  $\mathbb{R}^2$  et  $(x_0, y_0)$  un point de  $\mathcal{O}$ .

On appelle gradient de  $f$  en  $(x_0, y_0)$  le vecteur de  $\mathbb{R}^2$  noté  $\nabla f(x_0, y_0)$  défini par

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left( \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$$

dans la base usuelle de  $\mathbb{R}^2$ .

---

### Propriétés III.3.2

Si  $f$  est de classe  $C^1$  sur l'ouvert  $\mathcal{O}$  et  $(x_0, y_0)$  est un point de  $\mathcal{O}$  alors

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, \langle \nabla f(x_0, y_0) | (h, k) \rangle = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k$$

où  $\langle | \rangle$  désigne le produit scalaire usuel sur  $\mathbb{R}^2$ .

Remarques

- Cela résulte du fait que la base usuelle de  $\mathbb{R}^2$  est orthonormée pour le produit scalaire usuel.
- Lorsque  $f$  est de classe  $C^1$  sur l'ouvert  $\mathcal{O}$ , le développement limité de  $f$  en tout  $(x_0, y_0)$  de  $\mathcal{O}$  à l'ordre 1 peut donc s'écrire sous la forme

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \langle \nabla f(x_0, y_0) | (h, k) \rangle + o(\|(h, k)\|)$$

Lorsque  $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0_{\mathbb{R}^2}$ , le vecteur gradient donne la direction dans laquelle  $f$  croît le plus vite.

## IV Extremums

### IV.1 Définitions

---

#### Définition IV.1.1

Soit  $f$  une application définie sur une partie  $\mathcal{U}$  de  $\mathbb{R}^2$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , et  $a$  un point de  $\mathcal{U}$ .

(1) On dit que  $f$  admet :

(a) un maximum local en  $a = (x_0, y_0)$  s'il existe  $r > 0$  tel que :

$$\forall (x, y) \in \mathcal{U} \cap \mathcal{B}(a, r), f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

(b) un minimum local en  $a = (x_0, y_0)$  s'il existe  $r > 0$  tel que :

$$\forall (x, y) \in \mathcal{U} \cap \mathcal{B}(a, r), f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$$

(c) un extremum local en  $a = (x_0, y_0)$  si  $f$  admet un maximum ou un minimum local en  $a$ .

(2) On dit que  $f$  admet :

(a) un maximum global en  $a = (x_0, y_0)$  si :  $\forall (x, y) \in \mathcal{U}, f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ .

(b) un minimum global en  $a = (x_0, y_0)$  si :  $\forall (x, y) \in \mathcal{U}, f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$ .

(c) un extremum global en  $a$  si  $f$  admet un maximum ou un minimum global en  $a$ .

### IV.2 Condition NECESSAIRE d'existence d'un extremum local

---

#### Définition/Propriétés IV.2.1

Si  $f$  est une fonction définie et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur un ouvert  $\mathcal{O}$  de  $\mathbb{R}^2$ , à valeurs réelles qui admet un extremum local en  $(x_0, y_0) \in \mathcal{O}$  alors

$$\nabla f((x_0, y_0)) = 0_{\mathbb{R}^2}$$

#### Remarques

- Tout  $(x_0, y_0) \in \mathcal{O}$  tel que  $\nabla f((x_0, y_0)) = 0_{\mathbb{R}^2}$  est dit point critique de  $f$ .
- La recherche d'éventuel extremum local pour  $f$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur un ouvert, à valeurs réelles,
  - commence par la détermination des éventuels points critiques de  $f$  sur l'ouvert ;
  - se poursuit par l'étude du signe de  $f(x, y) - f(x_0, y_0)$  au voisinage des points critiques  $(x_0, y_0)$  :
    - si ce signe est constant sur une boule ouverte centrée en  $(x_0, y_0)$  alors il y a extremum local ;
    - si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'extremum local.

## V Règle de la chaîne

Soit  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un ouvert  $\mathcal{O}$  de  $\mathbb{R}^2$ .

### V.1 Dérivée selon un vecteur

---

#### Définition/Propriétés V.1.1

On dit que la fonction  $f$  est dérivable en  $(x_0, y_0) \in \mathcal{O}$  selon le vecteur  $u = (h, k)$  de  $\mathbb{R}^2$  si la fonction  $t \mapsto f((x_0, y_0) + t(h, k))$  est dérivable en 0. On note alors

$$D_u f(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (f((x_0, y_0) + t(h, k)) - f(x_0, y_0))$$

et on dit que  $D_u f(x_0, y_0)$  est la dérivée de  $f$  en  $(x_0, y_0)$  selon le vecteur  $u$ .

Remarque

orsqu'elles existent, les dérivées partielles premières de  $f$  en  $(x_0, y_0)$  sont donc les dérivées de  $f$  en  $(x_0, y_0)$  selon les deux vecteurs  $e_1$  et  $e_2$  de la base usuelle de  $\mathbb{R}^2$ .

- Si  $f$  admet des dérivées en tout  $(x_0, y_0) \in \mathcal{O}$  selon le vecteur  $u = (h, k)$  de  $\mathbb{R}^2$  alors la fonction  $(x_0, y_0) \mapsto D_u f(x_0, y_0)$  définie sur  $\mathcal{O}$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , est appelée fonction dérivée de  $f$  selon le vecteur  $u$  et notée  $D_u f$ . On a, en particulier :

$$D_{e_1} f = \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{et} \quad D_{e_2} f = \frac{\partial f}{\partial y}$$

### V.2 Expression des dérivées directionnelles avec le gradient

---

#### Définition/Propriétés V.2.1

Si  $f$  est une fonction définie et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur un ouvert  $\mathcal{O}$  de  $\mathbb{R}^2$  et  $(x_0, y_0)$  un point de  $\mathcal{O}$  alors  $f$  admet des dérivées en  $(x_0, y_0)$  selon tout vecteur  $u = (h, k)$  de  $\mathbb{R}^2$  données par :

$$D_u f(x_0, y_0) = \langle \nabla f(x_0, y_0) | u \rangle$$

### V.3 Règle de la chaîne

---

#### Théorème V.3.1

Soit  $x$  et  $y$  des fonctions de  $I$  (intervalle non vide, non réduit à un point, de  $\mathbb{R}$ ) dans  $\mathbb{R}$  tel que :

$$\forall t \in I, (x(t), y(t)) \in \mathcal{O}$$

Si  $x$  et  $y$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  et si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'ouvert  $\mathcal{O}$  alors la fonction

$$\psi : t \mapsto f(x(t), y(t))$$

est de classe  $C^1$  sur  $I$  et sa dérivée est :

$$\psi' : t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t))y'(t)$$

ce que l'on peut encore écrire

$$\frac{d}{dt}(f(x(t), y(t))) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t))y'(t)$$

### Définition/Propriétés V.3.2 (Interprétation géométrique de la règle de la chaîne)

Avec les hypothèses et notations du II.3.1., en notant  $\gamma : I \mapsto \mathbb{R}^2$  la fonction de classe  $C^1$  définie par

$$\forall t \in I, \gamma(t) = (x(t), y(t))$$

la dérivée de la fonction  $f \circ \gamma$  peut s'écrire :

$$\forall t \in I, (f \circ \gamma)'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)) | \gamma'(t) \rangle$$

On parle alors de dérivée de  $f$  le long de l'arc paramétré donné par  $\gamma : t \mapsto (x(t), y(t))$ .

### Définition/Propriétés V.3.3 (Application géométrique de la règle de la chaîne)

Soit  $k \in \mathbb{R}$  et  $(x_0, y_0) \in \mathcal{O}$ .

Si  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathcal{O}$  avec  $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0_{\mathbb{R}^2}$  et  $f(x_0, y_0) = k$  alors  $\nabla f(x_0, y_0)$  est orthogonal à la courbe

$$C_k = \{(x, y) \in \mathcal{O} \mid f(x, y) = k\}$$

appelée ligne de niveau de  $f$ .

## V.4 Propriétés

### Propriétés V.4.1

Soit  $x$  et  $y$  des fonctions de  $\mathcal{O}'$  (ouvert non vide de  $\mathbb{R}^2$ ) dans  $\mathbb{R}$  tel que :

$$\forall (u, v) \in \mathcal{O}', (x(u, v), y(u, v)) \in \mathcal{O}$$

Si  $x$  et  $y$  sont de classe  $C^1$  sur  $\mathcal{O}'$  et si  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathcal{O}$  alors l'application

$$g : (u, v) \mapsto f(x(u, v), y(u, v))$$

est de classe  $C^1$  sur  $\mathcal{O}'$  et ses dérivées partielles d'ordre 1 sont :

$$\frac{\partial g}{\partial u}(u, v) = \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \frac{\partial f}{\partial x}(x(u, v), y(u, v)) + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \frac{\partial f}{\partial y}(x(u, v), y(u, v))$$

$$\frac{\partial g}{\partial v}(u, v) = \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \frac{\partial f}{\partial x}(x(u, v), y(u, v)) + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \frac{\partial f}{\partial y}(x(u, v), y(u, v))$$

Exemple important du passage en coordonnées polaires

Soit  $\mathcal{O}'$  un ouvert non vide de  $\mathbb{R}^2$  tel que  $\forall (r, \theta) \in \mathcal{O}', (r \cos \theta, r \sin \theta) \in \mathcal{O}$ .



- Les fonctions  $x : (r, \theta) \mapsto r \cos \theta$  et  $y : \theta \mapsto r \sin \theta$  sont de classe  $C^1$  sur  $\mathcal{O}'$  car leurs dérivées partielles d'ordre 1 existent et sont continues.
- Ainsi, si  $f$  de classe  $C^1$  sur  $\mathcal{O}$  alors  $g : (r, \theta) \mapsto f(r \cos \theta, r \sin \theta)$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathcal{O}'$  avec :

$$\frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) = -r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$\frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta) = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

# Chapitre 36

## Familles sommables de réels ou complexes

### Sommaire

<b>I</b>	<b>Familles sommables de réels positifs . . . . .</b>	<b>368</b>
I.1	Rappel : relation d'ordre dans la demi-droite achevée $[0 ; +\infty]$ . . . . .	368
I.2	Somme d'une famille de réels positifs . . . . .	369
I.3	Sommabilité d'une famille de réels positifs . . . . .	370
I.4	Opérations . . . . .	370
I.5	Théorème de sommation par paquets positifs (ADMIS) . . . . .	371
I.6	Théorème de Fubini positif . . . . .	371
<b>II</b>	<b>Familles sommables d'éléments de <math>\mathbb{K}</math> . . . . .</b>	<b>371</b>
II.1	Généralités . . . . .	372
II.2	Cas particulier important des familles d'éléments de $\mathbb{K}$ indexées par $\mathbb{N}$ . . .	373
II.3	Théorème de majoration . . . . .	373
II.4	Linéarité de la somme . . . . .	373
II.5	Théorème de sommation par paquets (ADMIS) . . . . .	373
II.6	Théorème de Fubini . . . . .	374
II.7	Cas particulier . . . . .	374
II.8	Produit de Cauchy . . . . .	374

Dans ce chapitre où  $\mathbb{K}$  désigne le corps  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ , on prolonge les calculs de sommes finies effectués en début d'année dans le chapitre "Sommes et produits finis" en présentant un cadre qui permet de sommer "en vrac" une famille infinie et procure ainsi un grand confort de calcul. On se concentre sur la pratique, vu son importance en MPI, dans les calculs d'espérance et de variance de variables aléatoires discrètes.

### I Familles sommables de réels positifs

#### I.1 Rappel : relation d'ordre dans la demi-droite achevée $[0 ; +\infty]$

---

##### Définition/Propriétés I.1.1

- On appelle demi-droite achevée l'ensemble noté  $[0 ; +\infty]$  défini par  $[0 ; +\infty] = [0 ; +\infty[ \cup \{+\infty\}$

Sur cette demi-droite achevée, on étend la relation d'ordre  $\leq$ , l'addition et la multiplication connues sur  $[0 ; +\infty[$  avec les conventions suivantes :

- (1)  $\forall x \in [0 ; +\infty[ , x < +\infty$ .
- (2)  $\forall x \in [0 ; +\infty] , x + (+\infty) = (+\infty) + x = +\infty$ .
- (3)  $0 \times (+\infty) = (+\infty) \times 0 = 0$ .
- (4)  $\forall x \in [0 ; +\infty] \setminus 0 , x \times (+\infty) = (+\infty) \times x = +\infty$ .
- Toute partie  $X$  de  $[0 ; +\infty]$  admet une borne supérieure (plus petit des majorants) notée  $\sup X$ .
  - Cas où  $X$  est une partie non vide et majorée :

$\sup X$  est égale à la borne supérieure de  $X$  vue comme partie de  $\mathbb{R}$ .

— Cas où  $X$  est la partie vide ou où  $X$  est une partie non majorée :

$$\sup X = \begin{cases} 0 & \text{si } X = \emptyset \\ +\infty & \text{si } X \text{ est non vide et non majorée} \end{cases}$$

## I.2 Somme d'une famille de réels positifs

---

### Définition/Propriétés I.2.1

Soit  $I$  un ensemble quelconque.

On appelle somme d'une famille  $(u_i)_{i \in I}$  d'éléments de  $[0 ; +\infty]$ , et on note  $\sum_{i \in I} u_i$ , la borne supérieure dans  $[0 ; +\infty]$  de l'ensemble des sommes  $\sum_{i \in F} u_i$  quand  $F$  décrit l'ensemble des parties finies de  $I$  :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sup \left\{ \sum_{i \in F} u_i \mid F \text{ partie finie de } I \right\}$$

#### Remarques

Soit  $(u_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $[0 ; +\infty]$ .

- Dans le cas où  $I$  est fini, la somme  $\sum_{i \in I} u_i$  coïncide avec la notion de somme finie usuelle connue.
- Dans le cas où  $I = \mathbb{N}$ , la somme  $\sum_{i \in I} u_i$  coïncide avec la notion de somme de la série  $\sum u_n$  :
  - dans le cas où la série  $\sum u_n$  d'éléments de  $\mathbb{R}_+$  converge ;
  - dans le cas où la série  $\sum u_n$  d'éléments de  $\mathbb{R}_+$  diverge avec la convention  $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = +\infty$ .

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} u_i = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

- Invariance de la somme par permutation

Si  $\sigma$  est une permutation de  $I$  (i.e. une bijection de  $I$  sur  $I$ ) alors

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_{\sigma(i)}$$

.

### I.3 Sommabilité d'une famille de réels positifs

Soit  $I$  un ensemble quelconque.

---

#### Définition I.3.1

La famille de réels positifs  $(u_i)_{i \in I}$  est dite sommable si sa somme vérifie  $\sum_{i \in I} u_i < +\infty$ .

---

#### Propriétés I.3.2

Si  $(a_i)_{i \in I}$  et  $(b_i)_{i \in I}$  sont deux familles de réels positifs tel que, pour tout  $i$  de  $I$ ,  $0 \leq a_i \leq b_i$  et si la famille  $(b_i)_{i \in I}$  est sommable alors la famille  $(a_i)_{i \in I}$  est sommable et  $\sum_{i \in I} a_i \leq \sum_{i \in I} b_i$

### I.4 Opérations

---

#### Définition/Propriétés I.4.1

Soit  $I$  un intervalle quelconque.

Si  $(u_i)_{i \in I}$  et  $(v_i)_{i \in I}$  sont deux familles de réels positifs et  $\alpha$  un réel positif alors

$$\sum_{i \in I} u_i + \sum_{i \in I} v_i = \sum_{i \in I} (u_i + v_i) \quad \text{et} \quad \alpha \sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} \alpha u_i$$

#### Remarque

Les conventions de calcul imposées dans  $[0 ; +\infty]$  donnent du sens à ces égalités y compris dans le cas où l'une des familles de réels positifs écrites n'est pas sommable.

## I.5 Théorème de sommation par paquets positifs (ADMIS)

---

### Théorème I.5.1

Soit  $I$  et  $J$  deux ensembles quelconques.

Si l'ensemble  $I$  est la réunion disjointe des ensembles  $I_j$  lorsque  $j$  décrit  $J$  et si  $(u_i)_{i \in I}$  est une famille de réels positifs alors la somme de cette famille vérifie

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left( \sum_{i \in I_j} u_i \right)$$

#### Remarque

Les conventions de calcul imposées dans  $[0 ; +\infty]$  donnent du sens à cette égalité y compris dans le cas où l'une des familles de réels positifs écrites n'est pas sommable.

## I.6 Théorème de Fubini positif

---

### Théorème I.6.1

Soit  $J$  et  $K$  des ensembles quelconques.

Si  $(a_{j,k})_{(j,k) \in J \times K}$  est une famille de réels positifs alors la somme de cette famille vérifie

$$\sum_{(j,k) \in J \times K} a_{j,k} = \sum_{j \in J} \left( \sum_{k \in K} a_{j,k} \right) = \sum_{k \in K} \left( \sum_{j \in J} a_{j,k} \right)$$

#### Remarques

- Les conventions de calcul imposées dans  $[0 ; +\infty]$  donnent du sens à ces égalités y compris dans le cas où l'une des familles de réels positifs écrites n'est pas sommable.
- Ce théorème est une conséquence du théorème de sommation par paquets vu ci-dessus pour les familles de réels positifs. Il résulte de l'écriture de l'ensemble  $I = J \times K$  comme réunion disjointe :
  - des ensembles  $A_j = \{(j, k) \mid k \in K\}$  lorsque  $j$  décrit  $J$  d'une part ;
  - des ensembles  $B_k = \{(j, k) \mid j \in J\}$  lorsque  $k$  décrit  $K$  d'autre part.
- Dans le cas où  $J$  et  $K$  sont finis, on retrouve un résultat vu dans le chapitre "Sommes et produits finis" pour les sommes doubles rectangulaires.

## II Familles sommables d'éléments de $\mathbb{K}$

Soit  $I$  un ensemble quelconque.

## II.1 Généralités

---

### Définition/Propriétés II.1.1 (Sommabilité)

La famille  $(u_i)_{i \in I}$  d'éléments de  $\mathbb{K}$  est dite sommable si la famille de réels positifs  $(|u_i|)_{i \in I}$  l'est, autrement dit si la somme  $\sum_{i \in I} |u_i|$  vérifie

$$\sum_{i \in I} |u_i| < +\infty.$$

On note  $\uparrow^1(I, \mathbb{K})$  ou plus simplement  $\uparrow^1(I)$  l'ensemble des familles  $(u_i)_{i \in I}$  d'éléments de  $I$  sommables.

Remarque Une sous-famille d'une famille d'éléments de  $\mathbb{K}$  sommable est sommable.

---

### Définition/Propriétés II.1.2 (Somme d'une famille sommable)

- Si  $(u_i)_{i \in I}$  est une famille de réels sommable, sa somme est définie par :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_i^+ - \sum_{i \in I} u_i^-$$

où  $u_i^+ = \frac{1}{2}(|u_i| + u_i)$  et  $u_i^- = \frac{1}{2}(|u_i| - u_i)$

- si  $(u_i)_{i \in I}$  est une famille de complexes sommable, sa somme est définie par :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} \operatorname{Re}(u_i) + i \sum_{i \in I} \operatorname{Im}(u_i).$$

### Remarques

- Ces définitions ont du sens puisque que si  $(u_i)_{i \in I}$  est une famille de réels (resp. complexes) sommable alors, d'après I.3.2., les familles de réels positifs  $(u_i^+)_{i \in I}$  et  $(u_i^-)_{i \in I}$  (resp. de réels  $(\operatorname{Re}(u_i))_{i \in I}$  et  $(\operatorname{Im}(u_i))_{i \in I}$ ) sont sommables puisque, pour tout  $i$  de  $I$ , on a :

$$0 \leq u_i^+ \leq |u_i| \quad \text{et} \quad 0 \leq u_i^- \leq |u_i|$$

$$(\text{resp. } 0 \leq |\operatorname{Re}(u_i)| \leq |u_i| \quad \text{et} \quad 0 \leq |\operatorname{Im}(u_i)| \leq |u_i|)$$

- Approximation de la somme d'une famille sommable par une somme finie  
Si  $(u_i)_{i \in I}$  est une famille d'éléments de  $\mathbb{K}$  sommable et si  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ , il existe une partie finie  $F$  de  $I$  telle que

$$\left| \sum_{i \in I} u_i - \sum_{i \in F} u_i \right| \leq \varepsilon$$

- Conservation de la sommabilité et invariance de la somme par permutation.

Si  $\sigma$  est une permutation de  $I$  et si  $(u_i)_{i \in I}$  est une famille d'éléments de  $\mathbb{K}$  sommable alors la famille  $(u_{\sigma(i)})_{i \in I}$  est sommable

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_{\sigma(i)}.$$

## II.2 Cas particulier important des familles d'éléments de $\mathbb{K}$ indexées par $\mathbb{N}$

---

### Définition/Propriétés II.2.1

Une famille  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de  $\mathbb{K}$  est sommable si, et seulement si, la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge absolument.

Dans ce cas,

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} |u_n| = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| \quad \text{et} \quad \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

## II.3 Théorème de majoration

---

### Définition/Propriétés II.3.1

Si  $(u_i)_{i \in I}$  est une famille d'éléments de  $\mathbb{K}$  et  $(v_i)$  une famille sommable de réels positifs tel que, pour tout  $i \in I$ ,  $|u_i| \leq v_i$  alors la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est sommable.

## II.4 Linéarité de la somme

---

### Définition/Propriétés II.4.1

Soit  $(u_i)_{i \in I}$  et  $(v_i)_{i \in I}$  deux familles d'éléments de  $\mathbb{K}$  et  $(\alpha, \beta)$  un couple d'éléments de  $\mathbb{K}$ .

Si les familles  $(u_i)_{i \in I}$  et  $(v_i)_{i \in I}$  sont sommables alors la famille  $(\alpha u_i + \beta v_i)_{i \in I}$  est sommable, de somme :

$$\sum_{i \in I} (\alpha u_i + \beta v_i) = \alpha \sum_{i \in I} u_i + \beta \sum_{i \in I} v_i$$

## II.5 Théorème de sommation par paquets (ADMIS)

---

### Théorème II.5.1

Si l'ensemble  $I$  est la réunion disjointe des ensembles  $I_j$  lorsque  $j$  décrit  $J$  et si  $(u_i)_{i \in I}$  est une famille d'éléments de  $\mathbb{K}$  sommable alors la somme de cette famille vérifie

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left( \sum_{i \in I_j} u_i \right)$$

## II.6 Théorème de Fubini

---

### Définition/Propriétés II.6.1

Soit  $J$  et  $K$  des ensembles quelconques.

Si  $(a_{j,k})_{(j,k) \in J \times K}$  est une famille d'éléments de  $\mathbb{K}$  sommable alors la somme de cette famille vérifie

$$\sum_{(j,k) \in J \times K} a_{j,k} = \sum_{j \in J} \left( \sum_{k \in K} a_{j,k} \right) = \sum_{k \in K} \left( \sum_{j \in J} a_{j,k} \right)$$

## II.7 Cas particulier

---

### Définition/Propriétés II.7.1

Si  $(b_j)_{j \in J}$  et  $(c_k)_{k \in K}$  sont sommables alors  $(b_j c_k)_{(j,k) \in J \times K}$  est sommable et

$$\sum_{(j,k) \in J \times K} b_j c_k = \sum_{j \in J} b_j \times \sum_{k \in K} c_k$$

Remarque

C'est une application du théorème de Fubini avec la famille  $(a_{j,k})_{(j,k) \in J \times K}$  où  $a_{j,k} = b_j c_k$ .

## II.8 Produit de Cauchy

---

### Définition/Propriétés II.8.1

Soit  $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites d'éléments de  $\mathbb{K}$ .

Pour tout  $p \in \mathbb{N}$ , on note :

$$w_p = \sum_{m+n=p} u_m v_n.$$

Si les séries  $\sum u_m$  et  $\sum v_n$  convergent absolument alors la série  $\sum w_p$  converge absolument avec

$$\sum_{p=0}^{+\infty} w_p = \left( \sum_{m=0}^{+\infty} u_m \right) \left( \sum_{n=0}^{+\infty} v_n \right)$$

La série  $\sum w_p$  est dite série produit de Cauchy des séries  $\sum u_m$  et  $\sum v_n$ .

Remarque

Ceci est une conséquence du résultat vu au II.7. appliqué à la famille  $(a_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^2}$  où  $a_{m,n} = u_m v_n$  et du théorème de sommation par paquets vu au II.5. appliqué avec la partition  $(I_p)_{p \in \mathbb{N}}$  de  $I = \mathbb{N}^2$  définie par  $I_p = \{(m,n) \in \mathbb{N}^2 \mid m+n=p\}$ .