

表 39 ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(1)

一、患者基础信息登记表					
患者姓名				病案号/ID	
性别/年龄	____岁 / ☐ 男 ☐ 女			收治科室/床号	____ ICU / ____ 床
ECMO 模式	☐ VA-ECMO ☐ ECPR ☐ VV-ECMO ☐ VAV/V-AV			置管日期与时间	____年__月__日 __时
ABI 高危风险因素(可多选)	☐ 心跳骤停 (ECPR) ☐ 严重低氧血症/长时间窒息 ☐ 上机前 PaCO ₂ >60 mmHg (CO ₂ 骤降风险) ☐ 原发脑血管疾病史/严重凝血异常 ☐ 体外循环术后			管路固定与置管深度	动脉侧: ____ cm 静脉侧: ____ cm
二、核心多模态神经监测工具					
监测工具	适用模式	启动时机	频率	关键阈值 / 正常值	异常 → 行动
NIRS (脑氧饱和度)	所有模式	ECMO 上机即刻	连续、双侧	①rSO ₂ >50%; ②↓>20-25%基线; ③双侧不对称>10%	①排除探头脱落/移位 ②优化氧输送 (MAP/PaCO ₂ /Hb/ECMO 流量) ③ VA 股-股→ 排查南北综合征 ④ 必要时头 CT + TCD
cEEG (连续脑电图)	ECPR+VA 高危	上机后 12-24h	连续≥24-48h	①非惊厥性发作 (NCSE) ②周期性放电 ③背景抑制/暴发抑制	①神经重症会诊 ②左乙拉西坦首选 (避免苯二氮革蓄积) ③评估预后
SSEP (体感诱发电位)	ECPR / 昏迷	复温后 ≥ 72h	评估 1-2 次	双侧 N20 缺失→极差预后 (不可逆皮层坏死)	结合其他多模态指标; N20 双侧缺失+其他不良指标→MDT 预后讨论
瞳孔评估 (瞳孔计)	所有模式	入 ICU/上机即查	q4-6h	①双侧等大②NPi≥3 (神经瞳孔指数)	NPi <3 或双侧不等大→ ①排除镇静/肌松干扰 ②紧急头颅 CT (非增强) ③评估 ICP

一、患者基础信息登记表					
TCD (经颅多普勒)	ECPR+VA 高危	上机后尽早	每日或病情变化时	①MFV 40-70 cm/s ②PI 0.6-1.1 ③正常低阻波形	MFV < 30→脑灌注不足→↑MAP/↑流量；PI > 1.2+舒张期血流消失/反向→颅内高压/脑死亡 →CT 确认；钉板波/振荡波→脑循环停止
ONSD (视神经鞘直径)	ECPR+颅内 高压可疑	上机后尽早	q12-24h 或病情变化	<5.0mm（正常）	5.0-5.8 mm→ICP 增高预警→加强监测；> 5.8 mm→严重颅内高压→甘露醇/高渗盐+CT+神经外科
头颅 CT (非增强)	所有模式	①神经异常②ECPR 复温后 ③常规高危筛查 (上机后 12-24h)	按需/即时	排除：ICH（颅内出血）、大面积脑梗死、弥漫性脑水肿	ICH→参见第五部分；缺血卒中→参见第五部分

依据：ELSO 神经监测共识（Cho SM et al. ASAIO J 2024·PMID 39620302）+ Cho SM et al. Crit Care 2024（PMC11380208）+ Dennis M et al. CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ ELSO Neuro Monitoring Guidelines 2024

用途：ECMO 患者神经监测的标准化方案——覆盖监测工具→异常处理→预后评估→长期随访

配套使用：表 36（每日检查单·C1 神经）+表 14（ECPR 专项·神经预后）+表 33 超声 SOP（TCD/ONSD 操作）

表 39 ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(2)

一、患者基础信息登记表			
患者姓名	_____	病案号/ID	_____
性别/年龄	_____岁 / ☐ 男 ☐ 女	收治科室/床号	_____ ICU / _____ 床
ECMO 模式	☐ VA-ECMO ☐ ECPR ☐ VV-ECMO ☐ VAV/V-AV	置管日期与时间	_____年____月____日 ____时

一、患者基础信息登记表			
ABI 高危风险因素(可多选)	☐ 心跳骤停（ECPR） ☐ 严重低氧血症/长时间窒息 ☐ 上机前 PaCO ₂ >60 mmHg（CO ₂ 骤降风险） ☐ 原发脑血管疾病史/严重凝血异常 ☐ 体外循环术后	管路固定与置管深度	动脉侧：_____ cm 静脉侧：_____ cm
三、临床生理目标与脑保护策略			
管理领域	目标范围	危险阈值	脑保护意义
PaO ₂	80-150 mmHg	<70（低氧脑损伤）> 300（高氧→氧化应激+再灌注损伤，VA/ECPR 尤其危险）	低氧和高氧都对脑有害，窄窗管理
PaCO ₂	35-45mmHg（上机初 24h 降速 <10 mmHg/h）	变化过快>15 mmHg/h（高 PaCO ₂ →脑血管扩张/ICP↑；低 PaCO ₂ →脑血管收缩/脑缺血）	PaCO ₂ 是脑血流最强的调节因子,上机初 24h 是脑缺血最高危窗口
MAP	≥70 mmHg（个体化）	< 65mmHg →脑灌注不足	自身调节受损时，MAP 直接决定脑灌注
Hb	≥ 8 g/dL	< 7→脑氧供下降	ECMO 中脑氧耗高+微循环障碍→宁高勿低
核心体温	VA/ECPR:33-36°C×24-48h,VV:≤37.7°C（常温）	> 37.7°C→ 每升高 1°C，脑氧耗增 6-10%	ECPR 亚低温是核心脑保护手段；发热→恶化神经损伤
血糖	144-180 mg/dL（8-10 mmol/L）	< 3.9(低血糖→神经元坏死)>10(高血糖→加重脑水肿+炎症)	神经系统对血糖极度敏感
NaCl	135-145 mmol/L	NaCl 波动过大 > 10 mmol/d → 脑水肿/渗透性脱髓鞘	缓慢纠正，每日 Δ< 8-10
四、模式分层神经监测策略			
模式	脑损伤主要风险	神经监测策略	特色工具
VA-ECMO	①栓塞性脑卒中（管路/左室血栓）②ICH（抗凝）③南北综合征→脑缺氧 ④左室淤血→脑灌注不足	NIRS（连续·必须）+瞳孔 q4h + cEEG（ECPR 及昏迷者）+TCD+CT（神经异常时）	NIRS 可早期发现差异性低氧；TCD 评估脑灌注压

一、患者基础信息登记表			
ECPR	最高风险：①全脑缺血-再灌注损伤 ②严重脑水肿/颅内高压 ③NCSE ④ICH（抗凝+缺血再灌注）	全部工具：NIRS+cEEG(必须 24-48h) +SSEP(≥72h) +TCD +ONSD+瞳孔计 q4h+CT(复温后/12h 内) +生物标志物	NIRS/cEEG/SSEP/TCD/ONSD 五联；预后评估≥72h 多模态
VV-ECMO	①CO ₂ 快速变化→脑血流紊乱② ICH（发生率低于VA） ③ 镇静相关谵妄/神经肌肉无力	NIRS(持续)+瞳孔 q4-6h+cEEG(昏迷者)+CT(神经异常时)	重点防 CO ₂ 剧烈波动，不是"上更多监测"，是"控制扫气速度"

依据：ELSO 神经监测共识（Cho SM et al. ASAIO J 2024·PMID 39620302）+ Cho SM et al. Crit Care 2024（PMC11380208）+ Dennis M et al. CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ ELSO Neuro Monitoring Guidelines 2024

注：不同 ECMO 模式，神经损伤的风险类型和监测重点完全不同。

表 39 ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(3)

一、患者基础信息登记表			
患者姓名	_____	病案号/ID	_____
性别/年龄	_____岁 / ☐ 男 ☐ 女	收治科室/床号	_____ ICU / _____ 床
ECMO 模式	☐ VA-ECMO ☐ ECPR ☐ VV-ECMO ☐ VAV/V-AV	置管日期与时间	_____年____月____日 ____时
ABI 高危风险因素(可多选)	☐ 心跳骤停（ECPR） ☐ 严重低氧血症/长时间窒息 ☐ 上机前 PaCO ₂ >60 mmHg（CO ₂ 骤降风险） ☐ 原发脑血管疾病史/严重凝血异常 ☐ 体外循环术后	管路固定与置管深度	动脉侧：_____ cm 静脉侧：_____ cm
五、急性脑损伤（ABI）分型处理速查			
ABI 类型	关键动作	抗凝策略	神经外科

一、患者基础信息登记表				
ICH (颅内出血)	①紧急头 CT（非增强）②暂停肝素③逆转抗凝（鱼精蛋白 1mg/100U；严重→PCC 25-50 U/kg）④控制 MAP（SBP<140-160 mmHg，避免低血压）⑤床头 30°+甘露醇/高渗盐	暂停后重启时机:VV 可长期(>2 天)无抗凝;VA 需权衡(血栓 vs 出血),无抗凝 VA 可维持但血栓栓塞风险↑;重启前复查 CT 确认血肿稳定	急会诊：血肿量大/脑疝 →开颅血肿清除；脑积水→EVD	
缺血性卒中 (大面积)	①头 CT 排除出血 ②tPA 一般禁忌（ECMO 抗凝状态） ③ 大血管闭塞→机械取栓 ④ 允许性高血压（非出血时）	维持或适度加强抗凝（防血栓扩展）,与 ICH 相反	机械取栓评估；去骨瓣 (大面积+水肿)	
ICP 升高/脑水肿	①头 CT 确认②床头 30° ③短期过度通气(PaCO ₂ 30-35,仅危急)④甘露醇 0.5-1 g/kg /高渗盐⑤ TCD 动态监测 ⑥难治→EVD/去骨瓣	需排查是否 ICH 所致（见上）；非出血性→抗凝可维持	EVD 置入（监测+引流）；去骨瓣减压	
非惊厥性发作 (NCSE)	①cEEG 确诊 ②左乙拉西坦 20-30 mg/kg IV 负荷→10-15 mg/kg q12h 维持③如无效→丙戊酸/拉考沙胺 ④ 避免苯二氮䓬蓄积	不影响抗凝决策	如 NCSE 由结构性脑损伤所致→神经外科参与	
脑死亡评估	①严格遵守国家法规和指南 ②临床判断：深昏迷+脑干反射消失+自主呼吸消失 ③呼吸暂停试验需谨慎（ECMO 中可通过关闭扫气/降低流量完成,但操作复杂）④替代：脑血管造影（DSA）或核素脑扫描,金标准 ⑤TCD：颅内血流停止（振荡波/收缩期尖峰）		器官捐献评估（如适用）	

六、生物标志物监测时间表				
生物标志物	来源	监测时机	正常值	不良预后阈值
NSE（神经元特异性烯醇化酶）	神经元损伤	24h、48h、72h	< 17μg/L	>60-80μg/L（48-72h）持续不降→极差
S100B	胶质细胞损伤	24h、48h、72h	< 0.1μg/L	>0.5μg/L 持续→不良

一、患者基础信息登记表				
GFAP（胶质纤维酸性蛋白）	星形胶质细胞损伤	24h、72h	取决于试剂盒	持续显著升高→不良

依据：ELSO 神经监测共识（Cho SM et al. ASAIO J 2024·PMID 39620302）+ Cho SM et al. Crit Care 2024（PMC11380208）+ Dennis M et al. CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ ELSO Neuro Monitoring Guidelines 2024

注:NSE 在溶血时假性升高（ECMO 常见溶血）——必须同时测游离 Hb，如游离 Hb>50mg/dL→NSE 不可靠。

表 39 ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(4)

一、患者基础信息登记表			
患者姓名	_____	病案号/ID	_____
性别/年龄	_____岁 / ☐ 男 ☐ 女	收治科室/床号	_____ ICU / _____ 床
ECMO 模式	☐ VA-ECMO ☐ ECPR ☐ VV-ECMO ☐ VAV/V-AV	置管日期与时间	_____年____月____日 ____时
ABI 高危风险因素(可多选)	☐ 心跳骤停（ECPR） ☐ 严重低氧血症/长时间窒息 ☐ 上机前 PaCO ₂ >60 mmHg（CO ₂ 骤降风险） ☐ 原发脑血管疾病史/严重凝血异常 ☐ 体外循环术后	管路固定与置管深度	动脉侧：_____ cm 静脉侧：_____ cm
七、多模态神经预后评估（≥ 72h 后）			
评估维度	工具/指标	良好预后信号	极差预后信号（需多项同时出现）
临床	GCS/脑干反射/瞳孔/运动反应	瞳孔有反应；GCS 渐升；恢复自主呼吸	GCS ≤4（无镇静+双侧瞳孔光反射消失+角膜反射消失
电生理	cEEG + SSEP	EEG 背景连续、有反应性；SSEP N20 存在	双侧 N20 缺失（SSEP）+ EEG 持续背景抑制/暴发抑制
影像	CT / MRI	无大面积梗死；灰白质分界清晰	CT：弥漫性脑水肿、灰白质分界消失、大面积脑梗死；MRI：广泛 DWI 高信号
超声	TCD	正常低阻波形；MFV 40-70	颅内血流停止（振荡波/收缩期尖峰/无信号）；PI 持续>2
生物标志物	NSE / S100B / GFAP	NSE < 33 μg/L（48h）；动态下降	NSE>60-80μg/L（48-72h）且持续升高；S100B 持续>0.5μg/L
多模态综合	上述所有	—	≥ 2 个维度的极差指标→ MDT 讨论撤除生命支持
八、镇静管理与每日神经状态核查			
原则	推荐		模式差异

一、患者基础信息登记表		
镇静方式	间断镇静（优于持续输注），每日 SAT（自主唤醒试验）	VA/ECPR：RASS -1 至-2，VV（清醒 ECMO）：RASS -1 至 0，鼓励清醒、交流、自主呼吸
肌松药物	尽量避免使用长效肌松剂，掩盖癫痫发作、阻碍神经体查和 EEG 判读	VA/ECPR 上机初 24h 可临时使用（TTM/寒战控制），之后尽早停用
每日神经唤醒	每日定时暂停/减量镇静，进行标准化神经状态专项检查	ECPR 亚低温期间无法停药——复温后立即评估
九、出院后长期随访计划		
随访时间节点	随访核心内容	推荐工具/量表
出院前	全面神经功能评估，确立神经基线	CPC（脑功能分类）、mRS（改良 Rankin 量表）
出院后 3 个月	躯体神经功能 + 认知筛查 + 心理初筛	MMSE / MoCA；HADS（焦虑抑郁）；PTSD 筛查
出院后 6 个月	生活质量评估 + PICS 筛查 + 认知深入评估	SF-36 / EQ-5D；MoCA；mRS
出院后 12 个月	完整神经心理评估（神经心理专科）	成套神经心理测验；mRS；重返工作/生活评估

本表覆盖 ECMO 患者从入 ICU 到出院后 1 年的全周期神经管理。ECPR 患者是本表最高优先级的适用对象。所有预后评估必须在复温+停镇静 ≥ 72h 后进行，绝不依赖单一指标判断。