



表 30 VV-ECMO 监测与管理规范：特殊情况管理规范

五、俯卧位通气与 VV-ECMO 联合管理		
E — Echo & Lung Ultrasound（床旁超声评估·每日必做）： E1. 肺部超声		
要点	说明	执行
适应症	VV-ECMO 上机时 PaO ₂ /FiO ₂ <150、或背侧肺实变明显、或 VV-ECMO 后仍低氧	☐
时机	上机 12-24h 后（排除出血禁忌），早期联合	☐
体位变换	俯卧 16h + 仰卧 8h；或根据耐受度调整	☐
操作要点	至少 4 人团队；专人保护管路（插管+ECMO 管路+呼吸机管路）；翻身前确认插管深度→翻身后再确认	☐
俯卧前核查	☐ 所有管路扎带牢固 ☐ 管道钳在手边 ☐ 插管深度标记清晰 ☐ 镇静镇痛充分 ☐ 气管插管气囊压力正常	☐
俯卧后核查	☐ 插管深度无变化 ☐ ECMO 流量无变化 ☐ 气道压无显著变化 ☐ 无管路脱出/扭结 ☐ 瞳孔/面部无压伤	☐
并发症	管路脱出（最危险）、面部/前胸压疮、气管插管移位、ECMO 流量波动	☐
六、无需抗凝的 VV-ECMO		
适用场景	说明	执行
活动性颅内出血	VV 可在无肝素下运行数天（即使有管路血栓风险也可接受）	☐
严重创伤伴多发伤	出血风险 > 血栓风险时	☐
术后活动性出血	如肺移植后	☐
PLT < 20 ×10 ⁹ /L	输血小板+无肝素	☐
七、每日决策检查清单		
决策问题	回答	
PaCO ₂ 下降速度合理吗？（尤其上机初 24h）	☐ 合理 ☐ 过快→↓扫气 ☐ 过慢→↑扫气	
自主呼吸保留了吗？	☐ 已保留 ☐ 不能（原因_____）	
再循环评估过了吗？	☐ 正常 ☐ 需关注 ☐ 需要干预	
扫气可下调吗？（PaCO ₂ 趋势）	☐ 可 ↓____ L/min ☐ 维持	
FiO ₂ （ECMO+呼吸机）可否下调？	☐ 可下调 ☐ 维持	
俯卧位做了吗？（如需）	☐ 已做 / 进行中 ☐ 计划今天做 ☐ 不必	
镇静可减量做清醒评估吗？	☐ 已做 SAT ☐ 不能	
肺部超声趋势如何？（实变→B→A 的方向）	☐ 改善中 ☐ 平台 ☐ 恶化	
是否达到撤机评估条件？（→启动表 46）	☐ 可评估 ☐ 尚未	
24h 管理目标设定了吗？	☐ PaCO ₂ 目标____ ☐ 液体净平衡目标____ ☐ 呼吸机调整目标____	

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO 抗凝指南（2021）；
相比 VA：VV 可在无全身抗凝下运行更长时间（血栓风险低）；
无抗凝期间：每小时检查管路/氧合器有无血栓；TMP 监测每 2-4h；流量维持>2.5 L/min 降低血栓风险。
VV-ECMO 的核心管理逻辑不同于 VA：你的任务是用 ECMO 换时间让肺休息、用呼吸机保持肺不塌、用扫气滴定 CO₂、用清醒保留人的尊严。