MATRIXYL® 3000

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Glycerin (56-81-5), Aqua (Water) (7732-18-5), Butylene Glycol (107-88-0), Carbomer (9007-20-9), Polysorbate 20 (9005-64-5), Palmitoyl Tripeptide-1* (147732-56-7), Palmitoyl Tetrapeptide-7 (-).*

MATRIXYL® 3000

MATRIKINAS REVELAM SEUS MELHORES ÂNGULOS DE EXPRESSÃO

Função
Anti-rugas.

Definição
O Matrixyl® 3000 contém as matrikinas pal-ghk e pal-gqpr que agem sinergicamente para reparar os danos do envelhecimento cutâneo.

Propriedades
O Matrixyl® 3000 contém matrikinas que são mensageiras da reestruturação e do reparo cutâneo. Elas ativam a neo-síntese das macromoléculas da m atriz extracelular, proporcionando ao Matrixyl® 3000 uma eficácia visível anti-rugas.

Características
Como moléculas mensageiras, as matrikinas são capazes de regular as atividades das células. Interagem com receptores específicos para ativar certos genes envolvidos no processo de renovação da matriz extracelular e proliferação celular. Com a idade, estes processos tornam-se progressivamente mais deficientes.

Aplicações
Produtos anti-rugas.

Formulação
Solúvel em água.

Nível de uso recomendado
3%

Patente
Wo 2005/048968

Testes de eficácia
Testes *in vitro*

SÍNTESE DAS MACROMOLÉCULAS MATRICIAIS
Estudo da estimulação da síntese dos componentes matriciais extracelulares por fi broblastos incubados por 72 horas com Matrixyl® 3000 (1, 3 e 5%).



ESTIMULAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA
Estudo da regulação dos genes dérmicos e epidérmicos pelas matrikinas do Matrixyl® 3000, utilizando a técnica do DNAArray na epiderme reconstruída e na cultura de fibroblastos.

As matrikinas do Matrixyl® 3000 mostram um perfil de ativação gênica complementar com relação aos mecanismos principais envolvidos na reestruturação cutânea

MATRIXYL® 3000

Testes de eficácia
Testes *in vivo*

EFICÁCIA ANTI-RUGAS
Um painel de 39 voluntários, homens de 54,5 ± 6 anos, aplicaram em esquema comparativo de hemiface, um creme contendo 4% de Matrixyl® 3000 contra um placebo, duas vezes ao dia durante 56 dias. A eficácia antirugas foi medida por profilometria e fotografia.

VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS COMPARADOS AO T0 (%)

	Matrixyl®3000	Placebo
Superfície ocupada por rugas profundas (<200µm)	- 29,4**	+ 5,1 ns
Densidade das rugas principais	- 30,4**	- 19,7 ns
Aspereza	- 8,4**	- 2,2 ns
Volume médio das rugas principais	- 17,1**	- 2,7 ns
Profundidade média das rugas principais	- 10,2**	+ 0,2 ns
Amplitude da ruga (ângulo)	- 5,4*	- 0,7 ns

ns : não-significativo *significativo / T0 (p<0,05) **significativo /T0 (p<0,01)

T0 – Hemiface direita MATRIXYL 3000


T0 – Hemiface esquerda placebo

T56 – Hemiface esquerda placebo

T56 – Hemiface direita MATRIXYL® 3000

Estocagem
Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado.

Caracteriticas Fisicos quimicas
Forma: Gel
Cor: Esbranquiçado
Odor: Característico
Ponto de Fusão: Não disponível
pH: 4,0 – 6,0
Densidade relativa: 1,14 – 1,16
Teor de água por Karl Fischer %: 20 – 30
Índice de refração: 1,425 – 1,445
Teor de PALGQPR(HPLC) ppm: 40 – 70
Bactérias Aeróbicas totais: Max. 100 UFC/g
Contagem total de Fungos e leveduras: Max. 10 UFC/g