Phloretin LEMMA

Potente ativo multifuncional

Phloretin LEMMA

É um potente flavonoide do grupo das diidrochalconas, encontrado na casca da maçã. Apresenta potente atividade inibidora da peroxidação lipídica da pele, consequência da ação dos radicais livres, que danifica a membrana celular, levando ao envelhecimento da pele, e outros sinais de envelhecimento.

Phloretin é eficaz contra os danos da pele causados por raios UV, além de apresentar potente atividade anti-inflamatória e antioxidante, apresentado eficácia clínica no tratamento da acne e dermatites. Ainda, Phloretin LEMMA possui a capacidade de aumentar a permeação cutânea e interagir com outros ativos antioxidantes naturais e sintéticos.

Evidências clínicas do Phloretin LEMMA

Eficácia do Phloretin LEMMA na prevenção dos danos cutâneos causados pela radiação ultravioleta

As áreas de teste nos antebraços de 18 indivíduos saudáveis foram tratadas com Phloretin LEMMA 0,5% ou formulação placebo por 30 min. Posteriormente, as áreas de teste foram irradiadas com 1,5 vezes da dose de eritema mínimo (MED) e o eritema induzido foi medido fotometricamente na primeira visita (linha de base: antes da irradiação UV), 0 (após a irradiação UV), 1, 2, 3 e 6 dias após a aplicação do ativo. O índice eritema foi avaliado pelo Mexameter®.

Avaliação da indução do eritema cutâneo



Avaliação da indução do eritema cutâneo



Atividade anti-inflamatória do Phloretin LEMMA



Phloretin LEMMA reduziu de forma extremamente significativa o eritema cutâneo provocado pela radiação UV. Além da potente atividade antioxidante do Phloretin, a forte capacidade de reduzir o processo inflamatório através da redução de ciclooxigenase-2 (COX-2), prostaglandina (PGE_2) e IL-6 demonstram a capacidade do Phloretin de prevenir os danos causados pela radiação UV.

Phloretin LEMMA

LEMMA

Phloretin LEMMA no tratamento da acne inflamatória:

Estudo recente demonstrou que o Phloretin LEMMA inibiu fortemente o crescimento do *C. acnes* e sinalização inflamatória mediada *C. acnes* pelo receptor Toll-like-2 em queratinócitos humanos.

Os pesquisadores concluíram que a atividade anti-inflamatória do Phloretin LEMMA está associada à via de sinalização de NF-κB mediada por TLR2 estimulada por *C. acnes*.

Phloretin LEMMA interage com os sítios ativos de JNK1 e KAS III, sugerindo seu envolvimento na inflamação induzida por *C. acnes* e seu potencial como alvos para a atividade antibacteriana do Phloretin LEMMA. Estes resultados demonstram que a Phloretin LEMMA pode ser útil na prevenção e/ou tratamento da acne.

Phloretin LEMMA na melhora da dermatite de contato alérgica:

Os resultados desse estudo, em modelo animal, revelaram que o Phloretin LEMMA reduziu o processo de espessamento epidérmico e diminuiu a infiltração de mastócitos nas regiões de lesão, posteriormente reduzindo os níveis de histamina e as citocinas pró-inflamatórias interleucina IL-6, IL-4, linfopoietina estromal tímica (TSLP), interferon-γ (IFN-γ) e IL-17A.

Além disso, Phloretin LEMMA suprimiu as vias da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) e NF-κB nos tecidos dérmicos dos animais tratados.

Tomados em conjunto, os resultados demonstram que Phloretin LEMMA tem potencial para ser utilizado como agente terapêutico alternativo para o tratamento da dermatite.

Formulário

Prevenção do fotoenvelhecimento

Phloretin LEMMA	5%
Sérum qsp	30ml
Modo de uso: aplicar em toda face, pescoço e colo pela manhã e à noite	

Formulação para acne

Phloretin LEMMA	5%
SkinBiotic® Bifid O	2%
SkinBiotic® Lact B	2%
Lytenol A® (Bakuchiol)	0,5%
Gel qsp	30ml
Modo de uso: aplicar em todas as regiões afetas, 2x ao dia.	

Formulação para dermatite

Phloretin LEMMA	5%
SkinBiotic® Bifid O	2%
SkinBiotic® Lact B	2%
Base ômega Gold qsp	30ml
Modo de uso: aplicar em todas as regiões afetas, 2x ao dia.	

ANTIAGING - REJUVENESCIMENTO

Phloretin LEMMA	5%
Lytenol A® (Bakuchiol)	1%
Dermahyal® Vitaplus Factor	1%
Sérum qsp	30ml
Modo de uso: aplicar em toda face, pescoço e colo pela manhã e à noite	

- **Dermahyal® Vitaplus Factor**: sistema exclusivo de reticulação (proteção) do ácido hialurônico, muito mais resistente à degradação enzimática, assim, o AH é degradado muito mais lentamente, permanecendo intacto na pele por um período prolongado.
- **Lytenol A®** modula os principais genes antienvelhecimento, estimula a produção de diferentes tipos de colágeno, estimula o sistema de defesa antioxidante, potente e significativo efeito inibitório das MMP-1 MMP-12 , demonstrando sua capacidade em reduzir a flacidez cutânea e a profundidade das rugas.

Pró-aging com ação antiacne de alta potência

Phloretin LEMMA	200 mg
GliSODin®	250 mg
DERMMA Biotic	50 mg
Excipiente qsp	1 dose
Administrar 1 dose ao dia.	

Phloretin LEMMA concentração usual: 0,2 – 5%

Phloretin LEMMA uso interno: 150-250mg ao dia

Referências: Shin S, et al. Int J Mol Sci. 2014 Oct 20;15(10):18919-40. Cheon D, et al. Molecules. 2019 Apr 3;24(7):1319. Wu CS, et al. Int J Immunopathol Pharmacol. 2020 Jan-Dec;34:2058738420929442. Oresajo C, J Cosmet Dermatol. 2008 Dec;7(4):290-7.

LEMMA (11) 5044-7234 lemma@lemma.com.br (11) 97443-2801 lemma.com.br
/lemma.supply @lemma.supply linkedin.com/in/lemmasupply

Representante Oficial
LUBRIZOL LIFE SCIENCE Driven by Innovation. Powered by Partnership
Lipotec™ Active Ingredients