PORETECT™

Caprylic/Capric Triglyceride – Sorbitan Trioleate – Apium Graveolens (Celery) Seed Extract – Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract

- **Complexo Vegetal para o tratamento de POROS FLACIDOS**
- **REFORÇA o invólucro de colágeno presente nos POROS**
- **AÇÃO ADSTRINGENTE e AÇÃO REDENSIFICANTE – SIMULTÂNEA**
- **UMA NOVA TEXTURA PARA UMA NOVA PELE: conceito GLASS SKIN**

A espessura cutânea e o seu microrelevo interferem na percepção de uma pele renovada. Poros dilatados, mais especificamente os poros flácidos pelo avanço da idade, fazem com que a pele tenha uma textura irregular, comprometendo sua radiância.

Figura 1: Atual conceito de beleza – GLASS SKIN contempla uma pele natural, sem manchas, fortemente hidratada e perfeição do microrelevo respeitando a integridade da barreira cutânea
(Fonte: Literatura **PORETECT™** - Sederma)

GLASS SKIN - o atual conceito de beleza possui como estratégia, além do clareamento de manchas, a perfeição do microrelevo cutâneo. Este conceito visa uniformizar o relevo da pele sem interferir na integridade da barreira. Uma dupla atividade contratora de poros é a proposta de **PORETECT™**, recém desenvolvido pela Sederma.

Figura 2: **PORETECT™** é composto por marcadores extraídos da linhaça e aipo obtidos pela técnica de extração CO2 Supercrítico (Fonte: Literatura **PORETECT™** - Sederma)

PORETECT™ é composto por um peptídeo cíclico obtido da linhaça e um éster obtido da semente do aipo. Estes marcadores naturais tratam a dilatação excessiva causada pela oleosidade e, principalmente, reforçam e protegem proteínas responsáveis por manter o tônus dos poros. O resultado desta ação combinada é a obtenção de uma nova textura para a pele.

RAIO X DOS POROS




A

B

Figura 3 e 4: Principais razões pelas quais ocorre a dilatação dos poros. **(A)** vista superficial da dimensão de poros **(B)** vista transversal avaliados por microscopia eletrônica: a diminuição da dilatação dos poros vai além do controle da hipersecreção sebácea. Controle enzimático e reforço da síntese proteica contemplam poros com maior tônus e densidade. Uma nova textura para uma nova pele.
(Fonte: Literatura **PORETECT™** - Sederma)

Na epiderme descobriu-se o aumento da produção de uma enzima chamada **estratifina** que é elevada na presença de raios UV e processos oxidativos. Uma das ações desta enzima é fragmentar proteínas que sustentam e mantem o diâmetro dos poros além de ativar a ação de MMP-1 e MMP2 quando atinge a derme.

PORETECT™ DIMINUI A PRODUÇÃO DE ESTRAFILINA E REFORÇA COMPONTENTES DA MEC: Culturas de células foram testados ou não com PORETECT™ e expostos a uma fonte de estresse (UVB), mesmo após estresse, culturas controle e tratadas com PORETECT™ tiveram desempenho distintos no que se refere a produção de estrafilina e componentes da MEC.



Figura 5: Avaliação IN VITRO em cultura de queratinócitos (1) e fibroblastos (2 e 3) onde foram mensuradas a produção de estrafilina e componentes da matriz extra celular respectivamente.
(Fonte: Literatura **PORETECT™** - Sederma)

PORETECT™ REFORÇA A FUNÇAO DE BARREIRA EPIDERMICA E ELEVA SUA HIDRATAÇÃO: Ao melhorar a qualidade da barreira PORETECT™ eleva a isotropia do relevo para um melhor relevo e reflexo da radiância.



Figura 6: **PORETECT™** eleva os principais componentes que reforçam a função de barreira epidérmica.
(Fonte: Literatura **PORETECT™** - Sederma)

PORETECT™ PROMOVE REVITALIZAÇÃO DA ARQUITERURA DÉRMICA: preserva as estruturas de apoio da matriz dérmica contra o envelhecimento prematuro reprimindo a produção de agentes antimatriz dérmica (estratifina e proteasas) e promove o reforço das principais moléculas chave na vitalidade da derme (PIP, colágeno e elastina).



Figura 7: Reforço da arquitetura dérmica e proteção contra a ação da estrafilina e enzimas proteolíticas. (Fonte: Literatura **PORETECT™** - Sederma)

PORETECT™ REDUZ A INFLAMAÇÃO: Outra proteína também produzida na epiderme conhecida como **Regnase 1** possui finalidade protetora contra vários processos inflamatórios. Regnase 1 controla os efeitos genotóxicos induzidos pelo NF-κB e desta forma participa da homeostase imunológica da pele. Diminui a liberação de IL-6, IL-8 e demais mediadores inflamatórios que contribuem para oxidação e envelhecimento prematuro da pele.



Figura 8: **PORETECT™** eleva a produção de REGNASE 1 que promove ação antinflamatória contra IL-6, IL-8 e PGE2. (Fonte: Literatura **PORETECT™** - Sederma)

PORETECT™ DIMINUI OS POROS NA PELE MADURA

31 voluntários com idade entre 35 a 58 anos utilizaram duas vezes ao dia um creme contendo PORETECT™ a 3%. Após 8 semanas uma avaliação microscópica a laser confocal VivasScope® 3000 foi realizada:



Figura 9: **PORETECT™** aumenta em 14,4% o invólucro de colágeno ao redor dos poros devolvendo sua propriedade viscoelásta (Fonte: Literatura **PORETECT™** - Sederma)



Figura 10: Melhora do microrelevo cutâneo após dois meses do uso de PORETECT™ 3% duas vezes ao dia (Fonte: Literatura **PORETECT™** - Sederma)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

PORETECT™ é um blend lipossolúvel obtido a partir da extração de marcadores da semente de linhaça e aipo por CO2 Supercritico. Desta forma:

pH: estabilidade em ampla faixa de pH (3,0 – 7,5)

Temperatura: deve ser incorporado abaixo de 45 graus

DOSAGEM DE USO: 3%

APLICAÇÕES:

Produtos de higiene para pele oleosa e madura

Tratamento de poros dilatados (oleosidade ou flacidez)

Anti Aging e produtos relacionados ao conceito GLASS SKIN

Potencialização de formulações esfoliantes

Máscaras de tratamento PEEL OFF

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Literatura Original – **PORETECT™** by Sederma © – CRODA GROUP